











**<36634539490015**

**<36634539490015**

**Bayer. Staatsbibliothek**

dec. 1840.

*Oeconomia. Silvarum cultura.*  
*Plantae silvaticae. 365.*

~~*Oeconomia. 230.*~~

R

Theoretisch . praktisches

# H a n d b u c h

der Naturgeschichte der Holzarten

für den Forst- und Landwirth,

in welchem

ausser einer systematischen Eintheilung, vollständigen Anführung  
der Haupt- und Trivialnamen und genauen Beschreibung,  
sowohl der inn- als besonders nußbaren ausländischen Bäume  
und Sträucher, vorzüglich auf deren Benutzung und Cultur  
Rücksicht genommen worden

von

Friedrich Ludwig Walther

Professor zu Gießen.

---

Bayreuth

bey Johann Andreas Lübeck's Erben.

1793.

**BIBLIOTHECA  
REGIA  
MONACENSIS**

Er. Wohlgebohrn

H e r r n

J o h a n n B e c k m a n n

Königl. Grosbr. und Churhan. Hofrath, der Cameral-  
wissenschaften ordentlichem Professor zu Göttingen

widmet dieses Handbuch

a l s

Denkmal

seiner immerwährenden Hochachtung und Verehrung

der Verfasser.

11 11 2 III 2 2 2 11 11 2 2 2

11 11 2 III 2 2 2 11 11 2 2 2

11 11 2 III 2 2 2 11 11 2 2 2

11 11 2 III 2 2 2 11 11 2 2 2

11 11 2 III 2 2 2 11 11 2 2 2



---

## V o r r e d e.

---

Es ist ein erfreulicher Gedanke die immer mehr steigende Erweiterung und Vervollkommnung der Cameralwissenschaften, welche von so erwiesenem großen Einfluß in das Wohl der Nationen sind, wahrzunehmen. Man hat sich in unserem Zeitalter, wo die Cameralistik erst ihre eigentliche wissenschaftliche Form erhielt, rühmlichst bemüht, die Gränzen dieser Wissenschaft selbst, sowohl als derjenigen Hauptwissenschaften welche das ganze System constituiren, genauer zu bestimmen. Hiedurch mußte eine sorgfältigere Bearbeitung der einzelnen Theile und dadurch mehr Größe und Würde des ganzen Gebäudes entstehen. Man kann unterdessen nicht in Abrede stellen, daß diese Wissenschaften immer noch einer größern Ausbildung fähig sind. Vorzüglich sind es die Vorbereitungswissenschaften, die man mit Recht von den Hauptwissenschaften im Lehrvortrage

getrennt hat, welche noch mehr ausgebildet zu werden verdienen, da sie der Grund sind, auf welchen das ganze Lehrgebäude erbaut werden muß. Oekonomie (reine) Naturkunde (Naturlehre in Verbindung mit Chemie und Naturgeschichte) und Mathematik sind die eigentlichen propädeutischen Wissenschaften, mit deren Erlernung ein junger Cameralist, der planmäßig studiren und sich einen glücklichen Erfolg seiner Bemühungen und seines Fleisses versprechen will, den Anfang machen soll: denn sie enthalten theils die Geschichte der Naturkörper mit welchen sich die Hauptwissenschaften beschäftigen, theils die Gründe der Art sie zu behandeln und zu benutzen, welche in den Hauptwissenschaften, der Landwirthschaft, Forstwirthschaft, Technologie, gelehrt wird.

Folgende Schrift über die reine und angewandte Naturgeschichte der Holzarten mag als ein Beitrag zu diesen Vorbereitungswissenschaften gelten. Meine Absicht war nicht bloß eine Forstbotanik zu liefern, sondern ein Handbuch der allgemeinen und besondern Dendrographie, worein außer unsern sämtlichen einheimischen Holzarten, auch alle diejenigen aufgenommen werden sollten, die wegen ihres erwiesenen Nutzens in den verschiedenen Zweigen

gen der Oekonomie, dem Staatswirthes werkwürdig sind, zu Vorlesungen und zum Selbstunterricht, für diejenigen, welche fremden entbehren müssen. Bey jeder Art sind die Synonymen, dann die davon handelnden Schriftsteller angeführt worden. Hierauf folgt die Diagnose, auf diese die Beschreibung und dann der Nutzen nach ihren verschiedenen Theilen. Von der Culturart habe ich immer die wesentlichsten Umstände angeführt, und jedesmahl auf die bewährtesten Schriftsteller hingewiesen. Da ich diese Schrift selbst als Handbuch bey meinen botanischen Vorlesungen gebrauche; so wurde bey den hiesigen Holzarten, immer deren Standort mit ein paar Worten angemerkt.

Auf diejenigen, welche Forstwissenschaft studiren, mußte darinnen hauptsächlich Rücksicht genommen werden, denn auf ihre Veranlassung und um ihrer willen entwarf ich diese S. S. zuerst. Gelegentlich benützte ich Veranlassungen, die sich mir freiwillig anboten jungen Freunden der schönen Gartenkunst, einige lehrreiche Winke zu geben.

Vielleicht daß mancher Jüngling durch den Gebrauch dieser Schrift auf weiteres Nachdenken geleitet und mancher junge Forstmann durch diese



## Vorrede.

Schilderungen auf ihre Gegenstände in der Natur aufmerksam gemacht wird, sie in deren Schöpfungsstätte selbst zu studiren.

Uebrigens habe ich die Namen und Schriften meiner Vorgänger überall getreu angeführt, und jede Gelegenheit die sich mir darbot die Natur selbst zu studiren, sorgfältigst benützt. Wenige Holzarten sind hier beschrieben, die ich nicht selbst untersucht habe. Die Gießler Dryas ist auch schon sehr reichhaltig, und was sie nicht besitzt, fand ich in Ziegenberg, (anderthalb Stunden von Burg Friedberg) einen Dorfe, wo dessen Besitzer der Freyherr von Dieder zum Fürstenstein, Königl. Dänischer geheimer Rath, einen Park angelegt hat, worinnen man über zweihundert Holzarten antrifft. Man findet hier Bäume aus dem südlichen Europa, aus Italien, ferner aus Nordamerika, und manche Holzart z. B. *Prunus Laurocerasus*, *Bignonia Catalpa*, u. a. im freyen trefflich ausbauern, was man von dem Clima der Wetterau vor zwanzig Jahren wohl nicht vermuthet hätte.

Was nun endlich die von mir in dieser Schrift aufgestellte Eintheilungsmethode der Holzarten anlangt; so ist sie eine gereinigte Sexualmethode.

Holz.

Holzarten, deren Geschlechtsstand variirt, habe ich ganz von denen, die einen bleibenden haben, getrennt, und gewiß ist diese Eintheilung praktisch brauchbar für den Land- und Forstwirth, so wie sie Anfängern das auffuchen erleichtert. Bey der Classe: Mit bleibenden Geschlechtsstande sind zwey Unterclassen angenommen worden.

I. Zwittergeschlecht. Hermaphrodita  
und zwar mit

- a) Zwitterblüthen H. monoclina.
- b) Mit männlich- und weiblichen Blüten auf einem Stamme. H. diclina.
- c) Mit Zwitter- und männlich- oder weiblichen Blüten auf einem Stamme.

Diese Unterklasse hat eine einzige Holzart: Celtis, aufzuweisen. Wahrscheinlich finden sich auch Zwitterbäume und dann gehört sie in die Familie mit abwechselnden Geschlechtsstande. Mir ist aber noch kein Zwitterbaum vorgekommen. Ueberhaupt wird man, je mehr Polygamisten untersucht werden, finden, daß diese Classe nicht in der Natur gegründet ist.

II. Getrenntes Geschlecht. Dioecia.

Eine ganz einfache und in der Natur gegründete Methode, die ich zur Prüfung und Läuterung mit  
Schmie-

Vorrede.

Schmiedels Worten empfehle: Cum satis constet, modestum dissensum, neque veritati, neque scientiis umquam nocuisse: nemini molestum erit, si ea declaramus, quae nobis magis probantur, quantumvis ab aliorum placitis recedunt.

In Ansehung der Register bemerke ich endlich noch, daß die von mir gewählten Hauptbenennungen der Holzarten, sowohl der Gattungen als Arten und Abarten, zum Unterschied der Synonymen und zu mehrerer Bequemlichkeit beym Auffuchen, etwas vorgerückt worden.

Giessen den 2. Oct. 1792.

J. E. Walther.

---

# E i n l e i t u n g.

---

## §. 1.

**D**endrographie oder Holzkunde ist derjenige Theil der Gewächskunde, welcher in einem wissenschaftlichen Zusammenhange die theoretische (reine) und angewandte Naturgeschichte der Holzarten enthält. Eine Wissenschaft von Wichtigkeit nicht bloß für den Freund der Natur und für den der nach praktischen Kenntnissen in der höhern und niedern Forstwissenschaft strebt, sondern überhaupt für den Cameralisten, indem sie unter die Vorbereitungs-Wissenschaften des Cameral Lehrgebäudes gerechnet wird.

Anm. 1. Der Name Dendrographie ist alt, S. Johnstons Dendrographie. Frankf. 1662. und kann durch Holzkunde gut übersetzt werden. Von Dendrologie aber könnte man ihn noch unterscheiden, wie Physiologie und Zoologie unterschieden werden.

2 Für den Forstwirth hat dieser Theil der Gewächskunde ungemein viel Interesse. S. eines Ungenannten Versuch einer Widerlegung der irrigen Meinung verschiedener Forstmänner u. s. w. in Mosers Forstarchiv. VIII. 32. v. Burgsdorf Forsthandbuch. S. 20. Beyträge zur Forst-Cameral-Wissenschaft. Nürnberg 1790. S. 115. Naus Anleitung zur deutschen Forstwissenschaft. Maynz 1790. S. 26.

Ich bin überzeugt, daß, jemehr die Kenntniß der Holzarten und ihres Nutzens und Cultur allgemein wird, jemehr sie sich über alle Stände verbreiten wird, destomehr neue Quellen der Nahrung sich eröffnen, ältere durch sie verbessert und erweitert, destomehr Hände beschäftigt (und was will dieses nicht in unserm Zeitalter sagen?) die Erde verschönert, und die Mittel unsre Existenz zu erleichtern und zu erhöhen, vervielfältiget werden.



## §. 2.

Bekanntlich werden sehr allgemein die Gewächse in der Gewächskunde eingetheilt in

A. Phaenogamia, welche die Familien der

a) Holzarten, b) Pflanzen, c) Gräser und Halbgräser enthalten, und in

B. Cryptogamia.

Holzarten aber bedeuten — im botanischen Sinn, diejenigen Gewächse mit kenntlichen Befruchtungswerkzeugen, welche sich durch einen oder mehrere Schaft oder Stengel von holziger Substanz und mehrjähriger Dauer von den Pflanzen und Gräsern unterscheiden. Hieher gehören also alle Bäume, Sträucher und Erdhölzer, sie mögen wild wachsen oder in Gärten erzogen werden, Obstfrüchte tragen oder nicht. In einem beschränktern Sinn nimmt der Forstwirth dieses Wort, indem er unter Holzarten diejenigen Bäume und Sträucher versteht, welche Gegenstände der Forstwirthschaft sind.

Von Burgsdorf Forsthandbuch. S. 41 — 45. v. Werner's Anleitung zur gemeinnützigen Kenntniß der Holzpflanzen. Frankf. 1791. S. 23.

## §. 3.

Wer nun die Naturgeschichte der Holzarten besonders studiren will, muß zuvor die allgemeine Gewächskunde erlernen. Diese ist die Grund- und Stamm-Wissenschaft der Holz-Pflanzen- und Graskunde (Dendrographie, Phytographie, Agrostographie) in welcher immer auf jene hingesehen wird, und wenn sich gleich diese drei aus ihr ausfließenden und der Gewächskunde untergeordneten Wissenschaften, von ihr selbst abgesondert darstellen lassen; so sind doch die Gränzlinien, welche ihre allgemeinen Theile trennen, nicht so genau zu bestimmen, daß sie sich nicht an manchen Stellen unvermerkt in einander verlieren sollten. Wer eine allgemeine Naturgeschichte der Holzarten liefert, muß daher die Gränzen respectiren, die ihm diese Wissenschaft selbst vorzeichnet. Zweckwidrige

Aus



Ausschweifung würde es seyn, in einer allgemeinen (reinen, theoretischen) Dendrographie, alle Arten von Geschlechtsstand, Blütenstand, Blüten, Blättern, Früchten u. zu beschreiben. Nur diejenigen gehören hieher, welche bey den Holzarten gefunden werden.

§. 4.

Als Hülfswissenschaften gehören hieher

A. Die botanische Terminologie überhaupt: welche in folgenden Schriften erklärt zu finden ist,

C. a Linné Termini botanici explicati. etc. curavit D. Giseke. Hamburg 1781. C. a Linné Termini botanici explicati. Lips. 1767. Dietrichs Anfangsgründe der Pflanzenkenntniß. Leipz. 1785. C. a Linné termini botanici dissertatione academica explicati. Erlangae 1789. Onomologia botanica completa. Frankf. und Leipz. 1772. IX. Theile. v. Berner l. c. I. 261. in alphab. Ordnung.

B. Die Kenntniß der Synonymie der Holzarten.

Aus deren Unkunde große praktische Fehler entstehen können.

Anm. 1. H. H. Beckmann macht bey Gelegenheit einer Recension in seiner phys. öf. Bibliothek. B. XVI. S. 443. folgende sehr wahre Anmerkung: „Bey einer neuen Ausgabe (der Forsttabellen) würde ich rathen, die systematischen Nahmen jeder Art beyzusetzen. Es ist doch nun endlich wohl allgemein anerkannt, daß zur gründlichen Kenntniß des Forstwesens, die Botanick durchaus nicht entbehrt werden kann, und in vielen Ländern finden wir auch doch schon einige unter den untern Forstbedienten, so wie unter den Gärtnern, welche sich mit der botanischen Terminologie zu behelfen wissen. Bekanntlich sind die deutschen Nahmen bey sehr ähnlichen Arten nicht bestimmt genug.

S. auch von Burgsdorfs Forsthandbuch. 103. Batsch, Versuch einer Anleitung zur Kenntniß und Geschichte der Pflanzen. I. S. 316.

2. In der angewandten Naturgeschichte der Holzarten sind die Synonymen bey jeder Art genau angegeben worden, und wo ich nur den mindesten Zweifel hatte, habe ich ein Fragzeichen beygefügt. Daß man alle Ursache habe hierinnen so ge-

nau als möglich zu seyn, beweiset H. P. Schrank in seiner Bayer'schen Flora. Vorrede. S. 41 — 46.

## §. 5.

Als Hülfsmittel gehören hieher:

## A. Abbildungen

a) Kupferstiche — illuminirt oder schwarz. b) Gemählde. c) Abdrücke.

## B. Aufgetrocknete Blatt- und Blütensammlungen.

## C. Holz-Bibliotheken oder Kabinette.

## D. Gut angelegte Holzgärten.

Anm. Abel und Reiter haben die in dem Burgsdorffschen Handbuch beschriebenen Arten in schwarzen und illuminirten Kupfern geliefert. Andre Abbildungen kommen in der Folge bey jeder Holzart vor. Sehr lehrreich über dergleichen Abbildungen sind die Anmerkungen des H. Prof. Nau l. c. S. 7. Not. 4. Des H. H. Suclow's, in seiner theor. und ang. Botanik. I. S. 143. Des H. Ehrhards in seinen Beiträgen. V. 14. Batschens l. c. 319. und die erwähnten Beiträge zur Forst-Cameral-Wissenschaft. S. 417. Von Gemälden hat H. Jacquin vorzügliche Muster geliefert in seiner historia stirpium selectarum americanarum, coloribus vivis pictarum. Die Pflanzenabdrücke der H. Junghaus, Happe und Martius, der dieses ehemahlige Geheimniß in seiner Anweisung Pflanzen nach dem Leben abzudrucken, Wezlar, 1784 besonders bekannt gemacht hat. Aufgetrocknete Exemplare sind zu haben bey H. Botanicus Ehrhard in Herrnhausen. S. dessen Index arborum fruticum et suffruticum Linn: quos in usum Dendrophilorum collegit et exsiccavit F. Ehrhart. in seinen Beiträgen. Heft V, S. 158. Holzkabinette liefern: H. Belzermann in Erfurt und H. Candid. Huber, Pfarrvikar zu Ebersberg in Bayern. S. Mosers Forstarchiv. III. 326. XII. 354. Von botanischen Gärten S. Batsch. 331. Medicus, Beiträge zur schönen Gartenkunst. Mannh. 1782. 124.

## §. 6.

Die Kenntniß und Uebersicht Dendrologischer Schriften wird durch folgende Eintheilung erleichtert:

## I. Bibliotheken.

Boehmeri Bibliotheca historiae naturalis. Lips. 1784.  
Beckmanns ökonomisch-physic. Bibliothek. Göttingen.

## II. All-

## II. Allgemeine Dendrographie.

Traité des arbres et arbustes etc. par Mr. du Hamel. a Paris 1755. deutsch Nürnberg 1762. Knoop's Dendrologia. Te Leuwarden 1763. Physique des arbres par M. du Hamel. a Paris 1758. deutsch Nürnberg 1764 und 1765.

The Construnction of timber by Hill. London 1770.

Enderlin, Natur und Eigenschaften des Holzes. Basel 1770.

Weiß, Entwurf einer Forstbotanik. Göttingen, I. 1775. Lehrbuch für die Pfalzbaner'schen Förster Der zweite Theil München 1788. v. Berner's, Anleitung zur gemeinnützigen Kenntniß der Holzpflanzen. Frankf. 1791. I. 1792. II. Ein vorzügliches Werk hat das Publikum von dem H. R. R. Medicus zu erwarten.

## Besondre Dendrographie.

Beschreibungen einheimischer Holzarten kommen vor:

- a) in allgemeinen Pflanzensystemen, b) Lehrbüchern der Botanik und Forstwirthschaft, c) Naturhistorischen Reisen und Briefen, d) Schriften gelehrter Gesellschaften \*), e) Floren \*\*), f) Dryaden \*\*\*).

Märter's, Verzeichniß der Bestr. Bäume und Stauden. Wien 1781. Borkhausens, Versuch einer forstbotanischen Beschreibung der in den Hessen Darmst. Landen im freyen wachsenden Holzarten. Frankf. 1790. Karner's, Beschreibung und Abbildung der Bäume und Sträucher, welche im Herzogthum Württemberg wild wachsen. Stuttgart 1785. Bellermann's, Abbildungen zur Kenntniß der vorzüglichsten in- und ausländischen Holzarten nebst deren Beschreibung. Erfurt 1788. Becker's, Beschreibung der Mecklenb. Holzarten. Rostock 1791. Andrea, Charakter inländischer Forstbäume in Tabellen. Frankf 1790.

\*) Sie werden in der Folge bey jeder Holzart angeführt.

\*\*) Flora ist ein Verzeichniß und naturhist. Beschreibung der in einer bestimmten Gegend wild wachsenden Gewächse.

\*\*\*) Unter Dryas versteht man ein naturhist. Verzeichniß und Beschreibung der in einer bestimmten Gegend wildwachsenden Holzarten, unter Pomona eine naturhist. methodisch geordnete Beschreibung der Obstbäume, die in einer bestimmten Gegend kultivirt werden.



Crantz, *Stirpium austriacarum*. fascic. I. II. Viennae 1762. 63.

Abbildung der wilden Bäume und Stauden von Delhasen von Schöllenbach. Nürnberg I. 1767. II. und III. 1788. Oestreichs allgemeine Baumzucht, von H. Schmidt. Wien 1792.

g) in Monographien. Die bey jeder Holzart, von welcher sie vorhanden sind, angeführt werden.

h) in medicinisch-botanischen Schriften.

Anleitung zur Pflanzenkenntniß nach Linne von Jacquin für Apotheker. Mannh. 1787. Happii botanica pharmaceutica. Berol. 1787. Gleditsch botanica medica. Berol. I. 1788. II. 1789. (1 Rthl. 16 gr.) Ebenb. vollständig theor. prakt. Geschichte aller in der Arznei, Haushaltung ic. nützlich befundener Pflanzen. Berlin 1777.

i) in Oekonomisch-botanischen Schriften.

Ehrhards, ökonomische Pflanzenhist. Ulm 1756 — 1762. Suckows, ökonomische Botanik. Mannheim 1777. Weizensbeck's, ökonomische Pflanzengeschichte. München 1787. Bryants, Verzeichniß der zur Nahrung dienenden einheimischen und ausländischen Pflanzen. Leipzig 1785. Naturgeschichte der vornehmsten nutzbaren einheimischen Pflanzen. Elbingen 1787.

## §. 7.

Ausländische Holzarten, die für uns schicklich sind, und unter unserm Himmelsstrich ausbauern, findet man vorzüglich in folgenden Schriften beschrieben.

Gmelins Reisen durch Sibirien. Ebenb. Flora sibirica. Petropoli 1747. 1749. Pallas flora rossica. Francof. Hasselquist's, Reisen durch Palästina. Rostock 1762. Haller historia stirpium indigenarum Helvetiae. Bernae 1768. Ebenb. Enumeratio method. stirpium. H. Gött. 1742. Oederi Flora danica. Hafn. 1761. Müncchs, Verzeichniß ausländischer Bäume und Stauden. des Lustschloßes Wetzenstein. Frankf. 1787. Du Roi, die Harblesche wilde Baumzucht. Braunschweig 1772. 2. Bände. Kalm's Reise in das nördl. Amerika in der Sammlung neuer Reisen. Linnés Reisen durch das Königreich Schweden. I und II. Leipzig 1756 und 1765. Ebenb. Reisen durch Deland und Gothland. Halle 1764.

1764. v. Wangenheim's Beitrag zur deutschen Holzgerechten Forstwissenschaft. Göttingen 1787. Marshals, Beschreibung der wildwachsenden Bäume und Staudengewächse in den vereinigten Staaten von Nordamerika. Leipzig 1788. Schoepff, Materia medica americana. Erlang 1787. Carver's, Reisen durch die innern Gegenden von N. Amerika. Hamburg 1780.

---

## Allgemeine oder theoretische Naturgeschichte der Holzarten.

---

### §. 8.

#### I. Botanik.

Die einfachsten festen Theile der Holzarten sind Fasern d. i. hohle Gefäße, die in Rücksicht ihrer Bildung von zweyerley Art gefunden werden:

##### a) Schnurförmige.

Sie werden Schlauchreihen, Utriculi genannt, wenn sie wasserrecht an einander gereiht sind —

Saftgefäße, Vasa succosa, wenn sie nach der Länge des Gewächses fortgehen.

##### b) Spiralgefäße, Vasa spiralia.

Sie sind schraubenförmig gewunden und bilden ein fortlaufendes Gefäß. Diese Gefäße, welche bisweilen selbst im versteinerten Holze noch sichtbar sind, wachsen, so wie das ganze Gewächs wächst und verändern sogar in der Folge zum Theil ihre Substanz.

Abbildungen, Leipziger Magazin zur Naturkunde. 1781. III. f. 6. 7. 10. Ledermüllers Nachlese. Sammlung I. 40. Hales Statik der Gewächse. Die zur Einleitung gehörige Tafel. Agricola, Versuch einer allgemeinen Vermehrung aller Bäume. Regensburg 1772. S. 28. v. Burgsdorfs

Versuch einer vollständigen Geschichte vorzügl. Holzarten. I. t. 19. Du Ham. Naturgeschichte der Bäume. II. 231. Hedwig de fibrae vegetabilis et animalis ortu. Lips. 1789.

§. 9.

Aus diesen Fasern bildet die Natur die zusammengesetzten Theile, unter welchen wir zuerst das Oberhäutchen (Cuticula, Epidermis) wahrnehmen. Es bekleidet alle Theile des Baumes von aussen, ist bey einigen Holzarten einfach, bey andern vielfach zusammengesetzt und wird von verschiedner Dichtigkeit gefunden. Es ist ferner mit einsaugenden und ausführenden Gefäßen versehen, reproducirt sich, wenn es weggenommen wird, und manche Holzarten erneuern es alle Jahre.

Gleditsch, Forstwiss. I. 115.

§. 10.

Durch die Verhärtung der Gefäße wird eine andere Hauptsubstanz der Holzarten bemerkbar — Das Mark (Medulla) ein Aggregat häufiger großer Schläuche und feiner Gewebe. In dieser Holzart ist es von dichter, in jener von lockrer Textur, hier wird es in Menge, dort sparsam gefunden, ja selbst in ein und eben derselben Holzart wandeln diese Umstände nach den verschiednen Theilen und im ganzen nach dem Alter derselben. So findet man es auch in den verschiednen Holzarten und Altern desselben oft von verschiedener Farbe.

Du Hamel. l. c. 67. 72. Schriften der Kaiserl. Academie der Naturf. X. 131. v. Burgsdorfs Versuch. I. 113. Ebend. Forsthandbuch. 47. Gleditsch. 98.

§. 11.

Die zweite Hauptsubstanz — der rindige Ueberzug (Substantia corticalis) welche jene einschließt, hat ein mehr festes faseriges Gewebe, dessen Maschen nach aussen immer größer werden. Es zeigt uns verschiedne Schichten oder Lagen:

a) die



a) Die innerste — Holz (lignum) genannt, auf welches b) der Splint (Alburnum) folgt, welcher von dem c) Bast (liber) umgeben ist, den d) die Borke (Cortex, Parenchyma,) als die letzte äußerste Schicht des rindigen Ueberzuges, einschließt, welche dann das Oberhäutchen bekleidet.

Alle diese Schichten haben denselben Bau, dieselben Bestandtheile, nur durch die Grade der dichtern Textur unterscheiden sie sich, sie werden von denselben Faserbündeln oder Zellenhaufen durchbohrt, aber das Netz wird nach innen zu immer feiner.

Du Hamel. l. c. 44. v. Burgsdorfs Forsthandbuch 50. Gleditsch. F. W. I. 103. — 114. Abbild. v. Burgsdorfs Versuch. t. II. f. 6.

### §. 12.

Die flüssigen Theile der Holzarten sind, was ihre Farbe, Consistenz, Geruch, Geschmack, Mischung und Eigenschaften betrifft, sehr verschieden. Oft trifft man eine sehr bemerkbare Verschiedenheit der Natur der Säfte einer und eben derselben Holzart in ihren verschiedenen Theilen an. Sie sind bald häufig, bald sparsam vorhanden, und in ihrer Bewegung hauptsächlich von der Structur der Saftgefäße und der atmosphärischen Wärme abhängig.

Du Ham. l. c. II. 181. v. Burgsdorfs Versuch. I. 132. Ebend. Forsthandbuch. 52 — 55. Gleditsch Forstwirtschaft. I. 116 — 128.

### §. 13.

Unter den Organen der Holzarten zieht die Wurzel zuerst unsre Betrachtung an sich. Auch bey diesem Theile finden wir eine mannichfaltige Verschiedenheit in Ansehung ihres Standorts und der Anfügung in denselben, nach welcher manche flach, andre tief in die Erde gehen, oder auch auf der Erde weglaufen, manche Holzarten eine Pfahlwurzel mit starken Seitenwurzeln haben, andre

nicht. Manche haben eine senkrechte Richtung, andre gehen kriechend oder sind sprossend. Ihre Substanz, Querschnitt, Oberfläche und Verbindung mit dem Stamme, ist gleichfalls verschieden.

Gleditsch. I. 120 — 134. v. Burgsdorfs Forsthandbuch. 55 — 56. Du Ham. I. 101.

#### §. 14.

Stamm ist der verlängerte Theil der Wurzel über der Erde. Er ist strauchig oder baumartig. Bey Stämmen der Bäume aber unterscheidet man

- a) den eigentlichen Schaft, dessen Höhe und Stärke durch angenommene Maasse bestimmt wird.
- b) die Krone, welche die Aeste und Zweige (Zacken) trägt, an welchen die Blätter, Blüten und Früchte zum Vorschein kommen.
- c) Den Zopf, den obersten Theil der Krone.

Man findet aber eine große Verschiedenheit, was die Richtung der Stämme, ihre innre Substanz, ihren Querschnitt, ihre Oberfläche und äußre Bekleidungen betrifft.

Gleditsch. 140. v. Wernck. 80. v. Burgsdorfs Forsthandbuch. 57.

#### §. 15.

Nach Beschaffenheit der Aeste leiden die Stämme verschiedne Eintheilungen. Die Aeste und Zweige unterscheiden sich ihrem verschiednen Stande nach, welcher vorzüglich in dem besonders bestimmten Sitz der Knospen oder Augen, seinen Grund hat. Merkwürdig ist das Abwerfen der Zweige bey manchen Holzarten (*Diospyros virginiana*, *salix fragilis*) und das sogenannte Abspringen (*Pinus picea*).

#### §. 16.

Die Blätter bestehen aus solchen Bestandtheilen, die nach vorhergegangenen Veränderungen in die Holzsubstanz selbst übergehen. Sie erscheinen an verschiednen Stellen,



Stellen, wovon sie verschiedene Beynahmen erhalten. Andre bekommen sie von der Ordnung, nach welcher sie an den Zweigen neben einander stehen, wiederum andre von der Art ihrer Richtung und Einfügung. Was ihre Gestalt betrifft; so finden wir sie nicht wenig verschieden in Rücksicht der Hauptfigur ihres Umkreises, ihres äussern Umrisses, ihres Randes, ihrer Spitze. So findet man auch eine Verschiedenheit in Ansehung ihrer Zusammensetzung, Dauer, Flächen, und des Verhältnisses derselben gegen einander.

v. Berncke. 91. Suckow. 18. Batsch. 90. v. Burgsdorf. 58 — 61. Gleditsch. 152. 165 — 74.

### §. 17.

In der Nähe der Zweige und Blattstiele kommen die Blattanfätze zum Vorschein. Sie sind bald beständige bald unbeständige Theile, von bestimmter oder veränderlicher Farbe, und diejenigen, welche an der Basis des Blattstieles erscheinen, dienen zu charakteristischen Unterscheidungszeichen der Arten. Die Deckblättchen befinden sich in der Gegend der Blüten und unterscheiden sich untereinander durch besondere Eigenschaften. Bey manchen Holzarten trifft man auch gewundene Fortsätze an, welche Gabeln genannt werden, deren Stand und Vertheilung verschiedenartig gefunden wird. Die Wassen werden in Dorne, (harte stehende Auswüchse die aus der Holzsubstanz selbst hervortreten (Prunus spinosa) und Stacheln, (die blos aus der Rinde hervormachsen,) getheilt. Auch kann man die Brennspiken hieher rechnen. Blätter, Zweige und Stämme sind bisweilen noch mit besondern Ueberzügen, Haaren, Wolle, Filz u. d. gl. besetzt, zu welchen Ueberzügen auch manche die ausschweifenden Gäfte rechnen, weil ihre Beschaffenheit der Oberfläche derjenigen Theile, die sie bekleiden, mancherley Verschiedenheit giebt.

Gleditsch. 175 — 181. v. Wernck. 115. v. Burgsdorf. 61. Batsch. 119. 206.

### §. 18.

## §. 18.

Knospen sind aus der Oberfläche sprossende organische Theile, anfangs von den übrigen verschieden, werden ihnen aber bey fernerm Wachsthum ähnlich und ein Theil der Mutterpflanze, von welcher er getrennt, ohne vorhergegangene Befruchtung zu einer neuen erwachsen kann. Sie brechen in Gestalt kleiner Knoten aus der Rinde hervor, und enthalten a) nur Blattstiele oder Blätter, oder Blattansätze, oder Blüten, oder Blüten und Blätter zugleich, b) diese Theile auf verschiedene Art eingeschlossen, und zeigen eine c) verschiedene Gestalt, d) Farbe und e) Ueberzüge. Sie sind identische Theile mit der Mutterpflanze, in den Körper der Mutter eingewurzelt, bringen eigentlich selbst keine neue Gewächse hervor, sondern nur neue Exemplare der alten. Sie erleichtern dem aufmerksamen Forstmann die Kenntniß der Bäume im Winter.

Gleditsch. 181 — 90. Batsch. 114. 276. v. Burgsdorf. 62. v. Wernck. 131. Sukow. 103. Besonders aber I. Gärtner de Fructibus et seminibus plantarum Stutgardiae. 1788. 4. maj. P. I. Introd. Cap. I.

## §. 19.

Die Blüthe (Fructificatio) enthält die Befruchtungswerkzeuge und ist mit ihrem Gewächse gewöhnlich durch einen eignen Stiel verbunden, welcher Blütenstiel genannt wird. Ist er über die Blumendecke, über die Blumenkrone oder über beyde zugleich weiter hinaus verlängert; so ist es schicklicher ihn Fruchtstiel zu nennen, weil er jene Theile nicht mehr zusammen, sondern meistens die Frucht allein trägt. Mit dem Blütenstielen ist er nicht zu verwechseln.

Medicus botan. Beobacht. 1782. 101. Batsch. 75. 81. Sukow. 44. Gleditsch. 192.

## §. 20.

Es sind aber die Blüten untereinander und mit dem Hauptstiele auf verschiedene Art verbunden, und diese Ver-

Verbindungsart wird **Blütenstand** (Inflorescentia) genannt. Die bey Holzarten vorkommenden Blütenstände sind hauptsächlich folgende:

- a) Trauben (Racemus) b) Asterstrauß, (Corymbus) Schirmtraube, Doldentraube. c) Dolde, Schirm, (Umbella) d) Asterdolde, Asterschirm (Cyma) e) Kopf, (Capitulum) f) Büschel, (Fasciculus) g) Quirl, (Verticillus) h) Rispe, (Panicula) i) Strauß (Thyrus) k) Kätzchen, (Amentum)

Watsch. 83. Gleditsch. 193. v. Berned. 138. Sudow. 47.

Vielleicht erhält einst das Publikum eine eigne Schrift über die Inflorescenz der Gewächse vom H. Prof. von Ronen zu Leiden, wenigstens ist dieses wohl, nach dem was H. Ehrhard aus seinen Vorlesungen darüber berichtet, zu wünschen. S. Ehrhards Beiträge. Heft II. S. 122.

### §. 21.

Was nun die verschiednen Theile der Blüten anbelangt; so lassen sie sich unter zwey Klassen bringen.

- a) wesentliche und b) zufällige.

Zu den wesentlichen gehören:

Die Befruchtungswerkzeuge und zwar

- a) die männlichen.

Bey einem vollkommenen Staubgefäße (Stamen) unterscheidet man 1) den Staubfaden (Stamen) 2) den Staubbeutel (Anthera) und dessen 3) Saamenstaub (Pollen).

Sudow. 77. Gleditsch. 207. v. Burgsdorf. 70. Watsch. 142.

### §. 22.

Der wesentlichste Theil des Staubgefäßes ist erstens der Saamenstaub (Pollen). Er ist in dem Staubbeutel enthalten, in den meisten Fällen liegt er locker in der Höhle desselben. Durch Hülfe der Vergrößerungsgläser nimmt man besondrer Bildungen desselben wahr. In man-



manchen Gewächsen scheint er in Gestalt eines feinen Oehls vorhanden zu seyn.

v. Gleichen, microscopische Untersuchungen. Medicus bot. Beob. 1782. im Register f. v. Saamenstaub. Vatsch. 142. v. Wernck. 145. Suckow. 84. Gleditsch. 208.

### §. 23.

Der zweyte wesentliche Theil ist der Staubbeutel (Anthera). Ihre Gestalt ist verschieden und variirt oft in einer und eben derselben Blüte, auch zeigen sie manche besondere Bildung in Ansehung ihres innern Baues, und verschiedene Arten von Verbindungen unter sich oder mit den Staubfäden. Sie sind reizbar, in manchen Blüten unfruchtbar, haben bisweilen zufällige Nebentheile, auch wohl Bedeckungen unter denen sie stehen. Bey Pflanzen getrennten Geschlechtes, stehen sie auswärts, neigen sich aber auch zu Zeiten bey solchen zusammen.

Medicus bot. Beob. f. v. Staubkolben. Vatsch. 144. v. Wernck. 144. Suckow. 82. Gleditsch. 208.

### §. 24.

Zu diesen wesentlichen Theilen gesellt sich bey den meisten Holzarten noch ein fadenartiger Theil, Staubfaden genannt. Man findet ihn der Gestalt nach, vielfach verschieden, manche mit besondern Nebentheilen versehen, die andern fehlen. Dadurch, daß sie nicht immer aus dem gemeinschaftlichen Blumenboden entstehen, sondern sich an andre Theile anlegen und mit ihnen verwachsen, scheint es, als wenn sie in verschiednen Fällen aus ganz verschiednen Theilen entsprängen. Dieser ihr scheinbarer Stand gab zu einer eignen Methode den Eintheilungsgrund. Einen andern nimmt man von der Zahl derselben, die aber bey vielen Arten sehr variirt. Endlich kommt noch ihre Größe und ihre Verwachsung unter sich (der untern oder obern Hälfte — in eine oder mehrere Parthien) in Betrachtung, welcher Stand zu Unterabtheilungen in einer von der Zahl der Staubfäden herge-

nom-

nommenen Methode (wie Thunberg und Schrank geliefert haben) gebraucht werden kann.

Batsch. 144. Suckow. 78. v. Berned. 143. Gleditsch 207. Medicus, l. c. f. v. Staubfaden. Borkhausen tentamen dispositionis plantarum Germaniae secundum novam methodum a staminum situ et proportionem cum caracteribus generum essent. Darmstadli. 1792.

### §. 25.

#### b) Die weiblichen.

Der weibliche Geschlechtstheil (Stempel, Pistillum von einigen genannt) begreift a) den Fruchtknoten (Eyerstock, Saamenstock, Germen, Uterus, Ovarium) b) und die Narbe (Stigma.)

Der Fruchtknoten, die Gebärmutter, in welcher und aus deren Substanz nach erfolgter Befruchtung das Ey sich bildet, hat mit dem Staubgefäß einerley Ursprung, und zwar wie Hedwig deutlich erwiesen hat, aus dem Gewebe der Spiralgefäße, doch so, daß er in Gewächsen, wo er unter der Blume sitzt aus der Rinde und dem Holz augenscheinlich entsteht, in denen aber, wo ihn die Blume bekleidet, aus dem eignen Theil des Fruchtbodens, in beyden Fällen aber nach den Gesetzen der Erzeugung (Epigeneseos) gebildet wird. Uebrigens sitzen die Fruchtknoten theils einzeln, theils zu mehreren beisammen. An Gestalt sind sie sehr verschieden und bisweilen findet man an ihnen besondre Ueberzüge und Verlängerungen. Auch ist ihre Lage oder ihr Stand noch einer genauern Untersuchung werth.

S. Medicus bot. Beob. 1782. f. v. Fruchtknoten, Pistill. v. Berned. 147. Suckow. 84. Batsch. 135. Gärtner l. c. Cap. II.

### §. 26.

Der zweyte wesentliche Theil des Stempels ist die Narbe. Theils sitzt sie unmittelbar auf dem Fruchtknoten, theils ist sie das äußerste Ende des Staubweegs. Ihre

Ihre Bildung ist sehr verschieden. Manche sind mit besondern Hervorragungen versehen, andre sind merkwürdig durch die Art ihrer Einfügung oder Bedeckung. So variiren sie auch in der Zahl, und bleiben bey manchen Gewächsorten bey der Frucht sitzen.

Medicus, l. c. f. v. Narben. Batsch. 135. Suckow. 87. v. Wernick. 149.

§. 27.

Ausser diesen zwey wesentlichen Theilen findet man in vielen Blüten noch einen dritten den Staubweeg (Griffel, Befruchtungsröhre, Stylus, Tuba.) Er ist dicht, das ist, für jede nicht flüssige Materie undurchdringlich. Er ist theils bleibend, theils verwelkend, theils abfallend. So findet man auch die Staubweege in verschiedner Anzahl in den Blüten, die bey manchen Gattungen sehr veränderlich ist, und theils frey stehend, theils verwachsen, oder unten ganz, oben aber getheilt oder gespalten, übrigens von verschiedner Bildung, Richtung und Einfügung.

Medicus l. c. im Register f. v. Griffel. v. Wernick. 148. Suckow. 85.

§. 28.

Zu den zufälligen Theilen der Blüte gehören gewisse blätterartige Bedeckungen. Diejenigen welche die Geschlechtstheile umgeben, heißen Geschlechtsdecke (Perigonium). Sehr oft findet man zwey, dann wird die innre Blumenkrone (Blume, Corolla) die äussere, Blumendecke (Calix) genannt, von welcher man die Blütendecke (Perianthium) und zwar die gemeinschaftliche und besondere unterscheidet.

Batsch. 161. v. Wernick. 150. Suckow. 57. Gleditsch. 201. Medicus, f. v. Blume.

§. 29.

Ausser diesen blätterartigen Bedeckungen findet man noch bey manchen Blüten besondre Nebentheile, die in  
der



der Botanik unter den Namen Scheide (Spatha) Hülle (Involucrum) Nebenkronen (Corolla spuria) bekannt sind. Dahin sind auch die Honigbehälter (Nectaria) zu setzen, worunter eigne besondere Organe, welche Honig liefern oder in sich sammeln, einzig und allein zu verstehen sind.

Sudow. 64. 75. Batsch. 134. 171. 123. Gleditsch. 225. Medicus, l. c. 152. 274. v. Wernck. 157.

### §. 30.

Der Blumenboden (Blumenhalter, Blumenstuhl, Thalamus floris, Receptaculum floris) ist eigentlich das letzte Ende des Blumenstiels, das von seiner wesentlichen Verrichtung, die ganze Blüte zu tragen, diese Benennung führt, obgleich nicht alle Blüthentheile jederzeit deutlich und unmittelbar aus ihm entspringen. Mit dem Frucht- und Saamenboden (Thalamus, Receptaculum fructus et seminis) darf er nicht verwechselt werden.

Batsch. 86. Gleditsch. 199. Sudow. 100. Gärtner. VI.

### §. 31.

Dieser ist derjenige Theil der die Frucht oder den Saamen mit der Mutterpflanze verbindet und ihnen zur Stütze dient. Die Untersuchung desselben ist von Wichtigkeit, besonders die des Saamenbodens, weil sonst ganz ähnliche Früchte, schon hiedurch sehr leicht erkannt werden können. Es hat aber jeder Saame seine Umhüllung (Samara). In dieser liegt oder hängt er nun frey an der Pflanze (welche dann freysaamig, Gymnosperminia genannt wird) oder in einem besondern Behältniß (Saamenbehältniß, Perispermium) welches nebst den darin enthaltenen Saamen, Frucht (Fructus) genannt wird. Bisweilen liegt diese Frucht noch in einem besondern Behältniß, das Fruchtbehältniß (Pericarpium) genannt. Uebrigens zeigen sich die Umhüllungen, Behältnisse und Fruchtgehäuse von verschiedner Gestalt, Farbe, Größe und Substanz.

Batsch. 180. v. Berned. 190. Gleditsch. 213. Suckow. 89. Medicus philosophische Botanik. Mannheim 1789. I. Hest. Gaertner, de fructibus et seminibus plantarum. I. II. Gleditsch, Gärtner und Vorkhausen nahmen die Früchte und Saamen zum Eintheilungsgrund der Gewächse.

### §. 32.

Aeußere Theile des Saamens die allen gemein sind, sind: a) der Nabel. Nebentheile der Früchte und Saamen sind: Haarkrone, Schwanz, Flügel, Kamm, Hacken u. d. gl. Die Umhüllungen der Saamen sind: a) Die Schaaale und b) die innere Haut.

Oft ist nur eine davon vorhanden, oft finden sich Nebenbedeckungen. Die Schaaale ist immer ganz ungetheilt und hat keine andere Oefnung als, die Nabelschnur durchzulassen. Die innre Haut geht von der Schaaale leicht ab, schließt aber genau an den Kern an, und hat auch nicht einmahl die Oefnung für die Nabelschnur, sondern scheint ganz aus Gefäßen entstanden zu seyn. Sind alle diese Theile weggenommen, so kommt der Kern selbst zum Vorschein.

### §. 33.

Hier ist das Eyweiß (Albumen) der Dotter (Vitelum) und der Embryo (Embryo) zu unterscheiden. Das Eyweiß (Saamenkuchen bey Gleichen, Saamenblatt bey Böhmer) entsteht aus der, während dem reifen des Saamens verdickten Feuchtigkeit des Schafshäutchens, und ist sowohl an Consistenz als Farbe dem gekochten Eyweiß gleich. Es findet sich nicht in allen Saamen, und ist an Lage, Gestalt und Structur verschieden. In ihm ist der Sitz des Oehles, das die Saamen geben, und seine Consistenz ist mehlig, fleischig oder knorpelig. Zwischen ihm und dem Embryo sitzt gewöhnlich der Dotter — der seltenste von allen innern Saamentheilen.

Gaertner, Cap. X. XI. Boehmer de seminibus plantarum.

### §. 34



## §. 34.

Die Saamenblätter machen nebst der Wurzel und der Feder (plumula) den Embryo aus. Sein Wachsthum ist verschieden und giebt vier Arten derselben an. Seine Figur richtet sich nach der des Saamenblatts und seine Lage in Absicht

- a) auf die äussern Saamentheile bestimmt der Nabel
- b) in Absicht auf die innere ist sie
  - aa) in der Are des Saamens
  - bb) oder nach dem Umkreis zu befindlich.

Seine Größe ist verschieden.

Gaertner, Cap. XIII. v. Wernck. 202. 204. Andre nennen den Embryo Saamenpflänzchen, (Plantula seminalis) Keim oder Herz, (Corculum Caesalp).

## II. Dendrologie.

*Morphologie* §. 35.

Die Botanik der Holzarten macht uns mit den Bestandtheilen der Holzarten und ihren Organen bekannt; die Dendrologie mit der natürlichen Bestimmung dieser Theile. Sie ist also für die Holzkunde das, was die Physiologie für die Anatomie ist, und kann Philosophie der Botanik genannt werden, in so ferne man darunter eine systematisch geordnete Erklärung des erklärbaren in der Botanik versteht, bleibt aber genau genommen nur ein Theil derselben, weil die Physik der Holzarten von einer Philosophie der Botanik nicht ausgeschlossen werden kann.

## §. 36.

Die Spiralgefäße sind nach Hedwig (S. 38.) zu einem doppelten Endzweck bestimmt. In der größern Röhre, welche den Spiralfaden umwickelt, hält sich blos Luft auf; der Spiralfaden selbst aber ist das einsaugende oder Saft zuführende Gefäß. Die zurückführenden

Gefäße sind die im Zellengewebe und im Mark, in mancherley Gestalt vereinigten durchsichtigen Canäle. Sie schaffen die überflüssigen Säfte fort, nachdem die nöthige Ernährung des Gewächses geschehen ist.

## §. 37.

Das Oberhäutchen, welches sich bey einigen Holzarten, wenn es verletzt wird, reproducirt, bey andern nicht, ist wahrscheinlich bestimmt:

- a) nährende Theile aus der Athmosphäre einzusaugen b) dickere heterogene Säfte auszuscheiden c) die Ausdünstung zu dem gehörigen Grade zu mäßigen d) und die unter ihr liegenden Theile zu beschützen.

## §. 38.

Das Mark ist ein sehr wesentlicher Theil der Gewächse, daher befindet es sich auch in allen Theilen derselben, aber ihm einzig und allein das Wachsen und die Fortpflanzung derselben zuzuschreiben, hat sehr gegründete Einwendungen gegen sich. Der rindige Ueberzug zieht den Nahrungssaft aus der Wurzel in die Höhe, und wenn seine Gefäße hinlänglich damit angefüllt sind, bereitet er ihn und ernährt das Mark damit, welches sich ohne den rindigen Ueberzug nicht selbst ernähren könnte.

Hedwig im Leipziger Magazin 1781. III.

## §. 39.

Durch die Wurzel erhält der Baum einen festen Standort in der Erde. Sie ist auch wahrscheinlich ein Digestionsmagazin des Nahrungssaftes, den sie theils durch ihre Fasern, theils durch ihre Oberfläche einsaugt, und der nach der hier vorgegangenen ersten Zubereitung aufwärts steigt, wo er im Stamme und seinen Theilen verbreitet, immer geläuterter, und der Substanz des Baums assimilirt wird. Die Bestimmung der Aeste ist Blätter, Blüten und Früchte zu tragen.

## §. 40.

## §. 40.

Die Blätter werden Werkzeuge, durch welche die Gewächse, denen das Vermögen sich willkürlich zu bewegen fehlt, der zu ihrer Vegetation so nöthigen Bewegung theilhaftig werden können. Sie sind aber auch Werkzeuge der Einsaugung, denn sie ziehen mittelst ihrer Unterfläche Feuchtigkeit, Wärme, und Lichtstoff ein, bearbeiten die aufgestiegenen Säfte, daß diese verfeinert, den meistens zunächst an den Blattstielen sitzenden Knospen, zufließen, und Werkzeuge der Ausdünstung, indem sie mittelst ihrer Oberfläche die überflüssigen Säfte auswerfen. Wahrscheinlich dünnen sie bey Tag aus und saugen des Nachts ein. Sie schützen auch die Blumen und Früchte, reinigen die Luft, und leiten die atmosphärische Electricität ab,

## §. 41.

Viele bleiben das ganze Jahr sitzen, bey andern Arten fallen sie im Herbst ab. Wahrscheinlich wirken mehrere Ursachen bey dieser Erscheinung. Der Uebergang der Säfte in das Blatt wird um diese Zeit gehemmt, folglich der Zusammenhang zwischen Stamm und Blatt geschwächt. Es kommt aber hiebey auch die Feinheit der Säfte mit in Betrachtung, und noch andre Ursachen, die wir nicht kennen, mögen mitwirken. Die Nebenblätter und Ueberzüge dienen muthmaßlich zur Beschirmung und Bedeckung zarter Theile, für so lange als sie derselben bey jeder Art bedürfen.

## §. 42.

Die Gabeln sind zum festhalten solcher Gewächse bestimmt, welche wegen ihres schwachen Stengels hinsinken würden. Die Menge und Stärke der Waffen scheint mit der Vegetationskraft der Gewächse und den Nahrungsreichthum des Bodens in Verhältniß zu stehen. Die Gelenke dienen zu einer unmerklichen Bewegung,



wie nicht weniger zu dem wechselweisen eröffnen und schließen mancher Blätter und Blumen. Sie befördern das abfallen und die Richtung der Blätter, wie sie deren verschiedene Bedürfnisse erfordern.

#### §. 43.

Die Augen finden sich nur an den Holzarten kälterer Gegenden, weil daselbst die eintretende kältere Jahreszeit das Wachsthum hemmt. Die neuen Triebe befinden sich also in diesen Hüllen, die ihnen einstweilen den Saft aufbewahren, vielleicht auch zubereiten, damit er bey wiederkehrender Frühlingswärme den Trieb vervollkommen könne.

#### §. 44.

Die Blüten sind die Werkzeuge der Befruchtung und Fortpflanzung. Zur Zeit der Begattung wird die Narbe von dem Saamenstaub des Staubkolbens bestäubt. Die Natur selbst hat verschiedene Einrichtungen getroffen, um dieses austreuen des Saamenstaubs auf die Narbe zu begünstigen. Nach der Befruchtung verwelken die überflüssigen Theile der Blüte und fallen zum Theil ab. Der Fruchtknoten schwillt auf und nach und nach reift die Frucht. Die Blüten sind aber auch zugleich Abscheidungsorgane.

### III. Physik der Holzarten.

#### §. 45.

In diesem Theile der allgemeinen Dendrographie werden wir mit der Wachsthum - Ernährungs - und Fortpflanzungsart, Statik der Holzarten und anderen merkwürdigen Erscheinungen an denselben bekannt gemacht. Ein weitläuftiges Feld, wo Meinungen einander drängen, weswegen auch hier nur dasjenige, was für den praktischen Forstmann wissenschaftlich ist, ausgesondert werden soll.

#### §. 46.



## §. 46.

Gewächse sind organisirte Körper. Als solchen eignen wir ihnen eine dreifache Bestimmung zu, sich zu nähren, zu wachsen und ihres gleichen hervorzubringen. Erhaltung, d. i. Fortsetzung des Daseyns läßt sich ohne Nahrung nicht denken, Wachsthum ist Folge der Nahrung, und Fortpflanzung ist nur Efflorescenz des Wachstums.

## §. 47.

Nahrung saugt der Baum ein:

- a) aus dem Dunstkreis der ihn umgiebt, b) vorzüglich aber aus der Erde.

Das Hauptorgan bey diesem Geschäfte ist die Wurzel. Aber auch die Blätter, und vielleicht auch das Oberhäutchen der Rinde am Stamm und den Aesten saugen nährenden Stoffe ein.

## §. 48.

Die Nahrungsstoffe der Bäume sind aber eben dieselben, welche es für alle Gewächse sind. Die Erde selbst wirkt größtentheils nur mechanisch dabey, indem sie das Lager für die Wurzel abgiebt, und zur Aufnehmung, Aufbewahrung der Nahrungsstoffe, welche sich in ihr sammeln und daselbst durch den Beyptritt der Luft, der Feuchtigkeit vom Tag- und Erdwasser und anderer Stoffe, mittelst der Gährung sich mannichfaltig verbinden, zersetzen, kurz verändern, — dient. Jede Erdart ist daher geschickt Holzarten zu ernähren, aber nicht jede Holzart geschickt in jedem Grunde fortzukommen.

## §. 49.

Denn es sind noch mehr Stoffe nöthig: Wasser ist ein zweytes Aliment der Gewächse. Es wirkt aber als ein solches nur, indem es vermittelst enthaltener aufgelöster Salze, andre Körper aufschließt und durch seine Flüssigkeit in einen Nahrungsaft verwandelt. Je reiner die Erde, und je reiner das Wasser ist, desto weniger sind

beide fähig, Gewächse auf eine anhaltende und vollkommene Art zu ernähren. Es müssen noch andre Stoffe hinzukommen.

## §. 50.

Zum Wachsthum der Gewächse ist auch Luft, sowohl in der Erde als oberhalb derselben nöthig. In der Erde — weil sie als Ferment die Gährung der zur Nahrung dienenden Stoffe befördert. Mit ihnen tritt sie in die Substanz des Gewächses ein, wo sie zur Vegetation nöthig seyn muß — weil wir sie darinnen finden. Sie scheint aber auch da verschiedene Modificationen zu erleiden. Ueber der Erde ist sie für die Gewächse nöthig; denn sie bewirkt und unterhält durch ihre Strömungen die Ausdünstung der Gewächse, wodurch die Bewegung der Säfte und deren Wirkungen begünstigt werden. Sie wirkt aber auch auf eine wesentliche Art: Denn als ein Menstruum für alle Körper enthält sie immer Partikeln desselben in größter Feinheit aufgelöst, die mit ihr in das Gewächs eindringen und Theile seiner Substanz werden.

## §. 51.

Wie die Salze wirken, ist noch nicht so ganz erklärbar. Vielleicht durch Reiz, mit dem sie die Gefäße zur Erfüllung ihrer Bestimmung stimuliren, und vielleicht auch durch Anziehung der Wärme- und Lichtstoffs in der Erde. Die alkalischen insbesondere lösen die groben schleimigen Theile auf, wodurch diese bei hinzukommender Feuchtigkeit geschickt gemacht werden von den Gefäßen eingesaugt zu werden. Dergleichen schleimige Stoffe werden durch Zerlegung der Körper mittelst der faulen Gährung producirt. Die atmosphärische Wärme verdünnet die Luft in den Gefäßen, wodurch das aufsteigen des Nahrungsaftes befördert wird. Sie unterhält und vermehrt die Ausdünstung der Gewächse, die Läuterung der Säfte, den Absonderungs- und überhaupt Vegetations-Mechanismus.

## §. 52.

## §. 52.

Daß auch der Lichtstoff Einfluß in die Vegetation habe, beweisen die bleichen Siedlinge, welche in finstern Zimmern und Kellern überwintert werden. Er trägt zur Farbe und Lebhaftigkeit der Gewächse vieles bey. Selbst die atmosphärische Elektricität scheint mittelbar (vielleicht bey der einen Holzart mehr, bey der andern weniger) das Wachsthum zu befördern. Und vielleicht ist das Element des Wärme- Licht- und elektrischen Stoffes, man nenne es Aether oder wie man will — das große Sensorium durch welches die Natur Wachsthum in Gewächsen und Thieren bewirkt.

## §. 53.

Im innern des Baumes steigt nun der aus der Erde eingesaugte Nahrungssaft aufwärts. Die Einsaugung von andern Gefäßen wird fortgesetzt und zwar hängt die Lebhaftigkeit dieses Geschäftes von der Temperatur und Bewegung der Luft ab. Dieser Nahrungssaft wird nun je mehr er sich den Extremitäten nähert, desto feiner, indem er bis er diese erreicht, durch verschiedne Theile und Organe, die ihn läutern und das heterogene, überflüssige ausscheiden, zubereitet wird. So wird er nun fähig gemacht, ein reelles Aggregat des Baumes zu werden durch die sogenannte innige Aneignung oder Assimilation. Wie nun aber dieses geschehe, durch welche Kraft, wissen wir nicht, weil wir kein Ding an sich kennen, nur das was in Zeit und Raum vorgeht, — die Phänomene der Vegetation, (das was wir von ihr sinnlich anschauen können), nehmen wir wahr, und diese sind folgende.

## §. 54.

Wenn ein Saamenkorn in die Erde gelegt wird, saugt es den Nahrungssaft ein und schwillt davon auf. Der Embryo (die Saamenblätter nebst der Wurzel und Feder) erweitert sich und bildet sich genährt durch das Ep-  
weiß, welches ihm dieselben Dienste leistet, wie das thie-



rische Cyweiß dem Kücklein, aus. Diese erste Bildung wird das Keimen genennt. Das Würzelchen bohrt sich in die Erde ein, das Federchen strebt aufwärts. Die Samenblätter werden bey manchen Gewächsen auch über der Erde sichtbar, fallen aber ab, sobald das Pflänzchen ihrer zu seiner Nahrung nicht mehr bedarf.

## §. 55.

Im Fortgang der Zeit dehnt sich die Pflanze über der Erde sowohl in die Länge als Dicke aus und wird nun Lohde genennt. Am untern Ende zeigt sich zuerst die Holznatur. Daselbst bildet sich an dem untern ältern Theil der Spiralgefäße, durch Austreibung, Verstopfung und Vereinigung der Windungen derselben die holzige Faser. Zum Ersatz der durch die Veränderung in Fasern, weniger zu ihrem vorigen Zweck dienlichen, zuführenden Gefäße wird alle Jahre eine neue Lage von Spiralgefäßen gebildet, wodurch die Jahrringe entstehen. Auch aus den zurückführenden Gefäßen entstehen Fasern, aber später als aus den zuführenden, weil in diesen nach Hedwigs Untersuchungen dichtere zähere Säfte als in jenen fliesen. Diese alljährliche Bildung einer neuen Lage von Spiralgefäßen setzt die Natur bis zu demjenigen Alter fort, welches man bey den Bäumen das Alter der Vollkommenheit nennt, das von dem Alter der Haubarkeit wohl unterschieden werden muß. Die Zahl der Jahrringe in einem gefällten Baume zeigt also nicht genau an, wie alt er sey — sondern höchstens wie lang (wie viele Jahre) er gewachsen sey, denen man in vielen Fällen noch einige zuzählen darf.

## §. 56.

Aus der weichen Substanz die unter der innern Rinde des Lohdens sitzt und aus den Spiralgefäßen bildet sich die Knospe, die also aus dem eignen und in sie übergehenden Fleisch der Mutter besteht. Mit dem innern Theil wächst ihre Bedeckung fort. Aus ihnen bilden sich Zweige



Zweige, mit Blättern. So lange nun die Lohde gesund, der Boden mit Nahrungssaft versehen ist, und die äussere Luft den der Vegetation günstigen Grad der Temperatur hat, saugen die Fasern und Oberfläche der Wurzel den Nahrungssaft lebhaft ein, und die Lohde dünstet in eben dem Verhältniß stark und schnell aus. Bey kälter werdender Luft, vermindert sich das einsaugen und ausdünsten. Die Bewegung des Saftes (welche man sich aber nicht als Kreislauf denken darf) wird zuletzt fast unmerklich. Vielleicht tritt auch der Saft in etwas zurück. Wenn nun die Kälte der innern Luft dergestalt zunimmt, daß sie der Kälte der äussern gleich kommt; hört die Bewegung des Saftes gänzlich auf.

S. Mosers Forstarchiv. III. 31. IV. 279.

#### §. 57.

Durch dieses einsaugen und ausdünsten wächst der Baum. Die gleichartigen Theile bleiben zurück, die ungleichartigen und überflüssigen werden durch Ausdünstung ausgeschieden. In der Jugend und bey Laubholzarten, besonders solchen die reich an Aesten und Blättern sind, geht diese Einsaugung und Ausdünstung stark von statten, bey alten Bäumen, und bey Nadelholzarten langsamer, bey beyden in der warmen Jahreszeit am stärksten. Mit den Jahren wird die Consistenz des Schaftes stärker, die Gefäße werden zäher, steifer, und die Schichten des ringigen Ueberzuges immer bemerkbarer. Wie bilden sich diese Schichten? Die Jahrringe sind bey weichen Holzarten deutlicher als bey harten. Man findet sie überhaupt bald fein bald grobjährig, nach der individuellen Natur der Holzart, oder nach Veranlassung besonderer Umstände. Oft wechseln in einem Stamme weite und grobe Holzringe mit engen und feinen ab.

#### §. 58.

Hat der Baum dasjenige Alter erreicht, in welchem er fähig ist seines gleichen hervorzubringen; dann bildet sich

sich die Blüte, welche die zur Erzeugung und Befruchtung des Saamens nöthigen Theile besitzt. Durch sie gehen die Gefäße und das Mark aus der Mutterpflanze in den Saamen über. Die Lebenskräfte der Mutterpflanze reichen aber nicht weiter als zur Bildung. Kommt nicht die Befruchtung vom männlichen Saamenstaub von aussen hinzu, so bleibt der Fruchtknoten taub, wächst nicht fort und fällt endlich ab.

Anm. 1. Ich schreibe keine allgemeine Gewächskunde sondern nur eine dendrographische Einleitung zu dem folgenden besondern Theil, daher wird es mir erlaubt seyn, mich ganz kurz zu fassen und immer Kenntniß der allgemeinen Gewächskunde vorauszusetzen. Die neueste mir bekannte Schrift über das Geschlecht der Gewächse, ist folgende, *The sexes of plants vindicated in a letter to M. Will. Smellie by I. Rotheram. Edinburg. 1790.*

2. Die künstlichen Vermehrungsarten gehören nicht hieher, sondern in die Lehre vom Holzbau.

#### §. 59.

Ist aber der Saame vollkommen, wirklich befruchtet und fällt er ab; so bringt er, wenn er Erde fassen kann, ein neues der Mutterart ähnliches Gewächs hervor. Oft aber sehen wir den neuen Abstammling

a) in Ansehung seines Laubes b) seiner Früchte c) seiner Größe d) seines Habitus

von der Mutterart abweichen, woran vorhergegangene hybride Befruchtung, verändertes Klima, Lage, Boden und andre Umstände Schuld seyn können. Dergleichen Veränderungen sind nicht wesentlich, sondern nur durch besondere Umstände veranlaßte Ausartungen. Daher auch solche Gewächse, wenn man Saamen von ihnen säet, wieder in die Mutterart einarten.

#### §. 60.

Die Holzarten, welche das Alter der Vollkommenheit erreicht haben, erhalten sich noch lange in demselben, doch

doch einige längere, andre kürzere Zeit. So wie nun die einsaugenden und abführenden Gefäße allgemein steifer, härter und undurchdringlicher werden, nimmt auch die Einsaugung und Ausdünstung ab, bleibt endlich ganz aus und der Baum geht ein. Es kommen weniger und kränkliche Blätter zum Vorschein, im Kern erzeugt sich die Fäulniß, aussen schält sich die Rinde ab, und endlich verdorrt der ganze Baum.

## §. 61.

Ueberläßt man ihn seinem Schicksal; so wird er mit der Zeit gänzlich in seine Grundstoffe aufgelöst. Die Natur verrichtet hier, was der Scheidekünstler auf einem kürzern und bequemern Wege erreicht. Seine Bemühungen lehren uns, daß Wasser, öbliche Stoffe, Salze, Erde und ein auszugartiger zusammenziehender Stoff, die Grundstoffe der Holzarten ausmachen.

Betrachtung über die Chymie der Pflanzen. Guntersblum, 1788. Wannowsky diss. de principio plantarum adstringente. Koenigsb. 1791.

## §. 62.

Dasjenige Holz welches nun bereits einen hohen Grad der Fäulniß erlangt hat, pflegt im Finstern zu leuchten. Ob ein jedes faules Holz diese Eigenschaft habe, ist noch nicht ausgemacht. Am häufigsten bemerkt man es, bey Buchen- und Erlenholz. Die meisten Versuche hierüber sind wir dem Herrn Baron von Meidinger schuldig, der fast alle Arten verfaulten Hölzer untersucht hat. Ob aber das Resultat seines Nachdenkens, daß kleine Thierchen die Ursache dieses Leuchtens sind, vollkommen richtig sey, bedarf noch mehrerer Untersuchungen, und noch weniger Grund findet man für seine Vermuthung, wenn man sich an die von Beccaria angestellten Untersuchungen erinnert.

Forstmagazin XI. 229. v. Mohr, Hist. nat. arb. Hanows Seltenheiten der Natur. B. II. Ddbels Jäger-Practica III.

## §. 63.



## §. 63.

Selbst gesunde Bäume sind mancherley Verstörungen und Krankheiten unterworfen, deren Kenntniß für den Land- und Forstwirth von Wichtigkeit ist. Die bekanntesten Krankheiten sind:

- a) der Brand. b) Eisklüfte. c) Rothfäule. d) Krebs.
- e) Darre und das f) Absterben.

## §. 64.

Die Ursachen dieser Krankheiten sind hauptsächlich folgende:

- a) schlechte Behandlung der Bäume, b) ein ihrer Natur nicht angemessener Boden, c) ungünstige Witterung, große anhaltende Dürre, strenger anhaltender Frost, Frost zur ungewöhnlichen Zeit, Windstürme, Honigthau etc. d) Verbeißen vom zahmen und wilden Vieh, e) Viehhut in den Wäldern, großer Wildstand, schlechte Behandlung oder Vernachlässigung desselben, f) Insekten — ein zahlreiches Heer.

Das bemoosen der Bäume hat wie das bemoosen der Wiesen mehrere Ursachen.

Schrank, bayer. Flora II. 488.

## §. 65.

Zu denjenigen Erscheinungen an den Holzarten, welche entweder wegen der Seltenheit in der sie sich zeigen, oder wegen des frappanten Eindrucks, den sie bey uns hervorbringen merkwürdig sind, gehören

- a) die mancherley Auswüchse an den Blättern b) und die verschiednen Ausartungen, die wir an einzelnen Theilen der Holzarten wahrnehmen. c) Die Figuren, die man bisweilen im Holze findet, mögen wohl bloß von äussern in die Rinde gemachten Einschnitten herrühren.

Scheuchzer, itin. alp. 415. Keyßler in seiner Reisebeschr. S. 65. Adams Gedanken über das seltene und betrachtungswürdige an einem zu Landshut 1755 gefällten Buchbaume, 8. Bres-



8. Breslau 1756. Hamburger Magazin, X. 511. Kulmii  
diff. bot. phys. de litteris in ligno Fagi repertis. Gedani 1730.

## §. 66.

Das schließen der Blätter und Blumen zu bestimmten Tageszeiten, welches man sehr uneigentlich den Pflanzenschlaf zu nennen pflegt, ist eine Wirkung der Spiralgefäße, die, wenn sie der Luft blos gestellt werden, sich etwas abwinden und länger werden. Befeuchtet, verkürzen sie sich wieder und winden sich auf. Daher schreibt man ihnen Contractibilität und Elasticität zu, und in diesen Gefäßen liegt die Ursache der sogenannten Pflanzenbewegungen, die man sich noch vor wenigen Jahren als willkührliche Bewegungen dachte, die sich aber alle mechanisch erklären lassen.

Schrank vom Pflanzenschlaf, Ingolst. 1792.

## §. 67.

Die meisten Hölzer sind leichter als Wasser und schwimmen daher auf demselben. Dieses findet jedoch nur so lange statt, als Luft in den Gefäßen befindlich ist. Wird diese herausgetrieben, so dringt das Wasser hinein und das Holz sinkt zu Boden. Will man nun das eigenthümliche Gewicht der Holzarten und ihr Verhältniß gegen die Schwere des Wassers erfahren; so darf man nur gleich große Stücke (z. E. von einem Cubikz.) von jeder Holzart verfertigen lassen, und sie durch Abwägung gegen einander, und mit dem Gewichte eines Cubikzoll Wasser vergleichen.

Muschenbroek introd. ad Philosoph. natur. 536. Ebend.  
Elementa phys. 278.

## §. 68.

Bei solchen Untersuchungen nimmt man auch einen großen Unterschied der specifischen Schwere bei einer und eben derselben Holzart wahr, weil es bei diesem Gewichte auf so viele zufällige Ursachen ankommt, indem das Alter  
des

des Baumes, die Jahreszeit, in welcher das Holz gefällt wird, verschiedene Stellen an einem und eben demselben Baume, die Beschaffenheit des Bodens, das Verhältniß der Bestandtheile, die Art wie das Holz getrocknet wird, u. d. gl. zu diesem Unterschied das ihrige beitragen. Frisches Holz ist schwerer als solches das einige Zeit gelegen hat, und dieses ist wieder schwerer als trocknes, Doch ist alles trockne Holz zuweilen schwerer als frisches, wie auch Hieler in mehreren Versuchen gefunden hat.

### §. 69.

Insbesondre beweisen auch die vom Gr. Buffon angestellten Versuche, daß ein großer Unterschied in Ansehung der specifischen Schwere bey einer und eben derselben Holzart statt finde. Er erfuhr durch mehrere Versuche, daß die Schwere des Holzes sich nach der Länge desselben verringere. In der Wurzel fand er es schwerer als in der Mitte der Stammhöhe, und hier schwerer als am Gipfel. Dieß geht, so lange der Baum noch wächst, beynahe in arithmetischer Progression fort. Es kommt aber eine Zeit, da das Holz aus dem Mittelpunkte, und das vom Umfang des Kernes fast gleich schwer ist — diejenige, da das Holz zu seiner Vollkommenheit gelangt ist.

### §. 70.

Es mögen aber wohl mehrere physikalische Ursachen bey der respectiven Festigkeit und Schwere der Holzarten mitwirken. Nach du Hamel ist besonders die Beschaffenheit des Bodens die Hauptursache. Allein nicht weniger mag die Exposition gegen diese oder jene Himmelsgegend und das Klima dazu beitragen. Und dann muß wohl auch der innre individuelle Bau der Holzarten in Anschlag gebracht werden, da wir aus der Oekonomie der Thiere wissen, daß die festen Theile auf die flüssigen und diese wieder auf jene wirken. Man vergleiche nur die Eiche (ihre Säfte und Hohlstructur) mit der Fichte, ferner unsere Eiche im Thal und auf Anhöhen, im Bruchland,

land, Sandland und frischem guten Waldgrunde, endlich das Holz von unsern Eichen mit dem Holze der in Sibirien und in südlichen Ländern wachsenden.

## §. 71.

Wegen der häufigen Verwendung des Holzes zum Bauen ist es aber allerdings von Wichtigkeit, die Stärke und den Zusammenhang des Holzes kennen zu lernen. Mariotte ließ um die absolute Festigkeit des Holzes zu erforschen gerade viereckige Stäbe von proportionirter Länge verfertigen, die sich an beyden Enden in etwas dicke kubische Körper endigten, an welchen man sie befestigen konnte. So ließ er sie lothrecht herabhängen und hieng unten nach und nach so viel Gewicht daran, bis sie zerrißen.

Mariotte de motu aquarum. P. V. serm. 2.

## §. 72.

Muschenbroek wiederholte diese Versuche, wändte aber eine bequemere Methode dazu an. Er befestigte nämlich eine sehr accurate Schnellwage, auf welcher 1500 Pfund abgewogen werden konnten, an einem Gestelle, so, daß sie nach Belieben in die Höhe oder herabgeschraubt werden konnte. An den beyden dicken Enden der Stäbchen wurden eiserne Ringe angebracht, mit denen sie oben an der Schnellwage und unten, an einem an dem Gestelle befindlichen Knoten befestigt werden konnten. Wenn sie nun gehörig befestigt waren, wurde der Gewichtstein an den Wagbalken gehängt, und so nach und nach probirt, wie viele Kraft zum Zerreißen der Stäbchen nöthig war.

Muschenbroek introductio ad Cohærentiam corporum armorum in diss. phys. exp. et geom. Viennæ 1756. Ejusdem introductio ad philosoph. natural. §. 1129.

## §. 73.

Allein diese Versuche beweisen das nicht, was sie zu beweisen scheinen, denn:

Ⓔ

a) Es



- a) Es fragt sich immer noch ob man diese Erfahrungen zum Grund legen könne, wenn von Berechnungen der Stärke der Pfeiler, Säulen, Pfosten, die ansehnliche Lasten tragen sollen, die Rede ist. b) Es ist auch bey diesen Versuchen nur von einer Zerreiſſung und den Graden in welchen die angegebenen Holzarten dem zu ihrer Zerreiſſung angehängten Gewichte widerstehen, die Rede; beym bauen sind aber die Pfeiler, Säulen und Träger keinem zerreiſſen ausgesetzt.

## §. 74.

Weit wichtiger sind Untersuchungen über die respective Festigkeit der Holzarten, und in manchen Fällen kann man beyde miteinander mit Nutzen vergleichen. H. Gr. v. Büſſon hat hierüber verschiedene Versuche angestellt und bekannt gemacht, und seine Erfahrungen zeigten:

- a) daß die Stärke des Holzes nicht in ganz gleichem Verhältniß mit seiner Schwere stehe — die vom Mittelpunkt an gegen den Umfang abnimmt. b) daß die Stärke des Holzes auch nicht ein gleiches Verhältniß zu seiner Dicke habe — c) daß der Widerstand des Holzes sehr merklich abnehme, nachdem die Länge zunimmt.

Für Bauherrn und Baumeister sind die Versuche und Tabellen des H. G. v. Büſſon von Wichtigkeit. *Experiences sur la force du bois*, in den *Mem. de l'Academie royale des sciences de Paris*. Année 1740. 1741.

## §. 75.

H. Haller (Forstverwalter in Schweidnitz) prüfte diese Büſſonschen Versuche und machte sie noch weit nutzbarer: denn er bemerkte zugleich, wenn das Holz zu dieser Absicht gefällt wurde, wie schwer ein jedes Stück gewesen, das zerbrochen wurde, und wie viel die Zeit, so nach Auflegung der Last, bis zu der Zerbrechung verflossen, betrug.



## §. 76.

Eine andre auffallende Erscheinung am Holze ist, daß es durch Wärme und Kälte eine solche Veränderung leidet, die der an Metallen und andern Körpern bemerkten ganz entgegen lauft. Es wird nämlich durch die Wärme verkürzt und durch die Kälte verlängert. Diese Veränderung ist zwar äußerst gering, aber doch merkwürdig. Daß aber das Holz in der feuchten Luft ausgedehnt und in der trocknen zusammengezogen werde, kann man sehr gut und fast täglich, doch an einer Holzart mehr als an der andern, bemerken.

Kelsii neuer Versuch von der Ausdehnung der hölzernen Stangen in der Kälte, in den schwed. Abhandl. I. 41.

## §. 77.

Eben so lehrt uns eine allgemeine Wahrnehmung, daß jedes Holz und selbst das beste beim Austrocknen häufig Risse bekomme. Wahrscheinlich liegt der Grund davon in der Elasticität der Holzfasern und den Verlust der Feuchtigkeit. Je mehr eine Holzart Feuchtigkeit enthält, desto mehr zieht sie sich beim austrocknen zusammen. Daher pflegen auch beim austrocknen Risse zu entstehen, die bisweilen bis an den Mittelpunkt gehen, doch gegen diesen zu, immer kleiner werden. Du Hamel zog daraus verschiedne wirthschaftliche Regeln, um dem reißen vorzubauen und dadurch die Güte des Holzes zu erhalten und zu verbessern. Nach ihm haben wir mehrere Vorschriften erhalten, Holz an der Wetterseite gegen springen und reißen zu schützen \*) und unverbrennlich zu machen \*\*).

\*) Schwed. akad. Abhandl. IV. 272. I. 296.

\*\*) Ebend. I. 183.

## §. 78.

Endlich ist auch noch für den Naturforscher die außerordentliche Menge unterirdischen Holzes merkwürdig: Es läßt sich dasselbe auf folgende Classen reduciren:

- A. Gegrabnes Holz, Lignum fossile.  
 B. Incrustirtes — — — incrustatum.  
 C. Versteintes — — — petrificatum.  
 D. Metallisirtes — — — metallisatum.  
   a) Kupferhaltiges b) Eisenhaltiges  
 E. Mineralisirtes — — — mineralisatum.  
   a) Schwefelhaltiges, b) Vitriolhaltiges, c) Alaunhaltiges, d) Holzkohle.  
 F. Der Steinart nach ist das Holz  
   a) Kalkartiges, b) Gypsartiges, c) Thonartiges,  
   d) Sandartiges, e) Achatartiges, f) Jaspisartiges,  
   g) Pechsteinartiges, h) Crystallinisches.

Anm. 1. Schriftsteller: Schulze von versteinerten Hölzern. Bourguet Traité des Petrifications. Paris 1778. Gesneri Tr. de Petrefactis. Walchs Naturgeschichte der Versteinerungen. Nürnberg 1768. Schröters, vollständige Einleitung in die Kenntniß und Geschichte der Steine und Versteinerungen, T. III. Altenburg 1787. 4. Schröters Lithol. Lexicon. Frankfurt. 1779. Th. II. S. 384. Deutsche Encyclopädie. III. 95 und 897. XV. 919. 936.

2. Abbild. Knorr Sammlung, Th. III. t. a — p. Stobaeus Opusc. t. 16. Volkmanns, Siles. subterr. t. 7. 8. Lange de lapid. figur. t. 15. Büttner rud. diluv. test. t. 21. f. 5. Mylius Saxon. subterr. t. 13. f. 10. Beßler, Gazophyl. t. 35. Lochner Musaeum Besler. t. 31. Pontoppidan's Naturh. von Dänemark, t. 8. f. 3. Dresdner Mag. T. I. t. ad p. 46. Collini Tagbuch, t. 6. Imperati hist. nat. 753. Liebknecht Hassia subterr. t. 14. Seba Thes. t. 108. Schröters vollständige Einleitung, Tom. III. t. I. f. 1. 2.

Man hat oft in der Erde ganze Bäume gefunden, aber das meiste unterirdische Holz findet man in einzelnen Stücken. Seine Farbe ist entweder noch seine eigne oder es hat eine fremde angenommen. Gar leicht sind diese Naturkörper für dasjenige zu halten, was sie ehemals waren. Man sieht Knoten, Aeste, Wurzeln, Rinde, Jahresringe und oft läßt sich die Holzart noch angeben.

## IV. Oekonomie der Holzarten.

## §. 79.

Die ökonomische Naturgeschichte der Holzarten ist der wichtigste Theil der allgemeinen Dendrographie für den Cameralisten. Groß ist der Nutzen der Holzarten in der Haushaltung der Natur! Eine Menge wilder Thiere finden in ihnen und unter ihrer Krone Schutz, Aufenthalt und Nahrung. Sie reinigen die Luft, ziehen Dünste an, und unterhalten auf diese Art den Wechsel der Temperatur des Dunsstkreises. Durch sie wird die Erde verschönert, die Schöpfung mannichfaltiger, und selbst durch ihre Verwesung werden sie für uns nützlich. Das Studium der Gewächskunde ist überhaupt von großer Wichtigkeit für den Cameralisten, der nie vergessen sollte: *quam turpe sit in patria habitare et patriam ignorare* und Fontenelle hat Recht, wenn er an einem Orte sagt: *C'est la Botanique de son pays, qu'on doit le plus etudier*. Der Cameralist kann ohne Naturkunde nichts thun.

„Der Greis öffnete die Thüre eines Saals, welcher  
 „voll kleiner hölzerner Gebäude und voll von unendlich  
 „mannichfaltigen und unzähligen Geräthschaften war.  
 „Du siehst hier, fieng er an, die vielen Holzarten des Lan-  
 „des, mit deren Eigenschaften nicht bekannt zu seyn, für  
 „diejenigen, welche bey der Aufsicht über die Landwirth-  
 „schaft eine Stimme haben, eine brandmarkende Schande  
 „seyn würde, deren Andenken nur durch irgend eine he-  
 „roische That ausgetilgt werden könnte. Hier, fuhr er  
 „fort, indem er ein Buch öffnete welches die Geschichte  
 „dieser Holzarten enthielt, ist die Jugend und das Alter  
 „aller im Lande beträchtlicher Wälder, die wir nicht von  
 „ohngefähr ansäen ließen, sondern denen wir eigne Plätze  
 „bestimmten, angezeigt; und jeder Handels- und Wirth-  
 „schaftsrath macht sich, vermöge unsrer wohlthätigsten  
 „Geseze, eine eigne Karte, welche alle dreyßig Jahre



„verbessert werden muß. Jeder dieser Herrn besitzt eine  
 „genaue und umständliche Kenntniß nicht nur allgemeiner  
 „Begriffe, sondern des wirklichen gegenwärtigen Zustan-  
 „des der Wälder und der beträchtlichen Gegenden des  
 „Landes. Wie herrlich sind unsre Eichen und Tannen-  
 „wälder: und wie zittert in ihren heiligen Finsternissen  
 „dem sichern Wandrer das Herz! Er sieht die großen  
 „Schatten unsterblicher Väter im schweigenden Tieffinn  
 „wandeln, und die Erinnerung an sie stärkt jeden edlen  
 „Vorsatz, den er auszuführen, dahin geht. Die Mo-  
 „delle, welche du hier siehst, sind die Modelle unsrer  
 „Gebäude und bürgerlichen Werkzeuge. Sie sind aus  
 „eben der Art Holzes verfertigt, welche zu denselben die  
 „schicklichste ist. Du hast vielleicht schon beobachtet, daß  
 „bey uns niemand kann, wie er will; weil derjenige, der  
 „keinen Verstand und Geschmack besitzt, nichts beitragen  
 „soll, ihn ändern, so viel an ihm liegt, zu benehmen.

Wo dieses Institut sey, findet der geneigte Leser in Westens  
 rieders Traum in drey Nächten. München 1782.

#### §. 80.

Durch sie werden öde Heiden und unfruchtbare In-  
 seln in fruchtbare Gegenden umgeschaffen. \*) Der weise  
 Bauherr der Erde scheint sie daher über unsern ganzen  
 Weltkörper verbreitet zu haben; denn wir treffen diese  
 nützlichen Gewächse unter allen Himmelsstrichen an, Aber  
 so oft zerstört die Unwissenheit die weisen Verhältnisse in  
 Vertheilung dieses nützlichen Naturgeschenks, wodurch  
 kultivirte Länder in Wüsteneyen verwandelt werden. Aber  
 manchen Ländern führt auch die Natur dieses so unent-  
 behrliche Bedürfnis selbst zu. Ich meine das sogenannte  
 Treibholz, das selbst in Deutschland, ohnweit Stade,  
 am Strand der Elbe schon seit undenklichen Jahren ange-  
 schwemmt und gesammelt wird. Ueber die Herkunft des-  
 selb

\*) Ein Bepspiel habe ich unter Ulex angeführt.



selben hat man verschiedene Meinungen. Einige glauben, es käme aus den waldigen Gegenden Schlesiens und Böhmens und treibe mit dem Strom herab, welches weder wahrscheinlich noch möglich ist. Wahrscheinlicher ist die Vermuthung Beckmanns (eines Bruders des um die Cameralwissenschaften so sehr verdienten Herrn Professor Beckmanns in Göttingen) daß es aus der Nordsee in die Mündung der Elbe getrieben werde.

## §. 31.

Und wie wichtig ist nicht das Holz für unsre Subsistenz. Es ist unser erstes Feuerungs-Materiale. Verschiedene Gewerbe brauchen Kohlen, andre Asche. Das Civilbauholz wird in und über der Erde angewandt. In der Erde — zu Schwellen, Kosten, Bronnenröhren, auf der Erde zu, Pallisaden, Bohlen — über der Erde zum Taggebäude. Beym Wasserbau braucht man Pfähle, andre Sortimente für Brücken, Wehre, Schleussen, Cisternen. Bronnenröhren, Pumpen und Tröge sind gleichfalls hieher zu rechnen. Beym Mühlenbau kommen Räder (ober- und unterschlächtige auch Kammräder) mit ihren Wellen, Kämmen, Nägeln und Drillingen vor. Ferner braucht man in Mühlen, Tröge, Stempel- und Keilholz. Hütten-Hammer- und Pochwerke erfordern Wellen, Sphlengerüste, Blasebälge, Stempel, Hebel, Arme, Stangenwerke. Zum Häuserbau werden Schwellen, Dielen, Latten, Träger, Pfosten, Balken erfordert, ingleichen Bretter und Bohlen, Dachrinnen und für manche andre, Glockenstühle. Beym Schiffbau kommen vorzüglich Kielholz, Balken, Bohlen, Bretter, Masten und Krummhölzer vor.

Anm. Die Schiffholz-Sortimente kann man kennen lernen, aus Segondats Holztabellen. Hamburg 1792. und Du Hamels bekannten Werke von Fällung der Hölzer.

## §. 82.

Nicht weniger als das Stammholz sind auch die Zweige mancherley Nutzungen fähig, indem man sie zu Flechtarbeiten, Faschinen, Besen, Wieden, Spinnhütten, Körben, Gradierwellen, manche zu feinen Reissstäben, andere zum färben anwendet. Manche Wurzeln werden auf Theer benutzt, andere zu Fournierarbeiten, zu Körben, zum färben. Die Erdhölzer werden theils zur Stallstreu, zu Spinnhütten, zur Fütterung, zu Besen, zum färben, gerben, gebraucht. Auch die Blüten und Blumenknospen von manchen Holzarten, sind in der Oekonomie brauchbar.

## §. 83.

Sehr ausgebreitet ist die Nutzung der Blätter. Theils dienen sie zum Futter, theils zur Streu. Manche werden von Gerbern, Färbern und Bierbrauern benutzt, andere geben einen guten gesunden Thee. Aus verschiedenen Bäumen kann ein trinkbarer Saft gesammelt werden, von andern Terpentin und Harz. Die Früchte dienen zur Wildnahrung, zur Vogelweide, zum Viehfutter, zum Genuß, zu geistigen Getränken, Conserven, Müssen, zum einmachen, zu Backwerk, Oehl, zum färben, und selbst die Schalen mancher Früchte sind in der Oekonomie zu benutzen.

## §. 84.

Verschiedene Holzarten liefern eine spinnbare Saamenwolle. Die Rinden dienen theils zum färben, theils zum gerben, in der Medicin, der Bast zu Gespinnst, zu Matten und Stricken. In der Arzneykunst, werden von mehreren das Holz, von andern die Blätter, Rinde, Wurzel, Früchte, Saamen, Blüten, gebraucht. Die Zugutmachung der Holzarten liefert neue Artikel von Wichtigkeit, Pech, Asche, Ruß, Theer, Kohlen, Pott-

Pottasche, mit denen wegen ihrer Unentbehrlichkeit ein großer Handel getrieben wird.

S. diese Artikel bey Schedel.

### §. 85.

Diese einzige Familie von Gewächsen beschäftigt also eine Menge Handwerker:

#### a) mit ihrer Verarbeitung

Zimmerleute, Wagner, Dreher, Tischler, Mechanici, Instrumentenmacher, Böttcher, Siebmacher, Schachtel- und Scheffelmacher, Schindel- und Schleissenmacher, Korbmacher, Bildhauer, Formschneider, Ebenisten, Bleystiftfabrikanten, Besenbinder, Sägenmüller, Bohrmüller, die Verfertiger der hölzernen Kämme, Löffel, Zeller, Mulden, Joche, Ruder, Holzschuhe, Schauffeln, Spaden, Dreschflegel, Harken, Holzackeln, Dosen, Pfeiffenköpfe, Spindel, Spuhlen, Peitschen,

#### b) mit ihrer Fällung und Aufarbeitung

die Holzhauer, Nutzholzhauer, Faschinen- und Wellenmacher.

#### c) mit ihrer Zugutmachung

Theer- Pech- und Kohlen Schönler, Kienrußbrenner, Ascherer.

### §. 86.

Und diese Gewerbe machen die Existenz und den lebhaften Betrieb vieler andrer möglich. Endlich nehmen wir aus dieser zahlreichen Gewächscasse

- a) Holzarten zu Waldanlagen, b) Bäume, die Landstrassen damit zu besetzen, c) Bäume, trockne Wiesen schattig und fruchtbar - feuchte trocken zu machen, d) Holzarten unsere Grundstücke damit zu befriedigen, e) Kopfholzplantzungen anzulegen, f) den Flugsand zu dämpfen, g) Wasserufer zu sichern und zu befestigen, h) Heideländer bewohnbar und nutzbar zu machen, i)



den Waldboden zu benutzen, k) für wichtige Gewerbe eigne Pflanzungen der ihnen dienenden Holzarten anzulegen, l) die Landschaften zu verschönern: durch Alleen, Esplanaden, Sommer- und Winterlustwälder, Bosquets.

## V. Methodenlehre.

### §. 87.

Die dendrographische Methodenlehre giebt die Vernunft Principien an, nach welchen die so zahlreichen Holzarten classificirt werden. Ein solches Classificationsregister wird Methode genannt, die eine natürliche, künstliche oder gemischte seyn kann, davon hier die Begriffe aus der Gewächskunde vorausgesetzt werden. Aber ein Register, eine Classification ist kein System, wie man diese methodischen Eintheilungen oft nennen hört, eben so wenig als eine Methodenlehre, eine Systemkunde oder Systematologie.

### §. 88.

Im praktischen Forstwesen werden die Holzarten verschiedentlich eingetheilt. Die für diesen wichtigen Zweig der Oekonomie brauchbarste Eintheilung ist diejenige, welche H. v. Burgsdorf zuerst gelehrt hat und die daher immer wird beybehalten werden:

#### Laubholz.

#### Nadelholz.

| A.                        | B.          |            |   |   |   |   |
|---------------------------|-------------|------------|---|---|---|---|
|                           | Sommergrün. | Immergrün. |   |   |   |   |
| I. Bauholz                | —           | —          | — | — | — | — |
| II. Baumholz              | —           | —          | — | — | — | — |
| a) der ersten             | —           | —          | — | — | — | — |
| b) — zweyten              | —           | —          | — | — | — | — |
| c) — dritten              | —           | —          | — | — | — | — |
| III. Ganze Sträucher      | —           | —          | — | — | — | — |
| IV. Halbe                 | —           | —          | — | — | — | — |
| V. Erdholz                | —           | —          | — | — | — | — |
| a) rankend, b) kriechend. | —           | —          | — | — | — | — |

### §. 89.



## §. 89.

In den botanischen Systemen und Lehrbüchern hat man so vielerley Classificationsregister der Holzarten als Eintheilungsmethoden der Gewächse überhaupt. Hier, wo nur von einer Familie des Gewächsbereiches die Rede ist, sind die Holzarten nach folgenden Schema eingetheilt worden.

I. Holzarten mit bleibenden und

II. — — — abwechselndem Geschlechte.

Bey jenen finden wir folgenden Geschlechtsstand

A. Zwittergeschlecht.

Von Bäumen dieser Classe hat man jederzeit befruchteten Saamen zu erwarten. Man findet sie

- a) mit Zwitterblüthen,
- b) mit männlichen und weiblichen auf einem Stamme,
- c) mit Zwitter und männlich- oder weiblichen Blüthen auf einem Stamme.

B. Getrenntes Geschlecht.

Von Bäumen dieser Classe ist nur dann befruchteter Saame zu erwarten, wenn das Weibchen neben dem Männchen steht.

Bey diesen (Num. II.) wechselt der Geschlechtsstand, und ehe man Saamen von einem Baume dieser Classe sammeln will, muß man ihn zur Blütezeit untersuchen, von welchem Geschlechtsstande er sey. Die Unterabtheilungen sind von der Zahl der Staubfäden und deren freyen oder verwachsenem Stande hergenommen, um dem Lehrling der Holzkunde das auffuchen zu erleichtern. Man wird von dieser Methode weder Vollkommenheit in der Ausführung, noch wahre Vollständigkeit erwarten, beydes hat noch keine Methode geliefert. Aber praktisch brauchbar für den Forstwirth ist sie gewiß. H. Professor Schrank sagt: die Methoden sind unser Nachwerk — aber die Natur läßt sich in diese beschränkte Gränzen nicht einschließen.

§. 95.

Bei dem Gebrauch und Entwurf einer jeden Methode und Methodenlehre kommt aber sehr viel auf richtige bestimmte Begriffe von folgenden hier noch anzuführenden Benennungen an:

- a) Arten, Species sind Gewächse die aus ihres gleichen entsprungen sind, und wieder ihres gleichen hervorbringen.
- b) Abarten, Spielarten, Varietates entspringen aus jenen und bringen nicht allezeit ihres gleichen wieder hervor. Es sind Arten, die aber zufällige Veränderungen durch Cultur, Klima, Boden &c. erlitten haben.
- c) Halbarten, Scheinarten, Subspecies stehen zwischen a. und b. in der Mitte. Sie weichen von den Arten in kleinen Umständen ab, und zeugen beständig ihres gleichen.
- d) Mißgeburten, Verunstaltungen, Monstra, Deformes sind Gewächse in denen die allgemeine Organisation entstellt ist.
- e) Eine Sammlung von Arten welche im wesentlichen übereinkommen, ist eine Gattung, Genus.
- f) Eine Sammlung mehrerer in bestimmten Eigenschaften übereinkommender Gattungen wird Ordnung, Ordo genannt.
- g) Eine Sammlung unter sich ähnlicher Ordnungen Classe, Classis.

Walch. 291. Suclow. 112. v. Berned. 247. Ehrhards Beiträge. II. 49 51. III. 89. v. Wilke Versuch wilde Bäume und Sträucher bey dem ersten Anblick zu erkennen. 1788.

---

# Besondere Dendrographie.

## Erste Abtheilung.

### Holzarten mit bleibendem Geschlechtsstande.

---

Classe I. Zwittergeschlecht.

Unter-Classe I. Zwitterblüten.

Ord. I. Unverwachsene Staubfäden.

#### §. 91.

Gatt. 1. *Syringa*. Lilak. Sommergrünes Laubholz. Die Blumendecke ist einblättrig, vierzahnig. Die Blumenkrone ist einblättrig, trichterförmig, mit einer offenen viertheiligen Mündung, deren Lappen schmal, stumpf und zurückgerollt sind. Staubfäden zwey sehr kurze, sitzen mit ihren Staubbeuteln in der Kronenröhre. Fruchtknoten länglicht rund, hat einen Staubweg von der Länge der Staubfäden mit zweyspaltiger Narbe. Saamenkapsel zweysächrig, zweyschaalig, ungeflügelt. Saame ein einzelner in jedem Fache mit einem häutigen Rande.

#### §. 92.

Art. 1. Gemeiner L. *S. vulgaris* Linn.

Synon. *Syringa foliis ovato-cordatis* Hall. h. n. 531.  
franz. Le Lilas, commun Lilas.

engl. The comon Lilac. Haub. I. 193.

Gemeiner Lilak, türkischer Holder, spanischer Holler, spanischer Hollunder, spanischer Flieder, Springenstrauch, Cerinde, Syrene, Nägeleinstrauch.

Schriftst. Suckow theor. und angewandte Botanik. I. 31.  
C. Bauhini pinax. 398. Borkhausen 61. Lüders botanisch praktische Lustgärtneren. I. 21. Märker. 138. du Ham. Bäume I. 254. V. Schrank's, bayrische Flora. I. 206. Du Ro.



II. 443. Miller dict. n. 1. Linn. spec. plant. ed. III. T. I. p. 11. 10. Fr. Weissmann resolutio ligni Syringae coeruleae in Ephem. nat. cur. Cent. VII. et. VIII. 211. Crells chymisches Archiv. II. 98.

## §. 93.

## Herzförmig = eyrunde Blätter.

Ein sehr gemeiner Heckenstrauch, der auch bisweilen ein Baum dritter Größe wird. Die Blätter sind herzförmig eyrund, glattrandig, auf beyden Flächen sehr glatt, gestielt, ins Kreuz einander gegen über stehend, oben dunkel = unten blasgrün. Blütenstand, Sträußer an den Enden der Zweige. Die Saamenkapsel ist länglicht zusammengedrückt, zugespitzt. Die wohlriechenden Blüten erscheinen im May.

Ab. 1) mit weisser = 2) mit rother = 3) mit blauer Blumenkrone.

Abbild. Delhafen III. t. 13. 14.

## §. 94.

Für den Forstwirth ist dieser Strauch nicht merkwürdig und kommt hier blos als eine einheimisch gewordene Holzart vor. Sein Holz ist ziemlich hart, und an alten Stämmen schön roth geflammt. In Ansehung der Politur, die es gerne annimmt, kommt es dem Olivenholze gleich. Auch wissen Dreher und Tischler, die sich desselben bedienen, ihm durch eine kalte Beize mit Scheidewasser eine schöne rothe Farbe zu geben. Da es fast so hart wie Eisen wird, giebt es die besten Egenzähne. Wenn diese, so lange das Holz noch grün und frisch ist zugeschnitten und hernach getrocknet werden, so ist die Bearbeitung leichter und man kann davon einen Vorrath von theils langen, theils kurzen getrockneten Zähnen halten, um Egen mit langen und kürzern Zähnen zu haben. Die Vermehrung dieser Holzart geschieht am leichtesten durch Absenker in gemischtem frischen Lande.

Das



Das ätherische Oehl von S. v. kommt dem Rosenholzöhl nahe. S. Hagen progr. de plantis in Prussia cultis. Regiom. 1791.

## §. 95.

Gatt. 2. Ligustrum. Rainweide. Laubholz. Die Blumendecke ist klein, stumpf und vierzahnig. Die Blumenkrone ist trichterförmig und hat eine gleichförmige vierspaltige Mündung. Staubfäden zwey, der Blumenkrone eingefügt. Fruchtknoten eyrund, hat einen kurzen Staubweg mit einer dicken gespaltenen Narbe. Frucht eine runde glatte, einfache, viersaamige Beere. Saamen Kerne.

## §. 96.

Art. 2. Sommergrüne R. L. deciduum.

Synon. Ligustrum vulgare Linn. Ligustrum I. Bauh. Hist. I. 528. Hall. hist. n. 530. Ligustrum germanicum C. Bauh. pin. 475. Le Troene comun. The deciduous Privet Mawe dict. n. r. a. Ligustrum, Privet. Hamb. I. 138.

Gemeine Reinweide, Rainweide, Rheinweide, Beinholz, Zaunriegel, Rheinbeerbaum, Rheinbesingbeerstrauch, Reinwunder, spanische Weide, Mundweide, Röhrenweide, Schulweide, Mundholz, Kehlholz, Griesholz, Weisbeinholz, Deutsches Braunheil, Banholz, Beinhölzlein, Beinhülse, Haushülse, Geishülse, Zintenbeerstrauch, Dintenbeerstaude, Eisenbeerstrauch, unächter Hartriegel, weiser Hartriegel, Härtern, Härthern, Kerngerten, Kiengärten, Kerngerste, Heckholz, Grünselbaum, grüner Faulbaum, Chingert.

Borkhausen 250. Germershausen, Hausvater V. 296. Märter 143. Becker 63. Du Ham. I. 253. Du Roi I. 316. von Burgsdorf 223. Oleditsch vermischte Abhandlungen II. 425. Ehrhards ökonomische Pflanzenhistorie, VI. 57. Schwed. Abhandlung, XXV. 270. Moench I. 2. Pollich I. 6. Scopoli I. 7. Schrank I. 206. n. 6. Suttow. 32. Oleditsch, Forstwissenschaft, II. 159. Leonhardis Briefe 129. Denso  
von

von einer neuen Farbe aus dem Ligustro. Phys. Bibl. B. II. S. 167. Weismann Untersuchung der Beeren des Ligustri. Fränk. Samml. I. 313. Kirsten diff. in Virg. verl. alba ligustra cadunt vaccinia nigra leguntur. Altd. 1764. 4. Abb. Kerner t. 42. Cramer Tab. XLII.

## §. 97.

Ey-lanzetförmige stumpfe abfallende Blätter, lange Blütensträußer am Ende der Zweige.

Ein einheimischer harter ganzer Strauch, der in Wäldern, Gebüsch und Hecken sehr gemein ist. Alter der Vollkommenheit funfzehn Jahre. Blütezeit: Jun. Jul. Die Blütenstielchen haben an der Basis ein kleines glattrandiges grünes lanzetförmiges Deckblättchen. Die Blätter sind ey-lanzetförmig, kurzgestielt, stehen zu zwey oder Büschelweise einander gegen über oder abwechselnd. Die reifen Beere sind schwarz, enthalten zwey braune Kerne, die auf der äussern Seite abgerundet, innen wo sie an einander liegen, abgeplattet sind. Sie reifen zu Ende des Octobers, bleiben den Winter über sitzen. Der Saame liegt ein bis anderthalb Jahre in der Erde. Die Wurzel geht einen Fuß tief, breitet sich zwey Fuß weit aus. Das Laub bricht zu Anfang des Mayes aus, fällt in der Mitte des Octobers ab. Wächst hier häufig \*).

## §. 98.

Unsere Rainweide giebt brauchbare Hecken, Lauben und grüne Wände, die aber oft in der schönsten Jahreszeit von spanischen Fliegen entlaubt werden. Aus den Blüten sammeln die Bienen vielen Honigstoff. Die zähen biegsamen Zweige dienen zu Korbmacherarbeit. Das Holz von stärkern Stämmen nimmt eine gute Politur an, giebt kleines Schirr- und Dreherholz, Schuhzwecke, feuert

\*) Bey dieser und folgenden dergleichen Anzeigen ist des Verfassers Wohnort Wiesen gemeint.

feuert gut, und die Kohlen sollen ein vorzüglich gutes Schiespulver geben. Der reifen Beere bedienen sich die niederländischen Weinhändler ihren rothen Weinen eine dunklere Farbe zu geben. Auch kann man eine schöne dunkelviolette Mahlerfarbe daraus bereiten. Hoppe, Weismann und Siffert haben Färbversuche mit ihnen angestellt. Die Vermehrung geschieht am geschwindesten durch Ableger, Nebenschosse und abgeschnittene Zweige. Die Pflanzzeit ist der Frühling.

## §. 99.

Gatt. 3. Lonicera, Lonicere. Laubholz.

Die Blumendecke ist klein, fünfspaltig. Die Blumenkrone ist einblättrig. Ihre Mündung ist in fünf ungleiche zurückgerollte Abschnitte getheilt. Der Fruchtknoten ist eiförmig, hat einen Staubweg, dessen Narbe kopfförmig ist. Staubfäden fünf. Frucht eine zweysächrige vielsaamige Beere. Saamen viele ovale, glatte, harte Kerne.

## §. 100.

## I. Untergattung.

Specklilien Periclymena.

Krankende Stengel, langröhrige Blumen.

Art. 3. Unverwachsene S. P. distinctum.

Synon. Lonicera periclymenum Linn. Periclymenum germanicum Mill. n. 4. du Ham. I. 191. Periclymenum non perfoliatum germanicum. C. Bauh, pin. 302. Caprifolium capitulis ovatis, imbricatis, terminalibus, foliis omnibus distinctis. Hall. hist. n. 673. Lonicera caprifolium germanicum Dod. 41. Gled. II. 187. Le Chevre - feuille ordinaire. The duch - Honeysuckle, german Honeysuckle Maw. the red duch honeysuckle. Hanb. I. 263. Zaunlilie, Waldlilie, wildes Geisblatt, Waldgeisblatt, gemeine Specklilie, je länger je lieber, holländisches Geisblatt, deutsches Geisblatt, gemeines



Geisblatt, Baldwinde, Zaungilge, Lilienfrucht, wildes Caprifolium.

Sudow. 97. v. Burgsdorf. 226. Märter. 182. Becker. 72. Linn. sp. Plant. T. I. 247. Pollich palat. I. 215. Moench hafl. I. 104. Scopoli carn. I. 153. Gleditsch. II. 187. Vorkhausen 260.

§. 101.

Länglichlich eyrunde unverwachsene, einander gegenüber stehende Blätter. Eyrunde Blütenköpfchen am Ende der Zweige.

Ein sommergrünes, einheimisches Rankengewächs. Blütezeit: Julius. Die feststehenden Blütenköpfe sind dicht, eyrund, erscheinen am Ende der Zweige. Die Blüten liegen Dachziegelförmig über einander und sind durch ein eyrundes sanft behaartes Deckblättchen unterschieden. Die Blumenkrone ist groß, weiß, hie und da etwas purpurfarbig, wohlriechend, hat eine etwas gekrümmte, aussen leicht behaarte Röhre. An der Basis des Staubweegs finden sich kleine, stumpfe, weisliche Honigbehältnisse. Die Blätter brechen zu Anfang des Mayes aus, fallen zu Anfang des Octobers ab, sind länglicht eyrund, glattrandig, oben dunkelgrün, unten mit einem weisgraulichen Beschlag überzogen, auf beyden Flächen glatt, undurchwachsen, stehen einander paarweise gegen über. Die untern sind kurzgestielt, die obern sitzen fest. Die Wurzel geht zwey Fuß tief, einen Fuß weit. Die Beere sind bey der Reife (im Sept.) roth, fallen im October ab. Die Saamen sind klein, gelb, liegen acht Monathe.

Ab. a) *Periclymenum serotinum*. Späthblühende Specklilie. b) *Periclymenum quercifolium*. Eichenblättrige Specklilie.



## §. 102.

## II. Untergattung.

**Heckenkirschen, Chamaecerasi.** Gerade Stengel, zweyblüthige Blumenstiele, kurzröhrige Blumen.

Art. 4. Gemeine H. C. dumetorum. C. Bauh.

Synon. Chamaecerasus dumetorum, fructu gemino rubro. C. Bauh. pin. 451. Caprifolium foliis ovatis, acuminatis, subhirsutis, baccis gemellis. Hall. hist. n. 677. Lonicera xylosteum Linn. Sp. plant. T. I. 248. Lonicera chamaecerasus dumetorum. Gleditsch. II. 188. Xylosteum. Dodon. 412. Le Chamaecercisier des haies. The fly honeysuckle. Hanb. I. 142. Hundebeerstrauch, Walpurgisstrauch, Zaunkirsche, Hundskirsche, Wolpermai, Wolbermai, Welperman, Wolbertmei, Walpurgismeie, Zäunling, Purgierkirsche, Teufelskirsche, rothe Vogelkirsche, Flühkirsche, Ahlkirsche, Weinholz, Zwickholz, Beinröhrholz, Teufelsholz, Metternholz, Mutterholz, Marterholz, Sellenholz, Sölenholz, Röhrholz, Tabaksröhrenholz, Fospiepen, Brechweide, falsche Schießbeere, Spröžern, Ströžern, Ahlbaum, Hundsbäum, Läusebaum, Lunkirsch, Fiedelkrümpfchen.

## §. 103.

**Zweyblüthige Blumenstiele, glattrandige sanft behaarte Blätter, die Beere sind am untern Ende verwachsen.**

Ein einheimischer sommergrüner harter Strauch, der in Gebüsch und Hecken wild wächst und im May blüht. Die Aeste stehen einander gegen über. Das Laub bricht in der Mitte des Mayes aus, fällt in der Mitte des Octobers ab. Die Rinde ist an jungen Zweigen röthlich und glatt, an ältern Stämmen weißlichgrau und gestrichen. Die Blätter stehen einander paarweise gegenüber, sind gestielt, eyrund, glattrandig, weich, auf beyden Flächen feinwollig. Die Blattstiele sind sanft behaart und oben gefurcht. Die Blütenstiele kommen einander gegen

über aus den Achseln der Blätter hervor, sind rund, sanftbehaart. An der Spitze sitzen zwei Blüten. Die Kronenblätter sind schmutzigweiß, außen fein behaart. Der Fruchtknoten ist von zwei lanzettförmigen und zwei eyrunden Deckblättchen umgeben. Die Beere stehen zu zwei beisammen, sind bey der Reife roth, an ihrem untern Ende mit einander verwachsen. Die eine ist kleiner als die andre. Sie fallen im August und September ab, enthalten sechs gelbe Kerne, die zehn Monathe in der Erde liegen.

Ab. a) Mit schwarzen Beeren. b) Alpen Hecken-  
kirsche.

§. 104.

Die Blüten der gemeinen Heckenkirsche enthalten vielen Honigstoff, weswegen ihnen die Bienen nachfliegen. Den Beeren ziehen die großen Walbvögel nach. Das harte zähe Holz ist zu allerhand Nutzgebrauch geschikt. Man verfertigt Weberkämme, Rechenzähne und andre kleine Waaren daraus. Als Feuerungsholz giebt es gute Asche. Die langen Zweige geben gute Tabacksröhren. In Gärten dient dieser Strauch zur Abwechslung in Hecken, grünen Wänden, aber in den Forsten wird er nicht kunstmäßig angezogen, da er sich von selbst hinlänglich vermehrt, und wir unsre Sorgfalt auf edlere Holzarten zu richten haben.

§. 105.

Gatt. 4. Solanum. Alfranke. Laubholz.

Die Blumendecke ist radförmig, halb fünfspaltig, bleibend. Die Blumenkrone ist radförmig in fünf lanzettförmige, tiefe Abschnitte getheilt. Staubfäden fünf, sitzen auf der Blumenkrone, haben gegen einander geneigte, fast verwachsene an der Spitze durchlöchernte Staubbeutel, die länglicht und aufrecht sind. Der Fruchtknoten ist einfach, hat einen Staubweg mit stumpfer Narbe.

Die

Die Frucht ist eine vielsaamige, zweysächrige Beere. Die Saamen sind rundliche Kerne.

§. 106.

Art. 5. Steigende A. S. scandens.

*Synon.* Solanum dulcamara Linn. sp. Plant. I. 264. Solanum caule flexuoso frutescente, foliis supremis tripartitis et cordato-lanceolatis. Hall. hist. n. 575. Dulcamara. C. Bauh. pin. 187. La Morelle grimpanse. The Solanum, woody Night-Shade. Hanb. I. 272. Bittersüß, Waldnachtschatten, je länger je lieber, Mäuseholz, wild Stiefwurz, wild je länger je lieber, Hirschkraut, Hirschkraut.

Linn. Spec. Plant. I. 264. Pollich. palat. I. 227. Moench. hafl. I. 94. Scopoli carn. I. 161. Schrank bavar. I. 471. Sudow. I. 102. Gleditsch. II. 139. Leonhardi. 133. Berthausen 256. Märter 184. Becker 74. v. Burgsdorf 246. Odrrien 221. Gataker Observations on the internal use of the Solanum. Lond. 1757. De scorbuto solani scandentis usu curato. Acad. reg. Paris. 1761. Spiessenhof diss. de Dulcamara. Heidelb. 1742. Linnaei diss. de dulcamara. Upsal. 1771. Carrere Memoires sur les vertus, l'usage et les effets de la Douce-amare. Paris 1780. Dela Gressie Essai sur le traitement des Dartres. Paris 1784. Otto diss. de usu medico dulcamarae. Ien. 1784. Rühn von den wahren heilsamen Hirschkraute. Breslau 1785. Piquot über den Gebrauch der Dulcamara in der Samml. für pract. Aerzte. IV. 167. Razout de effectibus solani scandentis, im Journal de Medecine par Roux. T. XXII. 236.

§. 107.

Mit unbewehrten, strauchartigen sich windendem Stengel, unächten Blütenschirmen.

Ein sommergrünes, einheimisches Rankengewächs das an Ufern und Gräben häufig wächst. Die Blüten erscheinen vom Julius bis September in unächten Schirmen aus den Achseln der Blätter. Die Kronenblätter sind violet, die Staubbeutel gelb und pfeilsförmig. Die Blätter stehen abwechselnd, sind gestielt, eysförmig glatt-



rändig, die untern einfach, die obern dreytheilig, oder an der Basis mit großen ohrenförmigen Anhängen versehen. Die Frucht ist eine länglichte runde, durchsichtige, scharlachrothe Beere, reift in der Mitte des Octobers. Die Saamenkerne sind klein, weißlich, rundlich, liegen achtzehn Monate in der Erde. Die Neben schlagen Wurzeln.

## §. 108.

Bey kleinem Wasserbau und Dämmen ist der Nutzen dieser Holzart, die beständig Wasser verträgt, aus der größten Tiefe herauf und wieder hinunter wächst, sowohl zur Brechung der heftigen Gewalt der Ströme als zur Befestigung der Ufer gleich beträchtlich. Die Neben liefern feine Reisgen und Bänder zu Trinkgeschirren, kleinen Fäßgen für Fabrikwaaren, auch werden kleine Körbchen daraus gemacht. Die Vermehrung geschieht am leichtesten durch Ableger, welche bald Wurzel bekommen. Die Blattstiele, jungen Neben, (*Stipites Dulcamarae*) die Rinde werden in verschiedenen Krankheiten gebraucht. Man hat eine Abart mit weißer Blume.

## §. 109.

Gatt. 5. *Rhamnus*. *Rhamnus*. Laubholz.

Von dieser Gattung gehören folgende zwey Arten hieher, als welche beständig Zwitter sind:

a) Der Faulbaum *Rhamnus Frangula*.

b) Der Steinkreuzdorn — — *saxatilis*.

Die Blumendecke ist einblättrig röhrig, in vier bis fünf Abschnitte getheilt. Staubfäden, so viele als Abschnitte der Blumendecke sind. Staubweeg eine Narbe, drey bis viertheilig. Frucht, eine Beere.

## §. 110.

Art. 6. Faulbaum. *Rhamnus Frangula*. Linn.

*Synon.* *Frangula Alnus*. Mill. dict. n. 1. *Frangula du Ham.* I. 177. n. 1. *Alnus nigra baccifera*. C. Bauh. pin.



pin. 428. *Rhamnus inerimis* foliis ovato-lanceolatis, integris, floribus quinquefidis androgynis. Hall. hist. n. 821. *Alnus nigra baccifera*. I. Bauh. hist. I. 561. *Avornus Crescentii*. La Bourdaine. L'aune noire baccifere ordinaire. The comon frangula, Berry bearing Alder. Hanb. I. 166.

Faulbeere, Schiesbeere, schwarze Faulbeere, Pulverholz, Bechner, schwarz Pulverholz, schwarze Schießbeere = Schoßbeere, Läusebaum, Läuseholz, Stinkbaum, Sprecker, Spicker, wilde Kirsche, Spörickenholz, Spöckern, Spröcker, Sprözer, Sporgelbaum, Sporgelbeerbaum, Sporgelbeerstaude, Beerenholz, Pinnholz, Grundholz, deutscher Rhabarberbaum, de Fuhlboim, dat Sprickelholt, Spargelholz, Knitschelbeere, Sprähern, Spargelbeere.

Linn. syst. veg. p. 195. Spec. Plant. T. I. 280. Pollich. Palat. I. 230. Scopoli. carn. I. 164. Schrank. bavar. I. 499. Sukow 112. Becker 56. Märter 136. Borkhausen 232. Dörrien 266. Hausvater V. 288. v. Burgsdorf 216.

§. III.

Unbewafnet. Mit einwegigen Zwitterblüten, eyrunden, glattrandigen Blättern.

Ein sommergrüner, einheimischer, weicher, ganzer Strauch, der keine wahren Knospen oder Augen hat, an Wiesenrändern und Bächen wächst und im Jun. und Jul. blühet. Seine Wurzel breitet sich zwei Fuß weit aus. Die äußere Rinde ist aschgrau, weiß punktirt, die unter ihr liegende grüngelb. Die Blätter brechen zu Anfang des Mayes aus, fallen in der Mitte des Octobers ab, sind langgestielt, länglicht, glattrandig, auf beyden Flächen glatt und glänzend, stehen abwechselnd. Die Nerven ragen auf der untern Fläche vertikal hervor, die Blattstiele sind glatt, grün oder röthlich und oben flach. Die Blüten erscheinen zu vier und mehreren nebeneinander aus den Achseln der Blätter. Die Blütenstiele sind

kurz und haben schwache, eiförmige, gefärbte Deckblättchen. Die Frucht ist eine runde, schwarze Beere, enthält zwey glatte herzförmige Saamenkerne, reift im September, fällt im October ab, und liegt acht Monate in der Erde.

## §. 112.

Die Rinde dieser Holzart enthält viel färbendes Wesen. Sie liefert nach Verschiedenheit ihrer Trockenheit und der genommenen Zusätze verschiedne brauchbare beständige Farben. Bey Pulvermühlen ist die Cultur dieses Strauchs sehr anzurathen. Man haut ihn im Julius ab, schält ihn frisch auf Ort und Stelle, trocknet das Holz und verkohlt es gehörig, wo man Kohlen erhält, die den Hauptbestandtheil des besten Schießpulvers ausmachen, wozu sie ihrer Feinheit und Leichtigkeit wegen eigne Vorzüge haben. Auch von den Beeren erhält man brauchbare Farben. Das Laub war schon in den ältesten Zeiten als ein gutes Futter für Kühe und Schafe bekannt, die es wegen seines süßen schleimigen Geschmacks gerne fressen. Es vermehrt die Milch und reinigt zugleich das Vieh. Den Blüten fliegen die Bienen nach. Die Vermehrung geschieht durch Saamen.

## §. 113.

Art. 7. Steinkreuzdorn. *R. saxatilis*. Med. Mit aufrechtstehendem Stamm, Dornen an dem Ende jedes Zweiges, Zwitterblüten, eiförmig, spizig zulaufenden Blättern.

Ein sommergrüner, einheimischer, sehr dauerhafter ganzer harter Strauch, der auf Felsen wächst, in gutem Boden aber baumartig wird. Die Blumendecke hat drey bis vier Einschnitte, der Staubfäden sind drey bis vier, der Staubweeg ist bis weit über die Hälfte drey bis vier theilig. Die Beere ist rundlicht, hat meistens vier Fächer. Gewöhnlich kommen nur zwey bis drey Saamen zur Reife. Die Blätter stehen auf dreyviertel Zoll langen Stielen. Sie selbst sind fünfviertel Zoll lang, drey-  
vier-

viertel Zoll breit, unten abgerundet, und laufen oben in eine Spitze aus. Der Rand ist fein gezahnt. Die obere Fläche ist dunkelgrün und glänzend, die untre ist nebst den jungen Trieben und Blattstielen mit einer feinen Wolle bekleidet. Von der Wurzel an ist dieser Strauch mit gegen einander überstehenden waagrechten Aesten, die mit den nächst darauf folgenden ins Kreuz stehen, versehen. Die Aeste stehen gewöhnlich nur anderthalb Zoll von einander. In Ansehung des Nutzens möchte diese Art unserm Kreuzdorn gleich kommen.

Churpf. Bemerkungen vom Jahr 1774. 266. Märter beschreibt zwar auch S. 159 einen *Rhamnus saxatilis*, allein die von ihm beschriebene Holzart ist ganz sicher *Rhamnus Lycium scopoli* folglich *Rhamnus infectorius* Linnæi.

## §. 114.

Gatt. 6. *Evonymus*. Spindelbaum. Laubholz. (*Fusago*, *Fusaria*.)

Die Blumendecke ist einblättrig, vier bis fünfstheilig. Die Blumenkrone besteht aus vier bis fünf eysförmigen, offen stehenden Blättchen, welche länger als die Blumendecke sind. Staubfäden vier bis fünf stehen auf dem erhabenen Blumenboden, der sich über den Fruchtknoten hinzieht. Staubbeutel zweykörnig. Fruchtknoten zugespitzt, hat einen Staubweg mit kolbiger Narbe, die bey einigen Arten ohne fernern Staubweg auf dem Fruchtknoten sitzt. Frucht eine fünfeckige, fünffächrige an den Ecken aufspringende Beere. Saame, ein weiser, weicher, kleiner, eyrunder, mit einer farbigen Haut überzogener Kern. Unsere Arten sind sommergrün.

## §. 115.

Art. 8. Gestielter *E. E. petiolatus*.

*Synon.* *Evonymus vulgaris granis rubentibus* C. Bauh. pin. 428. *Evonymus foliis ovato-lanceolatis, serratis, ramis tetragonis*. Hall. hist. n. 829. *Evonymus vulgaris foliis lanceolatis floribus tetrandris, fructu tetra-*



gono. Mill. dict. n. r. Du Roi. I. 222. du Ham. I. 163. Evonymus europaeus. Pollich palat. I. 231. Evonymus vulgaris Scopoli carn. I. 166. n. 267. Schrank bavar. I. 496. Le fusain des bois, le bonnet des pretres. The narrow-leaved Spindle tree.

Spindelbaum, Spillbaum, Spulbaum, Eyerbretterholz, Hahnenhödlein, Hahnenhütlein, Hahnenblösigen, Kagenpfötchen, Mandelbaum, Mangelbaum, Mitschelinsholz, Pfaffenholz, Pfaffenhütlein, Pfaffenmütze, Pfaffenkappel, Pfaffenpfötchen, Pfaffenröslein, Pfaffensorge, Pfefferholz, Pfefferreisselholz, Schlimpfenschleglein, Spillbom, Beschelholz, Zweckholz.

Medicus, botanische Beobachtungen, vom Jahr 1782. S. 310. Märter 123. Becker 57. Dorrien 258. v. Burgsdorf 224. Borkhausen 57. Gleditsch I. 312. Leonhardi 123. Pollich I. 231. Scopoli I. 166 n. 267. Schrank. I. 496. Suckow I. 115.

Abbild. Cramer Tab. XXXVII. Kerner Vol. I. Tab. XX.

S. 116.

Lanzetförmig zugespitzte, fein gezahnte, gestielte Blätter, glatte, viereckige Saamenkapseln.

Ein einheimischer ganzer Strauch, der in Vorhölzern und Hecken häufig vorkommt. Die Stammrinde ist grünlichgrau, rauh, die Aeste sind einander entgegen gesetzt, in den jüngern Jahren mit einer grünen Rinde bekleidet, die mit vier röthlichen Linien bezeichnet ist, daß sie viereckig aussehen. Die Blätter stehen paarweise einander gegen über auf kurzen glatten oben gefurchten Stielen, sind länglicht zugespitzt, am Rande kaum merklich gezahnt (folglich bey Cramer unrichtig als glattrandig abgebildet) mit sehr feinen Drüsen an den Zähnen versehen. Sie brechen im May aus, fallen im October ab. Die Blüten erscheinen zu Anfang des Mayes aus den Achseln der Blätter in kleinen Schirmen. Die Kronenblätter (meist vier) sind grünlich gelb, die Narbe ist etwas gespalten. Der Staubfäden sind gewöhnlich vier. Die

Früchte



Früchte haben eine Pfirsichfarbe, die Saamenkerne sind mit einer orangengelben Haut bekleidet. Die Früchte bleiben bis zum Frost an den Zweigen sitzen.

Das starke und gerade Nuzholz wird zu den schönsten Spindeln, zu Faßhahnen, Orgelpfeifen, Clavieren, Ladstöcken, feinen Instrumenten und Dreherarbeiten, Etuis, Zahnstochern, Schuhwecken verarbeitet. Es läßt sich in überaus feine Brettchen spalten, auch liefert es, wenn es in eiserne, eigends dazu bereitete Canäle getrieben und gebrennt worden, die besten Zeichenkohlen. Die Früchte sind Menschen und Thieren schädlich, doch werden sie von einigen Vögeln gesucht, und auch gewöhnlich in die Sprekel zur Lockspeise für Rothkehlchen genommen. Germershausen hat öfters bemerkt, daß wenn seine Schafe in Gegenden, wo dieser Strauch wächst, gehütet wurden, immer eines zurück kam, das von der Epilepsie befallen wurde. Eine geringe Anzahl derselben erregt bey Menschen heftiges Erbrechen und Purgiren. Wenn man sie trocknet, zerreibt und auf den Kopf streuet, tödten sie die Läuse. In Trient soll man ein Lampenöl aus den Kernen pressen. Die Saamenkapseln geben mit schicklichen Zusätzen brauchbare Farben.

S. 117.

Art. 9. Deutscher breitblättriger *S. E. latifolius silvestris*.

*Synon.* *Evonymus latifolius*. Scopoli. I. n. 266. *E. latifolius*, foliis ovato-lanceolatis, floribus pentandris, fructu pentagono, pedunculis longissimis. Mill. dict. n. 2. du Ham. I. 163. du Roi. I. 226. Le Fusain à larges feuilles. The broad-leaved Spindle-tree. Breitblättriger Spindelbaum.

Scopoli carn. I. p. 165. n. 266. Medicus l. c. Moench. hafl. I. p. 108. Schrank bavar. I. 497. Sudow 116. n. 2. Borkhausen 56.

S. 118.

## §. 118.

Mit am Rande umgebogenen Kronenblättern, kegelförmigen Hügelchen statt der Staubfäden, Saamenkapseln, welche an den Rändern häutige Flügel haben.

Dieser Strauch, der aber wie der folgende niemals eine nuzbare Stärke erreicht und daher kein Interesse für den Forstwirth hat, wird in Waldungen und Hecken gefunden. Die jungen Zweige sind rundlich, die Blätter stehen einander paarweis gegen über, sind breit, lanzetförmig scharf zugespitzt, am Rande fein und scharf gezahnt, kurz gestielt. Die Blattstiele sind aber gefurcht. Die Blüten erscheinen aus den Achseln der Blätter in kleinen Schirmen. Kronenblätter vier bis fünf gelbbraunlich, mit umgebogenen weislichen Rand. Die Blätter der Blumendecke sind rund, grün, haben einen weislichen Rand. Es sind ihrer so viele als Kronenblätter. Statt der Staubfäden findet man eben so viele kegelförmige Hügelchen als Kronenblätter. Die Narbe ruht auf dem vier oder fünfseitigen Fruchtknoten. Die Saamenkapseln sind vier oder fünfseitig, vier, fünffächrig an den Ecken mit besondern häutigen Flügeln versehen. Man darf ihn mit dem *E. latifolius americanus* nicht verwechseln. S. Hoffmanns Anmerkung bey Marschal.

Abbild. Kerner I. Tab. 88.

## §. 119.

Art. 10. Warziger *S. Evonymus verrucosus*, Linn.

Synon. Le Fusain galleux. The warted spindle tree, the warty sibirian spindle tree.

Borkhausen 57. Märter 123. Becker 71. Marshall 78. Hausvater V. 302. Scopoli carn. I. 166. n. 268. Suckow. 116. n. 3. Medicus l. c. S. 312.

Warzige Aeste und Stiele, halbschwarze Saamen.

Niedriger vom Wuchs als die vorigen Arten. Die Zweige, Blatt- und Blumenstiele sind mit kleinen braunrothen

rothen erhabenen Warzen besetzt. Die Blätter sind kleiner als bey N. 9. Die Blüten erscheinen aus den Achseln der Blätter. Die Abschnitte der Blumendecke und die Kronenblätter sind roth punktirt. Am Grunde eines jeden Staubfadens ist ein Knötchen. Die Staubbeutel gerundet. Das Fruchthaltniß ist roth punktirt. Die Narbe ist blasenförmig, der Staubweg fehlt. Die Saamenkapseln sind etwas runzlicht, ungeflügelt, so lang als breit, die Saamen so weit sie aus dem aufgesprungenen Kapseln heraussehen, schwarz.

§. 120.

Gatt. 7. Ribes, Ribes. Laubholz, sommergrüne Sträucher.

Die Blumendecke ist bauchig, halbfünfspaltig, bleibend, über dem Fruchtknoten sitzend. Die Blumenkrone, ist vergehend, besteht aus fünf, den Abschnitten der Blumendecke eingeschalteten, schuppenähnlichen Blättchen. Staubfäden fünf, kurz, fein, der Blumendecke eingefügt. Die Staubbeutel liegen ganz glatt auf und öffnen sich am Rande. Der Fruchtknoten ist rund, unter der Blumenkrone sitzend. Staubweg einer, hat eine stumpfe zweispaltige Narbe. Die Frucht ist eine von der Blumendecke gekrönte, runde, einfache, genabelte, vielSaamige Beere. Die Saamen sind platte runde Kerne. Sämmtliche Arten sind, bis auf eine, Zwittergeschlechts und haben für den Forstwirth kein Interesse.

§. 121.

### I. Untergattung.

Johannesbeersträucher. *Ribesia inermia*.

Mit unbewasneten Zweigen.

Art. 11. Rother J. R. rubrum. Linn.

Synon. *Grossularia multiplici acino seu non spinosa hortensis rubra*. C. Bauh. pin. 455. *Grossularia rubra* Scopoli. carn. I. 167. *Ribes vulgaris baccis rubris*. Rupp. 100.



jen. 53. Ribes inerme floribus planiusculis, stipulis minimis. Hall. hist. n. 818. Ribes vulgare acidum. I. Bauh. hist. 2 — 97. Le Groseiller a fruit rouge. The common Currant. Hanb. II. 772. Wilder Johannisbeerstrauch, Johannistraublein, Weinbeere, Ribeselsstrauch, Rubigelsstaude, Johannistraube.

Mäntz 151. Dörrien 266. Becker 66. Du Roi II. 309. Borkhausen 268. Linn. Spec. plant. I. 290. Pollich. palat. I. 233. Moench hass. I. 108. Scopoli. carn. I. 167. Schrank bavar. I. 501. Eudem. 119. Gleditsch. II. 243. Hannemann de noxiis ribium esu. Eph. nat. cur. Dec. I. ann. I. p. 177. De aceto e baccis Ribis parando. in Tractat. menstr. oecon. Christian. 1762. 195.

§. 122.

Herabhängende glatte Blüentrauben, etwas plattgedrückte Blüten, zweispaltige Kronenblätter, fünffach eingeschnittene, unordentlich tief und breit gezahnte Blätter.

In Holzungen, Hecken und Feldbüschen. Blüht im April und May, reift seine Früchte um und nach Johannis. Die Wurzel greift weit um sich und treibt viele Schossen. Blütenstand, lange herabhängende Trauben, erscheinen aus dem alten Holze des vorigen Jahres und dessen Aestchen. Die Blüten sind klein, offen, plattgedrückt. Die Kronenblättchen sind zweispaltig. Der Staubweg ist zweytheilig und zurückgebogen. Die Blätter sind fünffach eingeschnitten, am Rande unordentlich gezahnt, von grober Substanz, haben eine runzliche Unterfläche, stehen auf langen Stielen, die auf der obern Fläche platt und etwas gefurcht, auf der untern aber etwas rund sind. Die Knospen treiben früh im Jahre, stehen etwas abwechselnd. Die Beere sind klein durchsichtig.

Johannisbeerwein zu machen S. aus Roziers Obs. et Mem. I. 1773. Marb. p. 184. in Crells chym. Entdeckungen, XI. 171. Berliner Samml. VII. 625. Transactions of the american society. I. 246. Schrank I. 501. und aus diesem Borkhausen 269.

§. 123.

## §. 123.

Art. 12. Schwarze J. *R. nigrum*. Linn.

Synon. *Ribes niger* vulgo dictus, folio olente. I. Bauh. hist. II. 297. *Ribes nigra* Tabern. p. 1083. *Pi-  
pirella*, *Grossularia non spinosa fructu nigro*. Dodon.  
749. Le groseiller a fruit noir, le poivrier. The blak  
Courrant. Hanb. II. 773. Sichtbeere, Ahlbeere, Al-  
besinge, Albesie, Alabeer, Alantbeer, Jungfraubaum,  
Pfefferbaum, Stinkbaum, Wendelbeere, Zeitbeere.

Du Roi. II. 315. Borkhausen 273. Becker 65. Linn. Sp.  
plant. I. 291. Pollich palat. I. 235. Moench hafl. I. 109.  
Schrank I. 503. Sudow 121. Gleditsch II. 244. Camera-  
rius de Rube nigro. Eph. nat. cur. Cent. VIII. 272. Cress-  
chym. Archiv. II. 106. Baker de virtute gelatinae Ribesio-  
rum nigrorum in faucium inflammatione. Philos. Transact.  
A. 459. p. 655. Les propriétés admirables du Cassis. a  
Bourdeaux 1712. Traité du Cassis, contenant sa culture,  
ses vertus. Dijon. 1750. Secretes utiles dans la pratique  
de la médecine etc. augm. d'un traité du Cassis. a Paris 1757.  
C. Fabri. Dissertazione tertia intorno alcune malattie. (Han-  
delt vom Gebrauch der Sichtbeeren bey dem tollen Hundsbiss)  
Florent. 1774.

## §. 124.

Mit hängenden Blüentrauben, länglichen Blüten,  
haarigen Blatt- und Blütenstielen, großen, fetten  
drey bis fünf lappigen Blättern.

Wird mit der vorigen Art öfters in einerley Boden  
gefunden und blüht im April. Die Blätter sind größer,  
fetter, drey bis fünfeckig oder drey bis fünf lappig, schär-  
fer gezahnt und tiefer eingeschnitten, oben glatt unten  
sanft behaart. Die Blattstiele sind an der Basis gefranzt,  
oben gefurcht. Die Blüentrauben kommen aus den  
obern Theilen der kleinsten Zweige, hängen herab, die  
Blüten stehen in ihnen weitläufig zu fünf bis sieben auf  
behaarten Stielchen. Die Blumendecke ist glockenförmig  
und roth, die Blumenkrone ist groß, eyrund, aufrecht,  
die Blättchen sind weisröthlich und stumpf, die Narbe ist  
zwey-

zweythellig, die Frucht ist schwarzviolett, starzhäutig, groß, von widrigen Geschmack und Geruch, reift im Julius. Diese Art muß mit der pensilvanischen schwarzen Johannisbeere nicht verwechselt werden.

## §. 125.

## II. Untergattung.

Stachelbeersträucher, *Grossulariae aculeatae*.

Mit Stachelzweigen.

Art. 13. Rauchhaarige St. *Grossularia hirsuta*.

*Synon.* Ribes *Grossularia* Linn. spec. Plant. I. 291. *Grossularia spinosa*, fructu hirsuto, obscure purpurascente I. Bauh. hist. I. 48. Uva crispa f. *Grossularia*. I. Bauh. hist. I. 47. Le groseiller epinaux a fruits velus. The Gooseberry with prickly branches and hoary berries. Rauchhaarige Stachelbeere, Kruschelbeere, Rauchbeere, Rauchbeere, Klosterbeere, Klosterbeere.

Du Roi. II. 318. Borkhausen 275. Linn. Spec. plant. I. 291. Moench. hass. I. 110. Leers herborn. 66. Schrank I. 504. Sukow 122. Gleditsch II. 245. von Burgsdorf 241.

## §. 126.

Die Haare der Stiele sind wieder behaart. Die Deckblättchen sind dreynblättrig, die Beere rauchhaarig.

In Hecken, Sträuchern und auf Ruinen. Die Blätter sind auf beyden Flächen mit feiner Wolle bekleidet, die Blattstiele kurz behaart, die Blüten gewöhnlich unter sich geneigt. Die Blütenstiele sind röthlich, die Deckblättchen dreyntheilig. Die Beere ist groß, roth, rauchhaarig, reift um Johanni.

## §. 127.

Art. 14. Glatte St. *Grossularia glabra*.

*Synon.* Ribes Uva crispa Linn. Spec. plant. I. 292. *Grossularia simplici acino*, vel *spinosa silvestris*. C. Bauh. pin.



pin. 455. Uva spina Matth. 167. Ribes ramis aculeatis, foliis rotunde lobatis. Hall. hist. n. 820. Le groseiller epineux et sauvage. The wild prickly Gooseberry. Kräuselbeere, Graselbeere, Grünbeere, Brunzel, Kräuselbeere, Krausbeere, Kristohrenbeere, Klusterbeere, Spinelle, Spunelle, Stechdorn, Stichbeere.

Märter 164. Becker 66. Du Roi II. 317. Borkhausen 274. Pollich palat. I. 235. Moench hass. I. 110. Leers herborn. 66. Schrank I. 504. Sudow 122. Gleditsch II. 245.

§. 128.

Glatte Beere, die Blütenstielchen sind zweyblütig, haben an ihrer Basis ein einblättriges Deckblättchen.

Wächst an denselben Orten, hat dünne herabhängende Zweige und blüht im April. Die Blätter sind klein, in drey Hauptabschnitte getheilt, welche mit runden Zähnen versehen sind. Sie kommen zeitig mit der Blüte aus gemeinschaftlichen Knospen auf langen Stielen hervor. Der behaarte Blütenstiel hat gemeiniglich zwey Blüten und an seiner Basis ein einfaches, eysförmiges Deckblättchen. Der Fruchtknoten ist behaart. Die Kronenblätter sind weislich, die Beere länglicht rund, mit einzelnen Haaren sehr dünn besetzt.

§. 129.

Art. 15. Rothe St. Grossularia reclinata.

Synon. Ribes reclinatum Linn. I. 291. Le groseiller epineux a fruit rouge. The Gooseberry with red Berries. Dreyblättriger Stachelbeerstrauch mit dunkelrother Frucht.

Linn. Spec. plant. I. 291. Sudow 121. Borkhausen 276.

§. 130.

Wenig stachelichte zurückgebogene Zweige und Blütenstiele, mit einem dreyblättrigen Deckblättchen.

Diese Art wächst seltener in Hecken und Zäunen als die vorigen Arten, mit denen sie die Zeit der Blüte und Fruchtreife gemein hat. Die Blütenstiele sind mit einem

dreyblättrigen Deckblättchen versehen, tragen eine, selten zwey Blüten. Die Beere sind dunkelroth, sehr süß, bey- nahe ganz glatt. Die Haare der Blattstiele sind einfach. Die Zweige sind nur wenig stachelicht, rückwärts gebogen und liegen sehr unordentlich durcheinander.

## §. 131.

Gatt. 8. Hedera. Epheu. Laubholz.

Die Blumendecke ist klein, fünfstheilig. Die Blumenkrone ist regelmäßig, vier bis fünfblättrig. Staubfäden fünf. Staubbeutel zweispaltig. Der Fruchtknoten ist von der Blumendecke umschlossen, hat einen sehr kurzen Staubweg, dessen Narbe einfach ist. Die Frucht ist eine runde, von der Blumendecke umgebene Beere mit fünf einsaamigen Fächern, und mit einer Haut umkleideten Saamen.

## §. 132.

Art. 16. Gemeiner E. H. Helix. Linn.

Synon. Hedera arborea et poetica major sterilis et humirepens. C. Bauh. pin. 305. Hedera foliis sterilibus trilobatis fructifera, foliis ovato-lanceolatis. Hall. hist. n. 826. Hedera corymbosa. Gleditsch II. 164. Hedera arborea du Ham. I. 206. La lierre. The common Ivy-tree. Hanb. 1., 258. Eppich, Wintergrün, Mauerepheu, Ewig, Erdepheu, Ewig, Waldeppich, Mauerewig, Mauernurz, Baumwinde, Lorbeerkraut, Mauerpfaue, Iven, Ilos, Ilaub, Klimop, Winter-epheu.

Abbild. Cramer Tab. XXXXV.

von Burgsdorf 266. Märter 177. Becker 73. Du Roi I. 300. Dörrien 260. Du Ham. I. 206. Borkhausen 253. Leonhardi 142. Guckow 123. Scopoli carn. I. 169. Schrank bavar. I. 505. Moench hass. I. 110. Pollich palat. I. 236. Linn. Spec. plant. I. 292. Rudbek Diss. de Hedera. Ups. 1716. Linn. Flor. suec. 1707. Hall. Bot. I. 633. Heder diff. de Hedera terrestri. Ald. 1736. Camerarius Hedera terrestri diuretica aqua eius ad pleu.

pleuritidem, sucus ad dissenteriam in Syll. Memorab. Cent. III. 168. Funesti effetti dell' Edera terrestre sopra i Cavalli in Giornale di Medicina. T. IV. 204. T. VIII. 188. Hederae facultas in absumendo lacte. in Dolaei et Waldschmidtii Epist. p. 59.

## §. 133.

Mit Blättern welche ihre Gestalt nach der Verschiedenheit des Alters ändern.

Ein einheimisches immer grünes Kriechgewächs, das sowohl im guten als schlechten Boden fortkommt, an der Erde hinläuft, in welchem Falle es Blüten bringt, oder an Mauern und Bäume hinaufklettert, wo es unfruchtbar bleibt. Man kann bey diesem Gewächs vier Alter (Aetates) unterscheiden, deren jedes anders gestaltete Blätter hat:

- a) im ersten Alter: lanzetförmige, b) im zweyten Alter: fünfklappige, c) im dritten Alter: dreyclappige, der Stamm ist aufrecht gabellos, d) im vierten Alter: eysförmige glattrandige Blätter.

Daher die verschiedenen Nahmen, als:

- a) *H. humirepens*, b) *H. sterilis*, c) *H. arborea*, d) *H. poetica*. C. Bauh. und der blühende *H. corymbosa*. Dies bewog ältere Botaniker aus diesen Aetatibus, vier eigne Species zu machen, welches sie jedoch nicht sind. Die Blüten erscheinen erst im September. Jede Blüte hat eine vielfach gezahnte Umhüllung. Die Kronenblättchen sind grün und haben eingebogene Spitzen. Die Beere sind anfangs grün, bey ihrer Reife im April schwarz, enthalten in einem grünen Mark fünf große eckige Saamenkerne, welche über ein Jahr in der Erde liegen. Die jungen Triebe sind grün, die Rinde der ältern Ranken ist hellbraun. Nach dem Gegenstande hin, woran sie aufklettern, sind sie mit Wurzelwarzen besetzt.

## §. 134.

Dieses Gewächs enthält ägende Säfte. Den Bäumen schadet es, indem es ihre Rinde durchbohrt und ih-



nen Saft entzieht. Das Holz von starken Stammreben ist weich und schwammig, so daß man Filtrirbecher daraus drehen kann. Die Beere werden von den Vogelstehlern gesucht. Bey schweren Geburten der Schafe zeigt sich der Absud des Laubes sehr wirksam. Man kocht die frischen Blätter im starken Biere zur Hälfte desselben ein und giebt den Schafen diesen Absud, wenn er hinlänglich abgekühlt ist.

## §. 135.

Gatt. 9. Ulmus, Ulme. Sommergrünes Laubholz.

Die Geschlechtsdecke ist einblättrig, glockenförmig, in vier, fünf bis acht Abschnitte getheilt. Staubfäden vier, fünf bis acht. Die Blüten erscheinen (mit Ausnahme einer Art) vor Ausbruch des Laubes. Staubbeutel, aufrecht, kurz, vierfach gefurcht. Fruchtknoten kreisrund, aufrecht. Staubweege zwey, zurückgeschlagen, mit haarigen Narben (fehlen bey einer Art.) Saame einer, eyrund, glatt, weißlich, bey einigen Arten am Rande glatt, bey andern behaart. Saamenkapsel, eine eyrunde, trockne, häutige, breitgedruckte Blase. Sie sind sämtlich sehr dauerhaft, doch nicht alle von gleicher Güte, auch kommt vieles auf den Boden an, worinnen sie stehen. Wo dieser es verstattet, treiben sie eine kleine Pfahlwurzel.

## §. 136.

Sie lieben einen guten milden Boden und können auch auf reinen Blößen angebaut werden. Man kultivirt sie in verschiedene Absicht, indem man sie zu Zimmerholz, Schlagholz, Hecken, Hopfen- und Köpfbäumen erzieht, Pflanzungen zu Bastmatten und für Gewehrfabriken anlegt. Sie lassen sich auch leicht versetzen, da sie aber ihre Blüten zeitig treiben; so muß die Pflanzung im Herbst vorgenommen werden. In Paris macht man mancherley Gebrauch von ihnen. Man bedient sich ihrer zur Beschützung, Verzierung und Beschattung. Sie schicken sich

sich sehr gut zu Gartenwänden und Alleen, wo sie allein oder mit andern Laubbäumen angepflanzt werden, zur Befrözung geräumiger Rasenplätze, um Schatten zu geben, zu welcher Absicht sie zu Dickigen oder Gruppen gepflanzt werden. Man setzt sie auch um Wohnhäuser um die Hefigkeit ungestümmer und kalter Winde zu brechen. Ihre Wurzeln greifen zwanzig bis vier und zwanzig Fuß weit um sich, und treiben unsägliche Brut.

## §. 137.

In verschiednen Gegenden am Rhein und Mann, findet man Ulmen an Wiesen und Gärten gepflanzt. Sie werden daselbst alle vier bis fünf Jahre gekörst, doch läßt man allezeit in dem Wipfel des Baumes junges Holz vom vorigen Hieb, zwey, drey, vier Fuß lang stehen, welches zum bessern Wachsthum der Zweige und zur Erhaltung des Stammes selbst viel be trägt. In Hessen und am Westerwalde findet man auf den Viehweiden und andern Plätzen, Ulmen, welche zu vier, fünf, sechs Fuß hoch über der Erde gekappt werden. Oben am Kopfe bleiben fünf, sechs und mehr waagrecht stehende Aeste stehen. Am Ende dieser Aeste ist eben so wie auf dem Hauptstamm ein Kopf anzutreffen. Die auf solche Art eingerichteten Bäume werden daselbst wilde Männer genannt und solche Pflanzungen in ordentliche Schläge eingetheilt.

## §. 138.

Die Ulmen kommen im trocknen und feuchten Boden, auf Ebenen und Bergen fort. In feuchtem Grunde wird ihr Holz weniger fest, und in einem hitzigen sandigen stehen sie früher ab. Ohngeachtet sie stark wachsen; so zehren sie doch das Erdreich nicht aus, daher man sie auch auf Wiesen pflanzen kann. Bey der Annäherung der Zeit der Saamenreife aber, die zeitig im Sommer und oft unvermuthet eintritt, muß man wohl Acht haben: denn es darf nur bey sehr schnell eintretender Reife ein

Wind entstehen, so stürmt er den Saamen vom Baume: Während des sammels und abtrocknens, wird der Boden durch den Pflug oder durch hacken wohl wund, (nicht locker) gemacht, und bey windstillem Regenwetter, wenn man dieses abwarten kann, der Saame, sechs Pfund auf einen Morgen gesäet, und nicht bedeckt.

v. Burgsdorf Forsthandbuch 449. v. Zanthier 93. 96. v. Burgsdorf Anleitung zur Erziehung der vorzüglichsten Holzarten, 259. welche Schrift in der Folge der Kürze wegen v. Burgsdorfs Holzkultur angeführt ist. Hartig 78. 90. Forstmagazin VI. 125. Museum rusticum VII. n. 35. Hannoversche Samml. 1755. S. 1081. Hushållnings Journal. Jan. till. Jun. år. 1789. Stockholm 1790.

### §. 139.

Art. 17. Korfrüster, *U. suberosa*. Moench.

*Synon.* *Ulmus procera* Trag. stirp. 1086. *Ulmus* Matth. ad 1554. p. 91. *Ulmus tetrandra*. Schkuhr Handb. 178. *Ulmus fativa* Mill. dict. n. 3. Leonhardi Briefe 75. L'Ypereau, L'Ormille. The common small-leaved english Elm. Mawe. n. 1. Upright english Elm. Hanb. I. 200. true english Elm. Hanb. I. 6. Kleinblättrige Ulme, rother Rüster, rauhe Ulme.

Ehrhards Beiträge VI. 87. Du Roi II. 502. Borkhausen 37. Becker 30. Münchs Verzeichniß 136. v. Burgsdorf 134. Glebisch 278. n. 3. Sudow 139. n. 3. Germershausens Hausvater V. 233. c.

Abbild. Matth. Comment. ed. 1554. p. 92. Schkuhr t. 67.

### §. 140.

Mit eyrund zugespitzten, doppelt gesägten, in den Lappen der Basis ungleichen Blättern, traubenförmig hängenden Saamenbüscheln, rissiger Stamm- und Astringe.

Die vorzüglichste Art, welche bey uns wild wächst. Sie erreicht schon mit hundert Jahren das Alter der Vollkommenheit, Die Blätter brechen zu Anfang des Aprils aus,



aus, fallen im October ab, sind eyrund zugespitzt, doppelt gesägt, schmahl, heller und weniger rauh und dick als von der folgenden Art. Die Lappen sind ungleich. Die Blüten enthalten vier Staubfäden. Die häutigen, strohgelben, glatten Saamenkapseln sind eyrund und tief eingeschnitten, die Saamenhaut glatt. Der Saame erlangt seine Reife (welche daraus ersichtlich ist, daß das Korn verb und öhlicht befunden wird) zu Anfang des Jun. und einige Tage später als die folgende Art. Die Rinde ist braungrau, am Stamme und den Aesten tiefgespalten wie am Nasholder. Das Holz ist fein, zähe, Kleinjährig, röthlich gefleckt, aderig, kommt dem Eichenholze sehr gleich, und ist ihm in manchen Stücken noch vorzuziehen.

## §. 141.

Unter allen Arten dieser Gattung, liefert der Korfrüster (welchen Namen er von seiner korfartigen Rinde führt) schon mit hundert Jahren das beste Schiff- und Civil-Bauholz. Man verfertigt daraus die besten Glocken- und Dachstühle für die größten Gebäude, Dohm- und andere Kirchen. Würde man dieses Holz in hinreichender Menge haben können; so würde keines, nach dem Urtheile der Kenner, ihm zum bauen vorzuziehen seyn, da man aus Erfahrung weiß, daß Schwellen von diesem Holze (die schon Vitruvius empfahl) weit länger als eichene dauern. Zum Schiffbau nehmen es die Engländer sehr gerne, weil es durch die Canonenkugeln nicht leicht splittert. Da es auch abwechselnde Nässe und Trockniß verträgt; so ist es zum Mühlen- und Wehrbau, zu Bronnenröhren, Pumpen u. d. gl. sehr brauchbar.

## §. 142.

Nicht weniger schätzbar ist es als Werk- und Nutzholz. Die Wagner verfertigen Deichseln, Raben, Felgen, Schienen, Kutschenbäume daraus, und kein Holz ist zur Wagnerarbeit schicklicher, besonders wenn Stücke

davon gemacht werden, die eine schwere Last tragen müssen und dabey zähe seyn sollen. Zu Mühlwellen und Wasserrädern ist es nach dem Lerchen- und Eichenholze das beste, und bey überschlächtigem Zeug hat es vor letzterm noch Vorzug, indem sich die daraus gefertigten Schaufeln nicht leicht werfen. Ferner dient es zu Pressen, Kestern, Haublöcken, Lavetten, Gewehrschäften, die aber etwas schwer ausfallen. Die Stangen geben gute Reissstäbe, Hopfenstangen, Weinpfähle. Tischler, Dreher und Mechaniker schätzen es wegen seiner schönen Maseren und Adern, und verfertigen allerhand feine, äusserst dauerhafte Arbeiten daraus, die nach der Bearbeitung, ohne fernere Politur spiegelglatt werden z. B. Schüsseln, Becher, Teller, Tische, Schränke. Die Instrumentenmacher nehmen es zu Violinen.

## §. 143.

Wenn man Rüstern und also auch diese Art von Jugend auf geschneitelt und in der Folge geköpft hat; so erhält das Holz ein solches vortrefliches Ansehen, daß man nicht errathen kann, was es für eine Holzart ist, indem an den Stellen, wo Aeste weggenommen wurden, eine Menge kleiner schwarzer Pünktgen zum Vorschein kommen. Durch den reichlichen durchdringenden Saft dieses Baumes, der diese Stellen gleich überzieht, und wann sie alsdenn bewachsen sind, bekommen diese Stellen die schwärzeste Farbe und gleichen dem Ebenholze. Der Bast dieser Art ist nicht so gut als von der folgenden, aber der Schleim von den Blasen, die sich auf den Blättern finden, giebt einen guten Mundleim.

S. Berner ökon. Sammlungen, 1763.

## §. 144.

Als Feuerungsholz wird Ulmenholz nicht weniger sehr geschätzt, nur ist es schwer zu spalten. Man erhält von Ulmenwäldern schon im dreißigjährigen Umtrieb alles was von Eichen in diesem Alter erwartet wird, ausser der Höhe,  
in

in der nämlichen Güte. Die Asche, welche das verbrannte Holz zurückläßt, enthält vieles und ein überaus scharfes Laugensalz, und die daraus gebrannten Kohlen sind denen vom Eichenholze weit vorzuziehen.

## §. 145.

Art. 18. Glatte Ulme, *U. octandra*. Schkuhr.

*Synon.* *Ulmus folio glabro*. Ger. emac. 1481. Mapp. alsat. p. 332? *Ulmus longioribus*, *florum et seminum petiolis*. Rupp. jen. ed. 2. p. 266. *Ulmus glabra* Mill? *Ulmus effusa*. Willdr. prodr. n. 296. *Ulmus octandra*. Schkuhr 178. *Ulmus campestris Burgsdorffii* Handb. 137. *Ulmus laevis* Pallas ross. ed. Francof. T. I. P. I. p. 178. *Ulmus ciliata* Ehrh. L'Orme sauvage. The common Elm. Glatter Rüster, Lindbast.

von Burgsdorf Forsthandbuch 137. Ehrhard VI. 88. Schkuhr 178. Becker 29.

Abbild. Schkuhr t. 57.

## §. 146.

Ungleich, doppelt gesägte Blätter. Achtfädige Blüten. Ungleich, lange Blütenstiele. Gefranzter Saamenumschlag.

Diese Art wächst schneller als die vorige, steht ihr aber in Ansehung der Güte des Holzes nach. Ihr Alter der Vollkommenheit erreicht sie mit siebenzig Jahren. Die Wurzel geht zwei Fuß tief und breitet sich gegen vier und zwanzig Fuß weit aus. Die Blätter brechen zu Ende des Aprils aus, fallen in der Mitte des Octobers ab, stehen abwechselnd auf äußerst kurzen Stielen, sind größer und rauher. Die Blüte erscheint einige Tage früher. Die Blütenstiele sind länger aber ungleich. Der Staubfäden sind acht. Die Rinde bleibt lange glatt und reißt nur an ältern Stämmen auf. Am jungen Holze ist sie sehr zähe. Das Holz ist weiß, weich, grobsaderig und nicht sehr dauerhaft.



## §. 147.

Der Bast von dieser Ulme ist sehr zähe und brauchbar, auch liefert die Rinde vom jungen Holze eine gute Lohe. Das Schlagholz ist schon mit zwanzig Jahren haubar, und verewigt sich gleichsam durch die häufige Wurzelbrut, und den abfliegenden Saamen. Gegen die Kälte ist sie eben so dauerhaft als die vorige Art, und nimmt mit einem viel leichtern, lockern Boden vorlieb, wenn er nur etwas Dammerde in seiner Mischung enthält. Man findet sie sowohl an den Rändern der Niedrigungen, als in höhern weit trocknern Lagen, im besten Wachsthum. Saat-Pflanzung und Benutzung hat sie übrigens mit der vorhergehenden Art gemein, und in sandigen Gegenden, wo diese nicht gedeiht, verdient sie alle Aufmerksamkeit und einen thätigern Anbau, der aber auf einem sehr trocknen Boden durch die Anpflanzung geschehen muß.

## §. 148.

Art. 19. Gemeiner Rüster. *U. nuda*. Ehr.

*Synon.* *Ulmus lata*. Trag. stirp. 1086. *Ulmus Cam.* epit. 70. *Ulmus campestris*. Linn. suec. ed. 2. n. 226. Reuster, Rüstholz, Ilme, Ulme, Rüsche, Fliegenbaum, Ospe, Rüsche, Ulmerbaum, Leimbaum.

Borkhausen 33. Leonhardi 75. Pollich palat. I. 251. Scopoli carn. I. 176. Suclow. 138. Ehrhard Vl. 86. Du Roi II. 495.

Abbild. Cam. epit. p. 70. Cam. Kreutt. 40, b. Cramer t. V. Delhafen III. 18. 19.

## §. 149.

Glatte Zweige. Ungleiche, doppelt gesägte Blätter. Sehr kurze, gleichlange Blütenstiele. Nakter Saamenumschlag.

Wächst in niedrigen fruchtbaren Auen. Die Blätter sind in ihren Lappen ungleich, länglicht zugespitzt, dunkelgrün, hart, rauh, mit starken parallel laufenden Ribben durchzogen, am Rande doppelt gesägt. Die Blüte

er-

erscheint in dichten rothbraunen Büscheln, häufig auf den äussersten Zweigen auf sehr kurzen, gleich langen Stielen. Der Saame ist glattrandig. Die Rinde bleibt an den Zweigen immer glatt. Nutzen und Cultur hat diese Art mit den vorigen gemein.

Ab. a) *Ulmus carpinifolia*. Hornbaumblättriger Rüster. Baumgarten Diss. de corticis ulmi usu medico. Lips. 1790.

### §. 150.

Art. 20. Breitblättrige Ulme. *U. scabra*. Linn.

*Synon.* *Ulmus folio latissimo scabro*. Germ. emac. 1481. *Tilia mas* Matth. 175. *Montiulmus* Cord. I. C. 113. L'Orme Tilleul. The witch Hazel. Englische breitblättrige Ulme, Wasserrüster, Bastilme, Urle, Raublinde, Bergrüster, langstieliger Blumenrüster.

### §. 151.

Mit sehr großen, ungleichen, ungleichgezahnten, fast stiellosen Blättern, langen Blütenstielen, großer, grüner Geschlechtsdecke.

Sie erlangt einen hohen schönen und geraden Schaft und wächst auch bey uns wild. Die Blätter werden gegen sechs Zoll lang und vier Zoll breit, sind länglicht zugespitzt, in ihren Lappen ungleich, rauh und fast stiellos. Der Rand ist ungleich gezahnt. Jung gleichen sie mit ihren Schüssen denen von der Haselstaude. Die Blüten erscheinen im April in schirmförmigen Büscheln, auf langen Stielen an den Seiten der Zweige. Die Blätter der Geschlechtsdecke sind groß und grün. Die Rinde ist gelbbraunlich, weispunktirt. Die Krone des Baumes hat einen flatterigen Wuchs. Das Holz ist weich und zerbrechlich.

Borkhausen 36. Sudow 139.

### §. 152.

## §. 152.

Art. 21. Schmahlblättrige U. | U. minor. Münchh.

Synon. Ulmus augustifolia. Mill. n. 6. Ulmus cornubiensis foliis minoribus. West. bot. I. 313. 352. L'Yperau a tres petites feuilles. The small - leaved cornish Elm. Mawe n. 53. narrow - leaved cornish Elm. Hanb. I. 6. 200. Iper, Steinlinde, Biete, Steckwiecke, Epe, kleine Kornwallulme.

Münchhausens Hausvater V. 353. Germershausens Hausvater V. 235.

## §. 153.

Mit schmahlen, länglicht-eyrund zugespitzten, glatten, doppelt gesägten Blättern.

Sie wird in Brüchern häufig gefunden. Ihre Zweige legen sich an den Stamm an, stehen mehr in die Höhe und treiben nicht so sperrhaft als bey andern Arten. Die Blätter sind schmahl, länglicht-eyrund zugespitzt, glatt, am Rande doppelt gesägt, kommen spät im Frühjahr zum Vorschein. Das Holz ist ziemlich hart, besonders von den in schweren trockenem Boden gewachsenen Bäumen. Die Bauern ziehen den im Winter gefällten Bäumen, wenn sie bis an das Frühjahr in der Sonne gelegen haben, den sodann leicht abgehenden Bast ab und nehmen ihn zu Stricken und zu geflochtenen Bienenkörben.

## §. 154.

Art. 22. Holländische U. U. hollandica. Linn.

Synon. Ulmus belgica. L'Ypereau d'Hollande. The duch Elm, narrow - leaved duch Elm. Hanb. I. 200.

Pallas ross. ed. francof. T. I. P. I. p. 184. Sudow 140. Worchhausen 344.

## §. 155.



## §. 155.

Mit meistens gleichlappigen, euförmig zugespitzten, ungleich gesägten Blättern, schwammiger, aufgesprungener Rinde.

Sie wächst um Braunschweig wild und erreicht die Höhe der größten Eichen. Die Rinde ist dick, aufgerissen, doch nicht so sehr als am Korkrüster. Die Blattstiele sind ganz in die zerrissne Rinde eingesenkt. Die Blätter sind klein, hart, rünzlich, euförmig zugespitzt, meistens gleichlappig, ungleich und meistens doppelt gesägt. Die Blüten erscheinen in dichten Büscheln.

Der Wuchs dieser Ulme ist in guten Boden ausnehmend schnell. Man hat fingersdicke Stämmchen gesetzt, welche nach zwölf Jahren bereits einen Fuß im Durchmesser hatten. Die Holländer besetzen ihre Strassen und Alleen damit. Zu Hecken und Gartenwänden schickt sie sich wegen ihres sperrigen Wuchses weniger als zu Alleen und Pflanzungen. Ihr Holz ist hart, zähe und gelb wie Buchsbaumholz.

Ab. a) Mit scheckigen Blättern.

## §. 156.

Art. 23. Amerikanische U. *U. americana*. Linn.

*Synon.* *Ulmus fructu membranaceo, foliis simplicissime ferratis.* Gron. virg. 148. (145.) L'Orme blanc de l'Amerique. The american rough-leaved Elmtree Marsh. 322. The white Elm-tree, with the leaves singly and equally serrated. Wang. 46. Nordamerikanische weisse Ulme.

v. Wangenheim 46. Marschal 322. Sudow 141. Du Roi II, 506.

## §. 157.

Mit eyrund zugespitzten, einfach und klein gezahnten Blättern, die an der Basis ungleich sind. Die Staubweege fehlen, die Saamen sind bis auf das Korn getheilt.

Sie wächst in dem größten Theile von Nordamerika und ihr Wuchs ist ansehnlich und dabey sehr schnell. Die Rinde ist weisbräunlich und sehr zähe, das Holz fest, weis und ziemlich schwer. Die Zweige sind mit einer rauhen, etwas licht gefärbten Rinde bekleidet. Die Blätter sind eyrund zugespitzt, an der Basis ungleich, auf der obern Fläche rauh, auf der untern haarig. Der Rand ist einfach und klein gezahnt. Sie bleiben bis spät in den Herbst sitzen und von Insekten verschont. Die Blüten brechen mit den Blättern aus. Die Narben sitzen ohne Staubweege auf dem Fruchtknoten auf. Die Saamen sind am Rande mit Haaren besetzt und ohnerachtet sie bis auf das Korn getheilt sind, stehen sie doch mit den Spitzen zusammen.

## §. 158.

Diese Ulme verträgt unser Klima sehr wohl. In einem milden, feuchten, warmen Boden ist ihr Wachsthum zum erstaunen schnell, hoch und stark. So gar die abgeschnittenen Zweige schlagen sehr gut an. Sie verträgt das Köpfen und beschneiden und ist zu Lauben, Wengängen u. d. gl. sehr brauchbar. Die davon angelegten Hecken werden schon im dritten Jahre dick und undurchdringlich. Der Stamm erhält eine solche Dicke, daß man in Amerika Canots daraus haut, giebt gutes Brenn- und Kohlholz und ein sehr brauchbares Werk- und Nutzholz. Selbst aus der Rinde dieses Baumes werden in Nordamerika Rachen verfertigt,

Ralm III. 72. 271.

## §. 159.

Art. 24. Weichblättrige U. U. mollifolia.

The american soft - leaved Elm. Marsh. 323.

Mit

Mit feinen, weichen, ungleichen, doppelt gesägten Blättern, gespaltenen Saamenkapseln mit gefranzten Rändern.

Sie wird eben so groß und vielleicht noch größer als die vorhergehende Art, mit der sie dasselbe Vaterland hat. Die Blätter sind länglicht-eyrund, scharf zugespitzt, an der Basis ungleich, am Rande doppelt gesägt, auf der untern Fläche haarig, auf der obern glatt, von feinem und weichem Gewebe. Die Saamenkapseln sind beträchtlich kleiner, an der Spitze eingekerbt oder gespalten, am Rande gefranzt.

§. 160.

Gatt. 10. Viburnum. Schneeballen. Laubholz.

Die Blumendecke ist klein, fünffach eingeschnitten, sitzt über dem Fruchtknoten, fällt nicht ab. Die Blumenkrone ist einblättrig, Glockenförmig, mit fünf stumpfen, zurückgebogenen Einschnitten. Staubfäden fünf, mit rundlichen Staubbeuteln. Staubweege zwey, drey, sehr kurze, fehlen bey manchen Arten. Frucht eine einsaamige Beere. Saame rundlich, breitgedrückt, steinartig.

§. 161.

Art. 25. Gemeiner S. V. Opulus. Linn.

Synon. Sambucus aquatica. I. Bauh. hist. I. 552. Trag. 1001. Sambucus palustris. Dodon. Pempt. 846. Sambucus aquatica flore simplici. C. Bauh. pin. 456. Opulus. Hall. hist. n. 668. Opulus Ruellii Du Ham. Bäume II. 71. L'Obier des bois. The marsh Elder Hanb. I. 197.

Gemeiner Schwelkenbaum, Wasserholder, Schwelkenbeerstrauch, Schwalken, Schwelken, Schwelgen, Schwelgenbeere, Schwallbeere, Schwalgesbeere, Schwalbesbeere, Calinen, Calinkenbeere, Calinchenbeere, Caninienbeere, Calingenbaum, Kalinke, Halinke, Kaline, Kalinkbeere, Kalinkenbeere, Malinenstrauch, Talinkenbeere, Fackelbeere, Fackelbaum, Schießbeere, rothe Schieß-



Schießbeere, Heller, Schweißbeere, Drosselbeere, Markholz, Gooßeflieder, Gänseflieder, Wasserflieder, Wasserflitter, Bechholder, Bachholder, Wasserholler, Wasserahorn, Affholder, Hirschholder, Widder, Rosenholder, Maßholder, Marsholder, wilder Schneeballenstrauch, wilde Gelderrose, Kalkbeere, Gimpelholz.

Suckow 142. Borkhausen 234. Scopoli carn. I. 221. Schrank bavar. I. 575. Moench hass. I. 145. Pollich palat. I. 311. Dörrien 277. Becker 60. Märter 132. Du Roi II. 477. Gleditsch II. 234. v. Burgsdorf Forsthandbuch 220. Münchhausens Hausvater, III. 135. V. 342. Germershausens Hausvater V. 298. Gleditsch vermischte Abhandlungen, II. 413.

Abbild. Cramer T. XXXIX., ist aber nicht ganz richtig. Besser bey Delhafen III. t. 11. 12.

### §. 162.

Mit glatten Blättern, deren Lappen eckig gezahnt sind, drüßigen Blattstielen, großen unfruchtbaren Blüten im Strahl, fruchtbaren Zwittern im Teller.

Ein sommergrüner, einheimischer, dauerhafter Strauch, der in sumpfigen Erlengebüschen, an Wasserrändern, zuweilen aber auch auf erhabenem, etwas feuchten, beschatteten Boden wächst. Sein Wachsthum ist ziemlich schnell, und er treibt auch nach der Abholzung wieder gut nach. Die Rinde ist dunkelgrau, an jungen Zweigen glatt, an ältern Stämmen etwas rauh und zähe. Zweige und Blätter stehen einander gegen über. Diese erscheinen an langen gefurchten Stielen, die an der Basis des Blattes mit Drüsen, und mit zwey hinfälligen, pfriemenförmigen Nebenblättchen besetzt sind. Die Blätter sind am Grunde rundlich gebildet, zertheilen sich oben in drey spizige Lappen, fast wie das Laub des gemeinen Ahorns, und haben einen scharf gesägten Rand. Die obere Fläche ist glatt und hellgrün, die untere matter von Farbe und leicht behaart. Die Blüten erscheinen (hier) zu Ausgang des Mayes und Anfang des Jun. in schönen großen,

großen, flachen, weissen Schirmen, an den Enden der Zweige aus den Achseln der Blätter. Die Strahlenblüthen, welche an der Zahl ungleich sind, sind groß, regelmäßig, weis und unfruchtbar, die Blüten im Teller sind klein, grüngelb und fruchtbare Bwitter mit einem Staubweeg. Die Beere sind anfangs hart und grün, bey der Reife saftvoll und hellroth. Sie bleiben den Winter über hängen und enthalten einen einzigen herzförmigen Saamen, der ein auch zwey Jahre in der Erde liegt.

Ab. a) Scheckiger S. Strauch. V. Opulus foliis variegatis. L'Obier panaché. The striped. Marsh Elder. b) Gefüllter S. Strauch. V. O. flore pleno. L'Obier double. The double Marsh Elder. c) Rosenblütiger S. Strauch. V. O. roseum. L'Obier sterile. The snowball Viburnum. d) Rosenblütiger S. Strauch mit scheckigem Laub. V. O. r. foliis variegatis L'Obier sterile a feuilles panaches. The striped Snowball Viburnum.

## §. 163.

Das Holz dieses Strauchs ist hart, weislich, hat einen etwas bräunlichen Kern und widrigen Geruch. Aus den Blüten hohlen die Bienen vielen Wachs- und Honigstoff. Das Holz kann zu verschiedenen kleinen Instrumenten und Geräthen genommen werden. Die Schuhmacher verfertigen Schuhzwecke daraus. Die jungen Triebe geben gute Pfeiffenröhre. In den Forsten wird dieser Strauch mit andern abgetrieben und zu Wellen aufgebunden. Verkohlt giebt das Holz schwache Stangenkohlen für Kleinschmiede und andere Feuerarbeiter. Den Beeren ziehen die Drosseln begierig nach. Nach Kalms Bericht werden die Beere von den Russen gegessen, und in Curland bereitet man einen Esig daraus. Wegen seines schnellen Wachses und schönen Anschens empfiehlt sich dieser Strauch zu Hecken in niedrigen feuchten Gärten.

## §. 164.

Art. 26. Schlingstrauch. V. Lantana. Linn.

Synon. Viburnum vulgo. C. Bauh. pin. 428. Viburnum Matthioli 217. Camerar. Epit. 122. Lantana vulgo, aliis Viburnum. J. B. Hist. I. 557. Viburnum foliis ovatis, ferratis, subtus tomentosis. Hall. hist. n. 669. Le Coudre moinsienne. The Wayfaring - tree, Pliant - Meally - tree. Hanb. I. 197. Schlingenbaum, Lantanen - Schneeballen, Schlinge, Schlingbaum, Schlingbeerbaum, Weegeschlinge, Weißschlingenbaum, Wiedern, Wiedel, Wiedelbaum, Kandelwiede, Pabstwiede, Pabstbaum, Schergenpabst, Scheriken, Scherben, Scherbiken, Patscherben, Petscherben, Bandstrauch, Kaulbeere, Kandelbeere, Haubeere, Schießbeere, Tyroler Schwindelbeerbaum, Holdernetteln, Kleiner Mehlbaum, Mehlstrauch, Pappelstrauch, Rothslinge, Schlingweide, Kandelweide, Schlungbeer, Bügelholz.

Suckow 143. Pollich palat. I. 310. Moench hass. I. 145. Scopoli carn. I. 221. Schrank bavar. I. 547. Gleditsch II. 233. Märter 148. Borkhausen 237. Leonhardi 128. von Burgsdorf 219. Du Roi II. 481. Dörrien 276. Du Hamel II. 264. Münchhausen V. 340.

Abbild. Kerner II. 4. 116. Delhafen III. t. 4. 5.

## §. 165.

Mit herzförmigen, gesägten, an der Basis ungleichen Blättern, die unten weißfilzig sind.

Ein einheimischer, sommergrüner, dauerhafter Strauch, den man in frischem, strengem Boden, so wie in sandigem mit Moorerde vermischem Erdreich antrifft. Er wird zehn und mehr Fuß hoch. Die Zweige sind nicht sehr zahlreich, aber lang und ausserordentlich zähe. Sie schießen oft in einem Jahre sechs Fuß lang in die Höhe. Ihre Rinde ist im Winter glatt und graulich, auf braun ziehend, besonders nahe am Fuß der Äste. Die jüngern Zweige sind, so wie sie schießen, sehr



sehr biegsam und mit einer weisgelblichen Wolke bekleidet. Ihre Enden sind, zumahl im Winter, weich und wollig anzufühlen. So wie sie älter werden, wird die Rinde grau und rissig. Die Stämme bleiben dünne. Das Holz ist weisgrünlich, weich, biegsam und hat, wie die vorige Art, eine starke Markröhre. Die Blätter stehen einander gegenüber, sind groß, herzförmig, lederartig, mit starken weislichen Adern durchzogen, auf der obern Fläche dunkelgrün, auf der untern mit einem weislichen Filz überzogen. Die Blattstiele sind kurz und flach. Die wohlriechenden Blüten erscheinen an den Enden der Zweige im Herbst. Sie wachsen den Winter über nicht fort, im May öfnen sich die Knöpfe und im Jun. sind die prächtigen Schirme ganz entfaltet. Alle Blüten sind regelmäßig und Zwitter. An der Basis ihrer Stiele findet sich ein kleines Deckblättchen. Die Kronenblätter sind weis und unter sich gebogen. Die Narben (zwei bis drey) sitzen ohne weitem Staubweeg auf dem Fruchtknoten und zwar die eine gewöhnlich etwas tiefer als die andere. Die Beere sind eyrund, zusammengedrückt, erst gelbgrün, hernach feinroth, nehmen aber endlich eine tiefe schwarze Farbe an. Sie reifen im October und enthalten einen platten, grauen, schwarzgestreiften Stein, der erst nach Jahr und Tag und oft gar nicht aufgeht.

Ab. a) Mit mehr eyrunden Blättern. The oval-leaved Viburnum. b) Mit scheckfigem Laub. V. L. foliis variegatis. Le Coudre moinsienne a feuilles panachees. The striped-leaved Wag-faring-tree. Artet in gutem Boden wieder in die Mutterart ein.

S. 166.

Man treibt diesen Strauch im Unter- und Buschholz ab und kultivirt ihn nicht besonders. Sonst benutzt man ihn auch wohl zu Waldzäunen. Die jungen Zweige geben gute Reitgerten, Wieden zum Wellen binden, Bänder zu Saßarbeiten, Schlingen und Haarseile für das

**Bieh.** Aus den jungen geraden Schüssen werden nach Rzalszynski die bekannten langen polnischen Tobackröhre (Ottowinnen, ungarische Weiden, türkische Weiden) verfertigt. Die Beere werden in den Wildbahnen wegen der Großvögel sehr geachtet, und an einigen Orten von armen Landleuten gespeist. Die Rinde der Wurzel und des Stammes giebt nach Dodonaeus durchsieden im Wasser und nachheriges maceriren in der Erde Bogelleim.

§. 167.

**Gatt. 11.** Sambucus. Hollunder. Laubholz, sommergr.

Die Blumendecke ist in fünf auch vier Einschnitte getheilt, sitzt über dem Fruchtknoten und fällt nicht ab. Die Blumenkrone ist einblättrig und hat so viele rückwärts gebogene Einschnitte als jene. Staubfäden fünf kurze, mit rundlichen Staubbeuteln. Staubweeg einer oval, drüsenförmig, mit drey stumpfen Narben. Frucht, eine rundliche Beere, mit einer Höhle, und drey bisweilen auch nur zwey platten auf der einen Seite eckigen Saamenkernen.

§. 168.

**Art. 27.** Schwarzer H. S. nigra. Linn.

**Synon.** Sambucus fructu in umbella nigro. Du Ham. Bäume. II. 197. C. Bauh. pin. 456. Sambucus arbo-rea, floribus umbellatis. Hall. hist. n. 670. Sambucus vulgaris. J. Bauh. hist. I. 544. Le Surau ordinaire a fruit noir. The common or black Elder. Hanb. I. 183. Gemeiner Hollunder, Glieder, Holder, Holler, schwarzer Beerstrauch, Baumholder, Rechholder, Glidder, Glitter, Blieder, Schiebicken, Schübickenbeere, Alhorn, Alhern.

v. Burgsdorf 211. Märter 124. Becker 59. Borkhausen 238. Endow 145. Pollich pallat. I. 313. Moench haff. I. 146. Hannoversche nützliche Sammlungen vom Jahr 1758. S. 1049. Phys. ökon. Sammlungen, S. 208. Scopoli carn. I. 372. Schrank bavar. I. 577. Gleditsch II. 199. Leonhardi 120. Dörrien 273. Du Roi II. 410. Germershausen

IV. 406. Tidemann historia Sambuci vulgaris. Groening 1733. Wittenb. Wochenblatt, Vol. VI. 256 — 303. IV. 80. Handvr. Magazin 1779. p. 1134. Richards medicin. Wochenblatt, Jahrg. II. St. 39. Dekon. phys. Abhandlungen, XX. S. 706. Berliner Sammlungen, Vol. VII. p. 81. Münchhausen III. 428. Forstmagazin, V. 249. Schrebers Sammlungen, V. 195.

Abbild. Ic. plant. med. t. 334. Cramer t. XXXII. Delshafen III. 7 — 8.

§. 169.

Mit baumartigen Stamme, fünfstheiligen flachen Blumenschirmen, gefiederten Blättern, die aus drei, fünf, sieben lanzetförmigen gesägten Blättchen zusammengesetzt sind.

Er findet sich häufig in unsern Waldungen und Hecken und an ungebauten Orten, erscheint bald als ein Strauch, bald als ein Baum. Die Rinde hat einen widerlichen Geruch. An jungen Zweigen ist sie grün, an den ältern und am Stamme aschgrau, am Stammende etwas aufgerissen, sonst ist sie runzlich und bedeckt eine grasgrüne Rinde. Die Blätter sind ungleich gefiedert, aus fünf bis sieben hellgrünen, kleinen lanzetförmig-zugespizten, am Rande scharf gezahnten Blättchen, wovon das äußerste am größten ist, zusammengesetzt. Sie stehen einander gerade gegenüber. An der Basis der Blattstiele findet man schwache, hinfällige, pfriemensförmige Nebenblättchen. Die Blüten erscheinen in flachen, fünfstheiligen Schirmen an den Spitzen der Zweige im Junius, auf besondern Stielen, die an einem allgemeinen befestigt sind. An der Basis der Blumenstiele stehen kleine, eiförmige, hinfällige, gefärbte Deckblättchen. Die Beere stehen auf röthlichen Stielen, sind anfangs grün, hernach bey ihrer Reife im October schwarzroth, haben einen schwarzrothen Saft und enthalten den Saamen, der oft von Vögeln weggetragen wird und auf hohen Mauern und Ruinen aufkeimt. Die Beere fallen im October ab und liegen bis zur Keimung acht Monate in der Erde.



Die daraus erwachsenden Pflanzen nehmen in gutem Boden geschwind zu und zeigen sich schon im ersten Sommer als kleine Hollunderzweige. Schon im dritten und vierten Jahre bringen sie Blüten und Früchte.

Ab. a) Weisbeeriger H. *S. fructu albo.* Le surau a fruit blanc. The white berried Elder. b) Grünbeeriger H. *S. fr. viridi.* Le Surau a fruit verd. The green berried Elder. c) Eßbarer H. *S. fructu purpurascence eduli.* Le Surau a fruits pourpres et mangeables. The etable red berried Elder. d) Weisgescheckter H. *S. nigra foliis ex albo variegatis.* Le Surau panache de blanc. The silver striped Elder. e) Weisbestäubter H. The silver dusted Elder. f) Gelbgestreifter H. *S. n. foliis ex luteo variegatis.* Le Surau panache de jaune. The yellow striped Elder.

S. 170.

Der schwarze Hollunder gewährt uns so mancherley Nutzen, daß er häufigere Anpflanzung verdient. Die Blüten werden vor ihrem gänzlichen Ausbruch in manchen Haushaltungen wie Gurken eingemacht, und die aufgebrochenen mit Butter gebacken oder mit Milch gekocht, genossen. Sie werden auch für die Apotheken gesammelt und ein Wasser daraus abgezogen. Die zwote grüne Rinde besitzt Heilkräfte und wird im Frühjahr gesammelt. Der Absud der Rinde giebt einige brauchbare Farben. Die noch unreifen grünen Beere, können mit Essig und Salzwasser wie Kapern \*) eingemacht werden. Aus den rei-

\*) Die eigentlichen Kapern sind die eingemachten Blumenknospen und Blumendecken, des stachelichten Kapernstrauchs: *Capparis spinosa* Linn. der in Egypten, Griechenland, Italien und einigen französischen Provinzen, auf Ruinen und Felsen wächst. Sie werden theils in Essig eingelegt, theils blos eingesalzen. Hamburg versorgt einen großen Theil von Deutschland damit. Die feinsten liefert die Gegend um Toulon unter dem Nahmen: *capres capucines*. Auch die jungen Früchte vom Kapernstrauch werden

reifen wird ein Mus bereitet, welches in vielen Gegenden allein oder mit Zwetschgenmus vermischt, die Abendspeise des gemeinen Mannes ist. Der aus den Beeren gepreßte Saft wird zu einer officinellen Selze eingekocht. Die Beere werden auch von manchen Weinhandlern zur Färbung der Weine gebraucht. Auch soll man Brandewein daraus örennen können. Aus den Beeren des weißen Hollunders soll man nach Haller mit einem Zusatz von Zucker, Ingwer und Nelken, einen, dem Frontignac ähnlichen Wein bereiten.

## §. 171.

Das Holz von alten Hollunderstämmen, welches, wenn es ausgetrocknet, weisgelblich, hart und zähe ist, wird zu Einfassungen mathematischer Instrumente, zu Maßstäben, Fischer-Knütt- und groben Filetnadeln, auch andern kleinen Dreherwaaren gebraucht. Die Kunsttischler bedienen sich des Stamm- und Wurzelholzes zu ausgelegten Arbeiten. Es wird mit Nutzen zu Spulen bey Spinn- und Zwirnmaschinen gebraucht, wo sonst andres Holz wegen des schnellen heftigen umlaufens leicht in Brand geräth. Die auf den Stämmen wachsenden Schwämme, *Spongiae sambuci*, *Auriculae Judae*, haben officinelle Kräfte.

## § 4

## §. 172.

den eingemacht und unter dem Nahmen *Cornichons de caprier* verkauft. In Deutschland sollen in der Gegend um Hofheim im Maynzischen viele Kappern gewonnen und in ganzen Ladungen nach dem Niederrhein und nach Holland ausgeführt werden. Wir können uns der eingemachten unreifen Hollunderbeere, der eingemachten Früchte der großen Kapuzinerblume, *Tropaeolum majus* (die hier unter dem Nahmen indische Kresse bekannt ist) und der eingemachten Blumenknochen der überall so häufig wachsenden Pfrieme, *Spartium scoparium*, statt der theuern ausländischen Kappern bedienen. C. *Spartium*.

## §. 172.

Man hat den Hollunder auch zu Hecken vorgeschlagen, weil er in jedem Boden gedeiht, und sein übel-schmeckendes Laub von dem Vieh nicht angegriffen wird. Ueberdies bestaudet er sich sehr und läßt sich gut unter der Scheere halten. Allein das Federvieh dringt bald durch die unten entstehenden Lücken, und das größere Vieh bricht mit leichter Mühe durch. Besser taugt er zu eignen Nutzpflanzungen. Der Saame leidet nur wenig Bedeckung und man muß ihn, bis er aufgeht, feucht und die jungen Pflanzen schattig halten. Wegen seines zeitigen Triebes, zieht man den Herbst, besonders auf feuchtem Boden, andern Jahreszeiten zur Verpflanzung vor.

## §. 173.

Art. 28. Petersilienblättriger S. *S. laciniata*. Linn.

*Synon.* *S. nigra laciniata* Linn. Spec. Pl. Ed. 3. T. I. p. 386. Y. *Sambucus laciniato folio*. C. Bauh. et du Hamel. Le Surau a feuilles de Persil. The Parsley-leaved Elder.

Boisshausen 241. Sudow 146. Du Roi II. 413. Miller IV. 56. n. 2. Ehurpsälz. Bemerk. 1774. 214. Münchhausen II. 450.

**Strauchartiger Stamm.** Doppeltgesiederte Blätter, deren äussere Blättchen abermahls eingeschnitten sind. Drey bis fünfstheilige Ästtersträusser. (Corymbi)

Ein sommergrüner, dauerhafter Strauch, der unsere Winter wohl verträgt, mit der vorhergehenden Art zu gleicher Zeit blühet und seine Früchte zeitigt. Die Rinde kommt mit der Rinde des schwarzen Hollunders überein. Die jungen Zweige und Blattstiele sind gefurcht und rauh. Die Blätter sind doppelt gesiedert. Sie bestehen aus fünf bis sieben gestielten und abermahls gesiederten Blättchen, davon die kleinsten oftmahls wieder eingeschnitten sind. An der Basis der Blattstiele stehen kleine pfriemenförmige Nebenblättchen. Die Blüten erscheinen an den Enden



Enden der Zweige in drey bis fünfstheiligen Schirmtrauben oder Aestersträußern auf kurzen Stielen, und haben nur einen geringen Geruch. Seine Zweige und vorzüglich die jungen Triebe sind wie ein Band mit Insekten umgeben. Die Beere sind klein und bey der Reife schwarz.

## §. 175.

Art. 29. Trauben H. S. *racemosa*. Linn.

*Synon.* *Sambucus racemosa rubra*. C. Bauh. Pin. 456. *Sambucus racemosa acinis rubris*. J. Bauh., hist. I. 551. *Sambucus cervina* Tabernaem. 1029. Le Surau a fruit écarlat. The mountain red-berried Elder. Hanb. I. 183. Bergholler, Steinholler, Hirschholler, rother Holler, Baldholder, wilder Holder, Steinholler, Kefke, Kelfe, Kefke, Schalaster, Schiebgen, Zwitschenbeere, Zwitschenstaude.

Sudow 146. Gleditsch II. 200. Leers. herb. 81. Pollich palat. I. 314. Moench. hass. 147. Scopoli carn. I. 223. Schrank bavar. 578. Leonhardi 121. Borkhausen 243. Märter 126. Du Roi II. 417. Du Hamel Väume II. 198. Dörrien 273. v. Burgsdorf 213.

Abbild. Cramer t. 32. B. Kerner Vol. I. t. 72. Delhasen III. t. 9.

## §. 176.

Die Blätter sind aus drey, fünf, sieben Blättchen zusammengesetzt. Eyrunde, zusammengesetzte Blütensträuben.

Ein einheimischer, sommergrüner, ganzer Strauch, der auch bisweilen als ein kleiner Baum vorkommt. Er erreicht das Alter der Vollkommenheit mit funfzehn Jahren. Die Rinde ist wie am schwarzen Hollunder beschaffen, hat aber ihren unangenehmen Geruch nicht. An den jungen Schüssen ist sie röthlich. Die Knospen sind im Winter groß und aufgeschwollen, und von röthlichbrauner Farbe. Die Blätter stehen paarweis einander gegenüber, sind ungleich gefiedert, aus drey, fünf, sieben,

ben, neun dicken, lanzetförmigen, scharf gezahnten Blättchen zusammengesetzt, brechen zu Anfang des Mayes aus, fallen gegen das Ende des Septembers ab. Die Nebenblättchen sind stumpf und hinfällig. Die Blüten erscheinen in May auf den Enden der Gelenke der letztjährigen Schüsse in eyrunden zusammengesetzten Trauben. Die Blumendecke ist sehr klein. Die Kronenblätter sind weiß, auf grün ziehend, und nach einigen Tagen zurückgeschlagen. Die Beere sind eyrund, hochroth, wäßerig, werden von der Blumendecke gekrönt und reifen im Jul. Sie liegen acht Monate in der Erde, enthalten drey eyrunde gelbliche Saamen und werden von den Drosseln begierig gesucht, so wie das Laub von den Hirschen.

Steht als ein Baum im botanischen Garten und wild findet man ihn in der Teufelskanzel einer Basalt-Grube ohnweit Giesen, im Walde Hangelstein.

§. 177.

Gatt. 12. Staphylaea, Pimpernuß. Sommergrünes Laubholz.

Die Blumendecke ist fünfstheilig, gefärbt und benahe so groß als die Blumenkrone. Die Blumenkrone ist fünfblättrig. Im Grunde derselben befindet sich ein krugförmiges Honigbehältniß. Staubfäden sechs. Staubweege drey, zuweilen auch nur zwey. Frucht eine Blasenfrucht. Die blasigen Kapseln, deren gewöhnlich drey sind, sind verwachsen. Saamen kleine runde, mit einer Narbe gezeichnete Nüsse, mehrentheils zwey in einer Kapsel.

§. 178.

Art. 30. Gefiederte P. St. pinnata. Linn.

Synon. Pistacia silvestris. C. Bauh. pin. 401. Staphylaea foliis pinnatis. Hall. hist. n. 831. Staphylodendron. du Ham. Väume II. 217. Staphylodendron pinnatum. Scopoli. Carn. I. 223. Le Nez - coupé ordinaire. The five - leaved Bladder Nut. Hanb. L. 189. Gemeiner Pim-

Pimpernußstrauch, Klappernuß, Todenköpflerbaum, wilde Pistacien, Paternosterstrauch, Pimpernußle, wilder Kürbisnußstrauch, Rosenkranzstaude, Blasennuß.

Sudow 148. Scopoli carn. I. 223. n. 130. Schrank bavar. I. 578. Dörrien 274. Leonhardi 128. Borkhausen 48. Du Roi II. 439. Märker 142. v. Burgsdorf Forsthandbuch 221.

§. 179.

**Gefiederte Blätter.** Hängende Blüentrauben mit zwei einander gegenüberstehenden Träubgen.

Ein einheimischer Strauch, der im milden Klima wächst und bisweilen auch als ein Baum vorkommt. Die Schüsse sind markig, lang und gerade. Die Knospen pflegen zeitig im Winter so aufzuschwellen und groß zu seyn, als ob sie ausbrechen wollten. Die Blätter sind aus fünf, sieben eyrund zugespizten, feingezahnten, hellgrünen, langgestielten Blättchen zusammengesetzt und stehen einander paarweis gegenüber. An den Seiten der Zweige erscheinen die Blüten in Trauben auf vier Zoll langen Stielen. An diesen stehen die Blütenstiele einander paarweise gegenüber, und das unterste Paar weit von den übrigen entfernt. An jedem Stielchen steht ein weißröthliches Blüthen mit zwei Staubweegen. Hauptstiele, Blütenstiel und Blütenstielchen haben an der Basis lanzetförmige Neben- und Deckblättchen. Die Kronenblätter sind eigentlich weiß und ziehen nur an der Spitze ins Fleischfarbige. Eben diese Farbe nimmt die Blumendecke an. Die zwei bis drei fahlgelben, fast durchsichtigen Blasen sind der Länge nach mit einander verwachsen. Die Saamen sind kleine, harte, glänzendbraune, kugelige Nüsse.

§. 180.

In der Forstwirthschaft hat diese Holzart keinen besondern Nutzen, daher sie auch nicht forstmäßig angebaut wird. Das Holz hat zwar eine schöne Farbe, aber aus  
Abgang



Abgang einer hinreichenden Stärke der Stämme keinen Gebrauch. Indessen werden aus den glänzendbraunen, in den blasigen Saamenkapseln enthaltenen Nüssen von dem gemeinen Manne zuweilen Rosenkränze verfertigt, und die Kerne derselben, nach Haller, in der Schweiz von den Kindern gegessen. Sie geben auch ein Oehl, und lassen sich vielleicht da, wo sie (wie im Oestreichischen in manchen Gegenden) in großer Menge zu haben sind, besser benutzen, als wirklich geschieht. Im botanischen Garten steht sie als ein Baum.

§. 181.

Gatt. 12. Aesculus, Roßkastanie. Sommergrünes Laubholz.

Die Blumendecke ist bauchig, einblättrig, fünfzahnig. Die Blumenkrone ist fünfblättrig, mit ihrem Grunde der Blumendecke eingefügt. Staubfäden sieben, acht. Der Fruchtknoten ist rundlich, von der Blüte umgeben. Staubweg einer, mit zugespitzter Narbe.

§. 182.

Art. 31. Gemeine K. A. Hippocastanum. Linn.

Synon. Castanea equina. Clus. hist. p. 7. Castanea equina. Clus. hist. p. 7. Castanea folio multifido. C. Bauh. pin. 419. Hippocastanum. Hall. hist. n. 1029. Du Hamel. I. 107. Le Manonier d'Inde. The common horse - Chestnut. Hanb. I. 13. Pferdcastanie, wilde Kastanie, indische Kastanie, Berierkastanie, Berierfeste.

Abbild. Jc. plant. med. Tab. 97. Cramer t. 23. B. Delahayen II. 37. 39.

Sudow 180. Du Roi I. 35. Dörrien 252. Märter 71. Borkhausen 49. Scopoli carn. I. 268. n. 450. Schrank bavar. I. 636. Borrowsky's Almanach, 183. 288. Germershausens Hausvater V. 282. Miller. I. 50. Du Hamel I. 207. Journal oeconom. 1751. Oct. Allgemeines Magazin II. 307. Hamburger Magazin, XIII. 28. Berner ökon. Sammlungen

Lungen II. 943. Marlandier Abhandlung vom Hanf. Freys-  
stadt 1763. S. 98. Eburpsälz. Bemerkung 1774. S. 273.  
1780. 177. Medicus über die Veredlung der Roßkastanie.  
Lautern 1780. Beckmanns Beyträge zur Geschichte der Erfin-  
dungen. St. IV. S. 497.

§. 183.

Fächerförmige Blätter, die aus fünf kleinern, feilsör-  
migen, gezahnten Blättern zusammengesetzt sind.  
Pyramidenförmige Blütensträußer. Siebenfädige  
Blüten. Stachelichte Saamenkapseln.

Ein nunmehr bey uns naturalisirter Baum, der  
einen schnellen Wuchs zeigt und ausnehmend dauerhaft  
ist. Die Blätter brechen zeitig hervor, stehen auf  
langen Stielen, und sind aus fünf bis sieben feilsörmigen,  
gezahnten, starknervigen Blättern, welche an dem Haupt-  
stiele fächerförmig ausgebreitet stehen, zusammengesetzt.  
Die jungen Triebe sind mit einem braunröthlichen Wasse  
bekleidet, schießen schnell auf und erreichen ihre jährige  
Größe in drey Wochen. Die Blüten erscheinen in pyra-  
midenförmigen Sträußern im May und man findet bis-  
weilen männliche Blüten unter die Zwitterblüten gemischt.  
Die Kronenblätter sind weiß, mit rothen und gelben Fle-  
cken gezeichnet. Die Rinde ist dunkelgrau, an jungen  
Stämmen glatt, an ältern wird sie nach und nach rauh  
und schuppig. Die Früchte sind mit einer dicken, grün-  
braunen, mit kurzen Stacheln besetzten Schaale, welche  
aus drey Stücken bestehet, bekleidet, gleichen den ächten  
Kastanien, haben von aussen eine harte, glänzende, brau-  
ne Haut. Ausserdem ist der gelbe, reife, mehlichte Kern  
noch mit einer ganz dünnen lichtbraunen Haut überzogen.  
Wächst in hiesiger Gegend häufig.

Ab. a) Mit weisgeschecktem Laube. A. H. foliis ex albo  
variegatis. Le Maronnier d'Inde panaché de blanc.  
The white striped horse - Chesnut. b) Gelbscheckige  
N. N. A. H. foliis ex luteo variegatis. Le Maronnier  
d'Inde panaché de Jaune. The yellow striped horse-

§. 184.

## §. 184.

Schon lange wurde die Roßkastanie zur Verschönerung der Landschaften gebraucht. Man bediente sich dieser Bäume häufig zur Besezung der Chaussees, Allees, Schattengänge, wo sie aber, weil sie in lange, gerade Reihen gepflanzt wurden, zu einförmig ins Aug fallen und ihre eigenthümliche Schönheit nicht recht sichtbar wird. Weit besser nehmen sie sich aus, wenn sie einzeln und beträchtlich weit von einander gepflanzt werden; als wozu sie selbst durch die natürliche Art ihres Wachses, durch ihre schöne kegelförmige Krone, die im Sommer schwelgerisch belaubt ist, bestimmt sind. Besonders geben die von Ausbruch des Laubes dick aufgeschwollenen Knospen und die ungemein prachtvollen Blumen diesem Baume ein kühnes und schönes Ansehen, wodurch er die Einbildungskraft schon in der Ferne auf eine angenehme Art rührt. Zu Dickigen schicken sie sich nicht, weil sie ihre Blätter fallen lassen, wenn sie gedrängt stehen. Wenn man sie aber zu Allees gebrauchen will, so muß man sie mit andern Bäumen von regelmäßigem Wuchs und großem Laube abwechseln lassen.

## §. 185.

Die Früchte haben wohl den meisten Nutzen für das Vieh: denn die versuchten Benutzungen derselben zu Oehl, Brandewein, Haarpuder, Asterkoffee &c. haben nicht zu ihrem Vortheile entschieden. Zur Zeit der Brunst sind sie für Hirsche ein treffliches Futter, daher dieser Baum in Thiergärten angepflanzt zu werden verdient. Man kann Federvieh damit mästen und Schweine thun sich sehr gütlich damit. Rindvieh frist sie unvermischt, noch lieber aber mit Gerstenschrot. Schafe fressen nicht nur die Früchte, wenn man sie ihnen zerschnitten vorlegt, sondern auch die harten mit spizigen Stacheln versehenen Schaaen. Sie sind die zuverlässigste Arznei welche man bis jetzt gegen die Faulsucht der Schafe kennt, und dienen eben so gut, dieser Krankheit vorzubeugen, als sie zu heilen.



heilen. Sobald nach Michaelis Reiffe und Nebel fallen, giebt man Schafen und Lämmern klein geschnittene oder zerstoßene Kastanien mit den Schaalen, einige Tage nach einander des Morgens und Abends. Auf ein Schaf rechnet man fünfviertel Pfund Früchte und Schaalen.

Magazin der Vieharzneykunst, Vol. I. 144. Neues Hamb. Magazin, St. 105. S. 286. Zinkens Leipziger Sammlung, Vol. VII. S. 333. Fränkische Samml. Vol. II. S. 7. Vol. IV. S. 350. Handver. Anz. 1753. St. 63. Handv. Samml. 1746. S. 1455. J. 1755. St. 6. J. 1756. St. 92. J. 1758. S. 239. Handver. Mag. 1763. St. 72. 1768. St. 93. 1766. St. 79. 97. 103. Beytrag zu den Braunschweiger Anzeigen, 1763. St. 82. Stuttg. phys. ökon. Auszüge, Vol. II. S. 278. Vol. VII. S. 88. Unzers kleine physische Schriften, S. 89. Allgemeines Forstmagazin, Vol. III. S. 97. Rohrs ökon. Reliquien. I. Zehend, S. 13. Beckmanns Beyträge IV. 143. Vermischte Verbesserungsvorschläge, Frankf. 1778. St. 5. Hirschfelds Gartenkalender 1782. S. 251. Neue Stuttg. Realzeitung 1766. S. 91. Defon. Bedenken über allerhand Sachen 1759. S. 302. Gießensche Anzeigen 1767. St. 2. Schriften der Handbr. Landwirthschafts-Gesellschaft, Vol. II. S. 214. Leipziger Intelligenzblatt, 1765. n. 26. 1766. no. 6.

§. 186.

Dem Wasser geben die Früchte eine seifenartige Eigenschaft, wodurch es zum waschen und bleichen der Leinwand brauchbar wird. Aus dem Absud derselben soll man mit Alkali und Oehl eine brauchbare Schmierseife erhalten. Auf Blechhämmern bedient man sich des Absuds der geschroteten Früchte zum beizen des Eisenblechs. Die Schaalen derselben in verschlossenen lutirten Gefäßen verbrannt, geben eine schöne schwarze Farbkohle. Auch liefern Schaalen und Blätter brauchbare Farben. Den Blüten fliegen die Bienen nach. Die jungen Blätter können statt des Hopfens zum Bierbrauen genommen werden. Die Rinde und das Garayische Extract derselben haben officinelle Kräfte. Das Holz dient

zu mancherley Tischlerarbeiten, aber nicht zu Zimmerholz. In Holland nimmt man es zum Formschneiden.

Verfahren Leinwand mit Kastanienwasser zu bleichen: *Handverisches Magazin* 1767. St. 24. Anweisung Leinen und Wollenzeug mit wilden Kastanien zu waschen: *Journal encycl.* T. V. P. I. S. 92. *Handbr. Samml.* 1758. St. 65. Der aus dem Reiche der Wissenschaften wohl versehene Referendarius. T. IX. S. 93. X. 31. Remlers Versuch über die doppepfarbe der Roßkastanienrinde. *Almanach für Scheidekünstler* 1785. S. 124. Secret pour faire une lampe de nuit a peu de frais (mit Roßkastanien) *Gazette salut.* 1768 no. 34. *Handbr. Mag.* 1768. St. 93. Beobachtung der Bienen auf den Kastanienblüthen. *Hamb. Magaz.* Vol. XIX. S. 115.

Vom Gebrauche der Roßkastanien zu Rebpfählen.

*Samml. der Berner ökon. Gesellschaft.* Jahrg. VI. St. IV. S. 131.

Ueber die Heilkräfte der Roßkastanienrinde.

Lettera da Gio. Jac. Zannichelli, speciale all' insegna dell' Ercale d'oro, intorno alle facolta dell' Jppocastano. Venez. 1733. 4. H. W. Peiper diff. de cortice Hippocastani. Duisb. 1763. J. P. Eberhardt diff. de nucis vomicae et corticis Hippocastani virtute medica. Halae 1770. Webers Auszüge, Band I. Wasserbergs Sammlung, T. I. S. 10. El Hypocastano, o Castanna de Indias verdadero succedaneo de la Quina. Madrit. 1774. A. Turra delle febrifuga facolta dell' Jppocastano. Vicenza. deutsch von Jagemann, mit Anmerkungen von D. Buchholz. Weimar 1783. Moenagels praktisches Handbuch, Band I. St. 2. Sabaret de la Verniere von der Fieberkraft des wilden Kastanienbaums im *Journal de Medecine.* T. XXXXVII. S. 324. *Journal encycl.* a Bouillon. 1777. May. Moehring de corticis Hippocastani vi febrifuga in *Commerc. Norib.* Vol. VI. S. 20. *Nova acta naturae Curiosorum.* IV. 264.

S. 187.

Vielleicht lassen sich noch dereinst die Früchte dieses Baumes durch sorgfältigere Kultur veredeln, und für die Menschen brauchbarer machen. Durch diese Früchte geschieht die Fortpflanzung. Die im Herbst der Erde anver-

vertrauten Verfaulen zum Theil, und diejenigen, welche man den Winter über aufbewahren will, müssen in trocknen Sand gelegt werden. Im Frühling legt man sie sodann zwey Zoll tief und drey Zoll von einander. Das Beet wird schattig gehalten. Im zweyten Herbst versetzt man die Pflanzen in die Pflanzschule, in drey Fuß weiter Entfernung. Wenn sie vier bis fünf Jahre da gestanden haben, setzt man sie im Oct. ins freye, in einen nicht zu feuchten noch zu schweren Boden aus.

## §. 188.

Gatt. 14. Vaccinium. Heidelbeere. Laub-Erdholz.

Die Blumendecke ist klein, fünfzahnig, sitzt auf dem Fruchtknoten. Die Blumenkrone ist glocken- oder frugförmig, an der Mündung vier bis fünfspaltig und zurückgebogen. Staubfäden acht bis zehn, dem Fruchtboden einverleibt, und mit Ausnahme einer Art ungewachsen. Staubweeg einer, länger als die Staubfäden, stumpfnarbig. Fruchtknoten rund, sitzt unter der Blumendecke. Frucht, eine genabelte, vierfährige, viel-saamige Beere.

## . §. 189.

## a) Sommergrün.

Art. 32. Sumpf- H. V. uliginosum. Linn.

Synon. Vitis Jdaea secunda. Clus. hist. I. S. 61. 62. Vitis Jdaea magna, Myrtillus grandis. J. Bauh. hist. I. 578. Vitis Jdaea foliis subrotundis exalbidis. C. Bauh. pin. 470. The great. Bilberry. Hanb. Sumpf-Preusselbeere, Trunkelbeere, Tringelbeere, Drumpelbeere, großer Heidelbeerstrauch, großer Kausch, große Kauschbeere, Moorbeere, Bruchbeere, Kostbeere, Jägerbeere, Zugelbeere, Moosheidelbeere, Kranbeere, Krackbeere, Krackbesien, große Ruthecken, Kosbeere.

von Burgsdorf 252. Becker 70. Borkhausen 281. Gleitsch II. 177. Pollich palat. I. 381. Schrank bavar. I. 646. Sudow 187. Du Roi II. 473.



## §. 190.

Einblütige Blumenstiele, verkehrt eyrunde, glattrandige, am Grunde meistens gefranzte Blätter.

Ein Erdstrauch, der auf moorigem und feuchtem Lande bey uns und in den nördlichen Gegenden unseres Erdtheils wächst. Er wird höher und stärker im Holze als die gemeinen Heidelbeere, *V. monadelphum*. Stamm und Aeste sind im Umfange rund. Die Blätter stehen abwechselnd, sind verkehrt eyrund, stumpf, glattrandig, oft an der Spitze sanft ausgerandet, manche an der Basis gefranzt. Uebrigens sind sie glänzend, auf der obern Fläche hellgrün, unten bläulichgrün, mit einem abrigen Netz durchzogen und fallen im Herbst ab. Die Blüten erscheinen im May an den Spitzen der Zweige, in Büscheln und auf einem Stiele immer eine Blüte. Die Kronenblätter sind weiß, die Staubbeutel orangenfarbig, der Staubweeg ist grün. Die Beere reifen im August, sind blau, fast viereckig, wässerig, und haben ein weißliches Fleisch.

## §. 191.

In Gegenden, wo dieses Erdholz häufig wächst und das Brennholz selten ist, muß es die Feuerung auf dem Herde vorzüglich unterhalten helfen. Es hinterläßt eine sehr gute Asche. Die Gerber bedienen sich dieses Strauchs statt des Kiehnposts (*Ledum palustre*). Die Beere sollen in Menge genossen, eine sehr berauschende Kraft haben, weswegen dieser Strauch den Namen Trunkelbeerstrauch erhalten hat. Allein nach Erfahrungen zeigen sie diese Wirkungen nur bey manchen Menschen, und in Kamtschatka zieht man sogar einen sehr flüchtigen Brandwein davon ab. Fast in ganz Italien wird Leder damit gegerbt.

## §. 192.

## b) Immergrün.

Art. 33. Moos = *H. V. oxycoccos*. Linn.

Synon. The Cranberry. Hanb. l. c. Moospreusselbeere, Winterbeere, Schneebeere, Hübelbeere.

Eucfom

Suctow 188. Münchhausen III. 468. Becker 70. Leonhardi 135. Pollich palat. 383. Moench hass. I. 186. Scopoli carn. I. 272. Schrank bavar. I. 648. Borkhausen 285. Leers. 98.

§. 193.

Glattrandige, immergrüne, eyrunde, am Rande umgerollte Blätter. Fadensförmige, nackte, kriechende Stengel.

Ein einheimisches Erdholz, das vorzüglich gern auf Torfboden, sumpfigen Oertern und an morastigen Quellen mit der vorigen Art wächst, wo es mit seinen dünnen rankenden Aeben weit ausstreicht. Die Blätter stehen wechselsweise, meistens auf eine Seite gerichtet, sind immergrün, glattrandig, kurzgestielt, eyrund, oben dunkelgrün und glänzend, unten mattgrün, mit einer starken Ader, die oben eine Vertiefung hervorbringt, durchzogen, am Rande zurückgerollt. Die Rinde ist purpurroth. Die Zweige sind von der Dicke eines Bindfadens, biegsam, zähe, kriechend. Die Blüten erscheinen im Julius zu zwey bis vier auf langen, dünnen, einblütigen Stielen an den Spitzen der Zweige und neigen sich auf die Seite. Die Kronenblätter sind roth. Die Beere sind roth, von der Größe einer Erbse, von säuerlichem Geschmack, reifen im October und bleiben den Winter über hängen. Die Beere werden, wie die Beere der vorhergehenden Art benutzt. Die Goldschmiede nehmen sie zum Weissfieden des Silbers. In Petersburg werden sie in unbeschreiblicher Menge zu Punsch und andern Küchenfabricaten genommen.

§. 194.

Art. 34. Trauben: *V. racemosum*,

*Synon.* *Vaccinium Vitis idaea*. Linn. Spec. Pl. T. I. 500. *Vitis idaea*, folio subrotundo, non crenato, bacis rubris. du Ham. Bäume. II. 276. C. Bauh. 470. *Vitis idaea sempervirens*, fructu rubro. J. Bauh. hist. I. 522. *Vaccinium foliis perennibus ovatis, subtus pun-*

Etatis, oris contractis.. Hall. hist. n. 1022. The red Whorts, whortte Berries. Hanb. Rothe Preusfelbeere, Preiselsbeere, Praiselbeere, rothe Heidelbeere, Rothbesingstrauch, Hammerbesien, Peselbesien, Krackbesien, Krackbeere, Kranbeere, Grandenbeere, Krunbeere, Kronsbeere, Praußbeere, Kraußbeere, Rauschbeere, Kleiner Rausch, Steinbeerlein, rothe Steinbeere, Grifselbeere, Holperlebeere, Bückenbeere, Buckelbeere, Pifselbeere.

§. 195.

Ueberhängende Blüentrauben an den Spitzen der Zweige, immergrüne, verkehrt eyrunde, am Rande zurückgerollte Blätter.

Ein kleines, ungemein wucherndes, einheimisches Erdholz, das kaum eine Spanne hoch wird, zum theil auf der Erde kriecht, und dem Buchs sehr ähnlich ist. Es wächst in trocknen, ausgelichteten Nadelwäldern unter der Heide. Die Blüten erscheinen im Junius an den Enden der Zweige, in überhängenden Trauben, und zeigen sich bey gelindem, feuchten Herbst bisweilen im Sept. zum zweytenmahl. Die Blumen sind weiß, wohlriechend, den Mayenblümchen ähnlich. An der Basis der Blütenstielchen steht ein kleines zugespitztes Deckblättchen. Die Rinde ist an den jungen Zweigen grün, an den ältern graugelblich mit Knötchen besetzt. Die Blätter gleichen den Buchsblättern, sind eyrund, kurz gestielt, an der Spitze, welche umgerollt ist, fein gezahnt, oben dunkel, unten weißlich grün, mit kleinen vertieften, schwärzlichen Punkten bezeichnet, fallen im Winter nicht ab, und stehen abwechselnd. Die Beere sind rund, saftig, von der Blumendecke gekrönt, erst weiß, bey ihrer Reife (im Sept.) hochroth, zuletzt durchsichtig und haben einen angenehmen säuerlich-süßen Geschmack.

Sudow 188. Gleditsch II. 176. Pollich palat. I. 382. Leers herborn. 97. Moench hass. I. 185. Scopoli carn. I. 273. Schrank bavar. 647. Borkhausen 283. Leonhardi 135. Dör-



Dörrien 275. Märter 202. Du Roi II. 475. Münchhausen III. 466. v. Burgsdorf 121.

Abbild. Cramer t. 49. Fig. 3. 4.

§. 196.

Die Blätter dieses sehr gemeinen Unholzes können wie Theeblätter benutzt werden und besitzen auch Heilkräfte. Die Beere sind eine gute Vogelweide, und in den Apotheken wird daraus das bekannte Preuselbeermasser (Aqua baccarum vitis idae) und Preuselbeermuß (Roob vitis idae) verfertigt. Auch aus den Blüten wird ein wohlriechendes Wasser abgezogen. Die Beere werden roh oder gebraten mit Essig, Zucker und Gewürz eingemacht, nach welcher Zubereitung man sie Sonnenweise verschießt und zu Speisen als Salat aufsetzt. Auch hat man diesen Erdstrauch wegen seines schönen Ansehens und weil er sich unter der Scheer halten läßt, anstatt des Buchses in ganz unfruchtbaren sandigen Gegenden, zur Einfassung der Quartiere empfohlen.

§. 197.

Gatt. 15. Erica, Heide. Laubholz.

Die Blumendecke ist vierblättrig, oft doppelt. Die Blumenkrone ist einblättrig, glockenförmig, mit vierspaltiger Mündung. Der Fruchtknoten ist rund und von der Blüte umgeben. Staubfäden acht, dem Fruchtboden einverleibt. Staubweg einer. Saamenkapsel vierfächrig.

§. 198.

Art. 35. Glatte H. E. glabra. C. Bauh.

Synon. Erica vulgaris glabra. C. Bauh. pin. 488. Erica vulgaris Linn. Spec. pl. T, I. 501. Erica foliis imis adpressis, simplicibus floralibus calcaratis. Hall. hist. n. 1012. La bruyère commune. Thê common Heath or Ling. Hanb. I. 509. Gemeine Heide, Heyde, Hebe, rothe Heide.

Gleditsch I. 323. Märter 196. Becker 80. v. Burgsdorf 268. Borkhausen 68. Ehrhard IV. 167. Du Hamel I. 159. Dörrien 257. Pollich palat. I. 384. Schrank bavar. I. 649. Scopoli carn. I. 274. no. 460. Kalm diss. de Erica vulgari. Aboae 1754. Linnaei diss. de Erica. Upsl. 1770. Eiusd. Amoenit. academ. Vol. VIII. p. 46. Webers Auszüge aus Dissert. Band I. Handver. Mag. 1779. S. 1354. Strelitzische Abhandlungen. Tom. I. S. 35. Krünitz Enc. XXII. S. 715. Schwed. Abhandl. VI. 163. Handv. gelehrte Anz. 1753. S. 514. Leers herb. 98.

Abbild. Cramer t. 52. Jc. plant. med. t. 102.

### §. 199.

Glockenförmige, fast gleichartige Blumen, mit doppelter Blumendecke und borstigen Staubbeuteln. Blütenstand: Aehren. Pfeilförmige, obsolet vierseitige, einander gegenüber stehende Blättchen.

Ein sehr gemeines, immergrünes, einheimisches Erdholz, welches in ausgelichteten Wäldern, und auf trockenem, rauhem, sandigem, unfruchtbarem Blößen häufig vorkommt, und diesen den Namen Heide (*Ericetum*) giebt. Der Stamm ist niedrig auf der Erde hingestreckt, treibt mehrere harte, aufgerichtete, theils abwechselnd, theils einander gegenüber stehende braunrothe Zweige. Die Blüten erscheinen im Jul. und Aug. auf den äußersten Zweigen in traubenförmigen Aehren und dauern bis in den Herbst. Die Blumen stehen auf kurzen Stielen und neigen sich auf eine Seite. Die Blumendecke ist doppelt. Die äussere ist theils haarig, theils mit feinen Spornen versehen. Die innere ist glatt. Die Kronenabschnitte sind lilasfärbig. Die Staubbeutel sind gegen einander geneigt, zweygehörnt. Die Narbe ist weisröthlich. Die Blättchen sind ungestielt, fleischig, pfeilförmig, obsolet vierseitig, an der Wurzel zweispaltig, glänzendgrün, oben flach und mit einer weissen Linie bezeichnet, und stehen einander gegenüber. Die einzelnen Paare stehen dicht zusammen und liegen Kreuzweise über-

übereinander. Sie verschaffen diesem Erdholze das Ansehen einer kleinen Eypresse. Im Philosophenwald und andern Gegenden bey Gießen.

Ab. a) Mit weisser Blumenkrone und gelben Staubbeuteln.

Tournef. inst. 602. Leers herborn, 98.

§. 200.

Ob nun gleich die Heide unter die Unhölzer gerechnet wird, so gewährt sie uns doch mancherley Nutzen. Heiden machen ihre Bewohner fleißig. Dieß bestätigt die Erfahrung überall, und im Schagwesen findet man, daß alle Heidedörfer geschwinder als andere bezahlen \*). Im Stifte Osnabrück fällt nach Mösern auf keinem guten Boden ein Stück Linnen. Die Heide wird da, wo sie ganze Striche besetzt hält, auf verschiedene Art genutzt. Man mähet sie, welches aber viele Uebung erfordert, und streut sie dem Vieh unter. Oder man hackt die sogenannten Heidepläzen, führt sie auf Haufen zusammen, läßt sie mit anderm Mist durchbrennen (modern) und bringt sie hienächst auf das Feld. Der mit Heide zubereitete Mist ist kräftig und sehr gut für bindende Felder \*\*).

§. 201.

Die Heide ist ferner nach Suckows und Dambourneys Versuchen, eines der vorzüglichsten Färbgewächse

G 4

für

\*) Möser's osnabrückische Geschichte. I. 96. Davenant discourses on Trade, II. 75.

\*\*) Munds landwirthschaftliches Magazin. II. Jahrgang. IV. Quartal 23. S. Von Ausrottung der Heide (Erica) und Urbarmachung des Heidebodens. (Ericetum) S. folgende Schriften: Fleischhauers ökonomische Vorschläge die Lüneburger Heide arthast zu machen. Göttingen 1754. von Justi ökon. Schriften. B. II. S. 246. Glebitsch phys. ökon, Betrachtung über den Heideboden in der Mark Brandenburg. Berlin 1782. Baylei theoretisch prakt. Werk, die Künste, Manufakturen und Handelschaft betreffend. Aus dem Engl. München und Leipzig 1780. M. A. Forstmagazin V. 132.



für Seiden- und Wollenfärber \*). Ihre Blüten enthalten vielen Honig- und Wachsstoff. Doch hat der Honig von bloßer Heide nicht viele Vorzüge. Ferner dient sie zum gerben \*\*) und zu Spinnhütten für Seidenraupen. Im Winter dient sie dem Rothwildpret zur Nahrung. Wo Reißholz selten ist, wird sie zur Feuerung genommen, wo sie in derben Bündeln eine starke Hitze giebt, und viele und gute Asche zurückläßt. Man macht auch Fasnischen daraus, um tiefe Wege und Löcher auszufüllen.

## §. 202.

In England nimmt man sie nach Plot, zum Bierbrauen anstatt des Hopfens. In nördlichen Ländern nimmt sie der Landmann zu Eindeckungen, und anstatt des Strohes zu Bettsäcken. Auf der Lüneburger Heide macht man aus den zähen Zweigen Kehrbesen, die man häufig nach Hamburg und Holland versührt, und die Heideschnacken, welche gesunder, fetter und wolliger als andere Schafe sind, nähren sich größtentheils von den jungen zarten Keimen der Heide. Um nun immer junge Heide zu haben, stecken die Schäfer die alte Heide gerne an, und brennen sie ab, welches aber oft zu Waldbrünsten Veranlassung gegeben hat.

Haffers Unterricht von der Zucht und Wartung der Schafe. Leipzig 1785. S. 162. 165. Germershausen das Ganze der Schafzucht. Leipzig 1789. I. 175. 212. 214.

## §. 203.

\*) Sukows Versuche über die Benützung verschiedener Gewächse für Färbereyen, in den Vorlesungen der kurpfälz. phys. ökon. Gesellschaft. Mannheim 1788. III. S. 77. Recueil de procédés, et d'expériences sur les teintures solides, que nos végétaux indigenes communiquent aux laines et aux lainages par Dambourney. a Paris 1786. 8.

\*\*) Häute mit Heide zu gerben. London Mag. 1766. May, S. 269. Neues bremisches Magazin I. S. 359.

§. 203.

Art. 36. Sumpf-*H. E. Tetralix*. Linn.

*Synon.* *Erica ex rubro nigricans scoparia*. C. Bauh. pin. 486. *Tetralix*. Hall. Helvet. 418. La bruyere des marais. The fir-leaved Heath. Cross-leaved Heath. Hanb. Winterheide, braunrothe Besenheide, ungarische Heide, brabantische Heide, niederländische Heide, rothschwärzliche Heide.

Suckow 189. Gleditsch 323. Borkhausen 69.

§. 204.

Eyrund glockenförmige Blumen, welche den Staubweeg einschließen. Blütenstand Köpfigen. Blätter gefranzt, zu vier beysammen stehend.

Ein immergrünes Erdholz, das seinen Stand in Niedrigungen und Brüchern hat, und mit seinen Wurzeln die Torfschichten vermehrt, wovon es keinen geringen Theil ausmacht. Es bleibt niedriger als die vorige Art, dringt mit seinen Wurzeln tief in den Boden und blühet im August. Die Blätter sind länger, gefranzt, pfriemenförmig, flach, offenstehend, zu vier auch zuweilen drey beysammen, geben dem Strauch im kleinen das Ansehen einer Fichte. Die Blüten stehen in Köpfchen, die bald dichter, bald lockrer sind. Die gelben, borstigen Staubbeutel stehen in der eyrund glockenförmigen Blumenkrone eingeschlossen. Die Kronenblätter sind weiß. Die trockne Blumendecke bleibt nach dem Verblühen fast immer am Stengel.

Ab. a) Mit rother Blumenkrone und bräunlichen Staubbeuteln. Der Blüte fliegen die Bienen nach. Jung ist diese Heide eine gute Schafweide. In Niedrigungen trägt sie viel zur Erzeugung des Torfes bey.

§. 205.

Gatt. 16. *Daphne*. Kellerhals. Laubholz.

Die Staubgefäße haben nur eine Geschlechtsdecke, welche einblättrig; trichterförmig, regulär, vierspaltig

und weiß ist. Ihre Abschnitte stehen kreuzweis, offen. An den innern Rand ihrer verschlossenen Röhre sind acht Staubfäden befestigt, welche wechselsweise tiefer stehen. Staubweg einer, sehr kurz. Frucht eine einsaamige Beere.

§. 206.

a) Immergrün.

Art. 37. Lorbeer-R. D. Laureola. Linn.

Synon. Laureola sempervirens flore viridi, quibusdam laureola mas. C. Bauh. pin. 462. Thymelaea foliis ellipticis, perennantibus, floribus ex alis nutantibus. Hall. hist. n. 1025. Thymelaea I. du Ham. II. 246, La Laureole. The Spurge Laurel. Hanb. I. 215. Immergrüner Kellerhals, Seidelbast, Zeidelbast, Baldlerbeere, Lorbeerartiger Kellerhals, Lorbeerdaphne.

Suckow 191. Märter 194. Du Hamel II. 246 Du Roi I. 213. Mönchs Verzeichniß 39.

Abbild. Icon. plant. medic. t. 327.

§. 207.

Lanzetförmige, glattrandige, immergrüne Blätter. Fünfblütige Blumentrauben aus den Achseln der Blätter.

Ein Erdholz, das nur zwey, drey Fuß hoch wird, und in niedrigen Gebirgen milder Länder wächst. Den Stamm umgiebt eine zähe, schmußigweise Rinde, welche an den jüngern Zweigen glatt und grün ist. Die Blätter stehen in dichtgedrängten Büscheln, sind fast stiellos, lanzetförmig, dick, glatt, glattrandig, oben glänzend, unten mattgrün. Die Blüten, welche einen angenehmen und unschädlichen Geruch haben, den sie des Abends weit umher verbreiten, erscheinen im May oder April aus den Achseln der Blätter in fünfblütigen Trauben. Die Kronenblätter sind klein und gelblichgrün, die Beere länglichtrund und bey ihrer Reife im Junius, wo sie abfallen, schwarz. Wächst im Ziegelberg bey Gießen.

Ab. a) Mit scheckigen Blättern.

§. 208.



## §. 208.

## b) Sommergrün.

Art. 38. Gemeiner R. D. Mezereum. Linn.

*Synon.* Laureola folio deciduo flore purpureo, officinis laureola foemina. C. Bauh. pin. 462. Thymelaea spica cylindrica, superne foliosa. Hall. hist. n. 1024. Thymelaea III. Du Ham. II. 246. Daphnoides flore purpureo. Tabernaem. hist. lib. III. Cap. 91. p. 1483. Laureola folio deciduo sive Mezereum germanicum. J. Bauh. hist. I. 566. Thymelaea lauri folio deciduo. Tournef. Inst. 595. Piper rusticus. Schwencf. Cat. Silles. 120. Thymelaea Mezereum Scop. carn. I. 276. Le Garou, le Bois gentil. The Mezereon. Haub. I. 116.

v. Burgsdorf 249. Gleditsch II. 168. Borkhausen 251. Märter 192. Dörrien 257. Du Roi I. 211. Gleditsch vollständige Geschichte der Pflanzen. I. 151. Mönchs Verzeichniß 38. Pollich palat. I. 385. Moench hist. I. 188. Pallas ross. ed. franc. I. 126. Scopoli carn. I. 276. Schrank bavar. I. 653. Leers herborn. 99.

Abbild. Jc. pl. medic. t. 3.

## §. 209.

Lanzetförmige, sommergrüne Blätter. Stiellose, zu zwey bis drey unmittelbar aus dem Stengel kommende Blüten.

Dieses kleine Erdholz ist in schattigen Laubhölzern in gutem Boden sehr gemein und kommt im Stande der Wildheit mehr einfach als ästig vor. Stamm und Zweige sind sehr biegsam und mit einer grauen, saftigen, feinen, zähen Rinde bekleidet. Die Blätter sind lanzetförmig, zart, weich, glattrandig, stehen zuerst büschelweise, hernach abwechselnd auf sehr kurzen Stielen und nur an den äußersten Enden der Zweige. Die stiellosen Blumen erscheinen schon im Febr. und vor Ausbruch des Laubes zu drey, vier. Die Mündung der Röhre hat vier ovale zuge-

ge-

gespitzte ausgebreitete Einschnitte. Sie haben einen angenehmen, aber starken, betäubenden Geruch. Innerhalb der Röhre findet man acht kurze, feine Staubfäden mit zweytheiligen Staubbeuteln. Der grüne ovale Fruchtknoten hat einen sehr kurzen Staubweg mit einer etwas plattgedrückten kopfigen Narbe. Er verwandelt sich nach der Befruchtung in eine fleischige, rundliche Beere, von der Größe einer Erbse, die erst grün, bey ihrer Reife im Jun. aber schön scharlachroth und endlich schwarz wird. In jeder Beere ist ein runder Saamenkern, der ein Jahr lang in der Erde liegt.

Ab. a) Mit weißen Blumen und gelben Beeren. b) Mit purpurrothen Blumen und rothen Beeren. c) Mit blasrothen Blumen und rothen Beeren. d) Mit karminrothen Blumen und rothen Beeren. e) Mit gelbgestreiften Blättern.

#### §. 210.

Diese Art enthält, wie die vorhergehende in allen ihren Theilen, besonders in den Beeren, eine starke verdeckte Schärfe, welche sich nicht sogleich durch den Geschmack entdecken läßt, aber nachhero desto empfindlicher wirkt. Die Rinde dient zum Blasenziehen und zu Haarfeilen. Unwissende nehmen die Beere zuweilen an die Speisen, anstatt des Pfeffers, allein wegen ihrer corrosiven Schärfe greifen sie den Magen und die Gedärme an, erregen Fieber, Entzündungen, Convulsionen und wohl gar den Tod. Betrügerische Leute nehmen sie zuweilen an Brandwein und Eßig um ihre Schärfe zu erhöhen, wovon aber Entzündungen des Halses und lang anhaltende Kopfschmerzen entstehen. Nach Lapechin reiben sich in Rußland betagte Schönen und alte magre Stutzer die Wangen mit dem Aufguß der Beere, wovon das Gesicht aufblüht und sehr voll wird, allein bald folgen unerträgliche Schmerzen nach und die Wangen plätzen auf.

Essai sur l'usage et les effets de l'écorce de Garou - par L. D. a Paris 1767. deutsch von Junker, Straßburg 1773.

Ross

Ross diss. de Cortice Thimbleae. Lugd. Bat. 1778. Engel Specimina medica. Berol. 1781. Medicinische Bemerkungen der Gesellschaft in London, Vol. III. 189. J. Home klinische Versuche, Leipzig 1781. Acta acad. Mogunt. 1778 und 1779. Breslauer Natur- und Kunstgeschichte, III. Verf. S. 698. Acta helvet. Vol. V. 325.

## §. 211.

Gatt. 17. Cercis, Cercis. Sommergrünes Laubholz.

Die Blumendecke ist sehr kurz, glockenförmig, fünfzählig und unten bauchig. Die Blume ist eine Schmetterlingsblume. Die Fahne besteht aus einem rundlichen Blättchen, welches mit einem Nagel unter die Flügel eingelenkt ist. Die Flügel sind länger als die Fahne, über sich gebogen und mit langen Nägeln versehen. Das Schiffchen ist aus zwey herzförmigen Blättchen zusammengesetzt. Staubfäden zehn. Staubweeg einer, mit einer einfachen Narbe. Der Fruchtknoten ist gestielt. Unter ihm befindet sich ein Honigbehältniß. Die Hülse ist einsährig, länglicht und enthält wenige, an die obere Nath befestigte Saamen.

## §. 212.

Art. 39. Gemeiner C. C. Siliquastrum. Linn.

Synon. Siliquastrum. I. du Ham. II. 205. Arbor Judae Dod. pempt. 786. The common Judas - tree. Hanb. I. 104. Großer Cercis, Judasbaum, gemeiner Judasbaum, europäischer Judasbaum, Siliquaster Cercis.

Sudow 216. Borkhausen 360. Churpf. Bemerk. 1774. S. 167. Medicus Beyträge zur schönen Gartenkunst. S. 23. 230.

## §. 213.

Mit herzförmig scheibenrunden, glatten, lederartigen Blättern.

Waterland. Süd Europa, der Orient. Sein Stamm ist aufrecht und wird zehn, zwölf, achtzehn bis zwanzig Fuß hoch, und zertheilt sich in eine unregelmäßige ästige Krone.



**Krone.** Die jungen Triebe sind röthlicht. Die Blätter sind herzförmig-scheibenrund, von lederhaftem Bau, glatt, langgestielt, auf der obern Fläche dunkelgrün, unten weisgrau. Am Stiel haben sie einen starken, herzförmigen Einschnitt. Sie bleiben von Insekten verschont und bis spät in den Herbst sitzen. Die Blumen sind schön purpurroth. Schon zu Ende des Aprils ist der Baum damit bedeckt, und bringt sie auch am alten Holze häufig hervor. So wie die Blüten abfallen und zu Schoten ansetzen, erscheinen die Blätter. Für Pflanzungen ist dieser Baum eine wahre Zierde. Die schöne Farbe seines Holzes empfiehlt es zu Tischlerarbeiten. Das Laub mit den grünen Zweigen kann in der Färberey genutzt werden. Bey uns dauert dieser Baum, wenn er einen wohlgeschützten Stand hat, auch im freyen sehr gut aus. Wächst im Ziegelberg, wo er sehr gut fortschlägt.

Ab. a) Mit fleischfarbigen Blumen und grünlichen Trieben. b) Mit weissen Blumen. c) Mit breiten Schoten.

§. 214.

Art. 40. Canadischer C. C. canadensis. Linn.

Synon. Siliquastrum canadense du Ham. l. c. The Canada Judas - Tree. Hanb. l. c. The red - bud - tree. Marsh. 57. The american Judas - tree with downy heart shaped Leaves. The Judas - tree of Canada. Wangenh. 84. Canadischer Judasbaum, Salatbaum.

v Wangenheim 84. Marschal 57. Churpf. Vorlesungen 1774. S. 170. Suckow 217. Du Roi I. 147. Miller I. 651. Mönchs Verzeichniß 21. Du Hamel II. 204.

§. 215.

Mit herzförmig-zugespißten, auf der untern Fläche etwas daunigen Blättern.

Er wächst in verschiedenen Theilen von Nordamerika wild, und erreicht eine Höhe von zehn bis zwölf Fuß. Der Stamm ist ziemlich stark, unregelmäßig ästig, mit einer schwarzgrauen Rinde bedeckt. Das Holz ist gelblich

lich und sehr fest. Die Blätter sind herzförmig zugespitzt, hellgrün, dünne, glattrandig, auf der obern Fläche glänzend, unten von matterer Farbe und etwas daunig. Die Blüten erscheinen vor Ausbruch des Laubes in kurzgestielten Büscheln um die Zweige herum. Die Blumenkrone ist fleischfarbig. Die Schote ist drei bis vier Zoll lang, und einen halben breit.

Ab. a) mit hochrothen. b) mit purpurrothen Blumen.

§. 216.

Das Holz dieses Baumes ist überaus fest und nimmt eine gute Politur an. Es dient zu kleinen Arbeiten der Dreher und Tischler. Die Blumen nehmen die Nordamerikaner zu Salat. Nach Suckows Versuchen verdiente er, wegen seiner vorzüglichen Färbkräfte mehr angepflanzt zu werden.

§. 217.

Gatt. 18. *Ledum*, Riehnpost. Laubholz.

Die Blumendecke ist fünfzahnig. Die Blumenkrone besteht aus fünf flach ausgebreiteten Blättern. Staubfäden zehn. Staubweg einer. Frucht eine einsaamige, fünffährige Kapsel, welche an der Basis anspringt.

§. 218.

Art. 41. *Sumpf-R. L. palustre*. Linn.

*Synon.* *Ledum silesiacum* Clus. hist. p. 83. *Cistus* *Ledon foliis Rosmarini ferrugineis*. C. Bauh. pin. 467. *Ledum silesiacum majus* Schwenkf. p. 120. *Rosmarinum silvestre* s. *bohemicum* Matthio. hist. et Champeuce Cord. hist. 1. *Cistus*. XIII. du Ham. I. 123. *Le Rosmarin sauvage*. The marsh *Cistus*, wild *Rosemary*, Hanb. I. 606. *Rühnrost*, *Rührust*, *Porst*, *Porsich*, *wilder Rosmarin*, *weise Heide*, *Bienenheide*, *Kienporst*, *Tannenporst*, *Schabenkraut*, *Mottenkraut*, *Kirieporst*, *Hartheide*, *Sichttanne*, *Sauchthanne*, *Granze*, *Sau-granze*, *Moorrosmarin*, *Heidnischbienenkraut*.

Suckow

Sudow 225. Du Roi 361. Gleditsch I. 217. v. Burgsdorf 259. Becker 75. Ehrhard III. 127. Gleditsch vermischte Abhandl. II. 172. Beckmanns Technologie 219. n. 1. Pinnees Reisen durch Deland und Gothland 59. Linnaei flora suecica 125. Handbr. nützliche Samml. 1757. St. 12. 21. Linnaei diff. Ledum palustre. Upf. 1775. Ejusd. Amoenit. acad. Vol. VIII. 268. Neue Abh. der Schwed. Academie. B. III. S. 68. Samml. für praktische Aerzte. X. 722.

§. 219.

Mit Rosmarinartigen, gleichbreiten, unten rauhen Blättern und straußweise stehenden Blüten.

Ein einheimischer, immergrüner, dauerhafter, halber Strauch, der in morastigen Gegenden, besonders des nördlichen Deutschlands wild wächst. Er überzieht die Moos- und Torf-Brücher durch seine häufig wuchernde Wurzelbrut und ausfallenden Saamen. Die Blüten erscheinen in Sträußern im Junius und Jul. an den Spitzen der Zweige. Die Blumen sind weiß und haben einen narkotischen Geruch. Die Blumendecke ist sehr klein, grün und einblättrig. Der Blütenstiel ist dünn, einen Zoll lang. Die Blumenkrone hat fünf eyrunde, flache, weißliche Blätter, die Staubfäden sind dünn, weiß, und tragen weißliche Staubbeutel. Der Fruchtknoten ist rundlich, grün. Der Staubweeg hat die Länge der Staubfäden und eine stumpfe Narbe. Die Blätter sind gleich breit, wie am Rosmarin gestaltet, oben dunkelgrün, unten rauh, braungelb, stehen einander gegenüber. Die Rinde ist glattbraun, an den jungen Trieben rostfarbig. Die Kapsel ist fünffächrig, öffnet sich unten in fünf Theile. Der Saame ist klein, länglicht, an beiden Enden zugespitzt, reift und fällt aus im Oct. die meisten Saamenkörner sind taub. Der Saame liegt neun Monate in der Erde.

Ab. a) Breitblättriger R. P. L. p. latifolium. Le R. f. a larges feuilles. The broad-leaved wild Rosemary.

b) Thy-



- b) Thymianblättriger R. P. L. p. Thymifolium. Le R. f. a feuilles de Thyme. The Thyme leaved wild Rosemary. c) Schecfiger R. P. L. p. foliis variegatis. Le Rom. f. a feuilles panachées, The striped - leaved wild Rosemary.

## §. 220.

Der ganze Strauch giebt mit und ohne Blüten eine brauchbare Berberlauge, worinnen das Leder dem englischen gleich gemacht werden kann. Die Blüten lieben die Bienen sehr, und man pflegt ihre Stöcke damit auszureiben. Die frischen Zweige sollen die Wanzen und der Absud derselben die Läuse der Thiere vertreiben. Manche Bierbrauer nehmen den Riehnpost zum Bier, welches aber dadurch eine sehr berauschende, der Gesundheit nachtheilige Eigenschaft erhält. Das von dieser Holzart abgezogene Oehl sollen die Russen mit Birkenöhl vermischt anwenden, um den Tuchten ihren specifischen Geruch zu verschaffen, welches indeß nach glaubenswürdigen Schriftstellern noch nicht so ganz erwiesen ist. Desto gewisser besitzt dieses Erdholz wirksame Heilkräfte.

Die Alten scheinen diesem Erdholze nicht umsonst den Namen Sichtanne gegeben zu haben. Es wäre zu wünschen daß in der ausübenden Arzneykunst Versuche mit dieser wirksamen Holzart angestellt würden.

## §. 221.

Gatt. 19. Andromeda, Andromeda. Laubholz.

Die Blumendecke ist fünfstheilig, gefärbt und bleibend. Die Blumenkrone ist bey einigen Arten glockenförmig, bey andern eckrund, fünfspaltig, mit zurückgebo- genen Abschnitten. Staubfäden zehn pfriemensförmige, kürzer als die Blume, haben zwey gehörnte, nickende Staubbeutel. Der Fruchtknoten ist rundlich, hat einen cylindrischen Staubweg, welcher länger als die Staubfäden ist und eine stumpfe Narbe hat. Die Saamenkapsel ist rundlich, fünfeckig, fünffährig, fünfschaalig,

H

in

in den Kanten aufspringend. Saamen, viele rundliche glänzende.

§. 222.

Art. 42. Hölzblättrige A. A. polifolia. Linn.

Synon. Rhododendron polifolium Scopoli. carn. T. I. p. 287. Rosmarinus silvestris aofinos. Clus. hist. I. 84. Ledum silesiacum minus. Schwenkf. Cat. 121. Polifolia. Buxbaum. Centur. V. p. 28. Acta petrop. II. 345. Vitis ideae affinis, Polifolia montana. J. Bauh. hist. I. 525. L'Andromede. The Marsh Cistus or Wild Rosemary. Hanb. I. 351. Kleiner, wilder Rosmarin, kleine Granze, Lavendelheide, Torfheide, Torf-Rosmarin, Rosmarinheide, falscher Kiehnpost.

Borkhausen 66. Pollich palat. T. I. 403. Schrank bavar. I. 682. Suckow 226 Gleditsch I. 320. Pallas ross. II. von Burgsdorf 271. Becker 79.

Abbild. Buxbaum Centur. Vol. V. t. 49.

§. 223.

Mit abwechselnd stehenden, zurückgerollten Blättern, gehäuftten Blumenstielen am Ende des Stengels und der Zweige. Eysförmige Blumenkrone.

Ein einheimisches, immergrünes, dauerhaftes Erdholz, das an vielen Gegenden in sumpfig-torfigen Stellen vorkommt, und kaum einen Fuß hoch wird. Es hat zähe, kriechende Wurzeln. Die Blüten erscheinen im May am Ende des Stengels und der Zweige. Sie stehen zu mehreren büschelweise beisammen, auf langen purpurrothen Stielchen, die durch eysförmige Blättchen von einander getrennt sind. Die Blumendecke ist sehr klein, rosenroth, fünfstheilig. Die Blumenkrone ist eysförmig, purpurroth, hat eine enge, fünffach eingeschnittene Oefnung, deren Abschnitte zurückgebogen sind. Die Staubbeutel sind zweygehörnt, dunkelroth, niederhängend. Der Staubweeg endigt sich in eine zugerundete röthliche Narbe. Die Saamenkörner sind sehr klein, oval, platt, glän-

glänzend, reifen im Oct. und liegen achtzehn Monate in der Erde. Die Blätter sind lanzetförmig, zurückgerollt, stehen abwechselnd. Die Mitte derselben durchläuft eine erhabene Ader. Die obere Fläche ist dunkelgrün und glänzend, die untere weiß und matt. Die Rinde ist dunkelroth, an älteren Stämmen grau.

## §. 224.

Das Holz ist zum Nutzgebrauch zu schwach. In Torfgründen trägt indeß dieses Erdholz durch seine kriechenden Wurzeln zur Vermehrung des Torfes bey. Sein herber zusammenziehender Geschmack empfiehlt es zu Versuchen in der Gerberey, Färberey und Arzneykunst. In den nördlichen Ländern bedient man sich desselben nach Pallas, statt der Galläpfel, zum schwarzfärben. Schafe aber, auf Torfgründe getrieben, wo dieses Erdholz häufig wächst, bekommen Verstopfungen und erkranken.

*Andromeda polifolia americana major* Wangenh. 106. scheint bloß Abart zu seyn.

## §. 225.

Gatt. 25. *Arbutus*, Bärenbeere. Laubholz.

Die Blumendecke ist fünfstheilig. Die Blumenkrone ist einblättrig, durchsichtig, fünfspaltig. Staubfäden zehn, sind unten sehr dick und wollig. Der Fruchtknoten sitzt auf einem mit zehn Punkten bezeichnetem Blumenboden. Die Frucht ist eine fünffährige Beere, welche kleine Saamen enthält.

## §. 226.

Art. 43. Bärenbeere, *A. Uva ursi*. Linn.

*Synon.* *Uva ursi* Clus. hist. p. 63. *Arbutus caulibus procumbentibus, foliis duris, integerrimis* Hall. hist. n. 1018. *Arbutus noveboracensis*. Colden. noveb. p. 104. *Vitis idaea putata et Uva ursi* Clusii. J. Bauh. hist. I. 523. *Arctostaphyllum*. Siegesb. Fl. p. 13. Le Busserole. The common Bear - berry. Hanb. I. 372. Sandbeere, Bären-



rentraube, Steinbeere, Spanischer Heidelbeerstrauch, Mehlbeere.

v. Burgsdorf 270. Gleditsch 172. Suñow 227. Märter 205. Du Roi I. 69. Du Ham. II. 79.

Abbild. Jc. plant. med. t. 62.

§. 227.

Mit niederliegenden Zweigen, harten, glattrandigen, immergrünen Blättern, welche auf der obern Fläche mit einem vertieften Adergewebe versehen sind.

Ein einheimisches, immergrünes, dauerhaftes Erdholz, das in ungebauten Wüsten und Sandflächen, so wie auf den höchsten Gebirgen gefunden wird, wo es sich Strichweise ausbreitet. Die Zweige sind rothbraun, wachsen sperrigt, sind gegen zwei Fuß lang, auf die Erde gestreckt und dicht belaubt. Die Blätter sind glattrandig, dick, steif, gestielt, stehen bald abwechselnd, bald einander gegenüber, sind auf der untern Fläche dunkelgrün, auf der obern glänzend und mit einem vertieften Adergewebe versehen. Die Blüten erscheinen im May an den Enden der Zweige in Büscheln. Die Blumendecke ist bleibend, sehr klein. Die Kronenabschnitte sind röthlich und haben einen gezahnten Rand. Die Staubbeutel sind getheilt. Der Staubweg ist von der Länge der Blumenkrone. Die Narbe ist dick und rund. Die Frucht ist eine erbsengroße, glatte, rothe Beere, reift im Sept. und enthält viele kleine harte Saamen.

Ab. a) Mit schwarzen Beeren. b) Mit grünlicher Blumenkrone.

§. 228.

Dieses Erdholz verdiente, bey Gerbereyen mehr versucht und gebraucht zu werden, da alle seine Theile einen adstringirenden Geschmack haben. In Schweden wird es zu diesem Endzweck häufig gesammelt und nach Stockholm gebracht, wo es nach Linne's Bericht die Stelle des ausländischen Sumachs vertritt. Auch wird dieser  
Strauch

rauch, nach Vallas und Georgi, im Gouvernement Casan zum gerben der Saffiane und andrer dünnen Felle angewandt, womit sie geschwinder und besser, als auf eine andere Art durchgegerbt werden. Sonst haben die Blätter nach Murray und andrer Aerzte Versicherungen, officinelle Kräfte. Die Blätter mischen manche unter den Rauchtoback, welches ihm einen angenehmen Geruch und Geschmack ertheilt. An den Wurzeln findet man oft die sogenannte deutsche Cochenille. In Schweden sammelt man die Bärenbeere im Herbst, trocknet sie mit Erhaltung der grünen Farbe der Blätter und wendet sie zur Bereitung der schwarzen Beaverfarbe an.

Scaliger de arbuto. Exercit. de Subtilit. p. 497. Schwedisch akad. Abhandlungen 1743. S. 235. Neue gesellsch. Erzählungen IV. S. 30. J. Quer Dissertacion physico-botanice sobre la passion nephritica, y la verdadero specifico la uva ursi. Madrid. 1763. Französi. Strassb. 1768. deutsch vom Nierensteig und der Bärentraube, Nürnberg. 1771. R. A. Gerhard von der Bärentraube, Berlin 1763. J. A. Murray Progr. de arbuto uva ursi. Goett. 1764. Murray opuscula. Vol. I. p. I. M. Girardi de Uva Ursina etc. Padova. 1764. P. J. Hartmann Diss. de antinephritica Uvae ursi virtute suspecta. Franc. ad Viadr. 1778. Scovoli observata vis Uvae ursinae, in Orteschi Giornale d'Italia, T. III. De uva ursi virtute antinephritica. in Haen Ratio medendi. Tom. II. III. V. Lewis Hist. der Farben, S. 167. Ehrhards Beitr. II. 19.

### §. 229.

Gatt. 21. Berberis, Saurach. Sommergrünes Laubholz.

Die Blumendecke ist sechsblättrig. Drey Abschnitte sind groß, drey klein. Die Blumenkrone ist sechsblättrig. An der Basis eines jeden Blättchens sind zwey länglichtrunde, stumpfe Honigbehältnisse. Staubfäden zwölf. Je zwey sind zusammengewachsen, und tragen zwey Staubbeutel. Der Fruchtknoten, von der Blüte umgeben, ist walzenförmig, von der Länge der  
 Staub-

**Staubfäden.** Die kopfförmige Narbe sitzt ohne fernern Staubweeg auf dem Fruchtknoten. Die Frucht ist eine zweysaamige Beere.

## §. 230.

**Art. 44. Trauben- S. B. racemifera. Hall.**

**Synon.** Berberis vulgaris Linn. Berberis dumetorum C. Bauh. pin. 454. Berberis racemifera, foliis ciliatis. Hall. hist. n. 828. L'Epine vinette. The common Berbery - bush. Hanb. I. 94. Sauerdorn, Berberis-  
staude, Verbis, Verbisbeere, Berbesbeere, Berberis-  
zen, Erbselbeere, Esigdorn, Versich, Sauerach, Sal-  
sendorn, Weinäugeleinstrauch, Weinlägelein, Weinäp-  
fel, Weinschürlein, Weinscherlinge, Weinschädling,  
Wütscherling, Rhebarbarbeere, Reißbeere, Pafselsbeere,  
Peiselsbeere, Bayselsbeere, Reiselsbeere, Passelsbeere, Bri-  
selsbeere, Prummelsbeere.

Gleditsch II. 143. v. Burgsdorf 230. Becker 64. Hoppes  
botanisches Taschenbuch 1790 Ehrhard VI. 30. Leonhardi  
125. Märter 162. Borkhausen 247. Pollich pal. I. 354.  
Moench. hass. I. 152. Scopoli carn. I. 259. Sudow 164.  
Doerrien 253. Du Roi I. 75. Krüniz Encycl. IV. 194.  
Mönchs Verz. 13. Du Ham. I. 72. Ebend. von Obstkäumen  
II. 109. Miller I. 373. Münchhausen III. 439. Germershau-  
sen V. 299.

**Abbild.** Jc. plant. med. t. 86. Delhafen III. 3. Kerner  
Vol. III. t. 169. Schwedische Abhandlungen XI. S. 64. t. I.

## §. 231.

Mit eyrund zugestumpften, gezähnten, am Rande  
mit Stacheln versehenen Blättern, in Trauben er-  
scheinenden Blüten.

Ein einheimischer, sommergrüner, ganzer Strauch  
der in Gartenhecken und Feldbüschen häufig vorkommt.  
Die Zweige sind mit spizigen Dornen besetzt. Die Rinde  
des Hauptstammes ist gelblichgrau und gefurcht, an den  
Zweigen aschfarbig und glatt. Die Blätter sind eyrund  
zugestumpft, am Rande gezähnt und mit zarten Stacheln  
besetzt.



besetzt. Sie brechen zu Anfang des Mayes aus, fallen in der Mitte des Octobers ab und stehen, gewöhnlich fünf, aber von ungleicher Größe, auf kurzen, oben gefurchten Stielen. Die Blätterbüschel stehen abwechselnd und an der Basis eines jeden steht ein spiziger Dorn, an der Theilung eines jeden der wechselsweise stehenden Aeste aber drey. Die Blüten kommen zu Anfang des Mayes aus den Blätterbüscheln in Trauben hervor. Die Blumen-decke ist sehr hinfällig. Ihre sechs Blättchen stehen in zwey Reihen. Die Kronenblätter sind gelb. Bey der Befruchtung kann man mit bloßen Augen sehr deutlich sehen, wie sich die Staubfäden mit ihren Staubbeuteln einer um dem andern, gegen die runde, mit einem scharfen Rande versehene Narbe, neigen und sie mit dem Saamenstaube bestäuben \*). Der grüne Fruchtknoten ist so lang als die Staubfäden. Die Frucht ist eine fast cylindrische Beere, die erst grün, bey ihrer Reife aber im Oct. scharlachroth wird.

Ab. a) Mit Beeren ohne Kerne. Eine Ab. die vom Alter herrührt. b) Mit weissen Beeren. Die Blätter sind heller, die Rinde weiser. Er bringt selten Früchte. c) Mit schwarzer Beere. Wächst nach Tournefort an den Ufern des Euphrats, und nach Marshall auch in Nordamerika wild.

§. 232.

Der Anbau dieses in mehr als einer Rücksicht sehr nuzbaren Strauches verdient alle Aufmerksamkeit. Er

H 4

dient

\*) Nach den Beobachtungen des H. Rath Adreuter, die in den Act. petrop, T. VI. Petrop. 1790. mitgetheilt worden sind, kommen die Staubfäden des Saurachs wenn sie gereizt worden sind, nach und nach doch wieder in ihre alte Stellung. Auch der elektrische Funke setzt sie in Bewegung. Im gewöhnlichen Lauf der Natur bewirken Insekten, welche aus den an ihrer Basis befindlichen Drüsen Honig saugen, die Annäherung der Staubfäden zum Staubwege.

dient zu Heckenanlagen auf trockenem, aus Sand mit Dammerde gemischtem Boden und alle seine Theile sind nutzbar. Das Holz von stärkern Stämmen wird zu eingelegten Arbeiten genommen. Es ist von alten Stämmen oder Wurzeln, unter allen Europäischen Holzarten das gelbste, sehr hart und gut zu poliren. Es giebt gute Tobacksröhre und Spazierstöcke. Die Wurzeln sind officinell. Die jungen zarten Blätter schmecken fast wie Sauerrampfer, und werden in Holland zu Salat gebraucht, und selbst in Suppen und mit Fleisch gekocht. Im Färben zeigen sie sich nach Suckow's Versuchen nicht besonders brauchbar. Die äussere Rinde haben Clusius und van Swieten in der Wassersucht empfohlen. Die innere gelbe Rinde wird gegen die Mundfäule gebraucht, und dient auch zum gelbfärben des Saffians, dem sie eine hohe Farbe und vorzüglich schönen Glanz mittheilt. Mit der Wurzelrinde wird in Schweden die Wolle gelb gefärbt. Auch wird in der gelben Lauge der Wurzel allerhand feine Nürnberger Holzwaare gebeizt und dann mit Firniß überzogen.

### §. 233.

Den meisten Nutzen aber liefern die Früchte dieses Strauchs. In Gehägen und Wildbahnen äset sich allerley Wildpret damit. Zum roh essen sind sie zwar zu sauer, aber sie werden mit Zucker eingemacht. Auch wird ein Mus daraus verfertigt. Der ausgepreßte Saft kann die Stelle des Citronensaftes vertreten, und wird in den Apotheken und Zuckerbeckereyen häufig gebraucht. Wo sie in Menge zu haben sind, bereitet man Brandewein und Eßig daraus. Mit römischen Alaun gekocht, geben sie eine schöne hochrothe Dinte. Die Vermehrung dieses Strauchs kann durch Saamen, Ableger und Wurzelschösslinge geschehen. Die Beere gehen meistens im ersten Jahre auf, wenn man das Saamenbeet fleißig begieset. Die Versetzung der Pflanzen kann im Frühjahr oder Herbst geschehen. Will man den Saurach auch in Hecken auf

auf seine Früchte benutzen; so darf man ihn nicht beschneiden, weil seine Blüten mehrentheils an den äußersten Zweigen sitzen.

Borrowsky's Almanach, S. 291. Frank's Landwirthschaftliche Polizey I. 142. Gleditsch vermischte Abhandlungen II. 425. Ankartrona Beschreibung des Saurachs in den schwedischen Abhandlungen, XI. 64. VI. 256. De Berberi vulgari ejusque baccis, in Tractat. menstr. oeconom. Christian. 1762. Wittenbergisches Wochenblatt. Vol. I. S. 78. Berliner Samml. VII. 619. Nachricht der Schles. patriot. Gesellschaft. I. S. 39. Handbr. Samml. 1759. St. 8. Stuttg. ökon. phys. Auszüge II. 483.

### S. 234.

Gatt. 22. Tilia, Linde. Sommergrünes Laubholz.

Die Blumendecke ist einblättrig, fünftheilig. Die Blumenkrone ist fünfblättrig und fällt mit jener ab. Staubfäden viele, dem Blumenboden einverleibt. Staubweeg einer, mit einer fünfseitigen zugestumpften Narbe. Der Fruchtknoten ist rundlich. Um ihm sitzen bey einigen Arten fünf Saftgrübchen, als kleine mit der Blume verwachsene Schuppen. Früchte Nüssgen, zu fünf bis sechs, in einer fünffächrigen, fünfflappigen, an der Basis aufspringenden Kapsel.

### S. 235.

#### a) Einheimische Linde.

Die Honigbehältnisse fehlen.

Diese Gattung begreift vier bis jetzt bekannte Arten, welche sämtlich dauerhafte, sommergrüne, vortreffliche Bäume sind. Zwey davon sind bey uns einheimisch. Man hat sich ihrer schon lange, wegen ihres regelmäßigen Wachses, schönen Laubes, wegen ihrer großen regelmäßigen Krone und schnellen Wachses zu Alleen, Pflanzungen an Chaussees, in Parks zu Umgränzung ausgedehnter Rasenstücke bedient, und sie auch in Waldgärten als Schattenbäume isolirt oder Gruppenweise gepflanzt. Aber diese schönen Bäume haben auch vor andern das traurige



Schicksal gehabt, von Baumschändern in Kugeln, Kegel, Pyramiden und andere Mißgestalten einer franken Phantasie, umgeschaffen zu werden. Ein wahres Verbrechen beleidigter Natur-Majestät!

S. Ehrhard II. 57. III. 9. 15. Manche sträuben sich außerordentlich, wenn man ihnen Linden zu Chauffeebäumen vor schlägt. Sie sollen den Boden unter sich naß erhalten, die Chauffee ruiniren. Möchten sie doch die schöne Lindenchauffee bey Weilburg beaugenscheinigen.

§. 236.

Unsere Linden schicken sich gut zu Hopfenbäumen, auch zu hohen Gartenwänden, da sie den Schnitt wohl vertragen, dicht wachsen und mit allerley Boden vorlieb nehmen. Nur zu Oberholz schicken sie sich nicht gut, da sie den Unterwuchs verdämmen. In den Forsten macht man daher selten Anlagen von Linden, sondern treibt sie da, wo sie stehen, mit dem andern Schlagholze ab, da denn ihre Wollen ein leichtes, weiches Feuerungsholz liefern. Sie lieben einen mit Dammerde oder Lehmen gemischten Boden in feiner, frischer Lage. Die Herbstsaat geht im Frühjahr auf.

v. Burgsdorf Holzkultur 256. 101. 194. 98. Hesse 119. 157. Unterricht zum Holzanbau 47. Germershausen IV. 240. V. 237.

§. 237.

Wo man Gelegenheit hat, Bast-Manufacturen anzulegen, sollte man die Anpflanzung der Linden nicht unterlassen, da sich solche sehr gut verzinsen, und dergleichen Matten sehr gesucht werden. Die Russischen werden aus Archangel und St. Petersburg in erstaunlicher Menge in alle Gegenden der Erde versührt. Die meisten davon werden in Sibirien verfertigt. Im Jun. oder Jul. wenn die Linden im vollen Saft sind, haut man sie zwey oder mehrere Faden und reißt die Borke der Länge nach auf. Alsdann treibt man mit Keilen an beyden Enden die Borke heraus, indem man das Beil in das Holz einschlägt.

schlägt. Die Borke legt man in Wasser und beschweret sie, damit sie unter Wasser bleibet. Nach sechs bis acht Wochen, wenn der Bast zeitig wird (sich von der rauhen Borke ablöst) hört man ein knistern. Alsdann ist es Zeit die Rinde herauszunehmen und den Bast von der Borke abziehen. Was zwischen dem Bast und der Borke sitzt, nennen sie Lup, ziehen ihn mit einem Ziehmesser von der Borke ab, und gebrauchen ihn zu leichten Kisten und zur Ausfütterung der Schlitten. Aus dem Baste verfertigen sie nun einfache und doppelte Matten, große und kleine Säcke. Damit wird nun nach Tausenden gehandelt. Archangel allein schickt jährlich 6 — 700,000 Stücke Matten und gegen 20,000 Stück Säcke meistens nach Hamburg, Amsterdam und London. Aus der Borke werden Schachteln und Waagenkörbe verfertigt. Sonst verfertigt man auch aus dem Baste Fischreiser und Bänder.

Abhandl. der Petersb. ökon. Gesch. VI. S. 78.

§. 238.

Auch die Bienenzucht wird durch Linden-Plantagen sehr befördert. Ihre stark und wohlriechenden Blüten locken die Bienen von andern Gewächsen an sich, daß sie bis spät in den Abend hinein, und bey stiller Witterung sogar die Nacht hindurch auf den Linden sitzen bleiben. Auch ist der Lindenhonig von Geschmack der angenehmste und von Farbe der weißeste. Zum Bauen und zur Feuerung wird das Holz fast niemahls gebraucht. Dagegen verfertigt man allerhand Hausgeräthe daraus. Besonders suchen es die Bildhauer, Modelirer und Vergolder, weil es sich sehr bequem schnitzen, stechen und gut schwarz beizen läßt. Es wirft sich nicht, wird nicht leicht vom Wurme angegriffen und daher zu Statuen, Figuren und Laubwerk gesucht. Die aus Lindenholz gebrannten Kohlen, dienen den Malern zum zeichnen, und zu Schießpulver. Chomel verordnete den aus Lindenholz bereiteten Trank mit Erfolg in der Wassersucht, und in manchen

Ge

Gegenden zapft man die Linden wie Birken an. Die Früchte geben ein feines Oehl, aber in geringer Menge und durch mühsame Bearbeitung.

Gleditsch verm. Abhandl. II. 419. Marggraf in den Nouveaux memoires de l'academie de Berl. 1772. S. 3. Zinß Leipz. Samml. XIV. S. 838. Denso phys. Bibl. Vol. I. S. 77. Neues Hamb. Magazin, St. 59. S. 452. S. T. Quelmalz de Pane succedaneo, corticeque Tiliae interiori. Lips. 1757. 4. M. R.

## §. 239.

Art. 45. Sommer l. T. platyphyllos. Scop.

Synon. Tilia europaea  $\alpha$  Linn. Spec. pl. Ed. III. p. 733. Tilia foemina, folio majore. C. Bauh. pin. 426. Tilia vulgaris platyphyllos. J. Bauh. hist. S. 137. Le Tileul des bois. The common Lime-tree. Hanb. I. 17. Wasserlinde, Graslinde, Großblättrige Linde, Breitblättrige Linde, Frühlinde, rauchblättrige Linde.

Suckow 239. Borkhausen 51. Gleditsch I. 301. Scopoli carn. I. 373. n. 641. Pollich palat. II. S. 84. n. 510. Leonhardi S. 99. Du Ham. II. 251. Märter 57. Becker 38. Du Roi II. 461. Dörrien 274. J. Steig, Beschreibung des Lindenbaums, Witt. 1657. Jlmer diff. de Tilia. Lips. 1669. Miller IV. 439. n. 2.

Abbild. Cramer t. 9. Jlmer l. c. Jc. plant. med. t. 281. Delhafen II. t. 13 — 15. Kerner II. t. 145.

## §. 240.

Mit herzförmig zugespikten, am Rande sägeförmig ausgeschnittenen, auf der untern Fläche mit weißlichen Adern gezeichneten Blättern, in deren Achseln sich eine Welle in kleinen grüngelblichen Knötchen befindet. Den Blüten fehlen die Honigbehältnisse. Große, wollige, etwas viereckige, dreysächrige Saamenkapseln.

Sie vollendet ihr Wachsthum mit hundert Jahren und kann ein Alter von fünfhundert erreichen. Die Blätter brechen in der Mitte des Aprils aus, und fallen zeitig



zeitig im Herbst ab; sie sind herzförmig zugespitzt, am Rande sägeförmig ausgeschnitten, unten mit erhabenen weißlichen Adern bezeichnet, in deren Achseln sich eine Welle in kleinen grüngelblichen Knötchen befindet. Die Blüten erscheinen im Jun. und Jul. auf einem gemeinschaftlichen Stiel, der mit einem gelblichen, langen, zungenförmigen Flügelblatte versehen ist. Sie haben einen angenehmen Geruch und fangen an sich gegen die Mitte des Mayes zu öffnen. Die Staubfäden sind schwefelgelb. Die Frucht ist beynabe noch einmahl so groß als bey der folgenden Art, etwas viereckig, dreyfährig und wollig. Die Rinde ist an jungen Zweigen glatt, rothbraun. Das Holz weiß und weich. Aus dem Saamen fallen zuweilen Abarten, wie die Holländische *L. T. p. hollandica*. Man unterhält und vermehrt sie durch Ableger.

b. Burgsdorf 109 — 185.

§. 241.

Art. 46. Winter *L. T. ulmifolia*. Scop.

*Synon.* *Tilia europaea* γ. Linn. Sp. Pl. Ed. 3. T. I. p. 733. *Tilia cordata* Mill. IV. 439, n. 1. *Tilia foemina*, folio minore. C. Bauh. pin. 426. *Tilia silvestris* Tragi. hist. IV. *Tilia saxatilis* Matth. Le Tillau. The rough or Elm-leaved Lime, common green twigged Lime, Mawe, Haub. Steinlinde, Waldlinde, Brandlinde, blaublättrige Linde, rauchblättrige Linde, Ulmblättrige Linde, Berglinde, Späthlinde, Sandlinde.

Borkhausen 53. Scopoli carn. I. 374. n. 642. Suckow 240. n. 2. Du Roi II. 466. Gleditsch I. 301. No. 11. Leonardi 101. b) b. Burgsdorf 109. 188.

§. 242.

Mit herzförmig zugespitzten, kleinern, härtern, auf beyden Flächen glatten, am Rande unordentlich gezahnten Blättern, leichtgrünen Schüssen, kleinen, runden, fünffährigen Saamenkapseln.

Kommt häufiger vor, als die vorige Art, mit der sie Kultur und Nutzung gemein hat. Sie bleibt niedriger  
von

von Buchs und vollendet ihr Wachsthum mit hundert und funfzig Jahren. Die Rinde ist brauner, an jungen Schüssen lichtgrün, das Holz zäher, fester, gröber, knorrig und röthlichgelb. Ihr Laub bricht später aus und fällt auch später ab. An Höhe und Stärke kommt sie der vorigen Art nicht gleich. Die Blätter sind kleiner, mehr herzförmig zugespitzt, am Rande unordentlich gezahnt, von Farbe dunkler, weniger glänzend und unten blaulich grün, glatt, haben bisweilen braunwollige Ader-Achseln. Die Saamenkapseln kommen später zur Reife. Wegen ihres länger dauernden Laubes zieht man sie in Pflanzungen der vorhergehenden Art vor.

Ab. a) Großblättrige B. l. *T. europaea maxima* West. Large - leaved Lime Mawe. Broader - leaved Mountain Lime. Hanb. b) Kleinblättrige B. l. *T. europaea minor*. West. The smaller - leaved Lime Mawe. The narrow - leaved Mountain Lime. Hanb.

Odde nützliches Allerley II. 301.

§. 243.

#### b) Ausländische Linden.

Die Blüten haben fünf Honigbehältnisse oder Saftgruben, welche lang, löffelförmig und so groß als die Kronenblätter sind, um den Fruchtknoten und zwischen ihm und den Staubfäden stehen und diese gleichsam zurück halten.

Art. 47. Schwarzlinde. *T. nigra*.

*Synon.* *Tilia americana* Linn. et Mill. Le Tillau noir de l'Amerique. American Lime - tree. Hanb. I. 196. American black Lime - or Linden tree Marfh. The Bass - tree. 317. The virginian Lime tree with woolly Leaves. Wang. Amerikanische schwarze Linde, nordamerikanische schwarze Linde.

v. Wangenheim 55. Suckow 241. Du Roi II. 467.

§. 244.

## §. 244.

Mit großen, herzförmig zugespitzten, breitgezahnten Blättern, schwärzlichbraunen Zweigen.

Ein nordamerikanischer dauerhafter Baum, der schnell wächst und eine beträchtliche Höhe und Stärke erreicht. Die Krone ist groß und regelmäßig, die Zweige sind mit einer schwärzlichbraunen Rinde bedeckt. Die Blätter sind groß, herzförmig zugespitzt, breit gezahnt, langgestielt, auf der obern Fläche dunkelgrün, auf der untern blässer, und mit weislichen Haaren besetzt. Die Blüten erscheinen an den Zweigen mit einem gelben Flügelblatte, welches größer als bey unsern Linden ist. Die Kronenblätter sind schmahl und gelbgrün. Die Saamenkapseln sind rund, etwas haarig und von der Größe einer Erbse. Wegen ihrer großen schönen Blätter gereicht sie Pflanzungen zur Zierde.

## §. 245.

Art. 48. Spitzblättrige L. *T. mucronata*.

*Synon.* *Tilia americana* Linn. *Tilia caroliniana* foliis cordatis, obliquis, glabris subserratis, cum acumine, floribus nectario instructis. Mill. n. 4. *Tilia* foliis majoribus mucronatis. Du Ham. n. 5. Gron. virg. 58. *Tilia pubescens* Loddiges. Le Tillau cotonné. Carolinian obliques - leaved Lime - tree. Marsh. 318. The large-leaved Carolinian Lime - tree, with smooth Green Leaves Wang. 56. Carolinian long - pointed leaved Lime. Mawe.

Suckow 241. Marshal 318. Du Roi II. 469. Churpfälzische Bemerkungen 1774. 218. von Wangenheim 56.

## §. 246.

Mit länglich herzförmigen, auf beyden Flächen glatten, doppelt gezahnten Blättern, die sich in eine lange, steiffe Spitze endigen.

Sie ist von kleinerm Buchse als die vorhergehende Art, wächst aber schnell und blühet bisweilen schon mit  
neun



neun Jahren. Die Rinde ist licht, etwas gefurcht, das Holz weiß, leicht und schwammig. Besonders ist sie durch ihre, nach der Erde herabhängende Blätter kentlich, wodurch sie auch Pflanzungen eine vorzügliche Bierre giebt. Die Blätter sind groß, herzförmig, tief und scharf gezahnt und haben eine schiefe Basis. Sie endigen sich in eine lange, steife Spitze. Beide Flächen sind hellgrün und glatt. Die Früchte sind fast noch einmahl so groß als bey unsern Linden, lederartig und etwas wollig. Die Blüten verbreiten einen angenehmen Geruch und werden von den Bienen häufig besucht. Der Ausguß der Blüten soll nach Marschal mit Erfolg in der Epilepsie gebraucht worden seyn.

§. 247.

Gatt. 23. Liriodendron, Tulpenbaum. Sommergrünes Laubholz.

Die Blumendecke ist dreyblättrig. Die Blumenkrone hat sechs, acht, neun Blätter, an deren Nägeln sich Saftgruben finden. Staubfäden viele, dem Blumenboden einverleibt. Staubweege viele. Frucht ein vielsaamiger Zapfen. Die Saamen sind nackt, geflügelt, liegen dachziegelförmig an der Zapfenspindel.

§. 248.

Art. 49. Tulpenbaum. *L. tulipiferum*.

*Synon.* Liriodendron tulipifera Linn. Spec. Plant. I. 755. n. 1. Tulipifera Liriodendron. Mill. III. 527. Tulipifera n. 1. Du Ham. II. 263. Le Tulipier de Virginie. The virginian Tulip tree. Hanb. I. 140. The Tulip tree, Poplar tree, white Wood. Wang. 32. Gemeiner Tulpenbaum, virginischer Tulpenbaum, Sambacca.

Suctow 249. Borkhausen 342. Marschal 133. v. Wangenheim 32. Du Roi I. 374. Münchs Verz. 56. Kalm's Reisen II. 287. 347. III. 183.

Abbild. v. Wangenheim, Fig. XXXII.

§. 249.

## §. 249.

Mit großen, an der Basis herzförmigen, in drey Lappen getheilten Blättern, von denen der mittlere abgeschnitten zu seyn scheint.

Waterl. Nordamerika. Er erreicht daselbst eine Höhe von siebenzig, achtzig bis hundert Fuß, und eine Dicke von vier bis fünf Fuß. Auch in Deutschland zeigt er einen schnellen Wuchs. Die Rinde ist grau und glatt, im Alter wird sie gefurcht. Die jungen Stämme treiben viele Nebenäste vom Grunde bis zum Gipfel hinauf, die sich aber nach und nach verlieren. Mit dreißig bis vierzig Jahren erwächst dieser Baum der eine Pfahlwurzel treibt, zu Baumholz, mit zwölf bis funfzehn zu Stangenholz. Die Blätter sind groß, breit, an der Basis herzförmig, haben drey Lappen, wovon der mittlere abgeschnitten zu seyn scheint. Sie stehen abwechselnd auf langen Stielen und haben zwey kleine, eyrunde Nebenblätter. Die Blumen erscheinen an den Spitzen der Zweige und haben ihrem Bau und Gestalt nach Aehnlichkeit mit der Seeblume (*Nymphaea alba*). Die Nägel der Kronenblätter haben Saftgruben. Die Früchte sind große, kegelförmige Zapfen.

Wächst in Ziegenberg.

## §. 250.

Das Brennholz von diesem Baume hat keinen besondern Werth, aber diesen Fehler ersetzt die Menge desselben. Es ist gelb, schwach und brüchig. Vom weissen L. (der sich blos durch sein weisses Holz unterscheidet) ist das Holz zäher, schwerer und härter, so daß es zu Brettern und Balken verarbeitet wird. Die Blätter liefern nach Suckow verschiedene brauchbare reine Farben. Die Wurzel wird als ein Ingredienz zu bittern Getränken genommen. Wenn nun gleich der L. kein Forstbaum ist; so ist er doch einer der schönsten Bäume für Lustwäldungen und Alleen.

## §. 251.

Gatt. 24. Clematis, Baldrebe. Sommer Laubholz.

Diese Gattung begreift zwei Untergattungen, wovon die eine Holzarten, die andere Pflanzen enthält. Jene sind Rankenhölzer. Die Sexualorgane haben nur eine Geschlechtsdecke welche vier, selten fünfblättrig ist. Staubfäden viele, dem Blumenboden einverleibt. Staubweege viele. Saamen nackt, eiförmig, geschwänzt.

## §. 252.

Art. 50. Gemeine W. C. Vitalba. Linn.

Synon. Clematis silvestris latifolia. C. Bauh. pin. 300. Clematis caule scandente, foliis pinnatis, ovato-lanceolatis, petalis coriaceis. Hall. hist. n. 1142. Flammula sepium foliis integris et dentatis. Rupp. jen. 54. Clematidis. n. 1. Du Ham. I. 125. Le Clematite a fleurs blancs. Travellers Joy or Viorna. Hanb. I. 254. Liesch, Teufelszwirn, gemeine Clematidis, Lienen, Lynen, Rehbinden, Rebbinden, steigende Baldrebe, blasenziehende Baldrebe, Holzwaldrebe, Bettlerskraut, Gänsemord, Hexenstrauch, Hagseiler.

Eudom 253. Märter 180. Siffert I. 124. Ehrhard III. 112. v. Burgsdorf 244. Borkhausen 335. Pollich Palat. II. 99. Scopoli carn. I. 388. Gleditsch I. 266.

## §. 253.

Gefiederte Blätter. Die Blättchen sind herzförmig, glattrandig oder gekerbt, oder eingeschnitten. Blattstiele und Blütenrispen flettern. Die Aeste der letztern werden an der Basis von einfachen, herzförmigen Blättern unterstützt.

Ein einheimisches Rankengewächs, das in Gebüsch, Hecken und Zäunen ziemlich häufig vorkommt und alle ihm nahe stehenden Stauden bis an den Gipfel überzieht und zusammenspinnt. Die Reben sind gegliedert, achteckig, anfangs grün, werden hernach braun, gefurcht und schlagen Wurzeln. Die Blätter sind ungleich gefiedert.



bert. Die Blättchen sind gestielt, herzförmig, zugespitzt. Die untern gelappt, die mittlern eingeschnitten oder gefeilt, die obern glattrandig. Sie sind hart, lederartig, oben dunkel- unten blasgrün, winden sich mit ihren Stielen um alles, was ihnen nahe steht. Die Blüten erscheinen im Jun. und Jul. in aufrechten, ansehnlichen, langgestielten Büscheln, deren gewöhnlich zwey an einer Vergliederung unter den Blattstielen hervordachsen. Jeder Ast ist mit einem eysförmigen, glattrandigen Nebenblättchen unterstützt. Die Geschlechtsdecke besteht aus vier kleinen, weissen, zurückgebogenen, lederartigen, sternförmig stehenden Blättchen. Die Saamen mit ihren langen, silberweissen Schwänzen werden im Späthherbst reif und bleiben bis in den Winter hinein hängen. Sie liegen über ein Jahr in der Erde.

## S. 254.

Das ganze Gewächs hat einen brennenden Saft, und sowohl das frisch zerquetschte Laub als der Saft ziehen Blasen. Blätter und Zweige können nach Siffert in der Färberey genutzt werden. Die Wurzelsprossen sind wie vom Hopfen esbar, und aus der Saamenwolle hat D. Schäffer ein ziemlich gutes Papier bereitet. Die langen, zähen, dünnen Zweige können in Ermangelung der Weiden und Birkenzweige zu verschiedenem Bind- und Flechtwerk in Gärten, Wingerten und Hecken auch zu kleinen Fasstreiffen genommen werden. Aus ihren Kerne werden kleine Körbe zu allerhand Gebrauch und von gutem Ansehen gemacht. Das älter gewordene Holz der untersten Stämme alter Hauptreben ist sehr zähe, hart, fest, hat einen gelben Splint und roth oder braun gestreiften Kern. Es hält sich gut und dient sowohl gebeißt als ungebeißt zum auslegen kleiner Geräthe. Besonders zeigt der Querschnitt, wenn man mehrere Stücke zusammenfügt sehr schöne regelmäßige sechsblättrige Rosen. Wegen seiner starken Verbreitung, ansehnlichen Blüten- und Saamen-

büscheln wird die Baldrebe in Lustgärten zur Bekleidung alter Mauern und Bedeckung der Lücken und unangenehmen Aussichten genommen.

§. 255.

Art. 51. Brennende W. C. Flammula. Linn.

Synon. Le Clematite vesicatoire. The creeping Climber or Flammula. Hanb. I. 254.

Suckow 254. Dörrien 255. Borkhausen 337. Miller n. 6.

§. 256.

Mit Blättern welche auf der untern Fläche haarige Nerven haben. Die Blütenbüschel stehen einzeln, sind lockerer, nicht so groß noch so ästig und die Geschlechtsdecke hat schmahlere Blätter.

Sie hat viele Aehnlichkeit mit der vorigen Art, steigt aber weit höher. Die Stengel sind achteckigt gefurcht, glatt, gegliedert. Das Stammholz ist schlank und porös. Die jungen Reben sind grün, auf der einen Seite bräunlich, die ältern sind gelbbraun, rissig und faserig. Die Aeste stehen einander gegenüber und etwas sperrig. Die Blätter sind ungleich gefiedert, einander gegenüber stehend. Die Blättchen sind zart, schmahl, eysförmig zugespitzt, auf der untern Fläche mit haarigen Nerven bezeichnet. Die untern sind eingeschnitten, beynahe gelappt, die mittlern gekerbt, die obern ungetheilt, glattrandig. Die Blattstiele winden sich. Die Blüten stehen in etwas lockern Büscheln, welche nicht so ästig noch groß als von der vorhergehenden Art sind. Auch erscheinen sie einzelner an einer Vergliederung. An der Basis eines jeden Aestchens findet sich ein einzelnes, schmahl lanzetförmiges Nebenblättchen. Die Blätter der Geschlechtsdecke sind schmaler. Ihr Saft ist noch brennender. Die zähen Reben dienen zu derselben Nutzenwendung. Aus den dicken Stengeln werden Spazierstöcke verfertigt.

§. 257.

## §. 257.

Gatt. 25. Prunus, Prunus. Laubholz.

Die Blumendecke ist einblättrig, fünfspaltig. Die Blumenkrone hat fünf Blätter, die mit Nägeln in die Blumendecke eingefügt sind und um den Fruchtboden herumstehen. Staubfäden viele, der Blumendecke eingefügt. Frucht eine Steinfrucht mit esbarem Fleisch. Saame ein weiser öhlichter Kern mit einem braunen Häutgen bekleidet. Saamengehäuse ein Stein von verschiedener Gestalt und Größe, undurchbohrt, hat am Rande hervorragende Nöhte.

## §. 258.

A. Untergatt. Pflaumen. Pruni Tournef.

Mit gestielten, nicht in Schirmen stehenden Blüten.

Art. 52. Schlehdorn, P. spinosa. Linn.

Synon. Spinus. Virg. Georg. IV. 145. Pallad. de insit. 63 \*). Prunus silvestris. C. Bauh. pin. 439. Mill. et du Ham. Acacia germanica f. Prunus silvestris. Weinm. Phyt. t. 10. lit. 6. Prunus spinosa, foliis glabris ferratis, ovato - lanceolatis, floribus breviter petiolatis. Hall. hist. n. 1080. L'Epine noire. Black - Thorn, Sloe - Bush, Sloe - tree. Schleedorn, Schwarzdorn, Schlehenbaum, Schlehenstrauch, Dornschlehen, Heckschlehen, Spinsling, wilder Kriechenbaum, Rietschken, Heckdorn.

Gleditsch II. 91. v. Burgsdorf 184. Leonhardi 127. n. 8. Suckow 302. Moench hass. I. 244. n. 407. Scopoli carn. I. 342. Pollich palat. II. 29. n. 469. Linn. Sp. pl. I. 682. n. 13. Borkhausen 208. Märter 160. Becker 53. Germerhäuser V. 293. Ehrhard IV. 16. Mattuschka n. 348. Dörrien 265. Du Roi II. 166. Münchhausen III. 365.

Abbild. Cramer t. 34. Jc. pl. med. t. 4.

## J 3

## §. 259.

\*) In beyden ist kein Genus bestimmt. Servius ad Virg. l. c. sagt: Spinus sey gen. mascul. beweist es aber nicht. Charisius sagt: es sey gen. soem. und führt aus dem Varro an, ex spinu alba.



## §. 259.

Mit lanzetförmigen, glatten Blättern, dornigen Zweigen, einzelnen Blumenstielen.

Ein sehr gemeiner Strauch, der allenthalben in Hecken, an Wegen und Tristen gefunden wird. Seine jungen Zweige endigen sich in lange Dornen. Der Stamm ist knotig und mit einer schwärzlichen oder grauen Rinde bekleidet. Die Blätter sind glatt, lanzetförmig, am Rande fein gezahnt. Die Wurzeln wuchern überaus stark. Das Holz ist bey seiner geringen Stärke sehr hart. Die wohlriechenden Blüten erscheinen frühzeitig und noch vor Ausbruch des Laubes in überaus großer Menge. Die meisten haben unvollkommene Staubweege, bey denen also keine Früchte zu erwarten sind. Die Früchte sind rund, anfangs grün, bey ihrer Reife im Oct. schwarzblau, mit einem feinen Duft überzogen. Sie schließen in einem sauern, grünen Fleisch einen ovalen platten Stein ein, in welchem der Saamenkern befindlich ist, der erst im zweyten Jahre aufgeht.

## §. 260.

In Laubforsten, wo dieser Strauch bisweilen im Unterholze vorkommt, wird er mit demselben abgebuscht und in die Wellen gebunden. Es würde dieser Strauch dem Weisdorn zu Schutzhecken gegen das Vieh vorzuziehen seyn, da das Rindvieh ihn auch bey der karglichsten Waide nicht benagt, wenn es den Weisdorn nicht verschont; aber seine wuchernden Wurzelsprossen nehmen allzusehr überhand, wodurch die Hauptstämme ausgehen und in der Hecke Lücken entstehen. Man braucht ihn daher nur zu schlechten, losen Hecken um die Gräben, Straßen, Dämme und niedrige Laubwälder, wo man ihn nach Belieben auslaufen läßt, und er doch dicke, feste Hecken macht. Von Zeit zu Zeit werden die dicksten, ältesten Sträucher herausgehauen, theils um mit ihren Zweigen junge Bäume gegen Hasen und Waidevieh zu schützen, theils

theils neue Hecken-Anlagen damit zu decken. Auf öden Feldern läßt man auch Schlehsträucher gerne stehen, weil sich Hasen und Rebhühner darunter verbergen.

## §. 261.

Die Blüten werden frisch oder getrocknet mit Wasser, Weinstein, Molken, oder gewürzter Fleischbrühe gekocht, als blutreinigende Frühlingskur gebraucht. In den Apotheken wird ein Wasser davon gebrannt. Auch suchen die Bienen die Blüte auf. Die Rinde hat man in manchen Arten der Schwindsucht mit Erfolg verordnet und oft ist sie bey Wechselfiebern an statt der China mit Nutzen gegeben worden. In manchen Gegenden bedient sich der Landmann der Rinde zur bessern Aufbewahrung seiner Käse. Mit Lauge abgekocht giebt sie der Wolle eine rothe Farbe. Die zarten, gelinde gerösteten Blätter geben einen guten Thee. Man hat auch die Rinde, besonders von der Wurzel zum gerben vorgeschlagen. Das abgetriebene Reissig wird, woferne man nicht Gelegenheit hat es an Salinen, welche es sehr suchen, zu verkaufen, zur Feuerung der Dorfbäcköfen genommen. Das Holz von alten Stämmen, welches im Splint und Kerne dem Pflaumenholz ähnlich ist, läßt sich schwer bearbeiten.

## §. 262.

Die Früchte des Schlehdorns benutzt man auf mancherley Art. Unreif hat man sie zu Gerb-Versuchen empfohlen. Mit Vitriol geben sie eine beständige schwarze Farbe und eine bessere Dinte, als die aus Galläpfeln bereitete. Sie ist zwar im Anfang weniger schwarz, wenn aber die Schrift einige Tage an der Luft liegt, wird sie vollkommen und dauerhaft schwarz. Im Späthherbst, wenn sie durch die angehenden Fröste schon etwas mürbe geworden sind, werden sie theils roh gegessen, theils gedörret. Zuweilen werden sie mit Zucker oder Senf eingemacht. Wo sie in Menge zu haben sind, wird Branndewein oder Eßig daraus verfertigt. Sie sind ein sehr

schickliches Mittel zur Verbesserung zäher Weine. Auch kann man ein weinartiges Getränk daraus bereiten.

Gleditsch vermischte Schriften. S. 1. Sieffert I. 156. Lewis Historie der Farben S. 30. Spielmann. diss. Acaciae off. Argent. 1768.

§. 263.

Art. 53. Kriecher. *P. infortunata*. Linn.

Synon. *Prunus silvestris major*. Mill. et du Ham. Le grand Prunier sauvage. The bullace tree. Hanb. I. 159. Pflaumenschlehe, Bilze, Haserschlehe, Krefen.

Suckow 302. Moench haff. I. 244. Linn. Sp. pl. I. 680. n. 12. Borkhausen 209. Du Roi II. 165. Münchhausen III. 365. Hirschfelds Fruchtbaumzucht II. Ehrhard VI. 32. Becker 52.

§. 264.

Mit eyrunden, gezahnten, unten wolligen Blättern, die in den Knospen zusammengerollt liegen. Kurze spitzige Dornen an den Enden und Seiten der Zweige.

Ein harter ganzer Strauch, der auch bisweilen als ein Baum vorkommt, und im May blüht. An den Enden und Seiten der Zweige stehen kleine spitzige Dornen. Die Blätter sind eyrund, auf der untern Fläche wollig, stehen abwechselnd und liegen in den Knospen einwärts gerollt. Von den Blüten findet man feltner Zwillinge auf einem Stiele als bey den Zwetschgen. Die Früchte sind noch einmahl so groß als an der vorhergehenden Art, und reifen früher als bey der folgenden. Das Kriechenholz wird als Nutzholz dem Pflaumenholze vorgezogen. Man hat drey Sorten a) mit weissen, b) schwarzblauen, c) und rothen Früchten, die sich durch die Kultur sehr vergrößern und veredeln. Auch verlieren sich sodann die Dornen. Man kultivirt die Kriechen häufig in Gärten unter dem Nahmen der Pflaumen- oder Haser-Schlehen. Einige halten sie für, durch die Kultur veredelte Schlehen. Nach andern machen sie den Uebergang von den Schle-



Schlehen zu den Zwetschgen. Vielleicht kann man sie mit eben dem Rechte als Mutterart der Pflaumen ansehen.

§. 265.

Art. 54. Wilder Zwetschgenbaum, *P. oeconomica* silv. Borkh.

Synon. *Prunus domestica* Linn. Spec. Pl. I. 680. n. 11. Moench. hass. I. 243. *Prunus foliis ferratis, hirsutis, ovato-lanceolatis, floribus longe petiolatis.* Hall. hist. n. 1079. Le Prunier ordinaire. The Plume-tree. Hanb. I. 158. II. 801. Quetschenbaum, Bauernpflaume, Zwespenbaum.

Märter 94. Sudow 298. Gleditsch II. 91. n. 56. Linn. Sp. Pl. I. 680. n. 11, Moench hass. I. 243. Borkhausen 210. Du Roi II. 160.

§. 266.

Mit ey= lanzetförmigen, auf beyden Flächen behaarten Blättern, die in den Knospen einwärts gerollt liegen. Die jungen Triebe sind dünne mit einer gelbrothen Rinde bekleidet. Die Früchte sind kurzgestielt, länglich, fast eysförmig, enthalten einen länglichen plattgedrückten Saamenstein, mit einem gewölbten Rücken.

Man findet ihn häufig in Borhölzern, Hecken, Dorf- und Feldbüschen. Seine Wurzel greift weit um sich, geht aber nicht tief. An den Spitzen und Seiten der Zweige stehen lange Dornen. Die jungen Triebe sind dünne, gelbroth. Die Blätter stehen abwechselnd auf langen Stielen, sind bald glatt, bald rauh, am Rande verlohren eingeschnitten, haben auf der untern Fläche stark hervortretende Adern, welche auf der Oberflache vertiefte Furchen hervorbringen. Sie liegen vor ihrer Entwicklung in den Knospen einwärts gerollt. Die Blüten erscheinen im May zu zwey, drey, fünf auf ein, zwey bis dreyjährigen Zweigen zugleich, und haben kürzere Stiele als die Kirschblüten. Die Blumenstiele sind be-

haart, die Kronenblätter sind grünlich weiß, die Abschnitte der Blumendecke sind aussen haarig und nicht zurückgebogen. Die Früchte reifen im Herbst und haben einen sauern Geschmack. Dieser Baum unterscheidet sich also kenntbar genug von dem Pflaumenbaume. Dieser hat ein weiches Holz, treibt weit dickere, längere (ein bis ein und eine halbe Ellen lange) saftige Jahreschüsse, welche mit einer braungrauen, wolligen Rinde bekleidet sind. Seine Früchte sind rund, enthalten einen rundlichen, plattgedrückten Saamenstein. Den Uebergang von dieser Untergattung zu der folgenden macht: die Kirschpflaume; *P. cerasifera*.

## §. 267.

Gewöhnlich nimmt man die wilden Zwetschgenstämchen in den Wäldern und Hecken, setzt sie in Gärten und pflanzet edlere Sorten darauf. Das Stammholz von gesunden und ausgewachsenen Bäumen ist so hart als das Holz vom Hornbaume, rothkernig, fast ohne Splint und wird mit den Jahren immer härter und röther. Wenn es nicht aufreißen soll, darf es nicht an der freien Luft liegen und muß recht langsam trocknen. Man verfertigt Maasstäbe, Ellen, Spiegelrahmen, Spinnräder und allerley feines Hausgeräthe daraus.

## §. 268.

B. Kirschen. *Cerasi*. Tournef.

Die Früchte sind rund, langgestielt, von verschiedener Gestalt, Farbe und Größe.

Man kann diese Untergattung in a) Süß-Kirschen, *Prunus avium* und b) Sauer-Kirschen, *Prunus Cerasus subdividire*.

Art. 55. Bogelkirsche. *P. avium*. Linn.

*Synon.* *Prunus Cerasus*. Scop. Carn. I. 343. n. 587. *Cerasus major ac silvestris*, fructu subdulci. C. Bauh. pin. 450. *Cerasa actiana Plinii et Tragi* Schwenckf. Siles.

Siles. 45. et J. Bauh. hist. I. 200. *Cerasus volucrum*.  
 Elsholz Menzel. Ind. 71. *Cerasus major*. du Ham. n. 1.  
 Le Merisier. The wild Cherry tree. Hanb. I. 158.  
 Wilder Kirschbaum, Zwifelsbeerbaum, Wißbeere, Wi-  
 spelbeere, Karsten, Wasserbeere, Haserkirsche, Rheini-  
 sche Kirsche, Kostebeere, Kasbeere, Süskirsche, Karse-  
 beere, Waldkirsche, Zisselkirsche.

Linn. Sp. plant. I. 650. n. 10. Pollich palat. III. 28.  
 Moench hass. I. 243. Pallas ross. I. 4. Scopoli carn. I. 343.  
 n. 587. Leers herborn. 116. Dörrien 264. Du Roi I. 172.  
 Suckow 350. Gleditsch II. 92. n. 58. von Burgsdorf 181.  
 Workhausen 212. Beller 51. Hesse 156.

Abbild. Cramer t. 16. Fig. 2.

§. 269.

Mit feststehenden Blumenstielen, eyrund zugespizten, am  
 Rande doppelt gezahnten, unten fein wolligen Blät-  
 tern.

Unter unsern wilden Obstbäumen ist diese Art die  
 ansehnlichste, indem der Vogelkirschbaum oftmahls die  
 Höhe und Stärke der Eiche erreicht \*). Er enthält viel  
 dickes, gelbrothes Gummi, das dem arabischen substituirt  
 werden kann, aber eben deswegen sind ihm Hieb und  
 Schnitt schädlich. Wenn er in einem seiner Natur ange-  
 messenen Boden steht, kann er zweyhundert Jahre alt  
 werden: aber in trockenem Sandboden hat er nur ein mäßi-  
 ges Wachsthum und in einem sumpfigen geht er leicht aus.  
 Sein schöner, hoher, gerader Schaft ist wie bey der fol-  
 genden Art mit einer vierfachen Rinde bekleidet, die sich  
 blättern läßt. Die Wurzel geht zwey Fuß tief, vier Fuß  
 weit. Die Blätter sind gegen fünf Zoll lang, gegen drey  
 Zoll breit, eyrund zugespizt, am Rande doppelt gesägt,  
 grobadrig, weich, saftig, auf der untern Fläche mit einer  
 fei-

\*) In den Gärten bey Drumlanrig in Schottland steht ein Vo-  
 gelkirschbaum der sieben Fuß, acht Zoll im Umfang hat. S. Pen-  
 nants Reisen durch Schottland.



feinen Wollle bekleidet, nicht so steif, dicke und glänzend als bey den Sauerkirschen, feiner von Farbe und halten sich länger. In den Knospen liegen sie von beyden Seiten zusammengerollt. Uebrigens stehen sie abwechselnd, brechen zu Ende des Aprils aus, und fallen im October ab. Die Blattstiele sind gefurcht, eben so lang als an den Sauerkirschen, aber vorwärts mit einer oder zwey Drüsen besetzt \*). Die Blüten erscheinen im April und May aus einzelnen Knospen, in stiellosen Schirmen, an den zweyjährigen Schüssen. Die Blumendolden sind mehrentheils dreyblüthig und mit einer vierblättrigen Hülle versehen. Die Kronenblätter sind gleich groß und lang, herzförmig, hohl, weiß, etwas ins röthliche ziehend. Die Einschnitte der Blumendecke sind farbig, zurückgeschlagen. Die Staubbeutel sind gelb. Die Früchte sind klein, Honigsüß, reifen im Jul. haben einen runden Saamenstein, mit kaum merkbarer Naht. Er liegt öfters über ein Jahr in der Erde.

Ab. a) mit großer, schwarzer Frucht. Henne 339. b) mit schwefelgelber Frucht. c) mit kleiner, bitterer, schwarzer Frucht. d) mit gefüllten Blumen.

#### §. 270.

Für die Fruchtbaumzucht ist dieser Baum von Wichtigkeit, weil er die Wildlinge liefert, auf welche man die so verschiedenen süßen Herz- und andre Kirschen pflöpft und kopulirt. Auch nehmen die Zwisselstämmchen alle Sorten Sauerkirschen an. Selbst in Lustwäldungen verdient er eine Stelle, weil er während seiner Blütezeit ein herrliches Ansehen hat, und eine Menge Früchte liefert, welche die Amseln und andere Singvögel anlocken. Im Unterholze giebt er Reißstäbe. Man hält aber bey dem Abtrieb desselben die Stämme gern über, zumahl das Holz bey der Feuerung von nur geringer Güte ist. Die Früchte

\*) Göze nützliches Allerley IV. 207.

Früchte dienen zur Wildäsung und Vogelweide. In der Schweiz und auf dem Schwarzwalde wird ein gesuchter Brandewein (Krieswasser) davon abgezogen, womit ein starker Handel getrieben wird, und die Einwohner das zur Speisung nöthige Korn sparen. Eine große Menge Früchte dörren sie, und diese dienen ihnen zu einer gesunden und angenehmen Winterspeise. Die innere Rinde unter Rauchtoback gemischt, giebt demselben einen angenehmen Geruch. Innerlich eingenommen soll sie in Wechselfiebern die Stelle der China, wenigstens in manchen Fällen vertreten können. Auch in der Färberey ist sie brauchbar.

§. 271.

In Savojen lebt ein ganzes Volk von Kirschbäumen, und diese Bäume bereichern mit ihren Früchten manches Dorf in Schwaben und in der Schweiz, jährlich mit etlichen tausend Gulden. Die untern Gegenden an der Elbe, um Hamburg und Stade, gewinnen jährlich viele tausende durch die Ausfuhr ihrer Kirschen in das Hanövrische, Hollsteinische und Schleswigische, und Holland ist wegen der edelsten Sorten derselben berühmt. Das Kirschbaum-Gummi kann dem arabischen substituirt werden. Es wird auch auf dieselbe Art gebraucht und giebt in Provence und Languedoc einen eignen Handelszweig ab. Das Holz von starken und gesunden Stämmen läßt sich in sehr feine Brettchen schneiden. Seine Schönheit und Härte machen es unter unsern einheimischen Holzarten dem Mahagony Holze am ähnlichsten und für Tischler, Clavier-Lauten- und andre Instrumentenmacher sehr nützlich. Ueberdieß nimmt dieser Baum mit einem ganz geringen Boden vorlieb, wenn er nur gemischter Natur und trockner Lage ist. Selbst in frischliegenden Sandboden kommt er recht gut fort, wie man denn in der Mittelmark, besonders um Berlin und Potsdam die schönsten Vogelfirschbäume im Sandlande antrifft.

Allge-

Allgem. Haushaltungs- und Landwiffenschaft I. 636. Ehrhard IV. 176.

## §. 272.

Art. 56. Sauerkirschbaum, *P. Cerasus*. Linn.

*Synon.* *Cerasus vulgaris*. Mill. n. 1. *Cerasus acidissima succo sanguineo*. C. Bauh. pin. 450. Le Cerisier ordinaire. The common or Kentish Chorry. Weichsel, Emmerle, Emerling, wilder Bloder, wilde Blutkirsche, Heckenkirsche, Bauerkirsche, wilder Weichselbaum.

von Burgsdorf 183. Becker 53. Borkhausen 214. Pollich palat. II. 27. Moench hass. I. 242. Du Roi II. 175. Leonhardi 92. Gleditsch II. 92. n. 59. Märter 92.

## §. 273.

Mit kurzgestielten Blumenschirmen, eyrund = lanzetförmigen, auf beyden Flächen glatten Blättern.

Kommt in Wäldern, Hecken und um Dörfer als ein Baum oder Strauch vor. Sein Wachsthum ist nicht so schnell, auch wird er nicht so stark und hoch als die vorige Art. Die Zweige sind schwächer, dünne, schwankend und hängen nieder. Die Blätter sind kleiner, steifer, dunkelgrüner, glänzend und auf beyden Flächen glatt. Sie liegen in den Knospen von beyden Seiten einwärts gerollt, und diese bestehen aus gezackten Schuppen. Die Blattstiele sind mittelmäßig lang. Die Stammrinde ist aschgrau auf röthlich ziehend. Die Blüten erscheinen auf den einjährigen Zweigen. Die Kronenblätter sind eyrund. Man findet oft unter den Blüten Zwitter mit unfruchtbaren Staubweegen. Die Früchte sind rundlich, herb, sauer, reifen später als die Süßkirschen. Das Holz ist fester und feiner und hat gleichen Gebrauch. Alle Sorten der edlen Gartenweichsel, lassen sich mit gutem Erfolge auf Vogelkirschstämmchen pflropfen. Bringt man aber süße Kirschenzweige und Augen auf Sauerkirschstämmchen; so wachsen sie zwar, bringen auch wohl



wohl häufige Blüten hervor, aber keine Früchte und gehen allmählich ganz ein.

§. 274.

Art. 57. Erdweichsel. *P. Cerasus fruticosa*.

Synon. *Chamaecerasus* Clus. hist. 64. *Cerasus pumila*. C. Bauh. pin. 450. *Prunus fruticosa*. Pallas ross. I. 42. *Prunus cerasus pumila* Burgsdorf. Holzcultur. 186. Le Cerisier nain. The shrubby dwarf Cherry. Staudenfirsche, wilde Bergfirsche, niedrige Staudenfirsche, Zwergfirsche, Zwergweichsel, Bergweichsel, Steinfirsche.

Gleditsch. II. 106. Borkhausen 215. Märter 189. du Roi 7. d. wo sie für eine Abart gehalten wird.

§. 275.

Mit stiellosen Blütenschirmen, verkehrt eyrunden, zugespitzten, glatten, fein gezahnten Blättern, deren untere Zähne Drüsen haben.

Man findet diese Art in manchen Gegenden sehr häufig und sie bleibt immer ein niedriger Strauch, der nur schwanke Ruthen treibt. Im schlechten Boden wird sie nur zwey Fuß hoch, da sie schon Blüten und Früchte bringt, in etwas bessern beschattetem Erdreich wird sie gegen vier Fuß hoch, in Gärten erreicht sie nach sechs bis acht Jahren eine Höhe von acht Fuß, treibt dann vollkommene Äugen und wächst frecher im Holze, artet aber nicht aus. Die Wurzel ist stark, geht tief unter sich. Die Rinde ist glatt, graubräunlich mit weissen Punkten besetzt, an den zähen, ruthenförmigen Zweigen aber grauschwärzlich. Der ganze Strauch ist dicht und buschig. Die Blätter stehen abwechselnd, einzeln oder in Büscheln auf kurzen Stielen, sind verkehrt eyrund, zugespitzt, steif, glatt, glänzend, fein gezahnt und die untern Zähne drüsig. An der Basis der Stiele stehen schwache, hinfällige, borstenförmige, gezähnelte Nebenblättchen. Die Blüten erscheinen in drey bis vier blütigen, stiellosen, oder  
nur

nur kurzgestielten Schirmen, an deren Basis einige Blätter und gezähnelte Nebenblättchen stehen. Die Blumen-  
decke ist glockenförmig, ihre Abschnitte stumpf und zurück-  
gebogen. Die Kirschen sind kugelförmig, roth, sehr wenig  
fleischig, von herben, widrigen Geschmack, der aber durch  
die Kultur etwas verbessert wird.

§. 276.

Art. 58. Mahaleb K. P. *Cerasus Mahaleb*.

*Synon.* *Prunus Mahaleb* Linn. Spec. Pl. I. 678. *Ce-  
rasus mahaleb* Mill. n. 4. du Ham. n. 6. *Ceraso affinis*.  
*C. Bauh. pin. 451. Cerasus foliis subrotundis, ferratis,  
petiolis Multifloris. Hall. hist. n. 1084. Le Mahaleb,  
Bois de st. Lucie. Mahaleb or perfumed Cherry. Hanb.  
I. 158. Dintenkirische, Dintenbeere, wohlriechender  
Kirschbaum, Steinweisel, Steinkirische, Parfümiers-  
kirische.*

*Sudow 308. Borkhausen 217. Pollich palat. II. 26. Pala-  
las ross. I. 36. Märter 127. Du Roi II. 182. Münchs Ver-  
zeichniß 84.*

§. 277.

Mit Austersträußern am Ende der Zweige und eyrund-  
herzförmigen Blättern.

Wächst am Rhein, an der Mosel und im Oestrei-  
chischen wild, auf trocknen steinigen Hügeln in südlicher  
Lage, bald als ein ausgebreiteter, niedriger Strauch, bald  
als ein Bäumchen. Die Rinde ist an jungen Zweigen  
bräunlich, an ältern Stämmen dunkel aschgrau und glatt,  
Die Blätter sind eyrund herzförmig, fein gezähnt, lau-  
fen in eine stumpfe Spitze aus. Sie sind ferner glänzend,  
oben dunkel- unten mehr bleichgrün, mit einer starken  
weisen Ader durchzogen, stehen abwechselnd bald einzeln,  
bald in Büscheln, und die meisten haben an den untersten  
Zähnen, Drüsen. An den Blattstielen findet man zwey  
Drüsen. Die Blätter variiren bisweilen etwas weni-  
ges in ihrer Gestalt, sind dick, gleichen im Geschmack  
bittern Mandeln, und fallen im Herbst ab. Die wohl-  
rie-

riechenden Blüten erscheinen zu Anfang des Mayes in Aestersträußern an den Enden der Zweige. Die Abschnitte der Blumendecke sind zurückgebogen, die Kronenblätter weiß. Die Frucht ist eiförmig, von der Größe einer Erbse, glänzendschwarz, bittersüß und steht an den Stielen gerade in die Höhe.

## §. 278.

Von den Früchten ist kein besondrer Gebrauch bekannt. Aber ihre Saamensteine kommen in den Handel unter dem Nahmen Magalep- oder Morgalep-Saamen vor. Sie haben einen angenehmen Geruch und werden entweder für sich allein oder mit dem davon abgezogenen Wasser zur Verfertigung wohlriechender Seifen gebraucht. Auch von den Blüten und Blättern wird ein wohlriechendes Wasser abgezogen. Das Holz ist bräunlich, hart, leicht und splintlos. Im Anfang hat es einen unangenehmen Geruch, der sich aber mit der Zeit verliert. Es ist sehr dauerhaft, anfangs weißlich, wird aber durch das austrocknen immer röthlicher. Es wird unter dem Nahmen Bucienholz verkauft, welchen auch das Holz unsrer deutschen Traubenkirsche führt. Man verfertigt Toiletten, Kästchen, Messerhefte, Vertäfelungen, und andre feine Tischler und Dreher-Fabricate daraus. Weil es in der Erde nicht leicht fault, nimmt man es da, wo es in Menge zu haben ist, zu Weinpfählen. Du Hamel empfiehlt diesen Strauch zu Hecken, und zur Vermehrung der Kirsch-Sorten, weil seine Stämmchen Propfreiser davon gerne annehmen, und er selbst in dem schlechtesten Boden gut fortkommt.

## §. 279.

C. Traubenkirsche, Padus Rupp.

Die Blüten erscheinen in Trauben. Eine Art davon (welche aber blos in Lustgärten kultivirt wird) ist immergrün.

K

Art.



Art. 59. Deutsche K. P. Padus. Linn.

*Synon.* *Cerasus avium*. Clus. hist. 65. *Cerasus racemosa silvestris*, fructu non eduli. C. Bauh. pin. 451. *Padus foliis ovato-lanceolatis ferratis*. Hall. hist. 1086. *Padus Dillen*. Giesl. 66. *Pseudoligustrum* Dodon. 777. *Padus germanica folio deciduo*. Rupp. jen. 181. *Padus avium glandulis duabus basi foliorum subjectis* Mill. n. 1. Le Cerisier a Grappes immangeables. The common Bird-Cherry. Hanb. I. 157. Pattscherbe, Vogelfirsche, Büschelfirsche, Elexen, Alpfirsche, Hohlfirsche, moskowitische Lorbeerfirsche, Oltfirsche, Altbaum, Oltbaum, Olantbaum, Ale, Elex, Elpe, Elexbeere, Elzbeere, Ape, Scherben, Scherpken, Scherkenholz, Pötscherben, Pabst, Pabstwiede, Wiedebaum, Kandelwiede, Wasserschlange, Trieselbeere, Kaulbeere, Faulbeere, Knitschelbeere, falscher Faulbaum, Stinkbaum, Hundsbäum, Tölpelgensbaum, Kitschbaum, deutscher Drachenbaum, Haarholz, schwarz Bendelholz, Herrenbaum, Hünereugenbeere, Knitschelbeere, gemeines Lucienholz.

Sudow 309. Bo thausen 218. Gleditsch II. 91. n. 57. Pollich palat. II. 25. Moench hass. I. 242. Pallas ross. I. 37. Scopoli carn. I. 343. v. Burgsdorf 182. Märter 46. Gersmershausens Hausvater V. 286. v. Münchhausens Hausv. III. 377. Schwed. Abhandl. V. 212. Du Roi II. 188. Du Ham. n. 3. Dörrien 264.

Abbild. Cramer t. 41. Jc. plant. med. t. 177. Kerner II. t. 195.

§. 280.

Mit Blüentrauben, eyrund-lanzettförmigen, scharf, e-sägten Blättern, die am Grunde der Oberfläche mit zwey Drüsen versehen sind,

Ein einheimischer, dauerhafter, sommergrüner Baum, der in Weiden- und Erlenbrüchern, Feldbüschen und feuchten Niedrigungen wild wächst und bald als ein Baum bald als ein Strauch von verschiedener Größe erscheint, in beyden Gestalten aber Blüten und Früchte bringt. Die

Rind

Rinde ist an den Zweigen bräunlich, mit kleinen weissen Warzen besetzt, die sich bey zunehmendem Alter vergrößern und dunkler werden. Die Stammrinde ist aschgrau, etwas aufgerissen. Die Blätter stehen abwechselnd, sind eyrund-länglich, zugespitzt, glänzend, am Rande mit scharfen, nach der Spitze zugerichteten Zähnen besetzt, die oft minder gesägt sind, oben hellgrün, unten blässer mit einer weislichen Ader durchzogen, die sich auf beyden Seiten in verschiedene Zweige theilt, auf beyden Flächen glatt, an der Basis der obern mit zwey röthlichen grünen Drüsen versehen. Auf der einen Seite laufen sie etwas weiter an den Stielen herunter. Die Blattstiele sind lang, auf der obern Seite röthlich und gerinnelt, und haben (so lange die Blätter noch jung sind) an der Basis zwey lange, pfriemenförmige Nebenblättchen. Die Blüten erscheinen in großer Menge im May, in lockern herabhängenden Trauben, an einblütigen Stielen, an deren Basis in der Jugend lanzetförmige Nebenblättchen stehen. Sie haben einen angenehmen bis zur Betäubung starken Geruch, besonders des Abends. Die Abschnitte der Blumendecke sind mit röthlichen Härchen gefranzt und zurückgebogen. Die Kronenblätter sind weis, rundlich, am Rande gezahnt. Die Früchte sind von der Größe einer Erbse, mager, von eckelhaftem Geschmack, anfangs grün, hernach roth, endlich bey ihrer Reife im August schwarz. Sie enthalten einen kleinen, ovalen Stein. Die Wurzel geht einen Fuß tief und breitet sich drey Fuß weit aus. Alter der Vollkommenheit: vierzig Jahre.

## §. 281.

Man baut zwar diesen Baum nicht forstmäßig an, allein wegen seines schönen, pyramidischen Wuchses, wegen seiner überausgroßen, wohlriechenden Blüentrauben, und weil sich die Singvögel bey der Reife der Früchte in Menge bey ihm einfinden, verdient er eine Stelle in Waldgärten (Parks). Die Vermehrung geschieht am be-

sten durch Saamen. In gutem Boden und bey gehöriger Kultur erhält man Bäume der zwoten Größe. Wer morastigen Ueberschwemmungen ausgesetzte Niedrigungen hat, kann ihn daselbst unter Weiden, Erlen, Eschen ic. anbauen, oder auch in guten, schwarzen, frisch liegenden Boden allein ziehen und süße Kirsch-Zweige darauf setzen. Zu eben dieser Absicht, kann man ihn auf einem feuchten Lande, das zuweilen unter Wasser steht, und worauf sonst keine Obstbäume fortkommen würden, anziehen. Aus den Saamen bleibt aber seine Vermehrung, in Rücksicht des Stammes und Holzes die beste.

## §. 282.

Die Rinde hat Heilkräfte. Man hat sie in Schweden (S. die oben angeführten Schwed. Abhandl.) bey eingewurzelten, siphylitischen Krankheiten mit sehr gutem Erfolge angewandt. Die Früchte werden in Lappland und Kamtschatka mit Salz oder Brandewein gegessen, welche Leckerkost wir den Bewohnern dieser Länder gerne lassen wollen. Die jungen, sehr biegsamen Triebe geben Tobacksröhre, gute Reißstangen und kleine Böttcherwaare. Nach Münchhausen sollen die Zweige, woran noch Blüten befindlich sind, die Mäuse von den Kornspeichern abhalten. Das stärkere Stammholz wird wegen seiner Schönheit und Güte, unter dem Nahmen St. Lucienholz (wie das Mahalebholz) zu verschiednen feinen Tischler- und Dreherarbeiten genommen. In Frankreich verarbeitet man es nach Du Hamel, zu saubern Hausgeräthe und Gewehrschäften, indem es den widrigen Geruch, den es anfänglich hat, wenn es trocken wird, verliert.

## §. 283.

Art. 60. Virginische Z. K. P. P. virginiana.  
 Synon. Prunus virginiana. Linn. I. 6777. Cerasus silvestris, fructu nigricante, in racemis longis pendulis, Phytolaccae instar congestis. Gronov. virg. 54. du Ham. n. 5. Padus virginiana. Mill. n. 3. P. Padus rubra.  
 Münch.



Münchh. V. 240. Le Cerifier de Virginie. Virginian bird - Cherry. Hanb. I. 158, The wild Cherry Tree. Wangenh. Beytraege. S. 34. Virginische Vogelfirsche, virginischer wilder Kirschbaum.

von Wangenheim 34. Marshall 208. Carrer 419. 420. Suckow 310. Berthausen 220. Du Roi II. 191. Medicus botanische Beobachtungen 1782. 345. Münch's Verzeichniß 83.

Abbild. v. Wangenheim. Fig. XXXII.

### §. 284.

Mit eyrund zugespizten, breitem, grobgesägten Blättern. Etwas entfernt von der Basis des Blattes sitzen zwey Drüsen. Deck- und Nebenblättchen fehlen an den Blättern und Blüten. Die Früchte sind größer.

Ein sommergrüner Baum, der Virginien zum Vaterland hat, und auch bey uns ausnehmend dauerhaft ist. Er wird in seiner Heimath oft vierzig und mehr Fuß hoch, bey einer Stammdicke von zwey Fuß, gefunden. Diese Dicke behält er auf eine beträchtliche Höhe, und verbreitet sich erst gegen den Gipfel zu in Zweige. Sein Wuchs ist dabey ziemlich schnell, so daß schon vierzigjährige Stämme zu Brettern geschnitten werden können. Er kommt sogar in einem mageren, leichten, hüzigen Boden fort, wächst sodann zwar nicht schnell und hoch, liefert aber ein desto schätzbarers Nutzholz. Seine Wurzeln laufen seitwärts flach aus. Die Rinde ist rothbraun mit weissen Wärzchen besetzt. Die Blätter, welche sehr frühzeitig ausbrechen, stehen abwechselnd, sind eyrund zugespizt, am Rande grob gesägt, auf beyden Flächen glatt, oben glänzend - unten mattgrün, laufen an der einen Seite etwas weiter herab. Die Blattstiele sind oben gerinnelt, haben in einiger Entfernung von der Blattbasis, zwey röthliche Drüsen und keine Nebenblättchen. Nach dem völligen Ausbruch des Laubes erscheint die starkriechende

Blüte, in langen hängenden Trauben, an glatten, einblütigen Stielen, deren Basis gleichfalls die Nebenblättchen fehlen. Einige Blüten kommen nach, wie bey der vorhergehenden Art, aus den Achseln der Blätter, welche an der Traube stehen. Die Abschnitte der Blumendecke sind eysförmig, stumpf, mit röthlichen, kurzen Borsten gefranzt, ein wenig zurückgekrümmt. Die Kronenblätter sind weiß, eprund, stumpf, mit langen, borstenförmigen, sehr feinen Zähnen gesägt. Die Frucht ist größer als von unsrer Traubenkirsche, rund, fleischig, anfangs grün, hernach roth, endlich glänzend schwarz, enthält einen ovalen, fast runden Saamenstein.

§. 285.

Dieser Baum hat so viele schätzbare Eigenschaften, daß er bey Anpflanzungen mehr Aufmerksamkeit verdiente. Sein Holz (welches gleichfalls in Frankreich unter dem Nahmen St. Lucienholz verarbeitet wird) ist fest, von starken Stämmen gelbbraun, sehr fein, häufig gemasert und nimmt eine gute Politur an. Vom Wurmsfraße bleibt es verschont. Die daraus geschnittenen Bretter reißen nicht und werfen sich nicht. Sie sind zu Arbeiten, die aus ganzen Stücken bestehen und nicht zusammengesetzt werden sollen, die vorzüglichsten. Zudem erlangt der Stamm dieses Baumes eine solche Stärke, daß ansehnliche Fabricate daraus verfertigt werden können. Da er schnell wächst und ein sehr gutes Brenn- und Kahlholz liefert; so ist er sehr geschickt dem Holzmangel abzuhelpen. Die Früchte dienen zur Bereitung eines Kirschgeistes der nach Hrn. v. Wangenheim, wenig feines gleichen hat. Legt man sie frisch in Rum oder Wein und läßt sie in der Wärme destilliren; so erhält man ein kräftiges, und wenn es mäßig gebraucht wird, gesundes Getränk. Dieser Baum nimmt mit einem leichten Boden und südlicher Lage vorlieb. Nach Hrn. v. Burgsdorfs Versicherung bringt jeder Heideboden in der Mark Brandenburg nächst den  
Kie-

Kiefern, in kurzer Zeit, auch diese Bäume und zwar sehr ansehnlich hervor.

## §. 286.

Gatt. 26. Mespilus, Mispel. Laubholz.

Diese Gattung begreift verschiedene Arten, welche theils bewafnet, theils unbewehrt sind, und wovon die meisten Nordamerika zum Vaterland haben. Man findet darunter Bäume, Sträucher (ganze und halbe) sämtlich unter die harten Holzarten gehörig. Staubfäden sechs, acht, neun, zehn und mehrere, der Blumendecke in einem ringsförmigen Stande einverleibt. Der Fruchtknoten sitzt unter der Blumendecke. Staubweege, einer, zwey, drey, fünf. Blumendecke und Blumenkrone sind fünfblättrig. Frucht, eine genabelte Steinfrucht, welche einen, drey, fünf steinharte Saamen, die gewöhnlich an das Fleisch angewachsen sind, enthält.

## §. 287.

Art. 61. Deutscher M. *M. germanica silvestris*. Borkh.

Synon. *Mespilus germanica* Linn. Spec. Pl. I. 684.

n. 1. *Mespilus germanica folio laurino non serrato*. C. Bauh. pin. 453. *Mespilus foliis elliptico-lanceolatis, serratis, calycibus longissimis, persistentibus*. Hall. hist. n. 1094. *Mespilus* Dodon. P. 801. *Mespilus folio laurino*. du Ham. n. 1. Le Nefflier comun. The Medlar. Hanb. I. 146. II. 825. Meßpel, Meßpel, Maßpel, Maßpel, Heßpen, wilder Mispel, Apenirsche, Espel, Mospel.

v. Burgsdorf I. 106. Gleditsch II. 207. n. 84. Borkhausen 196. Märter 103. Pollich palat. II. 37. n. 474. Moench. hist. I. 248. n. 412. Pallas ross. I. 66. Suckow 321. Du Roi I. 409. Gleditsch vermischte Schriften I. 19. Münchhausen III. 514.

Abbild. Kerner III. t. 277. Je plant. med. t. 190. Mayeri Pomona franconica. II. 45. n. 1. t. I. und II.



§. 288.

Mit lanzetförmigen, auf der obern Fläche etwas haarigen, auf der untern weißwolligen, glattrandigen Blättern. Die Zweige endigen sich in lange, scharfe Dornen.

Eine einheimische Laubholzart, die in unsern Waldungen bald als ein Baum dritter Größe, bald als ein Strauch erscheint. Seine sparrigen Zweige endigen sich in lange, steife, scharfe Dornen, die man auch bisweilen an den Seiten der Zweige findet. Die Rinde ist glatt, aschgrau, die jungen Triebe weißwollig. Die Blätter brechen im April aus, sind lanzetförmig, von zartem Bau, etwas steif, einigermaßen den Lorbeerblättern ähnlich, auf der obern Fläche etwas haarig, auf der untern weißwollig, glattrandig, bisweilen gegen die Spitze zu gezahnt. Sie fallen spät im Herbst ab und haben oft zwey kleine Nebenblättchen. Die Blattstiele sind kurz, oberwärts gefurcht. Die Blüten erscheinen im May und einzeln, aufrecht stehend, an den Spitzen der jungen Zweige, auf kurzen, wolligen Stielen. Die Krone hat fünf große, weißröthliche, rosenförmig stehende Blätter. An der Basis der Blütenstiele finden sich einige Blätter, die weit über sie hervorragen. Die lanzetförmigen Abschnitte der fünfblättrigen, feinbehaarten Blumendecke sind von der Länge der Blumenkrone. Die fünf Staubweege sind an der Basis verwachsen, haben kolbige Narben. Der Fruchtknoten sitzt unter der Blume, die Früchte sind verb, fleischig, von der Größe wilder Holzbirnen, anfangs grün, bey ihrer völligen Reife im October aber, ganz dunkelbraun, auf dem Wirbel gekrönt, haben ein blasses, hartes, herbes Fleisch und enthalten fünf bis zehn steinharte, braungelbe Saamen, mit weißem Marke, welche ein auch zwey Jahre bis zur Keimung liegen.

Das Holz ist hart und fest, aber wegen seiner Schwäche nur zu wenigem Nutzgebrauch geschikt. Wenn es stark und gerade gewachsen ist, läßt es sich hobeln und sau-

sauber bearbeiten. Man braucht es sodann zu Jagdspiesen, Peitschenstielen und kleinen festen Ackergeräth. Zur Feuerung giebt dieser Strauch unter dem Reißholz gute Hitze und Kohlen. Die Früchte müssen erst auf dem Lager teig werden, unreif sind sie bloß zum Gerben brauchbar, so wie die Rinde, Zweige und das Laub. Die Kultur hat diesen Strauch in den Gärten veredelt, und diese edlern Sorten sind ein Gegenstand der Fruchtbaumnacht geworden.

## §. 289.

Art. 62. Quitten-Mispel. *M. Cotoneaster*.

*Le Nefflier cotoneastre. The dwarf Quince.*

Unbewehrt: Mit eyrunden, glattrandigen, unten filzigen Blättern, schirmartigen, wenigblütigen Trauen.

Subsp. a) Rothe Q. *M. M. C. rubra*.

*Synon.* *Chamaemespilus Gesneri*. Clus. hist. V. I. 60. *Chamaemespilus Cordi*. C. Bauh. pin. 452. *Cotoneaster folio non serrato rotundo* C. Bauh. pin. 452. *Cotoneaster*. J. Bauh. hist. V. I. l. 73. *Mespilus folio subrotundo, fructu rubro*. Tournef. instit. 642. *Mespilus Cotoneaster*. Linn. sp. pl. ed. 3. Tom. I. 686. n. 7. *Mespilus inermis, foliis ovatis integerrimis, subtus tomentosis*. Hall. hist. n. 1093. Steinmispelstrauch, Zwergmispelstrauch, Zwerg-Mespel, Zwerg-Mespel, Bergquittenbeere, Quittenbeere, Hirschbirle, Flühbirle, Stein-Mespel, wilde Rüttenbeere.

Suckow 325. Forkhausen 198. Pollich palat. II. 39. n. 476. Moench. hass. 413. Leers herborn. 117. n. 375. Pallas ross. I. 69. Gleditsch II. 208. Märter 188. v. Bürgsdorf 208. Ehrhard III. 61. IV. 18. Dörrien 263. Du Roi I. 420. Hirschfelds Gartencalender 1785. 194. Ehurpfälz. Besmerk. 1774. 228.

## §. 290.

Mit sehr kurzen Blüentrauben und rothen Früchten.

Wächst im Amte Lauenstein, in der Pfalz, auf den felsigen Gebirgen der Bergstrasse, dem Melibocus und in andern Gegenden wild. Sie bleibt ein niedriger, unregelmäßig ausgebreiteter Strauch, im guten lockern Boden und in schattigen Gebüschern wird er aber ansehnlicher. Die Wurzeln laufen schräge und weit aus, gehen aber nicht tief. Die Rinde ist glatt und aschgrau, an jungen Zweigen glänzend braunroth. Die Blätter sind klein, eyrund, glattrandig, steif, oben glatt und glänzendgrün, unten weisswollig mit erhabnen Adern bezeichnet, stehen abwechselnd auf sehr kurzen, wolligen, oben gefurchten Stielen. Auch der Rand ist wollig, und an der Basis der Blattstiele findet man zwey lanzetförmige, zugespitzte hinfällige, röthliche Nebenblättchen. Die Blüten erscheinen in den ersten Tagen des Frühlings an den obersten Zweigen, theils einzeln auf einfachen, wolligen Stielen, theils in kleinen Schirmen auf ästigen, mit einer glänzendweisen Wolle bekleideten Stielen. Sie hängen unter sich. Die Kronenblätter sind rund, weiss mit einem grünen Striche bezeichnet. Die Abschnitte der Blumen- decke sind auf der einen Seite grün, auf der andern röthlich, aufwärts gebogen, fast so lang als die Kronenblätter und wollig. Der Staubweege sind gewöhnlich nur drey. Die Früchte stehen in Büscheln, sie sind klein, verkehrt eyrund, unschmackhaft, mehlig, reifen im Aug. haben einen fünfzackigen Nabel, und eine rothe, anfangs mit einer kurzen, silbergrauen, feinen Wolle dünne überzogene Schaale. Sie schließen zwey, drey, vier kleine, steinharte Saamen ein, die auf der einen Seite eckig, auf der andern platt sind.

## §. 291.

Subsp. b) Schwarze *M. M. C. nigra*.

*Mespilus folio rotundiori non serrato, fructu nigro.*

A man.



Aman. ruth. 251. v. Münchhausen V. 361. Du Roi I. 483. Ehrhard IV. 19. Suckow 325.

Abbild. Aman. t. 14.

Messerschmidt hat diese Mispel in Sibirien entdeckt und Aman hat sie beschrieben. Sie unterscheidet sich bloß durch die längern Blüentrauben und schwarzen Früchte.

§. 292.

Art. 63. Weisdorn, M. Oxyacantha Borkh.

Synon. Crataegus Oxyacantha, foliis obtusis, subtrifidis ferratis. Linn. Sp. pl. I. 683. Crataegus Oxyacantha foliis integris, lucidis, glabris, obtuse ferratis: apice obtusis. Gledits. 149. Crataegus Oxyacantha obtusifolia lucida. La petite Aubepine. The dwarf Hawthorn. Der kleine Weisdorn, der kleine glänzende Mehlbeerstrauch, kleiner Hageapfelstrauch.

Borkhausen 189. Gleditsch II. 179. Pollich palat. II. 33. Suckow 314. Märter 155.

Abbild. Jacquin austr. t. 292. f. 2.

§. 293.

Mit feilsförmigen, stumpfen, seicht drehsplätigen, stumpfgezahnten Blättern, zweiwegigen Blüten.

Ein kleiner Dornstrauch, der in manchen Gegenden allein, im fruchtbaren Boden aber mit der folgenden Art vorkommt. Blüten und Früchte erscheinen vierzehn Tage früher. In der Mark findet man ganze Strecken damit besetzt. Jacquin und Pallas führten ihn zuerst als eine eigene Art auf. Auch H. Borkhausen hielt ihn nach genauer Untersuchung für eine eigene Art, welche Vermuthung durch die Versicherung des Hrn. v. Burgsdorf, (S. dessen Anleitung zum Anbau der vorzüglichsten Holzarten) daß dieser Weisdorn, aus Saamen gezogen, sich beständig gleich bleibe, zur Gewißheit wird, die uns nöthigt diesen Weisdorn, wo nicht für eine eigne Art, doch für eine Halbart zu halten. Die Blätter kommen in abwechselnd stehenden Büscheln zum Vorschein, sind dunkler,

ler, glatter, glänzender als bey der folgenden Art, unten mattgrün, feilförmig, in drey seichte Lappen, von denen oft der mittlere noch zwey Einschnitte hat, getheilt, stumpf gesägt, dabey buchtig oder zernagt. Die Blattstiele sind unten rund, und haben auf der obern Seite eine kaum merkliche Furche. Die Blattanfänge sind halbmondförmig, bey den untern Blättern scharf gesägt, bey den obern glattrandig. Der Staubweege sind zwey, sehr oft drey. Die reifen Früchte sind scharlachroth, mehlig, enthalten zwey, drey, selten einen Saamen.

## §. 294.

Art. 64. Hagedorn. *M. Crataegus*. Borkh.

*Synon.* *Crataegus monogyna rubra*. Pallas ross. I. I. 59. *Mespilus Oxyacantha*. Scopoli carn. I. 344. *Crataegus Oxyacantha*. Moench. hass. I. 246. *Crataegus monogyna* Jacquin. austr. n. 206. *Spina acuta*. Dod. Pempt. 751. *Mespilus apii folio, sylvestris spinosa*. C. B. Pin. 751. *L'Epine blanche, noble Epine*. The common Hawthorn. Hanb. I. 112. Weißdorn, Heßdorn, Heckenweissdorn, Hagedorn, Hageapfelstrauch, Hagehot, Hundsdorn, Mehldorn, Mehlsägen, Möllervrod, Mehlfestgen, Mehlsässerchenstrauch, Meelstrauch, Maulbeere, Meldorn, unsrer lieben Frauen Birlein.

Borkhausen 190. Gleditsch II. 148. Sukow 314 von Burgsdorf 192. Märter 154. Becker 54. Germerhausen V. 291. Du Roi I. 180. Doerrien 256. Du Ham. I. 139. v. Münchhausen III. 71.

Abbild. Cramer t. 33. Jacquin. t. 292. f. 1. Kerner II. t. 198.

## §. 295.

Mit fünffach eingeschnittenen, oft bennehe gesiederten, sägezähnigen Blättern, deren untere Lappen sperrig abstehen, einwegigen Blüten.

Ein einheimischer, sommergrüner, ganzer, harter Dornstrauch, der überall häufig wild wächst, und bisweilen

len als ein mittelmäßiger Baum gefunden wird \*). Seine Wurzeln gehen ziemlich tief und breiten sich dabey weit aus. Die Stammrinde ist glatt, bräunlich und wird im Alter graulich. Die Blätter stehen abwechselnd, sind gegen den Stiel etwas zugespitzt, drey, fünf auch siebenmahl tief eingeschnitten. Die untern Lappen stehen sparrig ab, sind oft ganz von den obern getrennt, so daß die Blätter gefiedert aussehen. Der Rand ist sägeförmig gezahnt. Die obere Fläche ist dunkelgrün und glänzend, die untere hell und mattgrün. Die Blattstiele haben oben eine breite Furche und unten einen beynahe keilförmigen Rücken. Die Blattansätze sind groß, halbmondförmig, die obern glattrandig, die untern stark gezahnt, und ihre Zähne oft gefranzt. Die Blüten erscheinen zu Ende des Mayes in dichten Schirmen. Die Blütenstiele sind dreyblütig. Die Kronenblätter sind weiß, stehen rosenförmig. Staubweege, einer, zwey, im letztern Falle findet man die zwey Staubweege in der Hälfte vereinigt, oder der eine ist unvollkommen. Die Blumendecke ist glatt, und hat fünf, allmählich zurückgebogene Abschnitte. Die Früchte sind länglicht rund, anfangs grün, bey ihrer Reife im Sept. roth, enthalten in einem gelben meh-

\*) 1) Hirschfeld erwähnt (Fruchtbaumzucht. I. 18.) eines Hagedorns in den Thälern des Bisthums Basel nahe an der Strasse, der zu der Höhe eines großen Birnbaums erwachsen war, und H. v. Moser (Forstarchiv. VII. 256.) sah auf der Wirtenberger Alp ohnweit Bodingen einen Hagedorn, von der Höhe und Dicke eines Vogelbirnbaums.

2) Der Beynahme Monogyna ist, wie schon H. Vorkhausen bemerkt, nicht ganz schicklich zur Bezeichnung dieser Art: denn

- a) ihn führt schon eine von Hrn. Pallas entdeckte und beschriebene Art, *C. monogyna nigra*.
- b) Auch Marschals *Mespilus pyrifolia* ist einwegig,
- c) und vielleicht finden sich noch einige Arten die gleichfalls nur einen Staubweg haben.



mehlichen, unschmackhaften Fleisch einen sehr harten Samenfern, der zwey bis drey Jahre in der Erde liegt. Die Früchte bleiben zum Theil bis in den März hängen.

## §. 296.

Ab. a) H. mit gefüllter Blume. *M. C. flore pleno.* L'Aubepine a fleurs doubles. The double blossomed Hawthorn. b) Gelber Hagedorn. *M. C. fructu luteo.* L'Aubepine a fruit jaune. The yellow berried Hawthorn. c) Weißer Hagedorn. *M. C. fructu albo.* L'Aubepine a fruit blanc. The white berried Hawthorn. d) Großer Hagedorn. *M. C. major.* *Crataegus Oxyacantha major.* West. Lang scarled-berried Hawthorn. e) Ahornblättriger H. *Mespilus acerifolia* Burgsd. (Holzcultur. 147.) Le Nefflier a feuilles d'Erable. Gucow 319. The Mapple-leaved Medlar. f) Glastonbury-H. *Mespilus biflora.* *C. O. biflora.* West. *Crataegus praecox* Burgsd. Glastonbury Thorn.

## §. 297.

Man duldet den Hagedorn gern in Waldungen, er dienet den jungen Eichen zum Schutz und seine Früchte sind eine Wildasung. Im Buschholze, wo er starke Triebe macht, liefert er gute Spazierstöcke, die man bähret und braun beizt. Auf die jungen Stämme kann man Birne pspöpfen, die aber immer strenge bleiben. Zu lebendigen Hecken ist er in gutem Boden unser bestes einheimisches Heckenholz. Aber man muß die jungen Anlagen gegen das Vieh, welches die jungen Blätter und Sprossen gerne verbeißet, wohl sichern. Aus den Früchten bereitet man in der Schweiz ein bierartiges Getränk. Man kann sie auch auf Eßig, Brandewein und zur Schwein-Mast nutzen. Die Rinde giebt mit schicklichen Zusätzen brauchbare Farben. Das starke Stammholz giebt das beste Handwerkszeug, Stiele, Arzthelme, Radkämme,

fämme, Drillinge, Schirrholz, kleine Stücke zu allerhand Maschinen und dauerhafte Dreherwaaren.

Sieffert I. 174.

§. 298.

Art. 65. Scharlach H. C. coccinea.

*Synon.* Mespilus apii folio, virginiana, spinis horrida; fructu amplo coccineo. Pluck almag. 249. Mespilus spinosa f. Oxyacantha virginiana maxima. Herm. lugd. 423. Boerh. Alt. II. 257. Angl. catal. 49. Mespilus canadensis, sorbi torminalis facie. Tourn. inst. 642. Crataegus coccinea. Wang. 52. Mespilus virginiana colore rutilo. Bauh. Pin. 453. L'Aubepine a fruit rouge. The Cocks - spur Hawthorn. Hahnensporn dorn, Mispelbaum mit den Hahnenspornen, nordamerikanischer großer stachelichter Weisdorn, nordamerikanischer großer weißer Aceroll, nordamerikanische Elzbeere, scharlachrothe Mispel.

v. Wangenheim 52. Marshal 150. Ehrhard IV. 51. VI. 91 Borkhausen 194. Du Roi I. 194. Cuckow 316. Mönchs Verzeichniß 28. Medicus botanische Beobachtungen 350. Miller n. 4.

Abbild. Pluk. phyt. t. 46, f. 4. Mayer Pomona tranconica. II. 55. n. 3. t. VII.

§. 299.

Mit starken Dornen besetzte Zweige. Blätter herzförmig, eingeschnitten, gesägt. Nebenblättchen, klein, schmal, mit drüsigen Zähnen. Vielblütige, behaarte Schirmsträucher, drüsig gefranzte Kelchabschnitte. Länglichtrunde Früchte mit einem erhabenen Nabel.

Ein nordamerikanischer harter, ganzer Dornstrauch, der auch bey uns sehr gut fortkommt, und bisweilen als ein kleiner Baum erscheint. Die Zweige sind mit unterwärts gebogenen, scharfen, überaus starken, den Hahnenspornen ähnlichen Dornen besetzt. Die Blätter gleichen dem

dem Elzbirnlaube. Sie stehen in abwechselnden Büscheln, sind groß, herzenförmig, (die untern beynahe keilförmig) ausgeschweift, mit zehn bis zwölf spitzigen Ecken, am Rande scharf sägezählig, auf der obern Fläche fein behaart, unten glatt. In der Jugend sind sie mit zwey kleinen, schmalen, gezahnten Nebenblättchen versehen. Die Blattstiele sind lang, oben gefurcht, zu beyden Seiten der Furche mit harten Drüsen besetzt. Die Blüten erscheinen zu Ende des Mayes in Schirmsträußern an den Spitzen und Seiten der Zweige, vier bis fünf auf einem behaarten Stiele, an deren Basis lanzettförmige, drüsig gezahnte Nebenblättchen stehen. Die Nebenblättchen der Blattstiele sind nur in früher Jugend sichtbar und gleichfalls drüsig gesägt. Die Abschnitte der Blumendecke sind borstenförmig, drüsig gefranzt, die Kronenblätter weiß, fast rund, fein gezahnt, aussen gewölbt, innwendig hohl. Staubfäden neun bis zehn. Staubweege drey bis fünf. Die Frucht ist länglicht-rund, hochroth, enthält in einem mehlichen Fleische, zwey, drey bis fünf Saamensteine, die nicht so fest am Fleische, wie bey den übrigen Mispelarten, sondern in kleinen etwas erhärteten Fächern hängen, wodurch diese Art einen fast unvermerkten Uebergang zu der folgenden Gattung macht. Die Saamensteine liegen ein Jahr in der Erde.

## §. 300.

In Amerika benutzt man die Früchte dieses Hagedorns zur Viehmast. Das Holz desselben scheint in seiner Brauchbarkeit, mit dem Holze des Mehlbirnbaumes (*Pyrus Crataegus aria*) übereinzukommen. Da er, wenn er unter der Scheere gehalten wird, sehr dicht in einander verwächst, und seine langen, scharfen, überaus starken Dornen eine gute Wehre gegen das Vieh sind; so kann man mit Nutzen Hecken von dieser Holzart anlegen, wo-



zu sie auch schon Kalm \*) empfohlen hat. Wegen seiner schönen großen Blütensträucher und rothen Früchte, empfiehlt er sich auch, für Lustgebüsch.

## §. 301.

Art. 66. Grüner H. M. viridis. Linn.

L'Aubepine verde. The green Hawthorn. Der grüne Hagedorn ohne Stacheln.

Sudow 317. Churpfälzische Bemerkungen 1774. 289. Medicus bot. Beobacht. 1782. 344.

Unbewafnet. Blätter lanzetförmig eyrund, undeutlich in drey Lappen getheilt, gesägt, glatt.

Waterland. Nordamerika. Er hat keine Dornen. Die Blätter sind dünne, lanzetförmig eyrund, undeutlich in drey Lappen getheilt, glatt, gesägt, unten mattgrün, mit grünen Adern bezeichnet. Sie stehen abwechselnd, in ziemlicher Entfernung von einander und sind hinter sich zurückgebogen. Die Blattstiele sind ein bis zwey Zoll lang, oben mit mehreren Drüsen versehen, die oft Stacheln ähnlich sind, auch oft auf ganz kurzen Stielchen sitzen. Die Nebenblättchen sind Hahnenkammförmig. Die jungen Triebe meergrün. Die Blüten erscheinen in Schirmsträußern. Die Einschnitte der Blumendecke sind beynähe von der Länge der Kronenblätter, fein gezahnt, und hinter sich zurückgebogen. Staubfäden zählt man gewöhnlich acht, selten nur sechs oder sieben, nie mehr als zwölf. Die Fäden sind weiß, die Staubbeutel röthlich. Staubweege vier, fünf, grün von Farbe und etwas kürzer als die Staubfäden. An der Basis der Blütenstiele und Blütenstielchen stehen hinsällige, feingezahnte, lanzetförmige Deckblättchen. Die Schirmsträucher bestehen aus zehn, mehr oder wenigern Blüten, die bald einzeln stehen, bald mit kleinen Stielgen, zu zwey oder drey auf

\*) Schwed. Abh. Band XXXV. S. 320.

auf einem andern gemeinschaftlichen erscheinen. Die Früchte reifen im Sept. sind länglicht rund, bey der Reife dunkelroth, nachhero bräunlichtroth, enthalten vier große Saamensteine.

§. 302.

Art. 67. Glänzende M. *M. lucida*.

Synon. *Crataegus lucida* Mill. L'Epine luisante.  
The strong thorned Hawthorn. Nordamerikanischer Weisdorn mit glänzendem Laub.

§. 303.

Mit bedornten Zweigen, schönen glänzendem Laube, vielblütigen Sträußern.

Subl. a) Breitblättrige Glanz M. *M. l. latifolia*.

Ein harter, ganzer Dornstrauch. Vaterland. Nordamerika. Die Rinde ist dunkelgrau und glatt, die Aeste sind mit starken, sehr spizigen, walzenförmigen, gegen zwey Zoll langen, unter sich gekrümmten Dornen bewafnet. Die Blätter sind eylanzettförmig, gesägt, auf der obern Fläche dunkelgrün und überaus glänzend, auf der untern mattgrün. Sie stehen auf kurzen rothen Stielen, zu drey bis fünf besammen, und fallen sehr spät im Herbst ab. Die Blüten erscheinen in Sträußern. Die Abschnitte der Blumendecke sind strichförmig, offenstehend, von der Länge der Kronenblätter. Die herabhängenden Früchte sind kuglicht, bey ihrer Reife roth, enthalten zwey bis drey Saamensteine.

§. 304.

Subsp. b) Schmahlblättrige Glanz M. *M. l. salicifolia*.

Mit weidenblättrigem, glänzenden Laube.

Ehrhard IV. 17. 51. 81. von Wangenheim 53. Hirschfelds Gartenkalender 1785. 193. Du Roi I. 186. v. Münchhausen V. 146. Medicus l. c. Diese Mispeln gehören unter die schönsten Arten dieser Gattung, denen keine andere in Ansehung der Schönheit des Laubes, der Dichte

Dichte des Buchses, wenn sie beschnitten werden, und ihrer fürchterlichen Waffen gleich kommt. Wenn sie unter der Scheere gehalten werden, treiben sie häufig Schüsse, wodurch sie undurchdringliche Hecken bilden, welche wegen ihrer großen Dornen, das befriedigte Land gegen jeden Einbruch irgend einer Viehhart sicher stellen. Der Boden muß zu solchen Heckenanlagen, trocknes, aus Lehmen mit Dammerde gemischtes Land seyn.

S. 305.

Art. 68. Keilblättrige M. *M. cuneifolia*.

Synon. *Mespilus cuneiformis* Marshall. 153. *Crataegus Crus Galli* Linn.? *Milleri* n. 5. *Mespilus aculeata* du Ham. n. 11. L'Azerolier de Virginie. The virginian Azerole, wedge-leaved Mespilus. Mispelbaum mit keilförmigen Blättern, keilblättriger, virginischer Azerol-Mispelbaum.

Borkhausen 376. Hirschfelds Gartenkalender 1784. 286. Marshall 153. Suckow 317. Mönch 28. Ehrhard III. 21. Du Roi I. 195. Medicus botanische Beobacht. 344.

S. 306.

Mit Dornen, Blätter verkehrt eysförmig, feilartig gebildet, an den Stielen herablaufend, eckiggesägt, etwas behaart.

Waterland. Nordamerika. Ein sommergrüner, harter, ganzer Dornstrauch, der oft ein Baum dritter Größe wird. Die Blätter stehen abwechselnd, einzeln oder in Büscheln. Sie sind verkehrt eysförmig, feilartig gebildet, an den Stielen herablaufend, am Rande ungleich oft eckig, an manchen Zähnen doppelt und scharf gesägt, oben glänzend dunkelgrün, glatt, unten hellgrün, matt, von erhabenen Nerven etwas runzlig, auf den Adern behaart. Die Schirmtrauben sind vielblütig, stehen auf langen, an der Spitze dicken Stielen. Die Abschnitte der Blumendecke sind glattrandig, zurückgebogen. Staubweege drey bis vier. Die Frucht ist fast kugelförmig,



warzig punktirt, bey der Reife röthlich und hat einen niedergedrückten Nabel.

Ab. a) K. M. mit esbarer Frucht. *M. c. dulcis feu edulis*. L'Aubepine de Virginie a fruit mangeable. The eatable Haw. Loddiges. Cockspear with eatable fruit. Hanburg.

Abbild. Mayer *Pomona franconica*. II. S. 55. n. 4. t. VIII.

§. 307.

Art. 69. Rundblättrige M. *M. rotundifolia*. Moench.

*Synon.* *Crataegus pyrifolia*. Loddiges. n. 8. Le Nefflier a rondes feuilles. The round leaved Medlar. Rundblättriger Hagedorn. Ehrhard III. 21. IV. 81. Suckow 319. Hirschfelds Gartenkalender, 1784. 285. Mönch. 28.

Blätter rundlich, etwas eckig, gesägt, glatt, glänzend, vielblütige Schirmtrauben, drüsig = gesägte Kelchabschnitte, runde Früchte.

Waterland. Nordamerika. Ein dauerhafter, ganzer, harter Sommerstrauch, der in vielen deutschen Lustgärten prangt, und unsre Winter, ohne den geringsten Schaden zu leiden, aushält. Die Blätter sind rundlich, etwas eckig, gesägt, glatt, glänzend. Die Blüten erscheinen in vielblütigen Schirmtrauben. Die Abschnitte der Blumendecke sind gesägt = drüsig, die Früchte kugelförmig. Er ist, wie die vorhergehenden Arten, eine treffliche Heckenpflanze, indem er sie mit seinen fürchterlichen Stacheln, wo nicht übertrifft, doch ihnen gewiß gleich kommt.

§. 308.

Art. 70. Tüpfel M. *M. Xanthocarpus*. Linn.

*Synon.* *Crataegus tomentosa*. Linn. sp. ad. 2. 682. Ejusd. Veg. ed. 13. p. 387. *Mespilus Xanthocarpus*. Linn. suppl. 254. Le Nefflier de Virginie a fruit jaune, L'Epine de Pinchaw. The gooseberry-leaved Virginia-Haw.

Hawthorn. Haub. I. 113. Bolliger Hagedorn, filziger Weisdorn, virginischer Weisdorn mit gelber Frucht, Stachelbeerblättriger, virginischer Weisdorn.

Sudow 318. Du Roi I. 183. Mönch. 60. Ehrhard I. 181. II. 67. Hirschfelds Gartenkal. 1783. 189. Abbild. Mönch. t. III.

§. 309.

Blätter fast keilförmig, gekerbt. Blüten einzeln. Kelchabschnitte blätterartig, eingeschnitten, gesägt, lang, zurückgebogen. Frucht fast kräuselförmig, punktirt, warzig.

Waterland. Nordamerika, wo er Dornen hat, welche er in Deutschland nicht hervorbringt. Die Blätter sind fast keilförmig, gekerbt, ziemlich dick, etwas filzig und sehr kurz gestielt. Die Blüten erscheinen einzeln, auf kurzen, filzigen Stielen an den Spitzen der Zweige. Diese sind dünne, und in seiner Heimat mit Dornen dicht besetzt. Die Nebenblättchen sind strich-lanzetsförmig, gesägt, abfallend. Der Fruchtknoten ist filzig. Die Abschnitte der Blumendecke sind blätterartig, lanzetsförmig, eingeschnitten, gesägt, zurückgerollt und länger als der Fruchtknoten. Staubweege fünf. Die Frucht ist fast kräuselförmig, schmutzig gelb, mit schwarzen Warzen punktirt, von der Größe der Kriechen, reift spät und enthält fünf Saamensteine.

§. 310.

Art. 71. Zinnober M. M. Phaenopyrum. Linn.

Synon. Mespilus cordata Mill. n. 4.

Mönch. 61. Borkhausen 377. Hirschfelds Gartenkal. 1783. 189. Sudow 326. Ehrhard I. 182. II. 65. VI. 33.

Blätter herzförmig, drei, fünf bis sieben, lappig gesägt, glatt. Schirmtrauben. Kelchabschnitte kurz, stumpf, hinfällig. Frucht zusammengedrückt-fugelicht, breitgenabelt, mit fünf, an der Spitze entblößten Saamensteinen.

Waterland. Nordamerika. Ein ganzer, harter Dornstrauch, der auch als ein mittelmäßiger Baum vorkommt. Die Zweige sind weiß gefleckt, die Blätter herzförmig zugespitzt, drey, fünf bis sieben lappig, scharf gesägt, glatt, von der Größe des Birkenlaubes, stehen auf sehr zarten Stielen, die kürzer als die Blätter selbst sind. Die Blüten erscheinen in zusammengesetzten Schirmtrauben. An der Basis der Blütenstiele, stehen einzelne, pfriemensförmige, sehr kleine, hinfällige Deckblättchen. Die Blume ist etwas kleiner als bey unserm Hagedorn. Die Abschnitte der Blumendecke sind sehr kurz, stumpf, fallen mit der Reife der Früchte ab. Staubweege drey auch fünf. Die Frucht ist wirbelförmig, scharlachroth, von der Größe unsrer schwarzen Johannisbeere, breitgenabelt, enthält fünf an der Spitze entblößte Saamensteine. Die Saamen sehen an der Spitze heraus, daher der Trivial-Nahme dieser Art: phaenopyrum, von φαῖνω (appareo) und πυρὸς (granum) daher ist phoenopyrum, wie H. Ehrhard bemerkt, ganz unrichtig.

## §. 311.

Gatt. 27. Pyrus, Pirus. Sommergrünes Laubholz.

Staubfäden viele, sitzen um den innern Rand der Blumendecke und an derselben fest. Staubweege zwey, drey, vier, fünf, mit einfachen Narben. Fruchtknoten unter der Blume sitzend, erwächst zu einer Kernfrucht. Blumenkrone fünfblättrig. Blumendecke, einblättrig, fünfspaltig oder theilig, krönt, wann sie trocken geworden ist, die Frucht. Frucht, eine fleischige Kernfrucht, welche in zwey bis fünf ausgetaselten Fächern, in jedem derselben, einen oder auch mehrere, glatte Saamenkerne enthält.



## §. 312.

## A. Untergattung. Birnbaum.

a. Gemeiner Birnbaum. *P. communis*.

Die Blätter sind eckrund-lanzettförmig, glatt, länger zugespitzt als an den Apfelbäumen, auf der obern Fläche glänzend, am Rande mit Zähnen, die bald feiner, bald gröber sind, versehen. Sie stehen abwechselnd auf mehr oder weniger kurzen Stielen. Die untere Fläche ist blässer von Farbe, mit gröbern oder feinem Atern bezeichnet. Die Bäume wachsen pyramidenförmig, haben stärkere, gerade aufstehende Schüsse, mit hervorstehenden Augen. Die Rinde ist gelbbraunlich und bekommt im Alter tiefe Risse. Die Blüte ist kleiner als an den Apfelbäumen und erscheint etwas früher, in Sträußern. Die Abschnitte der Blumendecke sind blätterartig, spitzzulaufend, wollig, die Kronenblätter hohl, auswärts gekrümmt, Staubfäden zwanzig und mehrere. Die Staubbeutel nierenförmig, der Länge nach gefurcht. Staubwege fünf. Die Frucht ist saftig, spitzt sich gegen ihren Stiel, der dicker, länger und härter als an den Äpfeln ist, zu. Ihr Fleisch ist meistens voll kleiner Steinchen, davon ein Theil unmittelbar unter der Haut sitzt, wodurch die Birnen von aussen ein rauhes Ansehen erhalten und sich scharf anfühlen. Inwendig findet man fünf Fächer, welche um die Achse der Frucht in einen Kreis gestellt sind. Sie sind mit einer zarten, leicht zu zerreisenden Haut ausgefäset. Schneidet man die reife Frucht in der Queere entzwey: so bilden diese Fächer ein Fünfeck. Bisweilen findet man auch vier Fächer. Jedes Fach enthält ein oder zwey glatte, thränenförmige Kerne, welche aus zwey unförmlichen Halbkugeln bestehen, und mit einer braunen, glänzenden Haut bekleidet sind.

§. 313.

aa) Wilde Birnbäume. *P. sylvestres*.Art. 72. Holzbirnbaum. *P. Pyrastr.*

*Synon.* *Pyrus communis*, Pollich palat. II. 41. *Pyrus communis* Pyrastr Mönch. hass. I. 250. *Pyrus sylvestris*, C. Bauh. Pin. 439. Pyrastr. Dalech. Hist. 304. *Pyrus foliis ovato-lanceolatis, ferratis, glabris*. Hall. hist. n. 1096. Le poirier sauvage. The wild Pear-tree. Wilder Birnbaum, Knotelbaum, Feldbirnbaum, Sau-birnbaum, Geißbohlenbaum, Krutschbaum, de Hol-tifbeerbom.

v. Burgsdorf 194. Borkhausen 170. Märter 87. Gleditsch II. 71. n. 52. Becker 49. Sudow 326. Scopoli carn., I. 348. Linn. Sp. pl. ed. 3. T. I. 686. \*) Du Roi. II. 207.

Abbild. Cramer t. XIX. B.

Mit eyrund-lanzettförmigen, gesägten Blättern. Blütenstand ansehnliche Sträucher. Dornen an den Aesten und Zweigen.

Eine einheimische, harte Holzart. Man findet diesen Baum von verschiedener Größe, an Weegen, auf Feldern, in Vorhölzern in verschiedenem Grunde. Das Alter seiner Vollkommenheit erreicht er mit hundert Jahren. Sein Wachsthum ist langsam, auch liebt er einen freyen Stand. Die Wurzel geht zwey Fuß tief und breitet sich vier Fuß weit aus. Die Stammrinde ist schwärzlichgrau, rauh, aufgesprungen. Die Blätter brechen zu Ende des Mayes aus, fallen in der Mitte des Octobers ab, sind eyrund-lanzettförmig, (manche an der Spitze abgerundet) am Rande mehr oder weniger merklich gesägt, anfangs weich und mit einer feinen Wolle besetzt, hernach steif, hart, glatt, oben glänzend dunkelgrün, auf der untern Fläche gemeiniglich etwas wollig. Sie hängen an langen, röthlichen, dünnen, oben gefurchten Stielen, an deren Basis sich zwey Nebenblättchen finden, welche fast borstenförmig sind, etwas herab. Die Blüten erscheinen im May in großen Sträußern, auf langen, dünnen, leicht-

leichtbehaarten Stielen, welche hinfällige Deckblättchen haben. Die B. Krone hat fünf milchweise oder weisröthliche Blätter. Die Staubfäden sind purpurroth, die Narbe ist wollig. Die Früchte reifen in der Mitte und gegen das Ende des Sept. Sie erscheinen in überaus großer Menge, selbst an drey, vier, sechs bis achtjährigen Zweigen, sind von einem herben Geschmack und verschiedener Größe. Die Kerne gehen nach acht Monaten mit zwey ovalen, hellgrünen Saamenblättchen auf.

Die Früchte geben einen ganz guten Most, sie dienen Schweinen zur Mast, und dem Roth- und Schwarz-Wildpret zur Nahrung. Man kann Essig und auch Brandwein daraus bereiten. Wenn sie auf dem Lager teig geworden sind, sind sie eine Speise des Landmannes. Das Holz wird zur Verfertigung verschiedener Werkzeuge, Drucker- und Zuckerbeckerformen genommen, und von Holzschneydern, Bignettenstechern und Drehern gesucht. Es läßt sich schön schwarz beizen, so daß es dem Ebenholze sodann ähnlich ist. Man nimmt es zu Radkämmen und Rakettenstöcken. Im Unterholze duldet man den wilden Birnbaum gerne, weil er gutes Brennholz giebt.

§. 314.

Art. 73. Weisblättriger Holzbirnbaum, *P. nivalis* Jacquini.

Wächst im Oestreichischen wild. H. v. Mngind hat ihn zuerst beobachtet, und H. v. Jacquin in seiner f. austr. beschrieben, und abgebildet. Die Blätter sind stumpfer, dicker, weicher, kürzer gestielt, unten wollig, oben mit weissen Haaren besetzt. Die Blumen sind ansehnlich, haben einen starken Geruch, den sie behalten, wenn auch die Kronenblätter schon abgefallen sind. Die Früchte sind größer, grünlich, mit einem matten Purpur vermischt, werden aber, wie jene, erst auf dem Lager eßbar.

bb. Zahmer B. B. P. c. domestica gehört in eine Pomona, und bleibt also weg.

§ 5

§. 315.



## §. 315.

## b. Vogelbeerbaum. P. Sorbus.

Die Blumendecke ist fünfstheilig. Die fünf weissen Kronenblätter sind der Blumendecke eingefügt. Staubwege, drey, vier, fünf. Die Frucht ist eine fleischige Beere, von verschiedener Gestalt und Gröſe, auf dem Wirbel mit einem Nabel versehen; enthält in ausgetäfelten Fächern, deren so viele als Staubwege sind, glatte, einzeln liegende Samenkerne. Bis jetzt sind drey Arten davon bekannt.

## §. 316.

## Art. 74. Wilder Vogelbeerbaum, P. S. silvestris.

Synon. Sorbus aucuparia Linn. sp. pl. ed. 3. T. I. 683. Sorbus silvestris Mathioli. Sorbus foliis domesticæ similis. C. Bauh. pin. 415. Sorbus torminalis Blackw. Aucuparia Rivini. Rupp. jen. I. 126. Sorbus foliis pinnatis glabris, fructu glabro ineduli. Hall. Gott. 350. Sorbus foliis pinnatis glabris, fructu minimo. Hall. enum. 350. Mespilus foliis pinnatis utrinque glabris. Hall. hist. n. 1091. Mespilus aucuparia Scop. carn. ed. 2. n. 593. Pyrus aucuparia. Ehrhard. Batr. VI. 94. Le Sorbier des Oiseleurs. The Quicken tree. Hanb. I. 184. Eibschbeerbaum, Ebrisbaum, Eibschbeerbaum, Eibischbeerbaum, Eibschbeerbaum, Abreschenbaum, Ebreschenbaum, Evereschenbaum, Eberaschenbaum, Ewischbaum, Eschrösel, Hansreschbaum, Aressel, Gärmischbaum, Quickenbaum, Quitsche, Quitschern, Quitschbeerbaum, Quizbeerbaum, Pillbeerbaum, Philbeerleinbaum, Qualster, wilder Sorbenbaum, wilder Sperberbeerbaum, Maßbeerbaum, Linbaum, Wilaisch, Faulesche.

v. Burgsdorf 198. Borkhausen 181. Guckow 320. Pollich palat. II. 35. Mönch. hass. I. 247. Scopoli carn. I. 346. Sleditsch II. 125. Märter 40. Becker 55. Ehrhard I. 140, VI. 94. Germershausen IV. 239. V. 274. Du Roi II. 420. Du Hamel II. 210. Bucholz Briefe I. 9. Defon. Nachrichten VII. 846. Dörrien 273. Forst-Magazin VIII. 221.

Abbild. Lob. icon. Vol. II. 107. Cam. epit. 161. Camer. Kreutt. 88. b. Bauh. com. 215. Tab. hist. ed. 1687. p. 1426. Bauh. hist. Vol. I. S. 1. p. 62. Blackwell herb. t. 173. Graemer t. 18. Delhasen II. 43. Kerner II. 288.

§. 317.

Mit ungleich gefiederten Blättern, wolligen Blättchen und Zweigen.

Ein ansehnlicher Baum, der auf Steinflippen und altem Gemäuer oft als ein Strauch erscheint. Sein Wachsthum ist schnell, und mit vierzig Jahren tritt er in das Alter seiner Vollkommenheit. Die Wurzel breitet sich gegen vier Fuß weit aus, und die Pfahlwurzel geht, wenn es der Boden erlaubt, ziemlich tief. Die Rinde ist aschgrau, an jungen Stämmen glatt, an alten aber rissig. Der ganze Baum ist sehr saftreich, weswegen er den späten Hieb und Schnitt im Frühling nicht vertragen kann. Die Blätter sind ungleich gefiedert, stehen abwechselnd an den Zweigen und haben an der Basis ihrer Stiele gefärbte, hinfällige Nebenblättchen. Die Blättchen (neun, eils, dreyzehn) sind klein, lanzettförmig, sehr fein, tief, und spizig gezahnt, stiellos, auf beyden Flächen glatt, unten blasgrün, in der Jugend fein behaart, wann sie aber älter werden, ist es blos die untre, erhabne, röthliche Ader. Die mittlern Blättchen sind die längsten. Das an der Spitze stehende ist das kleinste. Zerrieben haben sie einen widerlichen Geruch. Die starkriechenden Blüten erscheinen in der Mitte des Mayes in großen, gewölbten Schirmen an den Spitzen der Aeste. Jedes Blüthen ist durch einen besondern Stiel an den gemeinschaftlichen Stiel befestigt, und Stiel und Stielgen behaart. Die Blumendecke ist sanft behaart. Die Kronenblätter sind rundlich stumpf, weiß, aussen gewölbt, und an die Blumendecke befestigt. Staubweege, drey, vier, mit folbigen Narben. Staubfäden, zwanzig. Staubbeutel, rund, grüngelb. Die Frucht ist eine kleine, walzenförmige, auf dem Wirbel genabelte, gelbrothe Kernfrucht.

frucht. Der Fächer sind so viele als Staubweege. Sie sind mit lederartigen Häuten ausgefäelt, und jedes Fach enthält in vollkommenen (nicht abortirenden) Früchten, zwey längliche, hellbraune Saamenkerne. Die Früchte reifen im August und September.

Ab. a) Mit gelbgestreiften Blättern.

§. 318.

Dieser Baum schickt sich gut in Schlaghölzer: denn er schlägt am Stock leicht aus, das Oberholz verdammt nichts, und das Schlagholz giebt gutes Brenn- und Kohlholz. Jenes giebt beim Feuern eine starke Wärme, dauerhafte Kohlen und macht keinen unangenehmen Rauch. Unter den Alleebäumen verdient dieser Baum einen vorzüglichen Rang, wegen seines schnellen, regelmäßigen Wachses, seiner schönen und wohlriechenden Blüten, weil er sein Laub, welches auch von Nachtfrosten nicht leidet, zeitig treibt, und weil er eine sehr schöne Krone hat. Die Rinde ist bitter, balsamisch, zusammenziehend, man kann ein ziemlich starkes Wasser davon abziehen, und manche substituiren sie der Tamarisken-Rinde. Zu Hopfenbäumen empfehlen sich die Vogelbeerbäume vor manchen andern und in Gerbereyen verdiente seine Rinde mehr benutzt zu werden.

Von den Beeren macht man mancherley Gebrauch. Sie dienen den Vogelstellern beim Fang der Krammets- und anderer großen Waldvögel. Auch anderm Federwild sind sie eine Vogelweide. Man kann einen sehr guten Brandewein daraus bereiten. Nach Gunner bedienen sich ihrer die norweger Goldschmiede, das alte Silber damit aufzulösen und ihm einen neuen Glanz zu verschaffen. Viele Landwirthe mengen sie unter das Futter der Kühe und Schaaf, welches diesem Vieh wohl bekommt. Man kann die Puterhähne damit mästen, wovon sie bald und sehr fett werden. Schweine fressen sie am liebsten, wenn man sie erst mit Wasser vermischt und in die saure Gähr-  
 rung



rung bringt, sodann Rüben, Kleyen oder Kartoffel hinzusetzt. Für die Hühner werden sie getrocknet, wornach man sie, bevor sie gefüttert werden, in Wasser aufquellen läßt. Schaafe und Ziegen fressen sie so gerne frisch als getrocknet, und mit den Rüben verhält es sich eben so, wenn man sie nur unter den Hechfel mengt. Besser ist es aber, sie zu dieser Absicht zu trocknen, und dann unter den für das Melkvieh eingesäuerten Kohl und das andere grüne Futter zu mischen. Hat man Kaninchenengärten; so kann man die Kaninchen den ganzen Winter hindurch damit füttern. Auch Enten fressen sie gerne. Unreif taugen sie, so wie das Laub und die Rinde, zum Gerben.

Das Holz läßt sich gut poliren und lackiren. Man verfertigt daraus Schrauben, Pressen, Spindeln, Formen, Handgriffe, Einfassungen, Ackergeräth, Walzen, kleine Radkämme und Wöttgerswaare, Keltern, Hobel, Spiese und Gewehr-Schäfte, die besten Nägel für Mühlenträder, und aus den jungen Stangen macht man die besten Spazierstöcke. Zu dieser Absicht hackt man in junge, geradschäftige Stangen mit einem scharfen, schweren Messer im May oder Jun. durch die Rinde bis auf das Holz rund herum, entweder quer oder schräg, von der Erde an fünf Fuß hoch hinauf. Im folgenden Herbst oder Winter schneidet man den Stock ab, zieht über Feuer die Rinde ab. Ist er trocken; so wird er mit Scheidewasser gebeizt, über Feuer gebräunt und dann sogleich mit Leinöhl bestrichen. Will man ihn schwarz haben; so bestreicht man ihn mit der Silbersolution, sodann mit Leinöhl, und polirt ihn alsdann mit Trippel oder Schachtelhalm. *P. S. domestica*, zahmer Vogelbeerbaum gehört nicht in eine Dreyas, und bleibt also hier weg.

§. 319.

Art. 75. Halbgefiederter B. B. P. S. pinnatifida.

Synon. Sorbus hybrida Linn. Gunner norweg. n. 428. Retz prodrom. n. 541. Mönch 128. Crataegus fennica Kalm. Oexel. Pontopp. Pyrus pinnatifida. Ehrhard. IV. 95. Le Cormier de Lapponie. The semipinnated Service. Hanb. I. 85. Bastard-Sorbus, nordischer Vogelbeerbaum, Bastard-Spenerling.

Abbild. Oeder dan. Tab. 301. Linn. Plant. rar. horti Upsal. Fasc. I. T. VI.

§. 320.

Mit halbgefiederten oder auch nur mit tiefen Einschnitten versehenen Blättern, die auf der untern Fläche filzig sind.

Ein dauerhafter, sommergrüner Baum, der am Harz und in Thüringen wild gefunden wird, sonst aber vorzüglich in Schweden und Norwegen zu Hause ist. Er ist kein Bastard vom wilden oder zahmen Vogelbeerbaum, sondern wirklich eine eigne Art. Der Stamm wird zwanzig bis dreissig Fuß hoch. Die jungen Zweige sind weislich. Die Blätter sind halbgefiedert oder auch nur mit tiefen Einschnitten versehen, auf der untern Fläche filzig. Medicus erzog ihn aus Saamen. Schon nach vier Jahren brachte er Blüten, wodurch sich also der Irrthum widerlegt, als bringe er seine Blüten und Früchte sehr spät.

Suckow 321. Churpfälz. Bemerk. 1777. S. 74.

§. 321.

c. Hagédornbirnbaum, P. Crataegus.

Diese Untergattung begreift vier bis jetzt bekannte Arten. Staubfäden, funfzehn bis zwanzig. Staubweege, zwei, drei, fünf. Frucht auf dem Wirbel mit einem Nabel versehen. Sie hat so viele ausgetaselte Fächer, als Staubweege vorhanden waren. In jedem Fache liegt ein glatter Kern. Die Früchte sind, wenigstens im Anfang, mit feinen Haaren oder Wolle dünne besetzt.

§. 322.



## §. 322.

Art. 76. Elsbirnbaum, P. c. torminalis.

*Synon.* Sorbus torminalis. Camer. epit. 162. Bauh. comment. 215. Dodon. pempt. 803. Crantz austr. II. 45. Sorbus torminalis et Crataegus Theophrasti. Clus. hist. 9. Bauh. hist. I. 63. Sorbus torminalis Plinii, Lob. icon. II. 200. Mespilus apii folio silvestris non spinosa. Bauh. basil. 109. Crataegus folio laciniato. Tournef. instit. 633. Crataegus folio septangulo, subtus subhirsuto. Hall. enum. 354. Sorbus folio septangulo, subtus hirsuto. Hall. Gott. 110. Crataegus torminalis Linn. Spec. plant. T. I. 681, n. 3. Mespilus torminalis. Kerst. Wigg. primit. 38. Borkhausen 192. Mespilus foliis serratis, septilobis, lobis primis divergentibus. Hall. hist. n. 1588. Pyrus torminalis Ehrhard. Beitr. VI. 92. Crataegus folio laciniato, du Ham. n. 1. L'Alizier a feuilles decoupées. The Maple-leaved Service tree. Hanb. Elsebeerbaum, gemeiner rother Elsebeerbaum, Elze, Elsbeere, Egenbaum, Alsbeerbaum, Aelschebeerbaum, Aelebaum, Eble, Egele, Egelbaum, Elge, Egelebirn, Ehelein, Ehelinsbeere, Eischbirle, Eischbele, Eperling, Eperlinsbirlebaum, Arbeere, Arfirsche, Arögel, Arlsbeerbaum, Aelsbaum, Adlersbeere, Adlasbeerbaum, Atlasbeere, Atlasbaum, Darmbeere, Darmbeerhagedorn, Darmbaum, Darmbeerbaum, Gersch, Gerschebirlein, Gerschebaum, Hörnische, Hörliche, zahmer falscher Vogelbeerbaum, Huttelbeerbaum, Ellrige.

Sudow 315. v. Burgsdorf 189. Borkhausen 192. Mirster 108. Gernershausen V. 284. Gleditsch II. 147. Leonhardi 94. Pallas ross. I. I. 56. Mönch hass. I. 245. Pollich palat. II. 33. v. Münchhausen III. 516. Jacq. austr. V. 21. Ehrhard Beitr. VI. 92.

Abailo. Du Roi I. 187. Cramer t. 17. Lobel. ic. Vol. II. 200. Cam. epit. p. 162. Cam. Kreutz. 89. Bauh. comment. p. 215. Tab. hist. ed. 1687. p. 1427. Dodon. pempt. p. 803. Bauh. hist. Vol. I. f. 1. p. 63. Jacq. austr. Vol. V. t. 443. Berner I. t. 62.



§. 323.

Mit herzförmigen, in sieben seichte Einschnitte oder Lappen getheilten Blättern, welche gesägt und scharf zugespitzt sind, zwei bis dreiwegigen Blüten.

Ein einheimischer, sommergrüner, harter Baum, der eine verschiedene Höhe erreicht, indem man ihn von sechs- zehen, zwanzig bis sechzig Fuß reiner Schaffthöhe antrifft. (von letzterer Höhe stehen einige in Ziegenberg) Bald erscheint er auch als Strauch. Man findet ihn in fruchtbaren Laubhölzern und er kann achtzig bis hundert Jahre alt werden. Die Rinde ist an den jungen Trieben rothbraun, weiß punktirt, am Stamme graubräunlich und im Alter rissig. Die Wurzel breitet sich vier Fuß weit aus, treibt viele Lohden und geht ziemlich tief unter sich. Die schuppigen, runden Knospen sitzen abwechselnd. Die Blätter brechen zu Ende des Aprils aus, fallen zu Ende des Octobers ab, sind groß, herzförmig, in sieben seicht eingeschnittene Lappen, welche gesägt und scharf zugespitzt sind, und wovon die untern sperrig stehen, getheilt. Auf der obern Fläche sind sie glatt und glänzend, auf der untern wollig. Die Aeste sind unbewafnet, brüchig, stehen abwechselnd zerstreut, und sind mit einer braungelblichen Rinde bekleidet. Die Blattstiele sind kurz, wollig. Die Blüten erscheinen in großen, ästigen Büscheln, auf wolligen Stielen, an den Spitzen der Zweige zu Ausgang des Mayes. Staubweege zwei, auch drei. Die Frucht ist länglicht rund, braungelb, genabelt, fein weiß punktirt, etwas haarig, reift im September, bleibt ziemlich lang am Baume hängen, hat ein weißes, herbes Fleisch, und enthält in ausgetafelten Fächern zwei bis drei, fast dreieckige, den Birnkernen ähnliche Samen.

Ab. a) Mit runden gesägten, b) Mit runden seicht eingeschnittenen Blättern.

§. 324.

Wo die Elsbeerbäume in Menge vorhanden sind, werden sie mit dem andern Schlagholze abgetrieben und liefern

liefern ein gutes Brenn- und Kohlholz. Sonst verschont man sie bey dem Abtrieb, wegen des mannichfaltigen Nutzens, den ihr Stammholz gewährt, und um dessen willen sie häufiger angebaut zu werden verdienten. Die Früchte geben eine gute Mast. Man bedient sich ihrer auch zum Vogelfang, macht sie mit Zucker ein, bereitet Essig und Brandewein daraus. Die herbe und bittere Rinde verdiente in der Heilkunst und in Gerbereyen Versuche. Das Holz läßt sich sehr gut bearbeiten, und wirft sich weniger als irgend ein andres. Man verfertigt daraus mittlere und kleine Mühlwellen, Aerme, Kämme, Walzen, Spulen, Spindeln, gute Weberkämme, Schrauben, Pressen, mechanische Instrumente, Sehwagen &c. Müller, Dreher, Kunstischler, Mechaniker suchen das Holz eben so sehr als die Haus- und Ackerleute. Zum Formstechen ist es dem Birnbaumholze noch vorzuziehen; weil es sich leichter stechen läßt und selbst in die Queere, wenn nur die Werkzeuge fein sind, ohne sich zu spahnen. Von den jungen Zweigen können Flöten und Zwerge-Pfeifen gemacht werden. Nach Miller schlagen die auf Elzbeersträuchen gepfropften Birnreisser sehr gut fort. In Lustgärten verdient dieser Baum gleichfalls aufgenommen zu werden. Zu Alleen schickt er sich zwar nicht, weil er sein Laub zeitig abwirft, aber in diejenigen Quartiere der Parks, wo man durch seine Früchte noch spät im Herbst die Vögel hinlocken will. Er verlangt guten frischen Waldboden, in welchen man den Saamen gleich nach seiner Reife legt. Die Kultur ist wie bey der folgenden Art, aber die jungen Pflanzen bleiben lang klein, und können erst im zweyten Herbst in die Pflanzschule, ein Fuß von einander, versetzt werden.

S. 325.

Art. 77. Mehlsbirnbaum, P. c. Aria.

Synon. Alni effigie lanato folio major. C. B. pin.

450. Mespilus Alni lanato folio major. Herm. H. L. B.

M

424.

424. *Mespilus aria*. Scopoli carn, I. 345. *Crataegus folio subrotundo, ferrato, subtus incano*. Tourn. Instit. 633. *Crataegus alpina Alni folio incano*. Rupp. jen. 138. *Aria* Auf. hist. I. 9. Oederi dan. n. 301. *Sorbus alpina*. I. Bauh. hist. I. 65. *Crataegus aria* α) Linn. sp. pl. ed. 3. I. 681. *Pyrus aria* Ehrhard. Beitr. IV. 20. *Sorbus aria* Crantz austr. II. 46. *Mespilus foliis ovatis, ferratis subtus tomentosis*. α) Hall. hist. n. 1089. *Aria Theophrasti*. L'Alouche, Le Drouiller. The white-leaf Tree. Handb. Mehlbeerhagedorn, Mehlbaum, Melbaum, Meelbaum, Mälbaum, Mählbaum, Mehlbeerbaum, Weißlaub, Weißläuben, Arlaßbaum, Atlasbaum, Atlasbeerbaum, weiser Arlsbeerbaum, Orelbaum, Meerfirschenbaum, Eßlein, Eßbirlebaum, Ehelsbirlebaum, wilder Schierbaum, wilder Spierlingsbaum, Sperberbaum, Speyerlingsbaum, rother Mehlbaum.

Wärter 106. Borkhausen 185. v. Burgsdorf 191. Hüschfelds Gartental. 1785. 196. n. 10. Germershausen V. 77. 292. Suchow 316. Leonhardi 95. Gleditsch II. 147. Du Roi I. 190. Pollich palat. II. 91. Scopoli carn. I. 345. Mönch hall. I. 245. Dörrien 256.

Abbild. Oederi dan. t. 302. Crantz austr. Vol. II. p. 46. t. 2. f. 2.

### S. 326.

**Dornlos.** Mit euförmigen, doppeltgesägten, unten weißfilzigen Blättern; vielblütigen, flachen Schirmtrauben.

Ein einheimischer, sommergrüner, harter Baum, der in Vorhölzern und Gebirgen wild wächst, mit siebenzig und mehr Jahren das Alter seiner Vollkommenheit erreicht. Er wird ein ansehnlicher Baum. Die Rinde ist an den jungen Trieben röthlich wollig, am Stamme braun und glatt, mit weißen Flecken besprengt. Die Blätter stehen abwechselnd, einzeln oder in Büscheln, sind hart, rauh, steif, euförmig, haben stark hervortretende Zähne, die am Rande gesägt sind, sind auf der obern Fläche glatt, oder



oder doch nur wenig behaart, dunkelgrün, glänzend, auf der untern mit erhabenen Adern bezeichnet, filzig wie mit Mehl bestäubt, stehen auf kurzen, weisfilzigen Stielen. Die wohlriechenden Blüten erscheinen zu Ende des Mayes, an den Enden der Zweige in flachen, vielblütigen Schirmtrauben, auf weisfilzigen Stielen. Die Blumen- decke ist mit einem weissen Filz bedeckt. Der Fruchtknoten, eiförmig, weisfilzig, sitzt unter der Blumendecke. Kronenblätter fünf, rundlich, weislich, am Grunde etwas filzig. Staubfäden, funfzehn bis zwanzig. Staubbeutel, blasgelb, Staubweege, zwey, bisweilen drey, an der Basis filzig. Frucht, anfangs grün, mit einer feinen Wolle besetzt, bey ihrer Reife im Spätherbst schön roth, enthält in ihrem gelben Fleische so viele lederartig ausgetäfelte Fächer, als Staubweege waren. Saamenkerne, zwey bis drey, haben eine harte braune Schale, liegen ein Jahr.

Das Holz dieses Baumes kann zu den besten Maschinen genommen werden. Er verträgt das Beschneiden wohl, nimmt mit einem mittelmässigen Boden vorlieb, behält sein Laub lange und schickt sich zu Alleen, die man nicht zu hoch und zu schattig haben will. Wegen seiner Früchte gehört er unter die Mastbäume: denn von Menschen werden sie selten genossen und müssen dann auch erst auf dem Lager teig werden. In der Schweiz nehmen sie nach Haller die Brandweinbrenner, auch kann man sie einmachen. Das zu Ende des Herbstes sammt seinem Laube gesammelte, wohlgetrocknete Reissig wird mit schicklichen Zusätzen gebraucht, Wollen-Zeug Beaver - schwarz zu färben. Die aus dem Holze gebrannten Kohlen geben eine starke, gleiche und anhaltende Hitze, aber es wäre nicht wirthschaftlich gehandelt, ein so gesuchtes Werk- und Nutzholz zum verkohlen zu bestimmen. Man verarbeitet das Stammholz zu Wellbäumen, Radkämmen, Rädern, Pressen, Walzen, Radzähnen, Weberspuhlen, Hobeln, Kämmen, Wagenachsen, Handgriffen, zu den schönsten

Spindeln, allerley Werkzeugen, sogar zu Flöten, so daß man alle Ursache hat, eine von Drehern, Tischlern, Bildhauern, Mechanikern, Wagnern, und andern Holzarbeitern so sehr geschätzte Holzart, mehr anzubauen, und in den Forsten zu Werk- und Nußholz überzuhalten. Die Anzucht geschieht aus dem Saamen, dessen Keimen man in Saamenschulen, durch öfteres begießen zu Hülfe kommt, weil er sonst ein ganzes Jahr liegt. Die Versetzzeit ist der Herbst. Er liebt eine kalte, freye Lage und nimmt mit einem mittelmäßigen Boden vorlieb.

Subsp. a) Mit eingeschnittnen, fast gefiederten Blättern.  
H. Borkhausen fand sie im Odenwald.

§. 327.

Art. 78. Azerolbirnbaum, P. c. Azarolus.

Synon. Pyrus Azarolus. Scopoli. carn. I. 347. Borkhausen 187. Crataegus Azarolus Linn. Sp. pl. ed. 3. I. 683. n. 9. Pallas ross. I. I. 63. Miller. n. 7. Mawe. n. 4. Mespilus du Ham. n. 13. L'Azerolier de Provence. The great Azarole. Azerolbaum, Azarole, Azerol-Hagedorn, Azerol-Mispel, Azarol-Äpfelbaum.

Suckow 319. Borkhausen 187. Lüber II. 555. v. Wilke monatliche Anleitung zur Beförderung einer ergiebigen Erziehung des Obstes. Halle 1787. S. 597. Mayer P. f. II. 54. 55. n. 1. 2.

Abbild. Mayer Pomona francon. t. V. VI.

§. 328.

Mit eysförmigen, etwas gezahnten, undeutlich in drey Lappen getheilten Blättern.

Wächst in Süd-Deutschland im Herzogthum Crain wild, und erscheint als ein Strauch oder Baum dritter Größe. Die Blätter stehen abwechselnd in Büscheln oder einzeln, sind stumpf eysförmig, undeutlich in drey Lappen getheilt, von denen der mittlere bey den meisten zwey seichte Einschnitte hat. Der Rand ist gesägt und  
die

die Sägezähne sind wiederum mit kleinern Zähnen besetzt. Die Stammrinde ist aschgrau und rissig, die Blüten erscheinen an den Enden der Zweige in gewölbten Schirmen im May, auf ästigen wolligen Stielen, an deren Basis sich ein hinfälliges Deckblättchen findet. Die Kronenblätter sind groß, weiß, der Staubweege zwey bis drey. Die Blumendecke ist mit einer feinen Wolle bekleidet. Sie findet sich auch bey den Früchten, aber nur im Anfang. Bey der Reife sind sie schön roth, rundlich, noch einmahl so groß als die Früchte des Hagedorns, von einem säuerlichen Geschmack und enthalten zwey bis drey lederartig ausgetaselte Saamensächer. Die Früchte werden sowohl roh gegessen, als eingemacht. Das Holz ist fest und zu Dreher- und Tischler-Arbeit brauchbar. Im beschützten Stande und warmen Jahren bringt er auch im nördlichen Deutschland reifen Saamen. Seine Vermehrung geschieht sowohl durch Saamen als pfsprossen auf Holzbirnstämmchen.

## §. 329.

a) Razerolbirnbaum, *P. Pollwilleriana*. Bauh.

Art. 79. Razerolbirnbaum, *P. Pollwilleriana*.

*Synon.* *Pyrus Pollueria*. Linn. Mantiss. 244. *Pyrus irregularis* Münch. III. 246. *Azerol*. Ramelt. Abhand. III. 236. *L'Azerolier* poirier. *The Azerole Pear - tree*. Mispelbirne, Hahnbuttenbirne.

Borkhausen 172. Sudow 330. J. Bauh. hist. I. 59. Du Roi II. 216. Mayer Pomona franc. II. 56, n. 5. Knoop. Pomologia. II. 38.

Abbild. Mayer t. IX. Knoop. t. IV.

## §. 330.

Mit großen, eyrunden, unten weißwolligen, am Rande scharf und unordentlich gesägten Blättern, Blüten in Austersträußern.

Diese Art verbindet die Hagedorn- und Mispelbirne mit einander und macht gleichsam den Uebergang.



Er ist ein einheimischer, sommergrüner, sehr dauerhafter Baum der zweiten oder dritten Größe. Als ersterer bringt er keine oder doch nur selten Früchte, weil er niedrig gehalten werden muß, wenn er sie tragen soll. Die Blätter stehen abwechselnd in Büscheln an weißwolligen Stielen, sind groß, eysförmig, scharf und unordentlich gesägt, unten weißwollig, oben glatt und nur in der Jugend haben sie einen dünnen, weißlichen Ueberzug. Die Blüten erscheinen in Astersträußern auf wolligen Stielen. Die Blumendecke ist sehr wollig, die Deckblättchen sind fast borstenförmig und sehr hinfällig, die Früchte klein, eyrund - länglich, rothgelb, reifen im Sept. enthalten ein gelbes mehliges Fleisch, das voll kleiner Steinchen ist.

J. Bauhin nannte diesen Baum zu Ehren des Herrn Polliviller, Pollwilleriana. Pollueria, wie es Linné umänderte, ist bey weiten keine so gute und schickliche Benennung.

### §. 331.

c) Mispelbirne, P. Mespilus.

Art. 80. Traubenbirne, P. M. Botryapium.

*Synon.* Pyrus Botryapium. Ehrh. Beitr. I. 183. Linn. Suppl. 225. Mespilus canadensis Linn. syst. veg. ed. 13. p. 388. Spec. plant. ed. 2. 685. Miller n. 6. Du Roi I. 416. Mawe. 6. Mespilus n. 9. Du Ham. Mespilus inermis, foliis subtus glabris, obverse ovatis. Gron. virg. 54. The snowy Canada Medlar, Canada Medlar. Canadische Birne, Canadischer Mispelbaum.

Sudow 324. Ehrhard I. 183. II. 68. Münch. 88. von Wangenheim 90. Hirschfelds Gartenkal. 1783. 190.

### §. 332.

Dornlos. Mit eyrund - länglichen, zugespitzten, gesägten Blättern, einfachen, langen Blüentrauben.

Waterland. Virginien und Canada. Ein dauerhafter, sommergrüner Strauch, der auch bey uns guten Saamen bringt. Die Blätter sind eyrund - länglicht, zugespitzt, fein gesägt, auf der obern Fläche glatt, glänzend,

zend, dunkelgrün, auf der untern blasgrün ins weisliche fallend, mit kurzen, feinen, kaum bemerkbaren Haaren besetzt. Wenn sie ausbrechen und ehe sie völlig ausgewachsen sind, ist die untere Fläche sehr haarig und zu der Zeit sehen sie silberfarbig aus, so daß dieser Strauch, wenn sie sich eben entfalten, ganz anders aussieht, als wenn sie völlig ausgewachsen sind. Sie stehen zu drey bis vier besammen auf langen, dünnen Stielen. Die Blüten erscheinen in einfachen, langen Trauben an den Spitzen der Zweige und zugleich mit den Blättern. Zehn und mehr Blüthen sitzen an der Traube auf filzigen Stielgen, die an der Basis ein hinfälliges, fadenförmiges, haariges Deckblättchen haben. Die Kronenblätter sind weis, strich = lanzetförmig, stumpf. Staubweege fünf. Die Frucht ist schwarzblau, von der Größe der schwarzen Johannisbeere, fünffächrig, saftig, von süß-säuerlichem angenehmen Geschmack, enthält acht bis zehn kleine, ovale, lange, steinartige Saamenkerne. Die Knospen gleichen den Knospen der Bitter-Pappel, ihre Schuppen sind innwendig haarig. Die Rinde ist glatt und von bräunlicher Farbe. Das Holz ist weis, zähe, sehr fest und zu mancherley Nutzgebrauch geschikt.

### §. 333.

Art. 81. Quantelbirne, P. M. Amelanchier.

Synon. *Vitis idaea*. III. Clus. hist. p. 75. *Alni effigie*, lanato folio minor. C. Bauh. pin. 452. *Pyrus*, foliis ovatis, subtus tomentosis calvescentibus. Hall. hist. n. 1095. *Mespilus Amelanchier* Linn. Spec. pl. ed. 3. T. I. 685. Suppl. ad syst. nat. 256. Miller n. 5. *Mespilus* n. 5. Du Ham. *Sorbus Amelanchier*. Crantz austr. II. 53. L'Amelanchier des bois. The Amelanchier. Hanb. I. 146. Quantelbeerstrauch, Glühbirnstrauch, Fliegenbeerstrauch, Mispelbirnstrauch, Amelanchier, Quandelbeerstrauch, schwarzer Heidelbeerstrauch, schwarzbeeri-ger Zwergmispelbaum.

Suckow 323. Dörrien 262. Pollich. palat. II. 38. Scopoli carn. I. 347. Borkhausen 180. Märter 147. Ehrhard I. 183. II. 68. III. 61. Läder II. 567. Du Roi II. 219.

**Dornlos.** Mit ovalen, gesägten Blättern, pfriemenförmigen, hinfälligen Nebenblättchen; einfachen, wenigblütigen Trauben.

Waterland. Schweiz, Deutschland, Frankreich. Ein schöner sommergrüner, sechs, zehn, zwölf Fuß hoher Strauch, der auf steilen Felsen an der Südseite wächst. Die Rinde ist glatt, bräunlich-grau, im Alter rissig, an den vorjährigen Trieben mit einem weissen Oberhäutgen bekleidet. Die Blätter sind oval, kaum einen Zoll lang, fein gesägt, in der Jugend unten sehr wollig, hernach glatt, stehen abwechselnd auf gefurchten Stielen, die beim Ausbruch des Laubes gleichfalls filzig sind. Die Nebenblättchen stehen den Blattstielen angedrückt, sind röthlich, hinfällig, pfriemenförmig. Die Blüten erscheinen an den Enden der Zweige zu vier bis fünf in einer Traube. Die Blütenstiele sind in der Jugend filzig, haben an der Basis hinfällige, fadenförmige, filzige Deckblättchen. Die Blumendecke ist filzig, die Krone ausgebreitet, etwas länger als jene, ihre Blätter sind weis, strich-lanzetförmig, abgestumpft. Staubweege, fünf. Frucht, anfangs grün, hernach roth, gegen das Ende des Jul. schwarzbraun, von der GröÙe der rothen Johannisbeere, mit einem wolligen Nabel, saftig, esbar, süß, enthalten in jedem Fache, deren fünf sind, zwey braune Saamen. Doch abortiren mehrere, in denen man nur fünf bis acht Saamen findet.

§. 334.

Art. 82. Büschelbirne. P. m. arbutifolia.

Synon. Mespilus canadensis. Münchh. V. 203. Pyrus arbutifolia Linn. Suppl. 256. Ehrhard I. 184. Mespilus arbutifolia Linn. Syst. veg. ed. 13. S. 388. Miller. n. 10. Du Roi I. 418. Crataegus virginiana, foliis arbuti. du



du Ham. n. 6. Le Poirier a feuilles d'Abroussier. Arbutus-leaved Medlar. Hanb. I. 146. The Virginia Medlar. Wangenh. 89. Erdbeerbaumblättrige Mispel, nordamerikanischer Birnstrauch mit Erdbeerbaumblättern.

Suckow 331. Ehrhard I. 135. 140. 184. II. 68. v. Wangenheim 89. Hirschfelds Gartenkal. 1783. 190. n. 6.

§. 335.

Dornlos. Mit ey-lanzetförmigen, sehr fein gesägten Blättern, deren obere Mittelribbe mit Drüsen besetzt ist: zusammengesetzte Schirmtrauben.

Waterland. Virginien. Der Strauch bleibt niedrig und ist unbewafnet. Die Blätter sind ey-lanzetförmig, sehr fein gesägt. Die obere Fläche hat eine mit gelbröthlichen Drüsen besetzte Mittelribbe, und bekommt im Sept. eine rothe, die untere wollige Fläche aber, eine gelbe Farbe. Die Sägezähne sind gegen die Spitze zu mit knorpeligen Drüsen besetzt, die Nebenblättchen, pfriemenförmig, dem Blattstiele anliegend. Die Blüten erscheinen zu sechs bis zwölf in zusammengesetzten, filzigen Schirmtrauben. Sie erscheinen an den Spitzen der Zweige, wenn das Laub bereits völlig ausgewachsen ist und haben einen angenehmen Geruch. Die Deckblättchen sind hinfällig, pfriemenförmig, die Kronenblätter weisröthlich, die Staubbeutel roth. Staubweege fünf. Die Frucht ist fünffächrig, fast kugelförmig, und enthält, wenn sie vollkommen ist, in jedem Fache zwey braune, längliche Samen. Wegen der schönen Blüten und des sonderbaren Laubes schickt sich dieser Strauch sehr gut für Lustpflanzungen. Das Holz kann wegen seiner Schwäche nur zu Bändern und kleiner Dreherarbeit genutzt werden.

Subsp. a) Rothe B. B. P. m. rubra. Die Blätter sind kleiner, mehr filzig als bey b. Die Früchte roth, von der Größe unsrer rothen Johannisbeere. b) Schwarze B. B. P. m. a. nigra. Die Blätter sind größer, weniger filzig, die Frucht ist größer, schwarz, von der Größe der Mehlbirne.

## §. 336.

Art. 83. Mispelbirne, P. m. Chamaemespilus.

*Synon.* Cotoneaster forte Gesneri. Clus. hist. I. 62. Cotoneaster folio oblongo, serrato. C. Bauh. pin. 452. Chamaemespilus. J. Bauh. hist. I. 72. Mespilus Chamaemespilus. Linn. Spec. pl. ed. 2. 685. Crataegus Chamaemespilus. Jacq. vind. 243. austr. III. 17. Sorbus Chamaemespilus. Crantz austr. II. 40. Mespilus, foliis ovatis serratis, glabris. Hall. hist. n. 1090. Pyrus Chamaemespilus. Ehrh. Beytr. IV. 19. Le Nefflier des Alpes. The bastard Quince. Hanb. Zwerg-Mispel, Bastardquitte.

Suckow 324. Ehrhard IV. 19. Mönch. 59. Hirschfelds Gartental. 1785. 195. n. 9.

Abbild. Jacq. Austr. III. t. 231. Crantz austr. II. t. 1. f. 3.

**Dornlos.** Mit länglicht-eyrunden, glatten, einfach gesägten Blättern; kopfförmigen Schirmtrauben.

Ein sommergrüner Strauch, der auf den Oestreichischen Alpen wächst und sehr niedrig bleibt. Die Blätter sind länglicht-eyrund, glatt, unten auch wohl weisswollig, einfach gesägt, gelbgrünlich, ziemlich langgestielt. Die Rinde der Zweige ist purpurrothlich. Die Blüten erscheinen aus den Achseln der Blätter, in kopfförmigen Schirmtrauben, die Kronenblätter sind purpurroth, die Deckblättchen der Blütenstielchen schmahl und purpurrothlich. Die Frucht ist rundlich, klein, schwarz, mit einer weissen Wolle bedeckt, essbar, fünffährig und enthält einen bis fünf Saamen.

## §. 337.

## B. Untergattung. Apfelbaum.

Der Apfelbaum unterscheidet sich von dem Birnbaume in mehreren Stücken, hat aber auch viele Eigenschaften mit ihm gemein. Die Blätter haben eine kürzere Spitze, sind flacher gezahnt, auf der obern Fläche uneben,  
auf

auf der untern fein wollig und stehen abwechselnd. Die Aeste stehen mehr sperrhaft und bilden eine glattgedrückte Kugel. Die Knospen sind rund und rauh. Die Rinde ist schwärzlich und erhält sich auch bey alten Bäumen ziemlich glatt. Das Holz ist spröder und gemasert. Die Blüten erscheinen etwas später, auf kürzern Stielen in Dolden. Die Abschnitte der Blumendecke sind auswärts gekrümmt, schmahl, sehr dick, wollig. Die Kronenblätter sind ausgehöhlt, weiß, mehr oder weniger roth gestreift. Die Früchte sind weniger zugespitzt, mehr rund. Der Stiel derselben ist kürzer, dünne, biegsamer, und geht immer gerade mitten aus der Frucht. Das Kernhaus besteht aus fünf, selten aus vier Fächern, die mit einer dünnen, festen, durchsichtigen Pergamenthaut ausgefäset sind. Jedes Fach enthält einen oder zwey Samenkerne.

## §. 338.

Art. 84. Holzapfelbaum, *P. Malus silvestris*.

*Synon.* *Malus silvestris* f. *foliis angustis*. Razi. hist. 1448. *Pyrus foliis ovatis acuminatis, subtus hirsutis, petiolis frugigeris brevissimis*. Hall. hist. n. 1097. *Malus silvestris foliis ferratis caule arboreo*. Mill. n. 1. The Crab-tree. Wilding or Crap Apple. Mawe. Hölzge, Hötche, wilder Apfelbaum, Waldapfelbaum, Sauapfelbaum, Hermeltingbaum, Holzstöcklingbaum, Holzströmlingbaum, Wildling, Buschapfel.

Sudow 331. Borkhausen 173. Becker '48. Märter 84. von Burgsdorf 196. Gleditsch II. 68. Hirschfelds Fruchtbaumzucht. I. 173. Linn. sp. pl. ed. 3. I. 686. Moench. hass. 250. Pollich palat. II. 42. Scopoli. carn. I. 348. Leonhardi 92. Du Roi II. 226. Sieffert I. 107.

Abbild. Cramer t. 19.

## §. 339.



S. 339.

Mit Dornen an den Aesten und Zweigen, gesägten Blättern, stiellosen Blütenschirmen, behaarten Blütenstielen, aussen glatter, innwendig wolliger Blumendecke, rundlicher glatter Frucht.

Ein ansehnlicher, einheimischer, dauerhafter Fruchtbaum, dessen natürlicher Stand, niedrige, schattige, mit einer fruchtbaren Erde versehene Holzungen sind. Aeste und Zweige sind mit Dornen besetzt. Die Blätter sind eiförmig zugespitzt, flach gesägt, oben hellgrün, glänzend, unten bleicher und etwas behaart. Die Blattstiele sind röthlich, oben gefurcht, leicht behaart, haben an ihrer Basis hinfällige, borstenförmige, röthliche Nebenblättchen. Die wohlriechenden Blüten erscheinen im May, in stiellosen, vielblütigen Schirmen an den Spitzen der jungen Zweige. Die Kronenblätter sind weisröthlich, oben mit rothen Adern gegittert, die Blütenstielen röthlich behaart, die Blumendecke auswendig glatt, innwendig behaart. Staubfäden neunzehn bis fünf und zwanzig. Die Frucht ist klein, glatt, rundlich, am Stiele etwas grubig, auf dem obern Ende abgeplattet, hat ein herbes, saures, weisses Fleisch. Die Rinde ist an alten Stämmen schwärzlich, etwas rissig, an den jungen Zweigen grau und glatt.

Die Früchte sind eine Wildäpfel, daher man den Baum in Wildbahnen gerne duldet. Manche füttern sie auch dem zahmen Vieh. Beym Eidermachen, werden sie bisweilen unter die Gartenäpfel gemischt. Man preßt auch einen Saft daraus, der in Frankreich unter dem Namen: Picasse, Piquette bekannt ist, und an die gekochten Fische gethan wird. Die frischen und durren Holzäpfel geben auch ein kühlendes Getränk für das Gesinde und die Arbeitsleute, dessen Bereitung H. Jung angiebt \*).

Aus

\*) Jungs Versuch eines Lehrbuchs der Landwirthschaft. S. 428. S. 1185.

Aus den Blüten sammeln die Bienen vielen Honigstoff. Die innre Rinde giebt mit Alaun gesotten, eine schöne gelbe Farbe. Stamm- und Wurzelholz werden von Mül- lern, Tischlern und Drehern gesucht. Man verfertigt daraus Hobel, Schlittkufen, Radkämme, und die Ab- gänge geben ein gutes Brenn- und Kohlholz.

## §. 340.

Subsp. a) Heckenapfel, *P. M. frutescens*.

*Synon.* Le Doucin, Pomier de Doucin, Fichet. Splittapfel, Splittche.

v. Müchhausen V. 247. Hirschfeld I. 174. Henne 92. Borkhausen 175. Sudow 335.

## Strauchartig.

Wächst hin und wieder in den Feldhecken und unter- scheidet sich bloß durch seine starken Wurzeltriebe. Er wächst, sich selbst überlassen, zu einen dicken Busch, kann aber auch zu einen sehr hohen Stamm erzogen werden, treibt aber beständig neue Schüsse an der Wurzel, und dem Stamme, durch die seine Vermehrung geschieht. Er soll besonders gut seyn, Buschbäume darauf zu pflanzen. Manche haben ihn für eine Abart der folgenden Art gehalten, welches er aber nicht ist.

## §. 341.

Art. 85. Johannisapfel, *P. M. praecox*.

*Synon.* *Malus paradisiaca*. Linn. sp. pl. ed. 3. I. 686. n. 2. *Malus pumila*, quae potius frutex quam arbor. C. Bauh. pin. 433. *Pyrus praecox*. Pallas ross. I. I. 51. Borkh. 175. *Pyrus caule humili fruticoso*. Gleditsch ver- mischte Abhandl. III. 26. *Malus pumila* Mill. n. 3. du Ham. n. 8. Le Pomier de St. Jean. The dwarf Apple. Süßer wilder Apfel, Zwergapfelbaum, Apfelstrauch, Kirschenapfel.

Sudow 3. 35. Borkhausen 175.

## §. 342.

Strauchartig. Blätter eyrund, gesägt, oben dünne, unten dicht behaart. Blütenschirme stiellos. Blumendecke starkwollig.

Er ist mehr ein Strauch als ein Baum, bleibt niedrig und treibt viele Schüsse. Seine Triebe sind besonders zart und fein. Die Früchte reifen schon um Johannis, sind klein, gelblich, von einem süßen, angenehmen Geschmack. Die Blätter sind eyrund, gesägt, stumpfer und haariger als am Holzapfelbaum, besonders auf der untern Fläche. Die kleinen Blüten stehen zu drey bis sechs in stiellosen Schirmen und haben wollige Blumendecken. Er läßt sich durch abgeschnittne Zweige und Ableger leicht vermehren, da er aus seinen Wurzeln neue Lohden in Menge treibt. Man benutzt ihn, um solche Aepfelsorten darauf zu veredeln, die man niedrig ziehen will. Er scheint ein Abstammeling wärmerer Länder zu seyn, verträgt zwar unser Klima bey einer mäßigen Winterkälte, geht aber bey strengem Froste und scharfen Winden aus.

In England hat man zwey Sorten, a) den Französischen und b) Holländischen, welcher letztere einen stärkern Buchs hat.

## §. 343.

Art. 86. Glasapfel, P. M. baccata.

Synon. Pyrus baccata Linn. Syst. veg. ed. 13. S. 389. Pallas ross. I. I. 52. Borkhausen 374. Transparente de Moscovie, Pomme d'Astracan, Pomme de Glace. The transparent apple. Kirschapfel, moscowitischer Apfel, sibirischer durchsichtiger Apfel, Beerartiger Apfel.

Suckow 336. Hirschfeld I. 195. Henne in der Beylage. Ehrhard I. 135. III. 178.

## §. 344.

Mit eyförmig zugespizten, gesägten Blättern, gestielten Blütenschirmen, hinfälligen Blumendecken, beerartigen Aepfeln.

Waterland: Sibirien. Er wächst geschwind, und ver-



verträgt unsre Winter recht gut. Staubweege, fünf. Die Blätter sind eiförmig zugespitzt, gesägt, langgestielt. Die Blüten erscheinen in gestielten Schirmen, die Blütenstielchen stehen gedrängt beisammen. Die Früchte sind beerenartig, enthalten in fünf Fächern zehn Saamenkerne, und sind nicht wohl essbar. Sein vornehmster Nutzen, weswegen er auch hier angeführt wurde, besteht in Hecken-Anlagen, wozu er sich ungemein gut schickt, indem er nicht allein geschwind wächst, sehr dicht wird, sondern sich auch gut unter der Scheere halten läßt, und sehr wohl ausdauert. Die abgeschornen Zweige können dürr gemacht und im Winter dem Vieh gefuttert werden.

Subl. a) Mit kleinen Früchten von der Größe der schwarzen Johannisbeere. b) Mit größern Früchten. *Malus fructu magno albido glaciato.* du Ham. arb. 317. N. 38.

§. 345.

### G. Untergattung: Quitte.

P. *Cidonia*. (Coignier, Coignassier. Quince-tree.)  
Rüthenbaum, Rüthenstrauch.

Der Quittenbaum, der häufig nur als ein Strauch vorkommt, bildet eine mächtige Krone. Seine Zweige stehen dünne, sein Wachsthum ist unregelmäßig, mehr busch- als baumartig. Die Blätter sind groß, glattrandig, eiförmig, unten wollig. Die Blüten erscheinen einzeln auf kurzen, wolligen Stielen an den Seiten der Zweige und den Spitzen der jungen Schüsse. Die Kronenblätter sind groß, weisröthlich, ausgezackt. Die Früchte sind mit Wolle bekleidet, sehr kurz gestielt, fünffächerig, reifen im October.

Folgende Quitten sind, wo nicht besondere Arten, doch Halbarten.

§. 346.

87. a) Wilde Quitte, P. C. *silvestris*. (Coignassier des bois. wild Quince tree.)

aa) Oblonga. Wilde Birnquitte,

Synon. *Cydonia oblonga*, foliis oblongo-ovatis, sub-

subtus tomentosus, pomis oblongis, basi productis. Mill. n. 1. du Roi II. 231. Malus cotonea silvestris. C. Bauh. pin. 435. Cydonia angustifolia vulgaris. Tourn. instit. 633. Pyrus cidonia, foliis integerrimis, suborbiculatis, floribus solitariis. Pallas ross. I. I. 48. Pyrus cidonia oblonga. Borkh. 177. Le coignassier femelle. The Pear-Quince.

Sudow 337. Glebitch II. 72. v. Burgsdorf 197. Märter 91. Becker 50. Hirschfeld I. 216.

§. 347.

Mit fast kreisrunden Blättern, birnförmiger Frucht.

In niedrigen guten Waldboden, an südlichen Einhängen und Weinbergen, bleibt immer nur ein mittelmäßiger Strauch. Die Blätter sind kleiner, als an der zahmen Art, fast kreisrund, glattrandig, oben dunkelgrün (und nur in der Jugend wollig) unten mit feiner, weisser Wolle besetzt, stehen abwechselnd auf wolligen Stielen. Die Rinde ist schwärzlichbraun, an den jungen Trieben weisswollig. Die Blüten erscheinen einzeln, auf kurzen wolligen Stielen, die Blumendecke ist dick und sehr wollig, die Kronenblätter sind groß, gezahnt, fleischfarbig. Die Blumen haben einen angenehmen Geruch. Staubfäden, zwanzig, purpurroth. Frucht birnförmig, der Länge nach mit erhabnen Riefen gezeichnet, reift im October, Aug und Stiel stehen in einer mit acht bis zehn Hügelchen eingeschloßnen Grube. Die Früchte sind anfangs mit einer grauen Wolle überzogen, die sich bey der Reife nach und nach verliert. Die Farbe der reifen Frucht ist gelb, auch hat sie einen angenehmen Geruch.

§. 348.

88. bb. Maliformis, Apffelquitte, (wilde)

Synon. Cidonia maliforma. Mill. n. 2. du Roi 234. Pyrus cidonia maliforma Borkh. 178. Malus cotonea minor. C. Bauh. pin. 434. Le coignassier male. The Apple-Quince.

Sudow 337. Borkhausen 178.

Mit

Mit enförmigen Blättern, kürzern rundlichen Früchten.

Wächst an den felsigen Ufern der Donau wild. Die Blätter sind mehr oval, glattrandig und auf beyden Flächen wollig. Die Blüte erscheint mit der Blüte der vorhergehenden Sorte. Die Früchte sind ungleich rund, apfelförmig, bey der Reife goldgelb. Man findet diese Quittensorte bald als einen Strauch, bald als einen kleinen Zwergbaum. Sie ist sehr dauerhaft und bringt auch im nördlichen Deutschland Saamen.

§. 349.

Gatt. 26. Spiraea, Spierstaude, Laubholz.

Die Blumendecke ist einblättrig, fünfsfaltig. Die Blumenkrone ist fünfblättrig. Staubfäden, viele, der Blumendecke einverleibt. Staubweege, drey bis fünf. Die Saamenkapsel ist flügellos und vieljaamig.

§. 350.

Art. 89. Weidenblättrige S. S. salicifolia, L.

Synon. Spiraea salicis folio. du Hamel. n. 1. Le Spiraea a feuilles de Saule. The willow-leaved Spiraea.

Sudow 338. Borkhausen 64. Du Roi II, 428. Miller IV. 320. n. 1. Rösch. 131.

Mit lanzettförmigen, stumpfen, sägezahnigen, glatten Blättern; dicke Blüentrauben am Ende der Zweige.

Wächst auch hin und wieder in Deutschland wild, und ist ein kleiner, dauerhafter, drey bis vier Fuß hoher Strauch. Die Zweige sind dünne und gerade, die Wurzel breitet sich weit aus und treibt viele Nebenschüsse. Die Rinde ist glatt, an ältern Stämmen roth, an den jüngern hellröthlich, an den Sommerlatten beynahe weis. Die Blätter sind lanzettförmig, stumpf, am Rande scharf gesägt, fast stiellos, auf beyden Flächen glatt, oben hell unten bräunlichgrün, stehen ohne alle Ordnung. Die Blüten erscheinen in dicken Trauben an den Enden der Zweige im Jun. Die Kronenblätter sind schön blastroth oder fleischfarbig. Im botanischen Garten.



## §. 351.

Art. 90. Gamanderblättrige S. *S. chamaedrifolia*.

Synon. Le Spiraea de Siberie. The Sibirian Spiraea. Sibirische Spierstaude.

Suckow 340. Du Roi II. 432. Scopoli carn. n. 600. Mönch 132.

Abbild. Scopoli l. c. t. 22.

Mit eyrunden, bis auf die Hälfte weit gezahnten, glatten Blättern. Gestielte weisse Schirm-Blüten.

Ein sommergrüner, dauerhafter Strauch, der in Sibirien und auch in Kärnth'n wild wächst. Die Blätter sind eyrund, am Rande bis auf die Hälfte weitläufig gezahnt, auf beiden Flächen glatt. Die Blüten erscheinen an den Enden der Zweige, in gestielten Schirmen. Die Staubbeutel sind weisse. Die Blätter sitzen bisweilen zu drey bis fünf beisammen.

## §. 352.

Art. 91. Wellenblättrige S. *S. undulata* Borkh.

Synon. Spiraea alba, folijs lanceolatis acutis, apice ferratis, floribus duplicato racemosis. Du Roi II. 430. Miller. The Garden. Dict. seventh. Edit. n. 8. Le Spiraea a feuilles de Saule, et a fleur blanche. The willow-leaved Spiraea with white flowers. Weissblühende Spierstaude.

Suckow dt. Bot. 158. Borkhausen 65.

Mit lanzetförmigen, gesägten, wellenförmig gebogenen Blättern, länglichen, traubenförmigen Blütensträußern.

Ein sommergrüner, dauerhafter Strauch, der in verschiedenen Gegenden in den Hecken wildwachsend angetroffen wird. Er erreicht eine Höhe von acht bis zehn Fuß. Die Blätter sind lanzetförmig, zugespitzt, fast stiellos, am Rande in dichte wellenförmige Falten gelegt, scharf gesägt, zart, auf der obern Fläche hell- auf der untern trübgrün. Die Blüten erscheinen an den Enden der Zweige in geraden, traubenförmigen, etwas lockern Sträu-

**Sträußern.** Die Kronenblätter sind weiß, die Staubbeutel braunroth. Staubweege, fünf. Eine Zierstaude wie die vorigen.

§. 353.

Gatt. 29. Rosa. Rose. Laubholz.

Diese Gattung enthält eine beträchtliche Anzahl (gegen sechzig) Blumensträucher, von denen manche baumartig gezogen werden können \*). Allein die reine Bestimmung der wahren Arten dieser Gattung ist sehr schwer, da die angenommenen Diagnosen so vieler Unbeständigkeit ausgesetzt sind. Nur im wilden Zustande erscheinen sie einfach, und in diesem müssen sie auch untersucht werden. Die Blumendecke ist bey allen Rosen frugförmig fleischig, am Halse zusammengeschnürt, an der Mündung fünfspaltig. Die Blumenkrone ist fünfblättrig. Staubfäden, viele, der Blumendecke einverleibt. Staubweege, viele, oft glatt, oft behaart, bey manchen Arten kaum bemerkbar, bey andern ganz abwesend. In der beerenartigen Blumendecke sitzen viele borstige Saamen. Die meisten Sorten sind mit Stacheln bewehrt, die sie von Zeit zu Zeit abwerfen.

\*) Hirschfeld Fruchtbaumzucht I. 18. Mosers Forst-Archiv VII. 256. Vorkhausen 297. 334.

Die Rosen haben viele Monographen gefunden.

A. Fumanellus de Rosis in Oper. suis Basil. 1543. Sylvius Oratio de Rosis. Hafn. 1601. Wittich Rhodographia. Dresd. 1604. Rosenberg Rhodologia. Argent. 1628. Strausius de Encomio Rosae. Giessae 1662. Salzmann de Rosa. Argent. 1670. Hagedorn Cynosbatologia. Ien. 1681. (Bennemann) Die Rose. Leipzig 1743. Dercum diss. de Rosa. Wirceb. 1751. Hermannii diss. de Rosa. Argent. 1762. Reynier descriptio specierum novarum Rosae. in den Memoires de l'Academie a Lausanne T. I. L. 67. Journal für die Gartenkunst. St. X. S. 141. Camerarius in Sylloge Memorabilium. Cent. III. S. 146. Gagnati Observat. L. I. S. 77. Scaligeri Exercitatio de Subtilit. S. 910. I. D. Major de tubulis roridis rosarum in Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 8. p. 7. Grassius de degeneratione rosarum, it. de Rosis proliferis. ibid. Dec. I. an. IV. V. S. 87. 44. Breslauer Natur und Kunstgesch. 3. Berr. 416. 17.

Bers. 169. 21 Bers. S. 50. Journal des Savans. VII. 167.  
Danziger Nachrichten 1754. S. 149. Neues Hamburger Ma-  
gazin XXX. 57.

## §. 354.

Die Blätter der Rosen werden häufig in Apotheken, von Destillirern und Parfumirern gebraucht. Man zieht das bekannte Rosenwasser daraus ab, mit welchem nach Schina, Persien, die Levante ein wichtiger Handel, theils von den asiatischen Völkern selbst, theils von den dahin schiffenden Europäern getrieben wird. Mit Rosen von Provinz wird in unserm Welttheile am stärksten gehandelt. Die mit Rosen zusammengesetzten Mittel sind: Rosenhonig, Rosenconserve. Aus den Blättern wird in Ostindien das Rosenöhl (wohl zu unterscheiden von Rosenholzöhl, Oleum ligni rhodii) bereitet \*). Die Früchte dienen zu Nußen. Die Schwämme sind officinell.

Castelli discorso dell' Elettuario rosato. Romae. 1633.  
Alexius de Syrupo rosato. Patavii 1630. Camerarius Spon-  
gia rosae silvestris quid? in Syll. Memorab. Cent. XVII.  
S. 1414.

## §. 355.

Art. 92. Rostblättrige R. R. rubiginosa. Linn.

Synon. Rosa maxima silvestrium. Camerar. epit.

99. Rosa silvestris foliis odoratis. Dod. 187. C. Bauh.  
pin. 483. Rosa eglenteria. Tab. icon. 1087. Rosa  
foliis odoratis, Eglantina dicta. J. Bauh. hist. VII. 41.  
Rosa foliis subtus rubiginosis et odoratis. Hall. enum. 350.  
Rosa eglanteria. Herm. ros. 17. Miller. n. 4. Münchh.  
V. 275.

\*) Donald Monno hat die Art und Weise bekannt gemacht, wie man in Ostindien das Oehl aus Rosen bereitet. Man blättert sie in ein hölzernes mit reinem Wasser gefülltes Gefäß. Je mehr solcher Rösche, desto mehr Oehl. Diese setzt man vier bis fünf Tage lang in die Sonne, wo sich das öhlartige abscheidet und auf dem Wasser schwimmt. Dieses Oehl nimmt man mit feinen Cattun-Lappen weg, und drückt diese in kleine Flächgen aus, die man genau verwahren kann. Gotha'sche gel. Zeit. aus Litt. 1792. XXIX.



V. 275. Du Roi II. 236. Gleditsch II. 261. n. 101. Rosa spinis aduncis, foliis, subtus rubiginosis. Hall. hist. n. 1103. Rosa eglanteria. Schrank. bav. II. 25. Rosa pampinula Tabern. 1496. Rosier Eglantier odorant. Eglantine or Sweet Briar. Hanb. I. 173. Weinrose, Eglantier, Engelthierrose, wilde wohlriechende Rose, rostfarbene Rose, Dünenrose, wilde Weinrose, Eglanterose.

Sudow 344. n. 7. Ehrhard I. 122. II. 42 134. III. 112. IV. 23. VI. 34. Borkhausen 305. Läder II. 599. n. 15.

### §. 356.

Mit runden, glatten Fruchtknoten, stacheligen Blütenstielen, krumgebogenen Staminstacheln, eyrunden, doppeltgesägten, unten mit einem eisenrostartigen Beschlage besetzten, drüsigen, flebrigen Blättchen.

In unsern Wäldern, in erhabner, trockner Lage. Der Strauch wird fünf bis sechs Fuß hoch und ist mit starken, krumgebogenen, breiten Stacheln, bewehrt und sehr ästig. Die Blätter sind ungleich gefiedert, die Blättchen fünf, sieben, neun, eyrund, doppelt gesägt, leicht gefranzt, oben dunkelgrün, glatt, unten bleich mit rostfarbigen Punkten und Drüsen, welche einen flebrigen Saft ausschütten, besetzt. Sie haben einen sehr angenehmen Geruch, den sie des Abends nach einem Regen weit verbreiten. Die Nebenblättchen sind pfriemenförmig, drüsig; die Blatt- und Blütenstiele borstig und drüsig. Die Einschnitte der Blumendecke sind halb gefiedert, die Früchte fast kugelförmig, am Grunde bisweilen mit Stacheln versehen.

Abarten a) einfache.

aa) Mit purpurrother Blume. bb) Mit blaurother Blume. cc) Mit weißer Blume. Gleditsch II. 268.

b) gefüllte.

dd) Halbgefüllte. ee) Gefüllte. R. e incarnata West.

*Rosa lutea* West. und *R. e. sempervirens* West.  
sind wohl auch blos Abarten.

§. 357.

Art. 93. Pimpinellblättrige *R. R. pimpinellifolia*.

Synon. The Barnet Rose. Hanb. I. 173. Mawe.  
n. 9. Bibernellblättrige Rose.

Sudow 342. Borkhausen 298. Luder II. 598. n. 13.  
Ehrhard II. 42. Borrowskys Almanach 293.

Mit glatten Früchten und Blütenstielen, rauhen Blatt-  
stielen, kleinen, rundlichen, sägenartig gekerbten  
Blättchen, stachlichem, niedrigem Stamme.

Dieser Strauch wird nur zwey bis drey Fuß hoch,  
ist rauh und darnieder liegend mit zerstreut stehenden Sta-  
cheln reichlich besetzt. Die Blätter sind ungleich gefiedert,  
die Blättchen sind fast kreisrund, stumpf, sägenartig ge-  
kerbt, den Blättern der Bibernelle (*Poterium Sanguisorba*)  
ähnlich. Die Blattstiele sind rauh, (bisweilen glatt.)  
Die unzertheilten glatten Einschnitte der Blumendecke  
sind fast so lang als die Kronenblätter. Die Blütenstiele  
sind glatt, die Blume ist klein, einfach, von keinem be-  
sondern Ansehen, die Kronenblätter sind herzförmig aus-  
gerandet.

Ab. a) mit rother Blume. b) mit schwarzer Blume. c)  
mit weißer Blume.

§. 358.

Halb. a) Hafer *R. R. spinosissima*.

Synon. *Rosa campestris spinosissima*, flore albo odo-  
rato. C. Bauh. pin. 484. *Rosa spinosissima* germinibus  
ovatis glabris, flore albo. J. Bauh. hist. 40. *Rosa cam-  
pestris odorata*. Clus. pan. 112. 113. 114. Petit Rosier  
tres epineux a fleurs blanches. Dwarf scotch Rose. Hanb.  
I. 173. dwarf burnet-leaved Rose. Bergrose, Frauen-  
rose, Kornrose, Mariendorn, Erdrose, Heidenrose,  
schottige Zwergrose, niedrige, bibernellblättrige Rose.

Linr.

Linn syst. v. 394. Pollich palat. II. 53. Leers herborn. 120. Scopoli carn. I. 353. Sukow 342. Gleditsch II. 261. n. 99. Vüder 598. n. 14. Borkhausen 299. Biborgs Sandgewächse 37.

Sie kann nicht wohl als eine eigne Art gelten. Ihr Stamm ist etwas größer, und ihre jungen Knospen pflügen im Winter bey milder Witterung zeitig aufzuschwellen und dann allenthalben als so viele kleine rothe Augen zu erscheinen. Die Blätter sind ungleich gefiedert, die Blättchen (sieben, neun, elf) stehen auf sehr stacheligen Stielen, gleichen den vorhergehenden. Der Fruchtknoten ist kugelig. Die Blütenstiele sind bald ganz steifborstig oder glatt, bald sind sie dieses nur zum Theil. Die Abschnitte der Blumendecke sind unzertheilt, um den Rand mit Haaren besetzt. Die Blüten erscheinen in großer Menge.

Ab. a) weisse H. R. Die Kronenblätter sind weis, haben gelbe Nägel. Die Früchte sind rund, anfangs glatt, hernach etwas stachelig, bey der Reife schwarz. b) Bleichrothe H. R. Du Roi II. 236. Du Ham. n. 45. Miller. n. 5. c) Gestreifte H. R. weis und fleischfarbig gestreifte Blumenkrone. d) Marmorirte H. R. Purpurroth und roth gemarmelt. e) Mit scheckigem Laub. R. f. foliis ex luteo et viridi eleganter variegatis. West.

### §. 359.

Art. 94. Alpen R. R. alpina. Linn.

Synon. Rosa inermis. Mill. n. 6. Alpine Rose, Rose without thorns, Hanb. I. 173. Bergrose, Jungfernrose, Rose ohne Dornen.

Sukow 346. n. 14. Linn. syst. II. 529, Miller n. 6. von Münchhausen V. 276. Mönch 119. Mawe n. 6.

Mit glattem, eyrunden Fruchtknoten, steifborstigen Blatt- und Blütenstielen, unbewehrten Stamme und Aesten.

Dieser Strauch wird fünf bis sechs Fuß hoch. Stämme und Zweige sind röthlich, ganz glatt, weewegen



gen sie den Namen Jungfernrose, oder die Rose ohne Dornen, erhalten hat. Die Blätter sind ungleich gefiedert, die Blättchen (sieben, neun) sind auf beyden Flächen glatt, tiefgesägt. Blatt- und Blütenstiele sind steifborstig. Die Einschnitte der Blumendecke sind ungetheilt. Der Fruchtknoten ist eyrund, glatt, die Kronenblätter sind verkehrt-herzförmig, zweylappig. Die Blüten erscheinen schon im May und hinterlassen lange schmähle Früchte.

Ab. a) Die weisse A. R. b) die hochrothe A. R.

§. 360.

Art. 95. Hängende R. *R. pendulina*. Linn.

Pendulous - fruited Rose. Hanb. I. 177. Rose mit hängenden Früchten.

Suckow 346. n. 13. Ehrhard II. 42. Du Roi II. 371. Läder II. 593. n. 7. Linn. syst. II. 531.

Mit glatten Früchten, rauchem Stamme und Blütenstielen, glatten Blattstielen, hängenden Blüten und Früchten.

Dieser Strauch wird fünf bis sechs Fuß hoch und treibt von unten bis oben, verschiedene steifborstige Zweige. Die Blattstiele sind unbewehrt, die Blätter ungleich gefiedert, die Blättchen eyrund. Die Blütenstiele sind steifborstig. Die Blüten hängen abwärts. Der Fruchtknoten ist eyrund und glatt, die Einschnitte der Blumendecke sind ungetheilt. Die Früchte sind lang, schmähle, niederhängend.

Vielleicht nur eine Subsp. der vorigen.

§. 361.

Art. 96. Zimmetrose. *R. collincola*. Ehrh.

Synon. *Rosa cinnamomea* Linn. syst. 393. sp. pl. I. 703. Münchh. V. 282. J. Bauh, hist. II. 39. du Ham. n. 33. *Rosa cinamomina*. Dod. pempt. 187. *Rosa odore cinamomi*. C. Bauh. pin. 483. La rose de Cannelle,

uello. Cinnamom Rose. Hanb. I. 174. Mayrose, Zuckerrose.

Lob. icon. II. 209. Leers herb. 119 Borkhausen 300. Ehrh. II. 70. Sudow 342. n. 3. Du Roi II. 348. Hirschfelds Gartental. 1783. 191. 9 Mawe n. 5.

§. 362.

Mit glatten Früchten und Blütenstielen, länglich: eiförmigen, stumpfen, einfach scharfgesägten, unten behaarten Blättchen, Stacheln am Grunde der Nebenblättchen, wolligen Blattstielen.

Waterland. Deutschland, Schweden, Dänemark. Der Strauch erreicht eine Höhe von fünf bis sechs Fuß. Die Zweige sind sehr glatt, glänzend, purpurröthlich, sparsam mit Stacheln besetzt, welche gerade und weislich sind. Die Blätter sind ungleich gefiedert, die Blättchen (fünf, sieben) sind länglich: eiförmig, stumpf, einfach, aber scharf gesägt, oben glatt unten mattgrün, behaart, besonders auf den Nerven. Die Blattstiele sind behaart, selten mit kleinen Stacheln besetzt. Die Nebenblättchen sind breit, länglich, fein gesägt, mit röthlich drüsigen Zähnen. Die Blüten erscheinen fast einzeln, auf sehr glatten Stielen. Die Einschnitte der Blumendecke sind pfriemenförmig, an der Spitze oft blätterartig, behaart, aufrecht. Die Blumen sind klein, purpurröthlich, von zimmetartigem Geruch, erscheinen im May. Die Früchte sind glatt und fast kugelrund.

- a) einfache Z. R. *R. cinnamomea* West. *Rosa fraxinifolia* Borkh? Single Cinnamom Rose. Hanb. Sie treibt viel stärkere Schüsse, wächst zehn bis zwölf Fuß hoch und ihre Zweige sind röthlich. b) Gefüllte Z. R. *R. foecundissima*. Du Roi II. 343. Münchh. V. 279. *R. cinnamomea plena*. West. *R. cinnamomea flore pleno*. Clus. hist. 115. *Rosa veneta*. Cam. hort. 145. *R. odore cinnamomi flore pleno*. C. Bauh. pin. 483. *Rosa majalis*. Herm. ros. 8. *R. minor, rubello multi-*

plicato flore. J. Bauh. hist. II. 38. Double cinnamon Rose. Hanb. Niedersächsische, gefüllte, stark wuchernde 3. R.

## §. 363.

Art. 97. Kriech-R. R. herporhodon. Ehrh.

Synon. Rosa arvensis candida. Rosa campestris repens albā. C. Bauh. pin. 484. Rosa silvestris folio glabro, flore plane albo. J. Bauh. hist. II. 44. Rosa arvensis. Hudf. angl. ed. I. 192. Linn. Mantiss. 245. Rosa silvestris. Herm. ros. 10. Pollich. palat. II. 51. Rosa repens campestris flore albo. Scopoli carn. I. 355. Rosa spinis recurvis, foliis glabris, septenis, calycibus tomentosis, segmentis subpinnatis, tubis longis barbatis. Hall. hist. n. 1102. Wilder weiser Rosenstrauch, Hatschapsische.

Suckow 345. n. 11. Gleditsch 260. n. 98. und 266. Ehrhards Beiträge II. 71. Borkhausen 304. Hirschfelds Gartenkalender 1753. 192. n. 10.

## §. 364.

Mit fast kugelförmigen, glatten Früchten, rauhen Blütenstielen, stacheligen Blattstielen, eiförmigen, auf beiden Flächen glatten, sägezahnigen Blättchen.

Ein einheimischer Strauch, dessen meisten Schüsse kriechen und mit zerstreuten, krummen Stacheln besetzt sind. Die Blätter sind ungleich gefiedert, die Blättchen (drei, fünf, sieben) eiförmig, glänzend, auf beiden Flächen glatt, drüsenlos mit sägezahnigem Rande. Die Blütenstiele sind rau, der Fruchtknoten ist fast kugelförmig und glatt. Die Einschnitte der Blumendecke sind sanft behaart und zum Theil halb gefiedert. Die Staubweege sind haarig und von der Länge der Staubfäden. Die Blüten erscheinen an den Spitzen der Zweige.

## §. 365.



## §. 365.

Art. 98. Weichblättrige R. *R. mollifolia*.

Synon. *Rosa molissima* Roth Tentamen flor. germ. I. 217. n. 5. *B.* Borkh. 307. Sansthaarige Rose.

Mit glatten, runden Früchten, rauhen Blütenstielen, stacheligen Blattstielen und Blättern, die mit einer seidenartigen Wolle bekleidet sind.

Ein einheimischer Strauch, der fünf bis sechs Fuß hoch wird, und mit zerstreuten, geraden Stacheln besetzt ist. Die Blätter sind ungleich gefiedert. Die Blättchen (drey, fünf, sieben) eyrund zugespitzt, scharf und doppelt gesägt, bleichgrün, mit weißen Haaren besetzt, die sich wie Seide anfühlen. Die Blütenstiele sind drüsig-rauch, die Blattstiele stachelig. Die Nebenblättchen sind spizig-gleichbreit, am Rande mit Härchen und gestielten Drüsen gefranzt. Die Blütenstiele stehen einzeln oder zu zwey an den Spitzen der Zweige, sind mit feinen, geraden Stacheln, und einzelnen, gestielten Drüsen besetzt. An ihrer Basis stehen zwey spizige, lanzetförmige, feinwollige, mit gestielten Drüsen besetzte Deckblättchen. Die Früchte sind fast kugelförmig, ganz glatt. Von den Einschnitten der Blumendecke sind zwey ungefiedert, drey halbgefiedert, alle aber endigen sich in eine blattähnliche Spitze, und sind von feinen Borsten und gestielten Drüsen rauch. Die Kronenblätter sind herzförmig ausgerandet, weißlich oder blasrosenroth. Von den Staubwegen zeigen sich nur Rudimente. Die Narben sind behaart, die Früchte glatt, glänzend, bey der Reife purpurfarbig mit etwas gelb gemischt. Sie reifen im August.

## §. 366.

Art. 99. Große Hagebuttenrose. *R. pomifera*. Borkh.

Synon. *Rosa villosa*. Linn. Sp. pl. I. 704. Moench. hafl. I. 254. Suckow I. 344. Miller, n. 3. Du Roi II. 341. *Rosa silvestris pomifera major*. C. Bauh. pin. 484.

Rosa

*Rosa parva spinosa*, folio hirsuto, J. Bauh. hist. II. 38.  
*Rosa spinis rectis*, foliis quinis tomentosis, pinnis rotundis spinosis. Hall. hist. II. 40. Grand Rosier sauvage a fruit epineux. Apple Rose. Hanb. I. 174. Große, Aepfeltragende Heckenrose, großer, rauchblättriger Biepenstrauch, rauhe Hagebuttenrose.

Eudora 344. n. 9. Dörrien 267. Mawe n. 8. Borkhausen 309. 387. Linder II. 598. n. 12. Gleditsch II. 261. nr. 100 und 267.

§. 367.

Mit stacheligen Früchten und Blütenstielen, rauhen Blattstielen und Blättern, deren obere Fläche mit einer seidenartigen Wolle, die untere mit flebrigen Drüsen besetzt ist.

Ein einheimischer Strauch, der in allerley Boden und Lagen wild wächst und in Gärten, wo er als eine Obstart gezogen wird, eine ansehnliche Höhe erreicht. Er ist mit zerstreuten, breiten, gekrümmten Stacheln besetzt. Die Blätter sind ungleich gefiedert, und stehen auf feinhaarigen Stielen, die untern sind mehrentheils mit einzelnen, kleinen Stacheln besetzt. Die Blättchen (fünf, sieben) sind eiförmig, scharf und doppelt gesägt, auf der obern Fläche feinwollig, auf der untern mit feinen Haaren und untermischten flebrigen, gestielten Drüsen besetzt. Die Sägezähne sind mit feinen Härchen gefranzt. Die Nebenblättchen sind feinwollig, am Rande mit gestielten Drüsen gefranzt. Die Blüten erscheinen einzeln oder zu zwey an den Spitzen der Zweige, ihre Stiele sind mit feinen Stacheln, und untermischten feinen Drüsen besetzt. Die großen Früchte haben in der Jugend an ihren Spitzen Knöpfchen, und sind mit steifborstigen Haaren besetzt. Reifzeit: Julius. Die Abschnitte der Blumendecke sind entweder ganz ungesiedert, oder zwey sind halb gefiedert. Sämmtliche endigen sich in eine blattähnliche Spitze, und sind mit gestielten Drüsen besetzt. Die Kronenblätter sind stumpf oder ein wenig ausgerandet, angenehm bleichroth

roth und haben gelbe Nägel. Die Narben sind etwas haarig und fast ganz ohne Staubweege. Die Früchte sind bey ihrer Reife dunkelpurpurroth.

Ab. a) Lanzetblättrige R. *Rosa lanceifolia*. Wächst gleichfalls in hiesiger Gegend wild. Borkhausen 310. Sukow 345. n. Göhes Allerley II. 372.

### §. 368.

Art. 100. Efigrose. *R. Gallica*. Linn.

Synon. Rosier a fleur rouge. Gallican Rose. Hanb.

I. 175. Französische Rose, Zuckerrose.

Borkhausen 314. Linn. syst. 394. Sp. pl. I. 704. Sukow 348. Miller n. 10. Du Roi II. 363. Mawe n. 3.

### §. 369.

Mit fast runden, rauhen Früchten, rauhen Blatt- und Blütenstielen, langen, haarigen Staubweegen, eiförmig zugespikten, harten, lederartigen, unten wolli- gen Blättchen.

Wächst in Deutschland wild, und ist mit kleinern und größern, geraden, rothbraunen Stacheln besetzt. Die Blätter sind gefiedert, die Blättchen hart, oben glatt und etwas runzlicht, unten weißwollig, mit erhabenen Nerven besetzt, von denen der mittlere, rothbraune Drüsen trägt. Uebrigens sind sie eiförmig zugespitzt, gesägt (bald grob bald fein, einfach oder doppelt). Der Blattstiel ist mit gestielten, braunrothen Drüsen und kleinern Stacheln besetzt, eben so auch die Blütenstiele und der fast runde Fruchtknoten. Die Nebenblättchen sind bald schmähler, bald breiter, von braunrothen Drüsen gefranzt. Die Einschnitte der Blumendecke sind blätterartig, eiförmig zugespitzt, mit braunrothen Drüsen besetzt, zwey davon mehr oder weniger gefiedert. Die Staubbeutel sind fast nierenförmig, die haarigen Staubweege von der Länge der Staubfäden und fast in einen Körper vereinigt. Die Narben sind gelblich, haarig, kopfig.

25.



Ab. a) Gemeine Epigrose.

aa) halbgefüllte. Semi-double red Rose. Hanb. Common red officinal Rose. Mawe.

bb) gefüllte. *R. rubra multiplex*. Du Ham. n. 2. *R. Gallica plena*. West. Old double red Rose. Hanb.

b) Bunte E. R. Borkh. 316. *R. provincialis* du Roi ll. 350. *R. basilica* du Ham. n. 12, *R. damascena versicolor*. West. *R. praenestina*. Mill. Dorkrose, Lancasterrose, englische bunte Rose. Yorck and Lancaster variegated Rose.

c) Bunte Rosemunde. *Rosa mundi* West. Variegated Rose. Mawe and Hanb. Roth und weißgestreifte Rose, Weltrose.

d) Damascener R. Borkh. 316. *R. damascena*. Mill. n. 15. Du Roi ll. 369.

aa) rothe D. R. Red damask Rose. Mawe. Hanb.

bb) weisse D. R. *R. d. alba*. West. White damask Rose. Mawe. Hanb.

cc) röthliche D. R. *R. d. incarnata*. West. Blush damask Rose. Hanb.

e) Mohnrose. *R. papaverina*. Moench.

f) Schwarze E. R. *R. atra*. Borkh. 315.

### §. 370.

Art. 101. Hundrose. *R. canina*. Linn.

Synon. *Rosa silvestris vulgaris*, flore odorato incarnato. C. Bauh. pin. 483. *Rosa spinis aduncis*, foliis septenis calycibus tomentosis, segmentis pinnatis et semipinnatis, tubis brevissimis. Hall. hist. n. 1101. Rosier sauvage. Dog - Rose or Hep - Tree. Hanb. l. 173. Hecke-rose, Dornrose, Hornrose, Hagedornrose, Hagebuttenrose, Hainbuttenrose, Hahneklöschen, Hahnehodchen, Hagehotten, Hagehüttchen, Hagehüften, Buttelhüften, Hainhocken, Wirbgen, Wiegenstrauch, Wiepfen, Wipen, Hiese, Hüften, Schlaftunz, Schlaftauz.

Linn.

Linn. syst. 394. Mant. 399. Pollich palat. II. 52. Leers herborn. 120. Scopoli carn. I. 352. Sudow 347. Borkhausen 317. Meditsch II. 259. Märter 160. Du Roi II. 359. Dörrien 207. Du Ham. n. 26, 26. Miller n. 1.

Abbild. Ic. pl. med. t. 329.

### §. 371.

Mit eysförmig nackten Früchten, nackten Blütenstielen, wolligen Blumendeckabschnitten, etwas gewölbtem Fruchtboden, stachelichen Blattstielen, eysförmig-spizigen, scharf gesägten, auf beyden Flächen glatten Blättern, stachelichem Saamen.

Unter unsern einheimischen Rosen ist diese die gemeinste Art, die in, um und ausser den Wäldern in mancherley Grund gefunden wird. Oft hat dieser Strauch eine niedrige, kriechende Gestalt, bisweilen erlangt er aber eine Höhe von zwölf, funfzehn, achtzehn Fuß \*). Der Hauptstamm so wie die stärkern Zweige sind mit krummen, röthlichen, unterwärts platt aufsitzenden Dornen, häufig besetzt. Die Blätter sind ungleich gefiedert, die Blättchen (fünf, neun) sind klein, eyrund zugespitzt, groß und scharf gesägt, auf beyden Flächen glatt. Die Blattstiele sind glatt, auf ihrer untern Seite sitzen einzelne, gekrümmte Stacheln. Die Nebenblättchen sind schmahl und pfeilsförmig, am Rande mit gestielten, braunrothen Drüsen sehr fein gefranzt, oft auch ganz glatt. Die Einschnitte der Blumendecke sind feinwollig, drüsig, zurückgebogen, endigen sich in eine blätterartige Spitze, zwey davon sind einfach, zwey auf beyden Seiten, und der fünfte nur auf der

\*) Crusius (in seiner schwäbischen Chronik) gedenkt eines Hundrosenstocks der bey dem Württembergischen Jagdschloß Einsiedel im Schönbuch zu sehen war, und erst vor etlichen zwanzig Jahren abgestorben ist. Er hatte zwey und funfzig Ellen im Umfang und seine Aeste ruhten auf vierzig steinernen Säulen. Herzog Eberhard I. soll ihn vor dreyhundert Jahren aus dem gelobten Lande mitgebracht haben.

der einen gefiedert. Die Kronenblätter sind gelappt, die Staubweege glatt, sehr kurz. Die Deckblättchen der Blütenstiele sind lanzetförmig, glattrandig oder fein gefranzt. Die Frucht ist eyrund, scharlachroth.

§. 372.

Die Früchte sind unter dem Nahmen Hüften (Hambutten, Hagebutten, Harnbutten, Hetichepetschen) bekannt. Man pflegt sie nach erhaltener Reife einzusammeln, aufzuschneiden, von ihren stachlichen Saamen und der Blumendecke zu reinigen und zu trocknen oder einzumachen. Auch wird ein sehr angenehm schmeckendes Mus daraus bereitet. Die jungen Blätter des Strauchs geben einen wohlschmeckenden Thee. Der ausgewachsene kann man sich, nach Gleditschens Vorschlag zum Gerben bedienen. Das Holz von stärkern Stämmen, das weißlich und sehr zähe ist, läßt sich in kleinen Stücken, wo es ohne Markröhre und nicht zu ästig oder wimmerig ist, zu verschiedenem Gebrauche gut und sauber bearbeiten. Zur Feuerung ist es als Reissig sehr gut. Die jungen Triebe, welche bisweilen von einer kleinen Gallenfliege angestochen werden, pflegen alsdann in rauchhaarige, zottige Beulen auszuwachsen, die in den Officinen, unter dem Nahmen Schlafäpfel (Rosenschwämme, Bedeguar off.) bekannt sind.

§. 373.

Art. 102. Straußrose. *R. corymbifera*. Borkh.

Mit eysförmig nackten Früchten, nackten Blütenstielen. Blütenstand: Strauß. Abschnitte der Blumendecke: glatt, drüsig gefranzt. Blattstiele: wollig, stachlich. Blättchen: eyrund spizlich, auf beyden Flächen dünne behaart.

Nach Borkhausen eine eigne, mit der vorhergehenden oft verwechselte Art. In der Höhe, Stärke und stachlichen Bekleidung gleicht sie der vorhergehenden. Aber



Aber ihre Blättchen sind eyrund, wenig zugespitzt, grob aber spizig gesägt, auf beyden Flächen dunkelgrün und behaart, doch auf der obern schwächer als auf der untern, und von den Nerven ein wenig runzlich. Die Blattstiele sind wollig, auf der untern Seite mit einigen gekrümmten Stacheln besetzt. Die Blüten erscheinen zu fünf bis neun in schirmförmigen Sträußern, an den Enden der Zweige. An der Basis eines jeden Blütenstieles finden sich zwey lanzetförmige, spizige, drüsiggefranzte Deckblättchen. Der in der Mitte stehende, einfache hat keines. An der Basis des ganzen Schirmes findet man endlich so viele größere Deckblättchen, als Blütenstiele um den mittlern herumstehen. Alle diese Stiele, so wie der eyförmige Fruchtknoten sind vollkommen glatt. Die Spitzen der Blumendeckabschnitte sind blätterartig, zwey ungefedert, zwey auf beyden Seiten, und einer nur auf der einen gefiedert, alle glatt und nur am Rande mit gestielten Drüsen besetzt. Die Kronenblätter sind bleichroth mit weissen Nägeln. Die Staubweege sind sehr kurz, kaum sichtbar.

## §. 374.

Art. 103. Schirmrose. *R. umbellata*. Leyser.

Blütenstand, Schirmstrauß. Fruchtknoten, glatt oder etwas rauch. Abschnitte der Blumendecke, drüsig gefiedert. Blattstiele, drüsig stachlich. Blättchen, eyförmig, spizig, doppeltgesägt, oben behaart unten drüsig, auf den Sägezähnen mit Drüsen besetzt. Dieser Strauch hat einige Aehnlichkeit mit dem rothblättrigen Rosenstrauch ist aber nach Leyser, Leers und Borkhausen eine von ihm dennoch verschiedene eigne Art. Blütezeit: Junius. Der Stamm ist mit starken, rothen, gekrümmten Stacheln besetzt, von denen sich an den Wurzelhoden und jungen Trieben zwey oder drey an der Basis eines jeden Blattes, und einer je zwischen zwey Blättern findet. Die Blattstiele sind mit gestielten Drüsen und

auf

auf der untern Seite mit gekrümmten Stacheln besetzt. Die Blättchen sind eyförmig zugespitzt, doppeltgesägt, auf den Sägezähnen mit Drüsen besetzt, oben dunkelgrün und fein behaart, unten blässer, behaart, mit untermengten flebrigen, braunen, gestielten Drüsen. Die Blüten erscheinen an den Enden der Zweige zu vier, sechs, acht, in kleinen Schirmsträußern. In der Mitte steht eine und die übrigen um sie im Kreise herum. Jeder Blütenstiel hat zwey kleine Deckblättchen, der mittlere keine, der ganze Schirmstrauß aber so viele drüsige, lanzettförmige Deckblättchen, als Blüten im Umkreise stehen. Die Stiele sind einblütig, von kleinen, braunrothen Borsten und gestielten Drüsen rauch. Die Früchte sind bald ganz glatt, bald etwas borstig. Die Spizen der Blumendeckabschnitte sind blätterartig, mit braunrothen Drüsen besetzt, drey davon sind gefiedert. Die Staubweege sind sehr kurz und behaart, die Früchte bey der Reife roth, zuletzt schwärzlich.

Eine Halb- oder Abart scheint folgende zu seyn: a) R. hispida. Borkh. Rauche Rose. Borkhausen 322.

§. 375.

Art. 104. Weiße R. R. alba. Linn.

Synon. Rosier blanc. White Rose. Hanb. I. 177.

Suckow 349. Luder 584. n. 2. Borkhausen 324. Linn. syst. 394. Sp. Pl. I. 705. Moench hass. I. 256. Miller n. 16. Du Roi II. 361. Mawe. n. 2. Du Ham. n. 16. 17. 18.

Mit glatten oder etwas rauchen Früchten, rauchen Blütenstielen, halbgefiederten Blumendeckabschnitten, haarigen und stacheligen Zweigen und Blattstielen, eyrunden, unten wolligen Blättchen.

Der Strauch wuchert sehr und wird beträchtlich hoch. Stamm und Aeste sind mit spizigen, etwas gekrümmten Stacheln besetzt. Die Nebenblättchen sind schmahl, am Rande fein drüsig, die Blattstiele wollig, unten mit gekrümmten Stacheln besetzt. Die Blättchen eyrund

eyrund, kaum spitzig gesägt, oben glatt, unten weichhaarig, mit röthlichen Spitzen der Sägezähne. Die Blüten erscheinen bald einzeln, bald zu mehreren an den Spitzen der Zweige auf Stielen, die von steifen, kleinen Borsten und gestielten Drüsen rauch sind. Die Früchte sind eyrund, glatt, oder an der Basis etwas rauch. Die Abschnitte der Blumendecke sind mit gestielten, braunrothen Drüsen besetzt, ihre Spitzen blätterartig, drey sind gefiedert. Die Kronenblätter sind stumpf oder etwas ausgerandet. Die Staubweege, von der Länge der Staubfäden, haarig, wachsen aus einer Grube des Fruchtknotens. Die Früchte sind bey der Reife dunkelroth.

Ab. a) Niedrige einfache w. R. R. alba West. Dwarf white Rose. Hanb. b) Halbgefüllte w. R. R. alba duplex. West. Semi-double white Rose. Hanb. c) Große gefüllte w. R. R. alba plena. West. Large double - white Rose. Hanb. d) Jungfräulich röthlich w. R. R. alba incarnata. West. Staidens - blush white Rose. Hanb.

§. 376.

Gatt. 30. Rubus. Himbeere. Laubholz.

Die Blumendecke ist fünfspaltig, steht unter dem Fruchtknoten. Die Blumenkrone ist fünfblättrig. Staubfäden viele der Blumenkrone einverleibt. Staubweege viele, stehen auf dem Fruchtboden. Frucht, eine aus vielen einsaamigen Beeren zusammengesetzte Beere. Man kann drey Unterabtheilungen bey dieser Gattung annehmen:

a) Aufrechte b) Gestreckte c) Krautartige  
wovon die letztern aber nicht hieher gehören, weil sie keine Holzarten sind.



§. 377.

## a) Aufrechte.

Art. 105. Gemeiner Himbeerstrauch. *R. idaeus*. Linn.

Synon. *Rubus idaeus spinosus* - b) *laevis* C. Bauh. pin. 479. *Rubus caule spinoso, subrecto, foliis quinatis et ternatis, subtus tomentosis, fructibus hirsutis*. Hall. hist. n. 1108. Le Framboisier. Common Raspberry. Hanb. II. 770. Himbeere, Hindbeere, Himpelbeere, Hohlbeere, Hombeere, Himmelbreme, Himmibreme, Haarbeerstrauch.

Crantz austr. 81. de Necker Gallob. 220. Pollich palat. II. 55. Scopoli carn. I. 355. Moench. hass. I. 256. Sudow 352. Workhausen 289. Märter 170. Doerrien 268. Leers n. 386. DuRoi II. 376. Mattuschka files. n. 357. v. Münchhausen III. 471. Deutsche Encycl. XV. 587. 509.

Abbild. Blackw. t. 289. Knorr del. a. t. 1. Cramer t. 48.

§. 378.

Mit gefiederten Blättern, eyrund zugespitzten, tiefgezahnten, oft zwey bis dreyfach eingeschnittenen Blättchen, gefurchten Blattstielen.

Dieser gemeine Himbeerstrauch hat seinen Trivialnamen *Idaeus* von dem Berge *Ida* in *Creta*, wo er sehr häufig wächst. Er wird bey uns in steinigem, gebirgigen Wäldern und Gebüsch häufig gefunden. Seine Stengel sind schwach, oft mit Stacheln besetzt, bisweilen auch nicht, steigen, wenn sie einen Gegenstand finden, wo sie hinaufklettern können, daran in die Höhe, sonst kriechen sie auf der Erde. Die jungen Stengel haben eine grüne, die alten eine braunrothe Rinde. Die Stacheln sind kurz, gerade, röthlich, gefurcht. Im zweyten Jahre sterben die Stengel ab, und in jedem Jahre treibt die Wurzel neue. Diese tragen im ersten Jahre weder Blüten noch Früchte, sondern erst im zweyten, da sie denn hernach gleich verdorren. Die Blätter sind gefiedert. Die Blättchen drey oder fünf sind eyrund zugespitzt, am Rande tief gezahnt, oft zwey bis dreyfach eingeschnitten, auf der

obern

obern Fläche glatt, hellgrün, mit Vertiefungen versehen, auf der untern silberfarbig und mit Wolle besetzt. Blatt- und Blütenstiele sind mit kurzen, röthlichen Stacheln besetzt, und haben oben eine Rinde. Die Blüten erscheinen zu drey bis fünf am Ende der Zweige und zwischen den Blätter-Achseln. Die stachelichte Blumendecke ist mit Wolle bekleidet. Die Beere sind fleischfarbig bisweilen hochroth, mit einer feinen, weissen Wolle bekleidet. Jedes Beerchen schließt einen Saamen ein.

Die Früchte haben einen angenehmen Geruch und Geschmack, sie werden sowohl roh, als mit Wein und Zucker zubereitet, genossen. Vorzüglich werden sie eingemacht, und Geleen oder Juleps, die in hitzigen Krankheiten sehr dienlich sind, daraus bereitet. Die Weinkünstler nehmen den Saft zu manchen Weinen. Aus den Beeren kann man auch ein angenehmes, weinartiges Getränk bereiten, doch bedürfen diese Früchte zum Genuß einer genauen Reinigung. Der daraus bereitete Essig ist kühlend, labend und antiseptisch. Man bereitet in den Apotheken einen Himbeergeist (*Spiritus rubi idaei*) und in Pohlen werden die Früchte zur Bereitung des Himbeermethes genommen. Fernere officinelle Fabrikate sind: der Himbeersaft (*Succus rubi idaei*) und das Himbeerwasser (*Aqua rubi idaei*).

Camerarii diff. de Rubo idaeo. Tub. 1721. Schulze diff. de Rubo idaeo. Halae 1744. Gazette salulaire 1773. 56. Berliner Samml. V. 391.

§. 379.

b) Gestreckte.

Art. 106. Brombeerstrauch. *R. fruticosus*. Linn.

Synon. *Rubus vulgaris*. f. *rubus fructu nigro*. C. Bauh. pin. 479. *Rubus caule spinoso, serpente, foliis quinatis et ternatis, subtus, subtomentosis, bacca laevi*. Hall. hist. n. 1109. Les Mures de Renard. The common Bramble. Haub. I. 269. Brumbeerstrauch, Broom-

beerstrauch, Bremen, Bromen, Rhambeere, Rabetbeere, Kraßbeerstrauch, großer B. St. hoher B. St. polnischer B. St.

Linn. sp. pl. ed. 3. I. 707. Pollich palat. II. 58. Moench. hass. I. 257. Scopoli carn. I. 356. Sudow 351. Gleditsch II. 255. Leonhardi 140. Borkhausen 286. von Burgsdorf 262. Becker 68. Märter 168. Viborg 39. Deutsche Enc. XV. 509. Du Roi II. 372. Du Ham. II. 180. Krünitz Enc. VI. 779. von Münchhausen III. 476. V. 291. Sieffert II. 154. Doerrien 268.

Abbild. Jc. pl. med. t. 280.

§. 380.

Mit einfachen, dreysachen und fünffachen Blättern, stachelichem Stamme und Blattstielen.

Wächst häufig an ungebauten Orten, in Hecken und Zäunen, auch auf Feldern. Seine Stengel sind zwey bis drey Ellen lang, stark, eckig (gemeiniglich fünfeckig) und fünffach gefurcht, kriechen weit umher. Die Blätter stehen abwechselnd, die untern sind aus fünf, die obern aus drey zusammengesetzt, die obersten sind gewöhnlich einfach. Diese Blätter sind von ungleicher Größe, eyrund zugespitzt, am Rande groß gezahnt, auf der obern Fläche dunkelgrün, auf der untern weiß, behaart, stehen auf stachelichten Stielen. Die beyden äußersten findet man stiellos und oft in Lappen zertheilt. Stamm und Stengel sind mit vielen harten, gekrümmten Stacheln besetzt. Die Blüten erscheinen auf den äußersten Zweigen vom May bis spät in den Herbst. Die Früchte sind anfangs grün, hernach roth, bey ihrer Reife schwarz.

Ab. a) Mit gefüllter Blume. R. f. flore pleno. Le Ronce a fleurs doubles. Double-blossomed Bramble. Hanb. b) Mit weißen Beeren. R. f. fructu albo. Bramble with white fruit. Hanb. c) Stachelloser. R. f. inermis. Bramble without Thorns. Hanb. d) Mit eingeschnittenen Blättern. R. f. foliis incis.

Cut.



Cut-leaved Bramble. Hanb. e) Mit scheckigen Blättern. R. f. foliis variegatis. Variegated Bramble. Hanb.

§. 381.

Dieser Strauch nimmt in manchen Waldungen ganze Strecken ein, und erstickt oft den jungen Zuwachs an Laubholz. Oft findet man aber auch schöne Eichenpflanzen unter seinem Schutz. Die Früchte werden theils roh genossen, theils zur Färbung der Franzweine genommen. Im fetten Erdreich erhalten sie den Geschmack der Maulbeere. In Provence giebt man mit ihnen dem weissen Muscatwein Farbe, und in Toulon nimmt man sie unter die rothen Weine. Das Holz ist zum Nutzgebrauch zu schwach. Die Sträucher in Gruben gebrannt, geben die besten Kohlen zu Pirschpulver, doch ist der Abgang beim verkohlen, ungemein beträchtlich. Das Laub liefert mit Zusätzen brauchbare Farben. Man hat mit den Blättern und der Wurzel auch in der Heilkunst Versuche angestellt. Sonst bedient man sich auch dieses Strauches, um lose Dämme gegen das Vieh zu bewahren und Lücken in den Hecken auszufüllen. Nach Viborg kann man ihn auch zu Dämpfung des Flugsandes benutzen.

§. 382.

Art. 107. Bocksbeere, R. caesius. Linn.

Synon. Rubus repens fructu caesio. C. Bauh. pin. 479. Rubus caule aculeato, prostrato, foliis ternatis subtus hirsutis. Hall. hist. n. 1110. Le Ronce des champs. Small Bramble, Dewberry basl. Hanb. I. 269. Ackerbrombeere, kriechende blaue Bocksbeere.

Sudow 352. von Burgsdorf 263. Linn. sp. pl. I. 706. Pollich palat. II. 57. Scopoli. carn. I. 356. Moench. haff. I. 257. Borkhausen, 288. Märter 171. Becker 68. du Roi II. 375. Doerrien 268.

§. 383.

Mit, aus drey tief gezahnten, unten etwas behaarten Blättchen, woran das mittlere gestielt, die zwey andern stiellos und mit zwey tiefen Einschnitten versehen sind, zusammengesetzten Blättern, runden stachelichem Stamme.

Auf Aeckern, in Hecken und an Zäunen, bleibt ein niedriger, kriechender Strauch. Die Ranken sind lang, schwach, rund, mit kurzen Stacheln besetzt, in der Jugend mit einer grünen, im Alter mit einer braunen Rinde bekleidet. Die Blätter stehen abwechselnd, zu drey bey-sammen, sind eyrund, runzlicht, tief gezahnt, auf der untern Fläche etwas haarig, das mittlere ist gestielt, die zwey andern sind stiellos, und mit zwey tiefen Einschnitten versehen. Die Blattribben sind dreyeckig, sanftbehaart, mit kleinen Stacheln besetzt. Die Blüten erscheinen im Jun. und Jul. und stehen einzeln, auch zu zwey und drey auf langen, haarigen, stachelichen Stielen. Die Frucht ist eine zusammengesetzte Beere. Der Beerchen sind weniger als bey der vorhergehenden Art, aber sie sind größer. Bey der Reife ist die Frucht schwarzblau, und mit einem Duft überzogen.

Die Früchte sind essbar und geben einen trefflichen Wein. Auch nimmt man sie, Traubenweine angenehmer zu machen. Aber der Landmann kennt und fürchtet dieses Gewächs nur allzusehr unter dem Nahmen: Traubenbrehme, denn es überzieht häufig seine Aecker, verdirbt das Getraid, und wo es einmahl eingewurzelt ist, ist es nur mit vieler Mühe auszurotten. Der abergläubische Landmann setzt sein Vertrauen auf den St. Abdons Tag, läßt die Brehmen in der Mittagsstunde mit der Sense abhauen, sieht sie zwar wieder nachwachsen, verliert aber seinen festen Glauben an Abdon dennoch nicht. Das beste Mittel zur Vertilgung dieses schädlichen Gewächses ist das aushacken. Allein die Tagelöhner und Knechte nehmen sich selten die Mühe, alle, auch die kleinsten Würzel-

zelchen auszumachen, welches doch durchaus nöthig ist. Hat man diese Arbeit nur einmahl recht gründlich vorgenommen, so bleiben die Brehmenstöcke aus. Aber man muß die gereinigten Felder im folgenden Jahre noch einmahl begehen und wo man etwa neue Ausschöslinge wahrnimmt, sie, wenn sie etwa eine Elle hoch herangewachsen sind, ausziehen lassen.

---

## Ord. II. Verwachsene Staubfäden.

### a) in eine Säule. Monadelphia.

#### §. 384.

Art. 108. Verwachsene Heidelbeere, *Vaccinium monadelphum*. Sommergrünes Laubholz.

*Synon.* *Vaccinium Myrtillus*. Linn. Sp. pl. I. 498. *Vitis idaea foliis oblongis crenatis, fructu nigricante*. C. Bauh. pin. 470. Du Ham. II. 275. *Vaccinium foliis rugosis, ovato-lanceolatis ferratis, caule anguloso*. Hall. hist. n. 1020. Les Airelles, le Bleuët. Common Bilberry, Black Wort, Whortle Berry. Hanb. I. 862. Heidelbeere, schwarze Preusselbeere, Heidel, Heidelstaude, Heidelstrauch, schwarze Heidelbeere, blaue Heidelbeere, Blaubeere, Schwarzbeere, Besige, Besinge, schwarzer Besingstrauch, Staudelbeere, Bickbeere, Bickelbeere, Puckelbeere, Pickelbeere, Waldbeere, Kopfbeere, Kuthacken.

Suckow 186. Gleditsch II. 176. n. 76. Leonhardi 135. von Burgsdorf 253. Vorkhausen 279. Wäner 200. Becker 69. Pollich palat. I. 379. Moench hass. I. 185. Scopoli carn. I. 273. Schrank. bavar. I. 645. Doerrien hass. 275. Du Roi II. 471. v. Münchhausen III. 464. Ferber's neue Beiträge zur Mineralgeschichte I. 456. Schwed. Abhandl. VII. 252.

Abbild. Ic. plant. med. t. 81.



## §. 385.

Mit, in eine Säule verwachsenen Staubfäden, einblütigen Blütenstielen, eyrunden, gesägten Blättern, vierseitigen Zweigen.

Ein einheimisches Erdholz, das häufig im Schatten hoher Bäume und am ansehnlichsten auf hohen, rauhen Gebirgen wächst. Die Blüten erscheinen zu Ende des Mayes, je eine auf einem Stiel in den Blätter-Achseln und sind etwas unter sich geneigt. Die Blumendecke ist klein, glatt, abgeschnitten, hat fünf kleine Zähne. Die Blumenkrone ist krugförmig, an der Mündung in fünf kleine, zurückgebogene Abschnitte getheilt, purpurfarbig. Staubfäden acht bis zehn, dem Fruchtboden einverleibt und um den Staubweg in eine Röhre verwachsen. Die Staubbeutel sind gegen einander geneigt, haben in der Mitte hakenförmige Ansätze. Staubweg einer, ragt über die Staubfäden hervor und hat eine stumpfe Narbe. Der Fruchtknoten ist rund. Die Blätter stehen abwechselnd auf kurzen, oben flachen Stielen, sind eyrund, gesägt, mit Adern durchzogen, brechen in der Mitte des Mayes aus, fallen zu Ende des Oct. ab. Die Stengel sind hellgrün, glatt, vierseitig, theilen sich in viereckige, aufrecht und abwechselnd stehende Zweige. Die Beere reifen im Jul. sind schwarzblau, rund, oben flach und von der Blumendecke gekrönt.

Ab. a) Mit weisser Frucht. V. M. fructu albo. V. Myrtillus. B. Linn. Findet sich in Thüringen und Sibirien.

## §. 386.

Dieses Erdholz wird zwar unter die Unhölzer gerechnet, gewährt uns aber dennoch mancherley Nutzen. Der ganze Strauch ist zu manchen Arten Gerbereyen sehr brauchbar. Die Bienen suchen die Blüten emsig auf, und manche Bienenväter lassen ihre Bienenstöcke zur Blütezeit an diejenigen Gegenden, wo dieses Erdholz in Menge wächst, bringen. Die Beere werden theils roh,  
theils

theils mit Milch und Zucker als eine heilsame Sommercur genossen, auch zu mancherley Backwerk und an andre Gerichte genommen. In Schottland, besonders zu Leith, nimmt man den Saft zum Punsch. Frisch giebt er mit Alaun eine schöne Violettfarbe, womit man in Schweden Strümpfe färbt. Setzt man noch Kupferschlag bey, so wird ungekochte Wolle blau, nimmt man aber Galläpfel, schwarz. Mit lebendigem Kalche, Grünspan und Salmiac eingekocht, erhält man eine Purpurfarbe für die Mahler. Man nimmt die Beere auch zur Färbung der Weine, zur Vereitung des künstlichen Pontaks. In der Gegend von Haarbürg werden in den Monaten Jul. und Aug. täglich ganze Schiffsladungen nach Hamburg und Altona übergeführt. Getrocknet sind sie ein gelind zusammenziehendes Mittel in anhaltenden Durchfällen. In den Officinen bereitet man ein Roob daraus. Wo sie in Menge zu haben sind, wird auch Brandewein daraus bereitet. Endlich sind sie in den Wildbahnen, eine Vogelweide für verschiedene Arten kleiner Waldvögel.

## §. 387.

Gatt. 31. Spartium. Psrieme. Laubholz.

Die Blumendecke ist einblättrig, zweylippig. Die Blume ist eine Schmetterlingsblume. Staubfäden zehn, in eine Säule verwachsen. Staubweeg einer mit haariger Narbe. Fruchtknoten länglich raub. Frucht, eine längliche, zusammengedrückte, an den Rändern gewölbte, einsährige Schote. Saamen kugelnierenförmig.

## §. 388.

Art. 109. Besenpsrieme, *S. scoparium*. Linn.

Synon. *Genista angulosa et scoparia*. C. Bauh. pin. 395. *Genista*. Dodon. Pempt. 761. *Genista angulosa trifolia*. J. Bauh. hist. I. 382. Cytiso - *Genista scoparia vulgaris*, flore luteo. Tournef. inst. 649. du Ham. I. 147. Schrank. II. 245. Le Genet a balai. Common english Broom. Hanb. I. 185. Brehme, gemeine Psrieme, Psrie-

Pfriemenkraut, Rehkraut, Günst, Ginster, Genster, gemeiner Ginster, Gelster, Geneste, Genister, Stechpfriemen, Pfingstpfriemen, Heidepfriemen, Witschen, Hasengeil, grüner Genster, Kunschröten, Kuhshröten, Kühnschröten, Grinizsch, Brom, Bromen, Bramen, Gast, Gäst, Gester, Gieniz, Haasenheide, Wildholz, Rehheyde, Grinsche, Grichsche, Schachkraut, Frauenschuel, Grünspan, Grünling, Pfriemenholz.

von Burgsdorf 236. Borkhausen 86. Suclow 359. Linn. Sp. pl. ed. 3. II. 996. n. 8. Pollich palat. II. 282. n. 665. Gleditsch I. 333. Leonhardi 113. Becker 76. Du Roi. II. 425. Dörrien 274. Döbel in den schwed. Abhandl. XXVII. 240. Schrebers, Samml. II. 429. J. Odelius de spartio scopario eiusque viribus medicis. Schwed. Abhandl. XXIV. 82. Trombelli von einer Leinwand aus dem Baste des Spartii scoparii inc. Comment. Bonnon. T. IV. S. 349. Lesskes Ueberf. B. II. 31. Neues brem. Mag. II. 214.

Abbild. Delhafen III. 1. Jc. plant. med. t. 224. Cramer t. 50. Kerner III. t. 246. Cramer t. 50.

### §. 389.

Mit einzelnen und zu drey heysammen sitzenden Blättern, eckigen, unbewehrten Zweigen.

Auf unfruchtbaren und leetigen Blösen. Erreicht eine verschiedene Höhe. Die Zweige sind ruthenförmig, stachellos, eckig, stehen abwechselnd. Die Blätter stehen theils einzeln, theils zu drey heysammen und abwechselnd. Sie kommen aus kleinen Erhabenheiten wie die Zweige und Blütenstiele, sitzen auf längern oder kürzern Stielen, sind auch zum Theil ganz stiellos. Die einzeln stehenden sind verkehrt eysförmig, stumpf oder etwas spizig, bey den zusammengesetzten, die wie ein Kleeblatt stehen, sind die Stiele, so wie bey jenen die Stielchen, feinwollig, das mittlere Blättchen ist größer als die zwey andern, welche kleiner und schmähler sind. Alle aber sind glattrandig, hellgrün und auf beyden Flächen, mit feinen, weißen Härchen besetzt. Die Blütenstiele sind rund, glatt, ein-



einblütig und mit ihrer Blüte abwärts gebogen. Die Schmetterlingsblume ist hellgelb, die Fahne rundlich-eyförmig, stumpf, zurückgebogen, inwendig rothgestreift, ragt über die kürzern, auswärts gebogenen Flügel hervor. Das Schiffgen ist etwas länger als die Flügel, zweiblättrig und leicht theilbar. Die Blumendecke ist gewöhnlich röthlich gefärbt. Die Staubfäden ragen zur Blütezeit aus dem Schiffgen hervor. Sie sind alle zehn in eine Säule verwachsen, doch ist der obere etwas tiefer abgesondert und kürzer. Der Staubweeg ist pfriemensförmig und in die Höhe gebogen, die Narbe, welche an der obern Seite der Spitze steht, ist haarig. Die Schoten sind schwarzbraun, lang, zusammengedrückt, an den Rändern gewölbt, einsäckrig, in zwey Schalen aufspringend, enthalten zehn bis zwölf glatte, gelbliche, kugelnierenförmige Saamen.

Ab. a) B. P. mit weisser Blume. S. l. flore albo. Le Genet a balai a fleur blanche. The white flowering Broom.

### §. 390.

In Gegenden, wo die Besenpfrieme häufig wächst, ziehen sich die Rebhüner und einige Arten Großwild hin und suchen sie bey tiefem Schnee auf. Da, wo große Strecken mit diesem Strauche bestanden sind, theilt man sie in vier bis fünf Abtheilungen, und treibt alle Jahre im Späthherbst, eine ab; denn in solchen brennholzarmen Gegenden giebt dieser Strauch ein gutes Feuerungs-Reissig, das zum backen, Bierbrauen, ja sogar zum Kalch- und Ziegelbrennen genommen wird. Auch unterhält man ihn bisweilen um der Schafe und Bienen willen. Nach Kaln soll man die Zweige statt des Hopfens zum Bier nehmen können, welches davon sehr stark und berauschend werden soll. Man kann sie auch röhen, und dann einen Bast abschälen, der einen groben aber festen Faden zu Säcken giebt. Auch werden aus den Ruthen Besen verfertigt.

fertigt. Die Blumenknospen werden in Artois in Salzwasser eingemacht, und unter dem Nahmen Ginstkapern als eine Delicatesse weit und breit verschickt. Auch in der Färbererey und Gerberey ist dieser Strauch brauchbar, und liefert mit schicklichen Zusätzen verschiedene gute Farben. Zu Heckenanlagen schickt er sich nicht, wohl aber kann man ihn nach Viborgs Rath zur Dämpfung des Flugesandes anwenden. Die öhlreichen Saamen verdienen mehr ökonomische und technische Versuche. Man zählt zwar die B. P. unter die Forst-Unkräuter, allein sie giebt edlern Holzarten Schutz und Schatten, daß sie unter und zwischen ihr frisch aufwachsen, und wenn sie die gehörige Höhe erreicht haben, geht die B. P. von selbst aus.

## §. 391.

Gatt. 32. Genista. Ginster. Laubholz.

Schmetterlingsblumen. Die Fahne ist länglichtrund, ausgerandet, und von den Sexual-Organen zurückgebogen. Die Flügel sind länglichtrund, kürzer als das Schiffchen. Dieses übertrifft auch die Fahne an Länge. Die Blumendecke ist zweylippig, die obere Lippe ist zwey - die untre dreyzahnig. Staubfäden, zehen, brechen gewöhnlich aus dem Schiffchen hervor, und sind in eine Haut verwachsen, welche den Fruchtknoten einschließt. Staubbeutel, einfach. Der Fruchtknoten ist länglich, der Staubweg einfach in die Höhe gebogen, hat eine, gewöhnlich einwärts gekrümmte Narbe. Frucht, eine kurze, aufgeschwollene, einsährige, zweyschaalige, ein oder vielsaamige Schote.

## §. 392.

Art. 110. Deutscher G. *G. germanica*. Linn.

*Synon.* *Genista aculeata* Tabern. hist. 1410. *Genista spinosa minor germanica*. C. Bauh. pin. 935. *Genistella aculeata foliosa*. I. Bauh. hist. 399. *Genistella spinosa*. Rivin. Tetrap. 67. *Genista foliis ovato-lanceolatis hirsutis, spinis in ramis senescentibus ramosis*. Hall. hist.

n. 352. Le petit Genet epineux. German prickly Broom. Haub. Stehende Hohlheide, stehende Erbpfrieme, Kleiner, stacheliger Ginster, niedrige, stehende, deutsche Pfrieme, rauhe Stachelpfrieme.

Suckow 361. n. 4. Borkhausen 87. v. Burgsdorf 243. Märter 174. Becker 78. Ehrhard I. 141. Linn. sp. pl. ed. 3. II. 999. n. 12. Pollich palat. II. 289. n. 669. Scopoli carn. II. 54. n. 876. Leers herborn. 159. n. 556. Dörrien 260. Gleditsch I. 339. n. 20.

Von Anlegung der Hecken mit der Genista spinosa. Bresl. Natur- und Kunst-Geschichte. 28 Vers. S. 455. Königl. Preuss. Rescript wegen Anlegung nützlicher Hecken aus dem Saamen der Genistae spinosae 1752. fol. Forst-Mag. V. 132.

### §. 393.

Mit zusammengesetzten Stacheln, unbewehrten Blütenzweigen, lanzetförmigen Blättern.

Ein einheimisches Erdholz, das in sandigen, gebirgigen Gegenden häufig vorkommt. Die Aeste sind mit zusammengesetzten Stacheln bewafnet. Die ältern haben eine bräunliche, die jüngern eine grüne Rinde. Die Blätter stehen nur an den jungen Trieben abwechselnd, sind lanzetförmig schmahl (die untern eyförmig und breiter) fein, stiellos, auf beyden Flächen behaart. Die Blüten erscheinen im Jun. in einfachen Aehren an den Spitzen der jungen Triebe. Die Blumen sind gelb, die Fahne ist herzförmig, fiedelartig, zurückgebogen, das Schiffchen ist mit zwey Nägeln eingefügt, länger als die Flügel. Die Schoten sind kurz, haarig, etwas rauh, schwarz, zwey bis dreyfaamig. Ein Bienengewächs. Es bestaudet sich sehr dicht, läßt sich gut unter der Scheere halten, und würde sich, wenn es einen ansehnlichern Wuchs hätte, zu niedrigen Hecken schicken.

### §. 394.

Art. III. Haariger G. G. pilosa. Linn.

Synon. Genista ramosa foliis Hyperici. C. Bauh. pin.

395. Chamaegenista 1. Clus. hist. I. 103. Genistella pilosa.



lofa. I. Bauh. hist. I. 395. Genista inermis procumbens, foliis duris subhirsutis, spicis floriferis brevibus. Hall. hist. n. 345. Le petit Genet velu. Branching Broom. Haub. l. c. Nestiger Ginster, kleine Erd-Pfrieme, kleine Heide-Pfrieme, kleine rauhe Erd-Pfrieme, kleine May-Pfrieme, ungarische Erd-Pfrieme.

Suckow 361. n. 3. Gleditsch I. 339. n. 19. von Burgsdorf 244. Linn. sp. pl. ed. 3. II. 999. n. 9. Pollich palat. II. 288. n. 668. Scopoli carn. II. 52. n. 874. Borkhausen 88. Leers herborn. 159. n. 555. Märter 208. Dörrien 259.

### §. 395.

Mit lanzetförmig stumpfen, Blättern, niederliegenden, knotigen, unbewehrten Stengeln.

Ein kleines einheimisches Erdholz, das sich gemein vermehrt und im dürresten Heideboden gefunden wird. Seine faserige, holzige Wurzel geht sehr tief. Der sehr ästige Stamm liegt auf der Erde und die dünnen Stengel oder Äste sind nur an der Spitze aufgerichtet. Sie stehen sperrig, sind oft zwey bis drey Fuß lang, grün, sechs bis siebenfurchig und mit kleinen Erhabenheiten besetzt. Aus diesen brechen die immergrünen Blätter hervor. Sie sind klein, lanzetförmig, stumpf, glattrandig, sehr kurzgestielt, oben hellgrün und glatt, unten mit weichen, weißlichen Haaren besetzt. Die Blüten erscheinen im May in langen Trauben. Sie kommen einzeln, oder zwey zusammen auf kurzen Stielen aus den kleinen Erhabenheiten, sind durch kleine, lanzetförmige Deckblättchen unterschieden und nicken ein wenig vor sich. Die Blumen sind gelb. Die Schoten sind klein, etwas knotig und rauh, schwarz, abwärts gebogen, fünf bis sechs-samig, reifen im Julius. Die Saamen sind rundlich, braungelb und glatt.

### §. 396.

Unter allen Hülsengewächsen, welche dem Schaafvieh auf den allertrockensten Heiden zustoßen kommen, ohne

ne daß man darauf Acht zu haben pflegt, ist diese Art die beträchtlichste und zugleich die schätzbarste, da sie auf Landstrecken fortschlägt, welche man für die elendesten hält, und die von keiner andern Feuchtigkeit wissen, als welche ihnen die Natur durch Thau, Regen und Schnee zuführt. Es wäre daher der Mühe werth, den Saamen von dieser Ginsterart zu sammeln, und unfruchtbare Heidegegenden zum Besten der weidenden Schaafheerden damit anzusäen.

## S. 397.

Art. 112. Färbginster. *G. tinctoria*. Linn.

*Synon.* *Genista tinctoria germanica* C. Bauh. pin. 395. *Genista inermis*, foliis glabris confertis, ellipticis, lanceolatis, floribus sessilibus spicatis. Hall. hist. n. 350. Le genet des teinturiers. The dyers Broom. Haub. I. 124. Färberginster, Färberkraut, gelbe Färberblume, Färberpfrieme, Gillskraut, Heideschmuck, gemeiner Genst, färbender Ginster, Färbeblumen.

Sudow 360. n. 1. v. Burgsdorf 242. Borkhausen 90. Märter 198. Becker 77. Wiborg 36. Linn. sp. plant. ed. 3. II. 998. n. 8. Pollich palat. II. 286. n. 667. Scopoli carn. II. 52. n. 837. Leonardi 133. b) Du Roi I. 291. Dörrien 259. Leers 159. n. 554. Pörner III. 111. 406 — 426. Hellot 201.

Abbild. Delhafen III. t. 2.

## S. 398.

Mit glatten, lanzettförmigen Blättern, gestreiften, runden, aufrechtstehenden, unbewehrten Zweigen.

Ein einheimisches, sehr wucherndes Erdholz, das seinen Standort in dürren Gegenden, Feldhöhen, auf Hügeln und weitläufigen Tristen hat. Der Stengel ist halbstrauchartig (nur an der Basis holzig) und treibt mehrere, abwechselnd stehende, bald aufrechte, bald kriechende, glatte, eckige, harte, unbewehrte, nur wenig behaarte, zweigige Aeste. Die stiellosen Blätter stehen abwechselnd, zerstreut, sind lanzettförmig zugespitzt, am Ran-

P

be

de ganz und fein weislich gefranzt, glatt, hellgrün, gedert, glänzend. Der mittlere Nerve ist auf der untern Fläche mit sehr feinen weissen Härchen besetzt. Die Blüten erscheinen im Jun. und Jul. in einer dichten Aehre an den Spitzen der Stengel. Die Blumen sind gelb, die Fahne ist enförmig, am Rande zusammengerollt. Die Flügel sind lanzettförmig, stumpf, zurückgebogen, das Schiffchen ist länger als die Flügel, fällt mit diesen im Alter ab, und läßt die Fahne zurück, welche alsdann die Geschlechtstheile einwickelt. Die Blüthen stehen abwechselnd auf kurzen Stielen, die durch kurze, lanzettförmige Deckblättchen unterschieden werden, außer welchen sich noch an jedem Blumenblättchen zwei kleine, einander gegenüberstehende, pfriemenförmige Deckblättchen finden. Die Schote ist glatt, flach, anfangs grün, hernach braun, vielsaamig, reift im September.

## §. 399.

Schon in ältern Zeiten war diese Ginsterart als ein gutes Färbgewächs bekannt, das sowohl frisch als getrocknet zum gelb und grün färben gebraucht wurde. Mit Harn und Pottasche erhält man eine sehr beständige pomeranzengelbe Farbe. Kocht man diesen Ginster mit Kalchwasser und läßt den Absud vom neuen mit Kreide und Alaun einsieden; so erhält man das Schüttgelb der Mahler, von welchem Handelsartikel Holland das meiste liefert. Doch machen auch die Berlinerblau-Fabrikanten zu Breslau, Berlin und andern Orten viel und gutes Schüttgelb, welches bey dem Militär zum färben der Monturen und Uniformen den stärksten Abgang findet. Die Buchbinder kochen die Blüten mit oder ohne Alaun, je nachdem die Farbe stärker oder schwächer werden soll, und färben das bekannte gelbe Papier damit. Kraut, Blüte und Saamen sind officinell, auch kann man diesen Strauch nach Viborg zur Dämpfung des Flugsandes anwenden.

## §. 400.



## §. 400.

Art. 113. Pfeilsförmiger G. G. sagittalis. Linn.

Synon. Le Genet sagittal. Sagittated Broom, Hanb.

L. 538.

Eudow 361 n. 2. Borkhausen 91. Linn. sp. pl. ed. 3. II. 998. n. 4. Pollich palat. II. 285. n. 666. Scopoli carn. II. 51. n. 872. Leers 159. n. 553. Doerrien 259. Schrank. II. 247.

## §. 401.

Mit gegliederten, schwerdtförmig = häutigen Zweigen, eyrund lanzetförmigen Blättern.

Halbstrauchartig. Der Stamm liegt auf der Erde und treibt mehrere gerade, aufgerichtete, nicht sehr ästige Stengel, die zwischen den Gelenken, mit herablaufenden, schwerdtförmigen Häuten, welche nach der Spitze hin breiter als unten sind, geflügelt sind. Die Blätter stehen abwechselnd auf kurzen Stielen, und haben einen röthlichen, schwieligen Knoten zur Basis. Sie sind eyrund-lanzetförmig, glattrandig, hellgrün, auf beyden Flächen behaart, unten an den Zweigen kleiner als oben. Die Blüten erscheinen an den Enden der Zweige in dichten Aehren im Jun. einige auch in den Blätterachseln an kurzen, haarigen Stielen. Die Fahne ist rundlich, stumpf, glattrandig, fast eben so lang als die etwas offenen Flügel, das Schiffgen ist stumpf, eben so lang als die Flügel. Die Schote ist stielloß, zusammengedrückt, etwas rauh, haarig, schwarz, einsährig, zweyschaalig, vier bis sechsfaamig. Saamen, fast kreisrund, gelblich, etwas platt, glatt.

## §. 402.

Gatt. 33. Ononis. Hauhechel. Laubholz.

Die Blumendecke ist groß, einblättrig, fünfzählig, die drey untern Zähne sind schmahl und lang, die zwey obern mit ihren Spitzen gegen einander geneigt. Blume, Schmetterlingsblume. Die Fahne ist größer als die Flügel und das Nachenblättchen, und gestreift. Die Flügel

sind sehr kurz und endigen sich in Haken. Das zugespitzte Nachenblättchen steht über die Flügel hervor. Staubfäden zehn in eine Säule verwachsen. Staubbeutel einfach. Fruchtknoten länglich und haarig. Staubweg einer, in die Höhe steigend mit stumpfer Narbe. Frucht eine aufgeschwollne, etwas behaarte, wenigsaamige Schote. Saamen nierenförmig.

§. 403.

Art. 114. Acker = *O. arvensis*.

Mit paarweis und einzeln stehenden Blüten, unten dreifingrigen, oben einzeln stehenden Blättern, etwas haarigen Zweigen.

Subsp. a) Stachelige A. *O. a. spinosa*.

*Synon.* *Ononis spinosa floribus subsessilibus lateralibus, caule spinoso.* Linn. sp. pl. ed. 3. II. 1006. n. 2. *Anonis spinosa.* C. Bauh. pin. 389. Scopoli carn. II. 54. n. 877. *Restia bovis.* *Remora aratri.* L'Arrête beuf epineux, Bugrane, Bugrade. Common thorned Rest-harrow, Chammock. Heuhedel, Stallkraut, Harnkraut, Ochsenbrech.

Suckow 362. Borkhausen 93. Pollich palat. II. 290. n. 670. v. Burgsdorf 250. Becker 78. Schrank - bavar. II. 249.

§. 404.

Mit stacheligen Zweigen.

Ein einheimisches Erdholz, das auf dürrer, öden Feldern wächst. Die Rinde ist an jungen Stengeln grün behaart, etwas flebrig. Sie liegen theils gestreckt, theils sind sie aufgerichtet, hart, rund, sperrig. Die ältern sind rothbraun. Ihre kleine Nebenzweige endigen sich in Stacheln. Die stiellosen Blätter stehen einzeln oder zu drey, sind eyrund, scharf gezahnt, auf beyden Flächen behaart. Die Nebenblättchen sind rundlich, gesägt, wollig. Die Blüten erscheinen in traubenförmigen Aehren. Die untern kommen von einem Blatt- und Deckblättchen unter-

terstützt, zu zwey, die obern einzeln, blos vom Blatt unter-  
stützt, auf kurzen, haarigen Stielen aus den Blätterach-  
seln. Die Schote ist fast eysförmig, bauchig, etwas flach,  
stumpf, fein behaart, etwas rauh, schwärzlich gelb.  
Die Saamen sind braungelb, glatt, dicklich, freisförmig,  
oben ausgerandet.

Ab. a) Mit weißlich purpurfarbiger Blume. Borkh. 94.  
b) mit blasrother Blume: c) mit weißer Blume.

Subsp. b) Unbewehrte A. S. O. inermis.

Synon. *Ononis mitis*, floribus subsessilibus solitariis,  
ramis inermibus. Linn. sp. plant. II. 1006. n. 2. *Anonis*  
*spinis carens*. C. Bauh. pin. 389. Thornless Rest-Har-  
row. Hanb.

Sudow 362. a. Borkhausen 94. Leers. 160. n. 558.

Ihre Zweige, die bey a) in der frühen Jugend nur  
haarförmig und kaum bemerkbar sind, sind in jedem Alter  
stachellos.

Ab. a) mit weißer b) rother c) purpurrother Blume.

Den Blüten fliegen die Bienen nach und die Blät-  
ter werden von den Schafen gefressen. Man kann nach  
Biborg die Hauhechel auch zur Dämpfung des Flugsan-  
des anwenden. Sie gehört auch unter die vorzüglichsten  
Farbgewächse.

Museo di Fisica. 147. Physiographiska Handlingar, Vol.  
I. 128. Fontanus in Analect. quæst. 12. p. 65.

§. 405.

Gatt. 33. Tamarix, Tamariske, Nadelholz.

Von dieser Gattung gehören hieher:

Art. 115. Deutsche T. T. germanica, Linn.

Synon. *Tamariscus germanicus*. Scopoli carn. I. 224.  
*Tamariscus germanica*, du Ham. II. 229. *Myrica sil-*  
*vestris*. II. Clus. hist. 40. *Tamarix fruticosa*, folio  
cras-



erassiore. C. Bauh. pin. 485. Tamariscus spicis foliosis. Hall. hist. n. 948. Le Tamariske d'Allemagne. German Tamarisk. Hanb. I. 195. Deutscher Tamariskenstrauch, Margrispelsstaude.

Suckow 148. Linn. sp. pl. I. 287. Borkhausen 356. Märter 195. Medicus botanische Beobachtungen 1782. 163. Du Roi II. 448.

Abbild. Jc plant. med. t. 170.

§. 406.

Mit zehn wechselseitig längern, auf einer gemeinschaftlichen, den Fruchtknoten umgebenden Scheide sitzenden, bis zur Hälfte verwachsenen Staubfäden.

Ein einheimischer, sommergrüner, ansehnlicher Strauch, der in verschiedenen Gegenden auf feuchtem, Ueberschwemmungen ausgesetzten, steinigem Boden, wächst. Die Nadelblätter gleichen denen von der Eypresse und fallen vor Winter ab. Sie sind blaulichgrün, saftig, die Zweige lang und gerade. Die Blüten erscheinen in gedrungenen Aehren, an den Spitzen der Zweige den ganzen Sommer hindurch. Einblütige Stiele stehen an den gemeinschaftlichen Stiele. Die Blumendecke ist fünfspaltig, die Kronenblätter (fünf) sind stumpf, röthlich, ein wenig behaart. Der Fruchtknoten endigt sich, ohne fernern Staubweg in eine köpfige, aus drey Warzen bestehende Narbe, und ist von einer Scheide umgeben, auf welchen die zehn bis zur Hälfte und in eine, bisweilen auch zwey Parthien verwachsene Staubfäden sitzen. Die Saamenkapsel ist länglicht zugespitzt, einsäckrig, springt bis zur Basis in drey lanzettförmige, spizige Schalen auf, und enthält viele kleine, mit einer Haarkrone versehene Saamen.

§. 407.

Die Rinde dieses Strauches kann zum Gerben gebraucht werden. Der Absud der belaubten Zweige giebt nach H. Suckows Versuchen, mit schicklichen Zusätzen, verschiedene schöne Farben. Man hat auch die Zweige an-

anstatt des Hopfens zum Bierbrauen genommen, und nach Pallas gebrauchen die Mongolen die Spitze der Zweige zum Thee. Für Lustpflanzungen ist endlich dieser Strauch sehr schicklich. Die Rinde ist officinell.

Borellus de Tamarisci et Filicis seminis motu praeditis et de eorum germine. in Hist. et Observ. Cent. III. 239. Cornette über die Salze aus der Asche der Tamarisken. Mem. de l'acad. roy. des Sc. a Paris. 1779. 497. Crells chym. Analen II. 53.

§. 408.

Gatt. 34. Cytisus (monadelphus) Cytisus. Laubholz. Die Blumendecke ist einblüttrig, glockenförmig, kurz, hat zwei Lippen, von denen die obere zwei gespalten und zugespitzt, die untere aber dreizählig ist. Schmetterlingsblume. Die Fahne ist eysförmig aufsteigend, an den Seiten zurückgebogen. Die Flügel haben die Länge der Fahne, sind gerade und stumpf, das Nachenblättchen ist etwas bauchig und zugespitzt. Staubfäden zehn mit einfachen Staubbeuteln. Der Fruchtknoten ist länglicht-eund, hat einen in die Höhe steigenden Staubweg mit stumpfer Narbe. Frucht eine längliche, stumpfe, steife, wenigsaamige, an der Basis schmälere Schote. Samen, nierenförmig, zusammengedrückt. Diese Gattung zerfällt in zwei Untergattungen

a) Mit in eine Parthie: b) mit in zwei Parthien verwachsenen Staubfäden, von denen hier blos die erstern angeführt werden.

§. 409.

Art. 116. Laburnen C. C. Laburnum.

Synon. Anagyris non foetida. C. Bauh. pin. 391. Cytisus racemis simplicibus, pendulis, foliis ovato-oblongis. Hall. hist. n. 360. L'Ambour, la fausse Ebene, The laburnum. Hanb. I. 115. Bohnenbaum, Kleebaum, Geisstaupe, Linsenbaum, falsches Ebenholz, Alpenebenholz.

Du Roi I. 205. Miller. I. 960. n. 1. Schrank. II. 265. Medicus Beytr. zur schönen Gartenkunst 320. Mönchs Verzeichniß 36. Suclow 410. Märter 129. Borkhausen 72. Borrowöfns Almanach 187. Linn. Sp. pl. ed. 3. II. 1041. Scopoli carn. II. 68. n. 903. Manetti in Griselini Giornale d'Italia. T. X.

Abbild. Kerner I. t. 71.

§. 410.

**Blütenstand:** hängende Trauben. **Blätter:** aus drey, eyrund länglichen Blättchen zusammengesetzt.

Die größte Art dieser Gattung. Die Rinde ist glatt, am Stamme bräunlichgrau, an den jüngern Aesten und Zweigen grasgrün. Die Blätter stehen an langen Stielen, sind aus drey, eyrund länglichen, stumpfen, an der Spitze mit einem kleinen Stachelchen, am Rande mit feinen, weislichen Härchen gefranzten, oben hellgrünen, unten matt und blaulichen grünen Blättchen zusammengesetzt. Man findet sie an einem und eben demselben Zweige von verschiedener Länge und Breite. Die Blüten stehen in längern oder kürzern Trauben, auf abwechselnden oder entgegen gesetzten Stielen. Der Blütenstiel und die Blütenstielchen sind mit einer sehr feinen Wolle bekleidet. Blütezeit, May. Die Blumendecke ist gelblichgrün, feinwollig, die Blume schön hellgelb. Die Fahne ist breit und etwas ausgerandet, die Flügel sind so groß als die Fahne und zugerundet, das Nachenblättchen ist zweyblättrig und kleiner als die Flügel. Die Schoten sind aschgrau, zusammengedrückt, haarig, reifen im Junius.

Man findet ihn von höhern oder niedrigeren Wuchs, von längern und breitem, oder kürzern und schmählern Blättern, von längern oder kürzern Blüentrauben, von hellerem oder dunklerem Laub, nach dem Stand und Boden den er genießt, und da diese Eigenschaften sich nicht forterben; so kann man auch diese Sorten für nichts anders als Spielarten gelten lassen.

Das



Das schöne fleuartige Laub, die herrliche Krone, die zahlreichen, unbeschreiblich schönen, hängenden Blütentrauben und der schnelle Wuchs dieses Baumes haben ihn schon längst den Ruf eines der ersten Verzierungs-bäume für Lustpflanzungen erworben. In Rücksicht des Bodens ist er sehr genügsam. Das Stammholz ist schön gelblich, bey ältern Bäumen mit schwarzen Adern durchzogen und so hart, daß es dem Ebenholze nichts nachgiebt. Die Mechaniker schätzen es sehr hoch und verfertigen allerley musikalische Instrumente und andre Fabrikate daraus, welche fest, schön und dauerhaft seyn sollen. Aus dem stärkern Holze werden Stühle, Tische, Bänke und Bettstellen verfertigt, die eine schöne Politur annehmen. Das Laub kann zwar dem Vieh gefüttert werden, allein es wäre sehr unökonomisch gedacht, einen so schönen Baum auf diese Art mißhandeln zu wollen.

Switzer diss. on the Cytisus of the antients. London 1731.

§. 411.

Art. 117. Oestreichischer C. C. austriacus Linn.

Le Cytille d'Autriche. Tartarian Cytisus. Hanb.

1. 115. Immergrüner C. tartarischer C.

Sudow 412. n. 7. Mönch 38. Miller n. 8. Mawe n. 5. Linn. gen. pl. Ert. 1778. III. 484. Pfl. Enst. IV. 250. Schrank. II. 267.

§. 412.

Mit lanzettförmigen Blättern, dichten, doldenförmigen Blütenköpfen an den Enden der Zweige.

Der Stamm wächst strauchartig, und theilt sich bald über den Boden in viele, mit einer grünlichen Rinde bekleidete Zweige, die eine buschige, dichtbelaubte Krone bilden. Die immergrünen Blätter sind glatt, lanzettförmig, weißlichgrün. Die Blüten erscheinen in dichten, doldenförmigen Köpfen an den Enden der Zweige. Unter jedem Köpfchen findet sich ein Büschel Blätter. Man hat zwey Abarten davon. Ein ganz brauchbares Farb-Gewächs.

## §. 413.

Art. 118. Schwärzlicher C. *C. nigricans*.

*Synon.* Cytisus IV. Clus. hist. 95. Cytisus glabris foliis subrotundis, pediculis brevissimis et Cytisus glaber nigricans. C. Bauh. pin. 390. Cytisus foliis ovatis nitidis, floribus spicatis cernuis, calycibus et siliquis sericeis. Hall. hist. n. 361. Cytisus glaber nigricans. du Ham. l. c. Le Cytise noir. Black Cytisus. Hanb. l. c. Zwerggeißlee.

Suckow 411. n. 3. Märter 190. Schrank. II. 266. Mönch 37.

Abbild. Cord. hist. 188.

## §. 414.

Mit einfachen, aufrechtstehenden Blüentrauben, eyrund länglichen, zu drey beysammenstehenden Blättchen.

Ein niedriger Strauch. Die Rinde des Stammes ist bräunlich, der jungen Schüsse grünlichroth. Die zu drey beysammen stehenden Blättchen sind eyrund länglich, glattrandig, oben glatt und unten kaum merklich behaart. Das mittellste Blättchen ist das größte. Die Blattstiele sind bräunlich. Die Blüten erscheinen in langen, einfachen, aufrecht stehenden Trauben an den Spizen der Zweige zu Anfang des Junius. Die Blüthen sind kurz gestielt, niederwärts hängend, die Blumen schön gelb und riechen stark nach Honig. Die Schoten sind flach gedrückt, etwas zugespitzt, schwärzlich. Wegen seiner langen, biegsamen Schüsse schickt er sich in Hecken. Ehrhard VI. 55.

## §. 415.

b. In zwey Parthien verwachsene Staubfäden.

Gatt. 35. Ulex. Stechginster. Laubholz.

Von dieser Gattung ist bis jetzt nur folgende einzige Art, von der es aber verschiedene Halb- und Abarten giebt, bekannt.

Art.

Art. 119. Europäischer St. G. U. europaeus. Linn.

*Synon.* Genista spartium majus aculeis brevioribus et longioribus du Ham. I. 189. Le genet epineux, Ioncmarin, Ajonc, Landes, Brusque gruet, Drogne, Jean, Ludwig. 52. Forze, Whins, Gorse, Prickly Broom. Hanb. I. 247. Europäischer Ulex, stachelicher Ginster, Scorpionkraut, europäischer Hecksamen, Stechginster, Heideginster.

Eudow 409. H. Youngs becon. Reisen durch England. III. 130. Museum rusticum II. 126. 301. III. 215 VI. 18. Kalm's Reisen I. 214. v. Münchhausen V. 348. Forstmagazin V. 239. Münchs Verzeichniss 136.

Abbild. Young l. c. III. t. 1. f. 3.

#### §. 416.

Dieser Strauch ist zwar keine immergrüne Holzart, da seine Blätter alle Frühjahr neu ausbrechen; er wird jedoch unter die immergrünen Sträucher von einigen gerechnet, weil seine zahlreichen jungen Zweige, Schüsse und Stacheln beständig grün bleiben, und also ein immergrünes Ansehen haben. Der Stamm ist stark, holzig, hart, aufrecht, vier, fünf, sechs, acht Fus hoch, ästig, buschig und mit einer weißlichbraunen Rinde bekleidet. Die Schüsse und Zweige sind grün, gestreift, biegsam, mit zahlreichen, starken, grünen, zerstreuten Stacheln dicht besetzt. Die Blätter sind rauh, spizig, klein, sparsam, fallen zeitig ab. Die Blüten erscheinen entlang der Zweige in zahlreicher Menge im April und März. Die Blumendecke ist zweyblättrig. Das obere Blättchen ist zwey- das untere dreyzahnig. Die Blume ist eine schöne, große, goldgelbe Schmetterlingsblume, die ihren Geruch in einer beträchtlichen Entfernung umher verbreitet und mit einer blas- oder weißlichgelben Farbe verblüht. Von den zehn Staubfäden sind neun verwachsen und einer steht frey. Der Fruchtknoten ist rauh. Die Schoten sind länglich, gerade, aufgeschwollen, wenigsaamig, kaum länger als die Blumendecke.

In



In Gärten bedient man sich der abgeschnittenen Zweige zur Beschützung zärtlicher Pflanzen gegen schneidende Winde. Man hat diesen Strauch auch zu Hecken empfohlen. Inzwischen werden dergleichen Hecken, weil sie mit der Zeit Lücken bekommen, und am Fuße nackt werden, nicht sonderlich geachtet. Allgemein wird er in die Lustgärten auch nicht aufgenommen, weil er gar leicht große Plätze überwächst. In Frankreich und England, wo die Stämme ziemlich stark werden, benützt man diesen Strauch auch zur Feuerung. In England hat man Versuche gemacht, ihn dem Vieh zu füttern. Die Zweige werden zu dieser Absicht auf Mühlen mit senkrechten Steinen (wie bey der Gypsmühle in Schubarts von Kleefeld Schriften) zerquetscht. Dieses Futter sollen die Pferde lieber als Körner fressen, und so lange sie es erhalten, weder Haber noch Heu anrühren. Es ist eine gesunde, ökonomische Fütterung, bey welcher aller Haber und neun Zehntel Heu erspart wird. Gegen unsern Winter ist dieser Strauch etwas zärtlich.

Euckow bl. Bot. 325. Jungs Versuch eines Lehrbuchs der Landwirthschaft 62. Riems Prodrömüs 41. Belmann Landwirthschaft ed. 3. 195. Der Volkslehrer 185. 189. Wark. Nachricht vom Nutzen des Stechginsters in Befestigung der Flußufer, aus den philos. transact. Vol. 52. P. I. S. 1. mit Zusätzen, im Wittenb. Wochenblatt Vol. VI. 339. Gebrauch des flachlichen Genss in Bedämmung der Flußufer, phil. Transf. n. 56. Brem. Mag. Vol. VII. 479. H. Forster (S. dessen Reise um die Welt. Vol. II. S. 449.) fand ihn auf der Insel St Helena, wo er über alle Weiden fortgewuchert hat. Indessen, sagt dieser Gelehrte, hat man Mittel gefunden, dieses Gewächs, welches unsre Landleute mit großer Mühe als unbrauchbar und schädlich auszurotten suchten, und das hier angepflanzt worden ist, zu nutzen. Der Anblick dieses Landes ist nicht immer so reizend gewesen, indem der Boden vor Zeiten von der entsetzlichen Hitze ganz verbrannt war und Gras und Kräuter nur kümmerlich fortkommen ließ. Allein die eingeführten Ginsterstauden wucherten, der Sonne zum Trost, fort und erhielten den Boden etwas feucht. In ihrem Schatten fieng nun an Gras zu wachsen, und nach und nach ist

Ist das ganze Land mit dem schönsten Kasten überzogen worden. Unjeho bedarf man der Ginsten nicht weiter, sondern man giebt sich große Mühe, sie auszurotten und bedient sich derselben als Brennholz, welches auf der Insel sehr selten ist.

## §. 417.

Gatt. 36. Robinia, Robinie. Laubholz.

Die Blumendecke ist einblättrig, kropfförmig, vierzahnig. Schmetterlingsblume. Staubfäden, zehn, von denen neun verwachsen sind und einer frey steht. Staubbeutel, rundlich. Staubweeg, einer, fadenförmig, über sich gebogen, mit haariger Narbe. Frucht, eine lange, höckerige, zusammengedrückte Schote. Samen, nierenförmig.

## §. 418.

Art. 120. Acacienbaum. R. Pseudoacacia.

Synon. Pseudoacacia. Du Ham. II. 147. Acacia americana filiquis glabris. Razi hist. 179. Le faux Acacia. Falsche Acacia. Hanb. I. 171. Gemeine Robinie, falsche Acacia, virginischer Schotendorn, amerikanischer Schotendorn, unächter Acacienbaum, wohlriechender Heuschreckenbaum, Courbaril, Süßholzbaum.

Sudow 413. Borkhausen 74. Medicus bot. Beob. 1782. 362. Du Roi II. 320. Märker 74. v. Wangenheim 15. Marschal 260. Schrank. II. 270.

Abbild. v. Wangenheim F. XIX.

## §. 419.

Mit hängenden Blüentrauben, Stacheln in den Winkeln der Zweige, ungleich gefiederten Blättern.

Waterland: Virginien. Ein sommergrüner Baum, der Bauholz Höhe und Stärke erlangt. Die Rinde ist am Stamme rissig und braungrau, an den jungen Zweigen glatt und grün. In den Winkeln von diesen sitzen zwey, drey, unten breite und sehr spizige Stacheln, welche abfallen, wenn die Aeste stärker werden. Dieser Baum wächst so schnell, daß er schon mit zehn Jahren  
mehr

mehr Holz liefert, als eine dreissigjährige Eiche. Die Blüten erscheinen in langen, hängenden Trauben im Jun. drey Wochen hindurch, und verbreiten, besonders des Abends ihren pomeranzenblütigen Duft weit umher. Die weissen Blumen sitzen an einblütigen Stielen. Die Fahne ist gross, offen, oben herzförmig eingeschnitten. Die Flügel sind länglich, eysförmig, frey, sind mit einem langen Nagel eingelenkt und haben auf der innern Seite einen stumpfen Ansat. Das Schiffchen ist zweyblättrig, zusammengedrückt, stumpf, halbkreisförmig und in der Länge den Flügeln gleich. Der Fruchtknoten ist länglicht cylindrisch, hat einen fadenförmigen, über sich gebogenen Staubweg mit einer haarigen Narbe. Die Staubfäden erheben sich, indem sie sich abwärts krümmen. Der oberste Zahn der Blumendecke ist noch einmahl so breit, als die drey andern, und kaum ausgerandet. Die Schote wird zwey, drey Zoll lang, ein, bis ein und einen halben Zoll breit, ist zweyschaalig, höckerig, zusammengedrückt. Die Blätter sind ungleich gefiedert, aus neun bis funfzehn eyrunden, glattrandigen, kurzgestielten Blättchen, welche einander gegenüber stehen, an der stumpfen Spitze mit einem Stachelchen, oben hell - unten blaulichgrün, und an der Basis des Stielchens mit einem feinen, pfriemenförmigen, sehr hinfälligen Nebenblättchen versehen sind, zusammengesetzt. Sie brechen etwas spät (hier in der Mitte des Mayes) aus, schließen sich bey Nacht, öffnen sich am Morgen, wenn der Tag seine gewöhnliche Helle hat, und bleiben bey bedecktem Himmel und Regenwetter oft lange geschlossen. Im Herbst fallen sie schon nach dem ersten Frost ab. Die Aeste und Zweige sind sehr zerbrechlich und im freyen Stande den Windbrüchen sehr ausgesetzt. Eine Pfahlwurzel treibt dieser Baum nicht, aber starke, sich weit ausbreitende Nebenwurzeln, die im lockern Grunde ein bis zwey Fuß tief unter der Dammerde weglaufen, und den über ihnen stehenden Gewächsen nicht schaden.



## §. 420.

Unter den aus Nordamerika zu uns herüber gekommenen, schäßbaren Holzarten ist dieser Baum ohnstreitig der allerschäßbarste. Kein Baum besitzt in einem so hohen Grade die Eigenschaft, nach abgehauenem Stamme, Wurzelstöcken zu treiben. Sein Holz ist eines der härtesten und festesten, schwer zu bearbeiten, hellgelb, oft mit schmalen, purpurfarbigen Adern durchzogen, und nimmt eine schöne Politur an. Es ist weder der Fäulnis noch dem Wurmsfraß unterworfen. Nach dem austrocknen wird es außerordentlich hart. Man verfertigt Stühle, Tische, Schränke und anderes Hausgeräthe daraus, dessen Farbe mit den Jahren immer schöner wird. Das Zimmerholz taugt zu Schwellen, Röhren, zum Gruben-Wehr- und Schleusenbaue, zu Bauholz in den untern Stockwerken, Pfosten, Fußböden, Treppen, Fensterstöcken und die Abfälle dienen zur Feuerung. Als Brennholz übertrifft es an Güte alle unsre Holzarten, selbst das rothbuchene Holz. Man hat in Harbke mit beiden Holzarten Versuche angestellt, da die außerordentliche Hitze eines Backofens, den man mit diesem Holze geheizt hatte, den Anwesenden auffiel und ihr Urtheil für das Holz des Acacienbaumes entschied. Wo Holzmangel herrscht, oder wo er einzureissen droht, in der Nähe von Schmelz- und Hüttenwerken und andrer Holz und Kohlen fressender Fabriken, kommt kein Baum diesem an schneller und ergiebiger Benutzung bey: denn die daraus gebrannten Kohlen feuern weit heftiger und sind weit vorzüglicher, als alle andre, aus unsern einheimischen Holzarten gebrannte Kohlen.

Medicus über das sicherste Mittel, dem Brandholz-Mangel abzuhelfen. Mannheim 1791. Munds landw. Magazin II. Jahrg. IV. S. St. 183. S. Ehrhards Beiträge IV. 78. Borrowsky's Almanach S. 185. Bohadsch Vorschlag, wie dem Königreiche Böhmen ein ungemeiner Vortheil durch den Gebrauch des Acacienbaumes zuwachsen möchte. Zweyte Auflage. Prag 1761. 4. m. R. M. W. Reinhard nouveau traité  
sur

sur l'arbre nommé Acacia. a. Bourdeaux 1762. 8. Neue Ab-  
handlung von dem Baume Acacia. Carlruhe 1766. 8. Ab-  
handlung von dem Baume Acacia, Forst-Mag IX. 128. VII.  
20. Vom Acacienbaume und dessen Wartung. Giornale d'Ita-  
lia. T. X. Krünitz Encycl. I. 193. Münchs Verzeichniß 1079  
110. Miller III. 843. Hirschfelds Gartenkalender auf 1787.  
S. 184.

## §. 421.

Man kann Gartenwände und Hecken (in einem ma-  
gern Boden) von dieser Holzart anlegen, die Bäume zu  
Köpfen einrichten, oder zu Schlag- und Bauholz benutzen.  
Das Köpfen, welches alle drey oder vier Jahre, hoch oder  
niedrig, nach der letzten Absicht, die man mit dem Stam-  
me vor hat, vorgenommen werden kann, schadet den  
Bäumen selbst nichts. Sie werden dadurch stärker und  
schon nach zehn bis zwölf Jahren kann man aus den  
Stämmen Bretter schneiden. Dieß ist auch das Alter  
der Haubarkeit des Schlagholzes. Als Zimmerholz fällt  
man die Bäume mit vierzig bis funfzig Jahren. Gegen-  
den die Weinbau treiben, sollten sich besonders auf die  
Anzucht dieses Baumes legen, der die besten Weinpfeile  
liefert. Man kann zu dieser Absicht besondere Pflanzungen  
anlegen, und sie alle drey Jahre an der Wurzel abtreiben.  
Wenn man Baumholz erwartet, muß der Boden gut,  
mit vieler nahrhafter Dammerde vermischt seyn und eine  
frische, warme, gegen Winde gesicherte Lage genießen.  
Der Baum läßt sich jung sehr gut verpflanzen. Da aber  
die im Herbst versetzten Acacien vom Froste zu leiden pfe-  
gen, so wird am besten der Frühling zur Pflanzzeit ge-  
wählt.

## §. 422.

Art. 121. Sibirische Robinie. R. Caragana. Linn.

Synon. Robinia altagana-Pallas. ross. I. I. 161.  
Pseudoacacia foliorum pinnis crebrioribus. du Ham. II.  
148. n. 3. Robinia sibirica. La Caragana de Siberie.  
Caragana. Hanb. I. 172. Sibirischer Erbsenstrauch,  
Cara-

Caragane, sibirischer Erbsenbaum, sibirische Robinie, Taubenerbsen.

Sudow 414. Du Roi II. 387. Medicus in den Ehurpfälz. Bemerk. 1774. 171. Miller n. 11. Münchs Verzeichniss 110. Worchhausen 81.

§. 423.

Mit einblütigen Stielen, büschelweise stehenden Blüten, abgebrochen gefiederten Blättern.

Waterland: Sibirien. Ein sommergrüner, ganzer Strauch, der äusserst dauerhaft und unempfindlich gegen die Kälte ist. Die Rinde ist am Stamme braun, und nur wenig rissig, an den Zweigen grüngelb. Die Blätter sind abgebrochen gefiedert. Die Blättchen sind klein, etwas herzförmig zugespitzt, glattrandig, oben hell- unten mattgrün, statt des ungleichen Blättchens am Ende des Blattstieles findet sich ein Stachelgen. An der Spitze der Blättchen sieht man gleichfalls eines, und die Stelle der Nebenblättchen vertritt nicht minder ein Stachelchen. Die Blüten erscheinen an den Knospen des vorigen Jahrs auf einzelnen Stielen und in Büscheln im Jun. Die Blumen sind gelb, geruchlos, die Fahne ist weniger tief eingeschnitten, als an der vorhergehenden Art.

§. 424.

Man hat ehemahls diese Holzart wegen vieler Eigenschaften, die sie haben sollte, aber nach neuern Erfahrungen nicht besitzt, empfohlen. Daß sie im magersten, trocknen Boden gedeiht, ist gewiß, aber sie wird auch nie mehr, als ein hoher Strauch. Ihr wichtigster Vortheil mag wohl der seyn, daß sie dem, der seine magern Sandäcker, die er nicht zu düngen und zu bestellen vermag, durch ihren Anbau einigen Vortheil gewährt. Der Bast soll, wenn man ihn wie Flachs behandelt, ein gutes Gespinnste geben.

Bielke Arbor sibirica pisifera f. Robinia in den schwed. akad. Abh. 1750. 125. Forstmagazin VI. 158. Ekleben de Acacia sibirica in den Petersb. dt. Abh. I. 45. v. Grafenried von der



*Robinia sibirica* in den Samml. der Berner öf. Gesellsch. Jahrg. IV. St. II. S. 97. Klein in den Abhandlungen der berliner Gesellschaft naturforschender Freunde II. 299. Hermerzhäusen V. 306. Ehrhards Beiträge V. 172.

## II. Unter-Klasse.

### Halbgetrenntes Geschlecht.

#### a) unverwachsene Staubfäden.

§. 425.

Gatt. 37. *Betula*. Birke. Laubholz, sommergr.

Männliche und weibliche Blüten auf einem Baume. Blütenstand: Kößchen. Männliche Blüten: Walzenförmige, schuppige Kößchen, die schon im Herbst erscheinen. Die Blütchen stehen zu drey beisammen an der innern Fläche einer gemeinschaftlichen Schuppe befestigt. Staubfäden, vier bis fünf von gleicher Länge. Blume, einblättrig, drey bis vierspaltig, offen. Weibliche Blüten, schuppige Kößchen, kleiner als jene, mehr aufwärts stehend. Die Blütchen stehen zu zwey beisammen. Blume, unmerklich — oder ganz abwesend. Staubweege, zwey, federartig, mit einfachen Narben. Frucht, schuppige, vielsaamige Kößchen. Saamen: eckig, zusammengedrückt, mit einem häutigen Flügel versehen.

§. 426.

#### A. Untergattung.

*Betula*. Birke.

Der Saamenkern ist mit einem Flügelhäutchen umgeben.

Art. 122. Weisbirke. *B. alba*. Linn.

Synon. *Betula*. C. Bauh. pin. 423. Schwenkf. Cat. filif. 30. *Betula foliis cordato-lanceolatis, serratis*. Hall. hist. n. 1628. Le Bouleau. The common Birch-tree

Bir

Birke, Birkbaum, Berke, rothe Birke, Wasserbirke, Mepe, Mutterbirke, Mayenbaum, Bunnebaum, Pfingstmaye.

Linn. sp. pl. II. 193. Pollich. palat. II. 601. n. 898. Scopoli carn. II. 232. n. 1171. Pallas ross. I. Schrank. bavar. I. 417. Sudow 69. n. 1. Gleditsch I. 407. n. 26. Leonhardt 87. v. Burgsdorf 150. Borkhausen 96. Märter 26. Becker 34. v. Santhiers vermischte Bemerkungen 65. Ehrhard V. 53. VI. 39. Du Roi I. 83. Du Hamel I. 74. Krünitz dt. Enc. V. 330. Forstmagazin I. 218. E. Camerarius diff. de betula. Tub. 1727. 4. C. Linnæi diff. de Betula. Holm. 1743. 4. auch in dessen Amoenit. acad. Vol. I. p. 1. übersetzt in dessen auerlesenen Abhandlungen Vol. III. n. 8. Kalm Oefwer Biörkens egenskaper och nytta. Abo 1759. 4. Kalm diff. Om amecikanska näsverbötar. Abo 1753. 4. Gagnebergi descriptio betulæ nanæ in act. helvet. Vol. I. 58. Oekonomische Beschreibung der Eigenschaften und des Nutzens der Birke in Schrebers neuen Cameralschriften. VIII. 22. 5. S. 154. Von der Nutzbarkeit des Birkenbaums in H. Hagens chem. phys. Abhandl. Königsb. 1778. n. 7. Handver. Magazin 1779. S. 859. Handver. gel. Anzeigen 1754. 219. Breslauer Natur- und Kunstgeschichte 3.1. Vers. S. 525.

Abbild. Linnæi diff. de betula. Holm. 1743. M. R. Ebend. Amoen. acad. I. M. R. Eramer t. 10. Delhafen II. 20. 21.

S. 427.

Mit eyrund scharf zugespizten, sägenartig gezahnten Blättern.

Ein einheimischer, sommergrüner Laubbaum der ersten Größe. Alter der Vollkommenheit, vierzig Jahre. Er hat wenige Wurzeln, und auch diese sind nicht stark, so daß sie andern, neben diesem Baume stehenden Gewächsen, die Nahrung nicht entziehen. Die Stammrinde besteht aus verschiedenen Lagen. Die äussere ist ein dünnes, weisses, zähes Oberhäutchen, das fast unverweslich ist. Darunter liegt eine etwas stärkere, weisse, unten röthliche, ins grüne spielende Rindenlage, die sich leicht absondern läßt. Beide lassen sich in viele Schichten zertheilen. Auf jene zwey Lagen folgt eine ziemlich

Q 2

dicke,

dicke, rothbräunliche, feste holzige Rinde. Die Zweige bleiben dünne, sind biegsam, mit einer glatten, braunen, weispunktirten Rinde bekleidet, hängen bey der Hangelbirke zur Erde, wie an der babylonischen Weide. Die Blätter stehen abwechselnd an glatten, oben gefurchten Stielen, sind herzförmig, scharf zugespitzt, mit unter manche ein wenig stumpf, am Rande hie und da eingeschnitten und mit ungleichen, eiförmigen, scharfen Zähnen rund um gesägt, glatt, glänzend, wohlriechend, auf der untern Fläche mit einem weißlichen Netze durchzogen, bey'm Ausbruch flebrig. Die männlichen Blütenfäzchen sind größer als die weiblichen, sehen bey der Befruchtungszeit gelb, die weiblichen kleinern aber grün aus. Jene kommen schon im Herbst, nachdem die Blätter abgefallen sind, hervor. Sie erscheinen an den äussersten Spitzen der zartesten Zweige, aus eignen Knospen, und sehen anfänglich bräunlich aus. Die weiblichen kommen aus den Blätter-Knospen, stehen aufwärts und sehen anfänglich röthlich aus. Sie brechen mit den Blättern zugleich hervor. Der Saame sieht bräunlich aus, ist sehr fein und geflügelt. Das Holz ist zähe und fest, mehr oder weniger nach dem Standorte dieser Bäume. Auf alten Stämmen findet man häufig Schwämme.

J. 428.

- Halb. a) Sommerbirke. Sie blüht früher und bringt schon im Jul. ihren, nach vorsichtig angestellten Versuchen reifen und zum Aufgehen tüchtig befundenen Saamen.
- b) Winterbirke. Ihr Saame erlangt seine Reife erst zu Ende des Septembers, und fliegt öfters erst auf den Schnee ab.
- c) Maserbirke. Vielleicht nur eine Abart. Sie wächst auf hochliegenden Hügeln, hat von der Wurzel an einige Ellen hoch eine grobe, höckerige Rinde. Den Maser selbst unterscheidet man in den von den Wurzeln, dem



dem Stamme und den Aesten. An einigen Bäumen findet man oft so große Gewächse, daß die größten Gefäße daraus gemacht werden können.

d) Hangelbirke. Vielleicht eine Abart. Das Holz ist bräunlich, die Blätter sind kleiner, bitterer, und das Vieh frist sie nicht. Die Zweige hängen nieder.

e) Brockenbirke. Die Blätter sind kleiner, dunkelgrüner, weniger glänzend, auf der untern Fläche mehr rothfarbig grün. Die Rinde ist schwärzlich. Sie bleibt ganz niedrig.

v. Zanthier 80. Ehrhard VI. 99. B. pubescens Ehrh.

f) Waldbirke. In Nord-Europa. Sie wird groß, stark, hat ein hartes, braunes Holz, unterscheidet sich besonders durch ihr Laub.

v. Zanthier 85

### §. 429.

Die Birke gehört unter unsre nuzbarsten Bäume, ob sie gleich in vielen Gegenden, weil sie eine einheimische Holzart, sehr allgemein ist und auch auf unfruchtbaren Boden häufig wächst, verkannt wird. Wegen ihrer biegsamen Zweige verdient sie eine Stelle unter den Hopfenbäumen, besonders dient die Hangelbirke zu dieser Absicht. Sie schickt sich sehr gut auf die Blößen, welche in den Forsten durch Nachlässigkeit entstanden sind, verbessert sogar den Boden durch ihre natürlichen Abgänge, wird dadurch das erste Mittel ausgehungerten Blößen die nöthige Dammerden-Schicht wieder zu geben, wodurch sie zur Annahme edlerer Holzarten fähig gemacht werden, weswegen sie in sandigen, unfruchtbaren Heidegegenden auf ganz kahl abgetriebnen Bergen, wo keine andre Holzart gedeihen will, fleißiger angebaut zu werden verdiente. Man hat magre Wiesen und Aecker, die als solche keinen Vortheil brachten, mit Birken bepflanzt, wo sie sehr gut fort kamen, und die Holzernde so reichlich war, daß ein solches Feld, wenn es bis zur Abholzung alle Jahre die

beste Kornernde geliefert hätte, sich doch nie so verinteressirt haben würde.

Hausvater IV. 240. v. Burgsdorf 153. 460. v. Zanthier 75.

§. 430.

Wegen des Baues ihrer Wurzeln und ihrer dünnen Krone sind die Birken auch andern Holzarten, unter denen sie stehen, nicht nachtheilig. Es ist eine alte bekannte Erfahrung, daß Eichen, Rothbuchen und andere Holzarten mehr (ja es gilt beynahe von allen) allein gesäet oder gepflanzt, bey weitem den schnellen Wuchs nicht zeigen, den man wahrnimmt, wenn man mehrere untereinander, die sich in Ansehung ihrer Natur und zu erwartenden Benützung mit einander vertragen, unter einander anbaut. Zu allen diesen Mischungen sind die Birken besonders brauchbar, schicken sich unter die meisten Holzarten und belohnen die auf ihre Anzucht gewandte Mühe und Kosten reichlich. Ja die Birke ist denjenigen Gegenden, welchen Brennholz-mangel droht, oder wo er sich bereits äußert, wegen ihrer Schnellwüchsigkeit, wegen der Güte ihres Holzes zur Feuerung und weil sie mit dem schlechtesten Boden vorlieb nimmt, wenn er nur nicht ganz dürr und fliegend ist, nicht genug zu empfehlen.

v. Burgsdorf 152. 460. Maurer Betrachtungen über einige sich neuerlich in die Forstwissenschaft eingeschlichene, irrige Lehrsätze und Künsteleyen. Leipzig 1783. S. 112—114.

§. 431.

Als Bauholz werden gewöhnlich diejenigen Birken benützt, die unter dem Nadelholze stehen und zu dieser Absicht einzeln ausgehauen. Das Werkholz, das man von solchen Bäumen erhält, ist nach Alter, Grund und dessen Lage verschieden, am Stammende aber allezeit härter und schwerer als am Topfende. Es behält seine Feuchtigkeits lange bey sich, zieht auch neue wieder an, wenn es auch schon trocken gewesen ist. In manchen Gegenden nehmen die Leute in Ermanglung eines bessern Zimmerholzes

zes, das Birkenholz zu ihren Wirthschaftsgebäuden, und wenn diese gut unter Dach stehen, dauert es ziemlich lange, in der freyen Luft aber wird es leicht zerstört. Es würde auch im trocknen länger dauern, wenn es nicht mit der Zeit von Würmern sehr angegriffen würde, gegen welche man vielleicht die Balken durch auslaugen oder räuchern sichern könnte. Man findet öfters in Bauernhäusern bey Fachwerken die Stäcken von Birken- oder Erleholz, und weil sie mit Leimen bekleidet sind, bleiben sie ganz frey vom Wurmschich. Ein mäßiger Ueberzug, welcher die Balken gegen den freyen Zugang der Luft sicherte, würde sie also auch weit dauerhafter machen.

## §. 432.

Als Werk- und Nutzholz hat Birkenholz mancherley Gebrauch. Sieb- und Korbmacher verarbeiten es überaus gerne. Man verfertigt daraus Joche, Stühle, Mülden, Schlittenkufen, Felchen, Milchbutten, Schlagrinne für Hüttenwerke, Bergtröge, Leiter- und Karrenbäume, Deichseln und andre Wagen- und Pflugstücke. Es wird überhaupt gern zu Maschinen genommen, welche Schlag und Stoß aushalten sollen, und nicht brechen. Man muß aber von allem Werk- und Nutzholz die Rinde bald, wiewohl nicht ganz, sondern nur fleckweise abbringen. Denn wenn das Holz in der Rinde bleibt, fängt es bald an zu stocken, es mag so fest seyn, als es will, schält man es aber ganz ab, so reißt es von der Luft und Sonne gern auf. Zu Radzähnen und Drillingen bedienen sich auch die Müller in Ermanglung eines härtern, zähern Holzes, des trocknen und zähen Birkenholzes, welches, ehe man es einsägt, gut warm gemacht, und mit heißem Talg eingetränkt wird, wodurch es der Abnußung länger widersteht. Die Abgänge vom Baumholze dienen zum brennen und verkohlen und die Rinde kann mit Nutzen für die Lothgerber geschält werden.



## §. 433.

Dreher und Tischler suchen besonders das Holz der Maserbirke. Man kann die Masern derselben ohne Beschädigung des Baumes ausschauen, ja sogar durch die Kunst zuwege bringen. Die daraus gefertigten Arbeiten werden wegen ihres guten Ansehens, und um ihrer, mit Leichtigkeit verbundenen Dauerhaftigkeit willen, sehr gesucht. Man liebt besonders die daraus gefertigten Pfeifenköpfe, weil sie nicht leicht aufspringen, noch, wenn sie fallen, Schaden nehmen. Mit Dosen, Schaa-len und andern daraus gefertigten Geräthschaften ist es eben so. In Rußland werden aus den Birkenmasern (die aber feiner gekrauset seyn sollen, als die unsrigen) kleine Schaa-len, Löffel und anderes kleines Hausgeräthe so dünne ausgearbeitet, daß sie durchscheinen und biegsam werden. Die Dreher wissen daselbst auch, weil die Masern so theuer bezahlt werden, mit denselben so wirthschaftlich umzugehen, daß sie ein Gefäß aus dem andern drehen, und die abfallenden Spähne zur Auslegung kleiner Kästchen anwenden.

v. Strahlenberg Beschreibung des russischen Reichs. Stockholm (eigentlich Leipzig) 1730. V. 385.

## §. 434.

Als Schlagholz von zwanzigjährigem Alter giebt die Birke ein gutes Brenn- und Kohlholz, ausserdem auch Leiterbäume, Deichseln, andres Geschirrh Holz, Reissstäbe für lustige Wein- und Bierkeller und Brauhäus-Geschirr. Wir nehmen davon eines unsrer besten Brennholzer, welches leicht und hell brennt und eine starke Hitze giebt. Es kann in Oefen, Backöfen, Caminen, Brauhäusern, Ziegeleyen mit Nutzen gebrannt werden, weil es viele Flamme giebt und lange anhält, wenn es wohl getrocknet ist. Da es aber leicht stockt, muß man sich wegen seiner Vorräthe genau hiernach richten, es nicht lange in der Rinde noch in großen Haufen oder an feuchten Orten liegen lassen, sondern es bald spalten und an einem trocknen, luftigen

tigen Ort aufbewahren, weil es widrigenfalls leicht stockt, mit Schwämmen überzogen wird, und viel von seiner Güte verliert.

### §. 435.

Zu Kohlen ist es ganz vorzüglich. Nach gemachten Erfahrungen sind die aus Birkenholz gebrannten Kohlen wegen ihrer Dichtigkeit und weil sie ein starkes, beständiges, gleiches Feuer geben, zum schmelzen, auch bey einigen Fabriken und bey chemischen Prozessen, vorzüglich brauchbar, da besonders auch ihr Dampf weder stark noch schädlich ist. Ist das Holz reif und gesund, so erhält man eine große Menge Kohlen. Man hat durch genaue Berechnung gefunden, daß von einem Centner Birkenholze zwanzig bis fünf und zwanzig Pfund Kohlen erhalten werden können. Es kann also einem Landwirth, der sich auf die Birkenzucht legt, nicht leicht an Absatz des Holzes fehlen.

### §. 436.

Selbst Ruß und Asche, die man bey dem Verbrennen des Birkenholzes erhält, sind brauchbar. Der Ruß ist zur Buchdruckerfarbe der beste. Die Asche dient zur Verfärbung der Pottasche so gut, als die Asche von hartem Holz. Dunkel angelaufene Fensterscheiben lassen sich mit trockner Birkenasche am besten reinigen. Man kann mit der Lauge und Harz eine zum Bleichen sehr dienliche Harzseife verfertigen. Auch kann man der Seide und Wolle mit dieser Lauge ihre verlohren gegangene grüne Farbe wieder geben.

Auch von der Rinde läßt sich manche nützliche Anwendung machen. Sie ist fast unverweslich und schützt auch andres Holz, welches man mit ihr bekleidet, gegen Verwesung. Man legt sie daher solchen Hölzern unter, welche von der Feuchtigkeit leicht Schaden leiden würden, daher Balken, welche in massive Häuser kommen, mit großem Nutzen an denjenigen Stellen mit dieser Rinde bekleidet werden, wo sie auf Steine zu liegen kommen.

In den nordischen Ländern findet man Brettdächer, welche mit Birkenrinde bedeckt sind, auf welche Rasen gelegt werden, und diese Rinde schützt das Bretterdach über ein halbes Jahrhundert gegen Verwesung. Man kann sich dieser Rinde in Ermangelung der Schleusenspähne auch im Haushalten zum anzünden des Feuers bedienen.

Die Kohlenbrenner bedienen sich ihrer zum anzünden ihrer Meiler und die Lohgerber können sie gleichfalls gebrauchen, ob sie gleich nicht so wirksam als Eichenlohe ist, indem sie das Leder bräuner und weniger dicht macht. Aus der reinen Birkenrinde wird in Rußland ohne anderweitigen Zusatz ein stinkendes Oehl (Birkentheer, Birkenöhl, Dagget, Dogget, Degon, Rußöhl, schwarz Degenoehl, Oleum rusci f. betulae) destillirt, welches man zur Bereitung der Tuchten gebraucht. Auch wird es zu einigen Arbeiten auf Messingwerken genommen. In der Schweiz macht man durch ein besondres Zusammenrollen der Rinde Fackeln daraus, welche sehr gut brennen. In Sibirien werden aus der äußersten Birkenrinde Gefäße gemacht, worinnen der Boden aus Fichtenholz eingesezt wird, welche keine Feuchtigkeit durchlassen, so daß man Gurken darinnen einmacht und Bier darinnen stehen läßt.

Die Rinde dient auch zum färben der Fische, zu welchem Ende sie mit etwas Birkenasche und Theer gekocht wird. Die damit gefärbten Fische weichen im Wasser nicht so leicht auf. Auch lassen sich die Fische wegen der wenigen Scheinbarkeit im Wasser leicht fangen. Aus dem innern Bast verfertigen die Fischer die Senkbeutel für ihre Neze, die sie wie letztere färben. Die äußere weiße Haut läßt sich am besten absondern, wenn der Birkenast aufhört zu laufen und wächst drey-mahl wieder nach. Man legt und trocknet sie Bündelweise. Die Finnen und Lappen legen sie in ihre Schuhe wodurch sie die Füße gegen Verkältung schützen, verfertigen starkschallende Hirtenhörner, Körbe, Stricke, Teller, Schachteln und allerhand andres Hausgeräthe daraus.



## §. 437.

Das Laub ist ein gutes Schaffutter. Nach Ort bedient man sich der Blätter in der Schweiz zum gelbfärben. Durch beigesezte Scharfe (*Serratula tinctoria*) wird die Farbe gelber und dauerhafter. Um Schüttgelb zu erhalten werden junge zarte Blätter mit Covent in einem Kessel bis zur Hälfte eingekocht. Dann wird zerstoßne Kreide und etwas Alaun beigesezt. Man fährt mit dem Kochen fort, und der Bodensatz ist die verlangte Farbe. Läßt man die Kreide weg; so bekommt man das Schüttgrün. Der ausgepreßte Saft des Laubes schützt die Käse, denen er beigemischt wird, gegen Maden. Die Knospen sind eine Nahrung der Birkhüner. Die Nordländer sammeln sie, trocknen sie in gelinder Wärme, und füttern mit schicklichen Zusätzen ihre Geflügel den ganzen Winter durch damit. Auch bedienen sie sich der getrockneten Knospen in der Gelbsucht.

## §. 438.

Eine besondere Nutzung hochstämmiger Birken, ist die auf ihren Saft, welcher als blutreinigendes Mittel gebraucht wird. Andre verfertigen einen Meth daraus, indem sie den Saft mit Honig und Gewürz abkochen. In den nordischen Ländern wird er zum Bierbrauen genommen, auch läßt sich ein, dem Champagner ähnliches Getränk daraus bereiten, und um Käse madenfrey zu erhalten, pflegen manche Landwirthinnen, zu der Milch beim Käsemachen, Birkenwasser zu schütten. Allein man muß dieses Wasser so zu gewinnen suchen, daß die Birken keinen Schaden leiden.

Vom Birkenwasser: Danziger wöchentliche Auszüge 1768.

4. Petersb. ökon. Abhandl. III. 90. VII. 34. Champagner Wein von Birkenwasser. Witt. Wochenbl. III. 71. Berliner Samml. IV. 305. Wedel diff. Diabetes a potu succi betulae lethalis. Eph. nat. cur. Dec. I. an. 2. obs. 198.

## §. 439.

## §. 439.

Die Zweige können als Weiden gebraucht werden. Die jungen Reisser enthalten nach Stellers Versuchen ein Harz, das dem Geruch und Geschmack nach Aehnlichkeit mit dem Copaiva-Balsam hat. Man brennt an einigen Orten ein brauchbares Wundöhl daraus. Aber eine Hauptbenutzung der Birkenreiser ist die zu Besen, ein unentbehrliches, allgemeines Hausgeräthe, und keine Holzart kann zu Besenreisern den Birken an die Seite gesetzt werden, daher man gar wohl auf die Vermehrung der Birken und dahin bedacht seyn darf, daß die Besenreiser nicht von stehenden Bäumen geschnitten werden.

## §. 440.

Diese wichtigen und mancherley Benutzungsarten der Birken empfehlen ihren allgemeinen, thätigern Anbau. Zuerst muß man seine Aufmerksamkeit auf die Zeit der Saamenreife richten; diese tritt bey der Sommerbirke im Jul. bey der Winterbirke im Sept. ein. Die Käzchen fangen dann an braun zu werden. Man soll aber ihre völlige Bräune nicht abwarten, sondern sie noch, ehe sie diese erreichen, abstreifen. Zu Hause werden sie sogleich auf einem lustigen Boden dünne ausgebreitet und fleißig gewendet. Sind sie abgetrocknet und haben sie ihre Nachreife erhalten, so kann man sie zwischen den Händen reiben und hernach den Saamen durch ein Sieb reinigen.

v. Burgsdorf 458. v. Zanthier 71. 72. Hartig 67. 77. Buehl 43. Hesse 113. 148. Unterricht zum Holzanbau für Heiderente 65. Maurer l. c. 20. Gedanken über verschiedne Gegenstände der Forst-Cameralwissenschaft. S. 93.

## §. 441.

Der Boden darf nur ganz geringe seyn, wenn er nur nicht ganz dürre und fliegend ist. Auch zieht die Birke jede Lage der süblichen vor. Man macht den Boden bloß wund. Auf einen Morgen werden vierzehn bis sechzehn Pund Saamen mit Schuppen gerechnet. Am besten

sten nimmt man die Saat bey windstillem Regenwetter vor, es geschehe nun im Frühjahr oder Herbst. Bedeckung leidet der Saame durchaus nicht. So lassen sich auch die Birken leicht durch Anpflanzung vermehren, so lange sie noch jung sind, und keine weisse Rinde haben. Drey- bis vierjährige Birken schicken sich am besten hiezu. Die Verpflanzung geschieht im Frühjahr, kurz vor Ausbruch des Laubes und man setzt sie vier Fuß weit im Verband. Wo aber Wild in der Nähe ist, sind Birkenanlagen schwer aufzubringen. Man hat die Birken ehemahls auch zu Hecken empfohlen, allein Birkenhecken dienen blos zur Bezeichnung des Eigenthums, nicht aber zur Abhaltung des Viehes, welches sie theils fahl frist, theils durchbricht.

Maurer 203. Germershausens Hausvater V. 205. Krünitz Encycl. V. 346.

§. 442.

Art. 123. Hornbaumbirke. *B. carpinifolia*. Ehrh.

Synon. *Betula lenta*. Münchh. V. 113. *Betula nigra*. Du Roi I. 93. Wang. 35. Linn. sp. pl. 1394. n. 2. *Betula foliis ovatis, oblongis acuminatis, serratis*. Gronov. virg. 188. (146) The black sugar Birch Tree. Wang. Schwarze Zuckerbirke, schwarze Birke.

Suckow 71. n. 2. Marshal 33. von Wangenheim 35. Ehrhard VI. 99. III. 35. v. Zanthier 81. Münch. 14.

Abbild. v. Wangenheim F. XXXIV.

§. 443.

Mit eyrund länglichen, zugespikten, gesägten, an der Basis ausgeschnittnen Blättern, gleichen, offen stehenden Schuppenlappen.

Waterland, Nordamerika. Ein sommergrüner, dauerhafter Baum der ersten Größe. Seine Wurzeln laufen seitwärts flach aus. In geschlossenem Stande ist der Schaft stark und der Wipfel besteht nur aus dünnen, biegsamen Aesten. Sie wächst in ihrer Heimat auf kalten  
ber.



bergigten Orten, in einem gemischten, frisch liegenden Grunde. Die äußere Rinde ist glatt, bräunlich und bastartig, die darunter liegende zähe und dick. Die Blätter sind eiförmig, länglich, zugespitzt, gesägt, an der Basis ausgeschnitten, glatt und auf der obern Fläche dunkler als auf der untern. Häufig stehen zwei Blätter mit ihren zottigen Stielen unten zusammen. Gerieben duften sie einen angenehmen Geruch aus. Die männlichen Blütenköpfe erscheinen an der Spitze, die weiblichen an der Seite der Zweige. Jene hängen hernieder, diese stehen aufrecht, beyde sind stiellos. Die Schuppen sind unten rund, ihre Lappen sind gleich groß und stehen offen. Der Saame ist herzförmig und fliegt zu Ende des Oct. ab.

## S. 444.

Ein Baum, dessen Anbau im Großen für manche deutsche Provinzen sehr vortheilhaft seyn kann. Er wird so stark, daß man in Amerika aus der äußern Rinde Rachen verfertigt. Für unsre hohen, bergigten Gegenden ist er ein sehr schicklicher Baum. Sein Wuchs ist schnell und weit ansehnlicher als von unsrer Birke. Auch kommt er in recht schlechten Boden fort, wenn er nur eine frische Lage hat. Das Holz ist ein gutes Nutz- und Werkholz, auch ein ganz vorzügliches Brenn- und Kahlholz. Der ganze Baum ist sehr saftreich, der Saft hat aber einen starken, etwas widrigen Geruch, daher gebrauchen ihn die Amerikaner bloß als eine Arznei. Durch die Gährung giebt er einen sehr scharfen Essig. Manche bereiten auch einen Zucker daraus, der aber nicht so süß und angenehm als der Ahornzucker ist, auch höher zu stehen kommt. Bey der Saat dieser Birke wird wie bey der Cultur unsrer Weisbirke verfahren.

Hier eine Anmerkung von H. Ehrhard aus dessen nützlichem Beyträgen Heft III. S. 199. dieß sind seine Worte: Clayton sagt in seiner Flora virginica, daß die Rinde von der *Betula foliis ovatis, oblongis, acuminatis, serratis* den Geschmack der Senega-Wurzel habe und er hat Recht. Da dieser Baum

sich

sich nun in unsern Lustwäldern befindet; so dünkt mich, daß wenn ich ein Arzt wäre, ich versuchen würde, ob diese zwey Pflanzen auch in der Wirkung mit einander überein kämen. Aber viele dieser Herrn verschreiben lieber Cassaparilla und China-Wurzel, gesetzt, daß solche auch nicht viel nutzen; so können sie auch nicht viel schaden.

## §. 445.

Art. 124. Spitzblättrige B. *B. acuminata*. Ehrh.

Synon. *Betula lenta*. Du Roi I. 92. *Betula julifera*, fructu conoide, viminibus lentis. Gronov. virg. 115. (146.) Le Merisier. The Birch Tree with Hearth Chaped Leaves, the Poplar leaved Birch Tree. Wang. 45. Zähre Birke, Birke mit dem Hopfenschopfe, rothe Birke.

Ehrhard VI. 92. von Wangenheim 45. Marschal 34. Wachs Verzeichnis 15.

Abbild. v. Wangenheim F. XXXVIII.

## §. 446.

Mit herzförmig, länglich zugespitzten Blättern, Blütenkäzchen, die eine entfernte Aehnlichkeit mit einem Hopfenschopfe haben.

Waterland. Nordamerika. Ein sommergrüner, dauerhafter Baum der ersten Größe, der in den kältern Gegenden seiner Heimat in seiner größten Vollkommenheit gefunden wird. Weiter gegen Süden nimmt sein Wuchs ab, und wird zuletzt strauchartig. Die äußere Rinde ist ein weiser, dünner Bast, die darunter liegende ist bräunlich und zähe. Die Zweige sind dünne, biegsam und hängen bey alten Bäumen, die nur eine schwache Krone haben, zur Erde nieder. Die Blätter sind herzförmig, länglich zugespitzt, am Rande sägeförmig ausgeschnitten, von einem starken Bestandwesen und rauh anzufühlen. Die Blütenkäzchen haben eine entfernte Aehnlichkeit mit einem Hopfenschopfe.

Man hat drey Sorten von dieser Birke, welche Halb- oder Abarten sind: *B. papyrifera*. Marsh. 36. Le Bou-

Bouleau a papier. The with Paper Birch. Von nur mittlerer Größe, mit einer sehr weissen glatten Stammrinde. b) *B. populifolia*. Marsh. 36. The Aspen-leaved Birch. Ein sehr schlanker Baum, dessen Blätter denen an der Zitterpappel ähnlich, fast dreyeckig, doppelt sägeförmig ausgeschnitten sind, aber in eine lange Spitze auslaufen. Sie werden von dem leichtesten Windhauche in Bewegung gesetzt. c) *B. humilis*. Marsh. 37. The dwarf Birch. Bleibt niedrig und zwergig.

## §. 447.

Der Wuchs dieser Birke scheint in gleichen Jahren und Boden weit schneller und stärker als bey unsrer Weisbirke zu seyn, daher deren Anbau vielleicht in den nördlichen Gegenden Deutschlands nutzbar seyn könnte. Aus der Stammrinde werden in Nordamerika Nachen verfertigt und das Holz ist ein ganz gutes Nutz- Brenn- und Rohholz. Bey der Cultur wird wie bey der Cultur unsrer Weisbirke verfahren.

Außer diesen angeführten Birkenarten giebt es noch einige, die aber für den Forstwirth kein Interesse haben; daher ihre bloße Namensanzeige, mit Verweisung auf die davon handelnden Schriftsteller, Entschuldigung verdienen wird.

α) *B. pumila*, Zwerg B. The dwarf Birch of Canada. v. Wangenheim S. 86. Sukow 72. n. 5. Du Roi 4. β) *B. verrucosa*. Ehrh. Warzige B. Ehrhards Beytr. VI. 98. γ) *B. nana*. Moorbirke. Le Bouleau nain. Ghe dwarf Birch. Gleditsch 408. n. 27. 422. Sukow 21. n. 4. Ehrhard V. 53. von Zanthier 83. Du Roi I. 98. Mönchs Verzeichniß 15. δ) *B. alnobetula*. Erlenbirke. Le Bouleau a feuilles d'Aune. The Alder-Birch. Hirschfelds Gartenkalender 1783. Ehrhard II. 72. Sie macht den Uebergang zur folgenden Untergattung.

## §. 448.



## §. 448.

B. Untergattung. Erle, *Betula Alnus*.

Mit ungeflügelten Saamenkernen.

Art. 125. Schwarzeiche. B. A. glutinosa. Linn.

Synon. *Alnus rotundifolia glutinosa viridis*. C. Bauh. pin. 428. *Alnus foliis glabris, rotunde crenatis, Spongiolis ad nervorum angulos*. Hall. hist. n. 1630. *Alnus* Camer. Epit. 68. L'Aune comun. The common Alder. Gemeine Erle, Rotherle, Urle, Ellern, Else, Orlinbaum, Otternbaum, Otter, Elst, Elten, Elsterbaum, Alder, Arle.

Suckow 72. Borkhausen 99. Linn. sp. pl. ed. 3. II. 1394. Pollich palat. II. 602. n. 899. Scopoli carn. II. 233. n. 1173. Pallas ross. I. I. 150. Schrank bavar. I. 421. Gleditsch I. 408. n. 28. Leonhardi 85. v. Burgedorf 145. Märker 43. Becker 32. Germershausen IV. 241. V. 186. Du Roi I. 100. Du Hamel. I. 36. Forstmagazin V. 1. Schrebers Cameral-  
schriften IX. 35.

Abbild. Cramer t. 12. Delhafen II. 29. 31.

## §. 449.

Mit ästigen Blütenstielen, eiförmigen, stumpfen, am Rande mit rund spizlichen Zähnen und nur ein wenig gelappten Blättern.

Ein einheimischer, sommergrüner Baum, der auch oft als ein ganzer Strauch angetroffen wird. Man findet die Schwarzerle häufig am Rande der Flüsse, Mühlentbäche, Seen, Teiche und auf feuchten Wiesen und Niedrigungen. Die Stammrinde ist bey jungen Erlen bräunlich, bey ältern schwärzlicher und rissig. Das frisch gehauene Holz ist schön gelbroth, wird aber, je länger es an der freyen Luft austrocknet, desto weislicher. Die Blätter brechen im April aus, sind eiförmig, am Rande nur wenig gelappt, mit rundlich spizigen Zähnen gesägt, auf beyden Flächen glänzendgrün, glatt, mit erhabenen weissen Nerven und Adern gegittert. Der Hauptnerve ist

R

an

an seinen beyden Rändern haarig und flebrig und in den Ecken der Adern finden sich kleine, schwammartige Drüsen. Die Blätter kommen aus breiten, blaulichen Knospen, stehen abwechselnd, an flebrigen, oben gefurchten Stielen, an denen lanzetförmige, stumpfe Nebenblättchen sitzen. Die Blüten, welche schon im Herbst vorhanden sind, brechen zu Ende des Merzes auf. Die Blütenstiele sind lang, röthlich, ästig, die Schuppen der männlichen Kätzchen sind auf ihrer obern Seite braun und purpurfarbig punktiert, die der weiblichen glatt, braun und purpurfarbig. Der Saame erreicht seine Reife im Späthherbst und fällt im Winter aus.

Nachricht von einer Schwarzerle mit Eichenblättern. S. Gleditsch vier hinterlassene Abhandlungen, das praktische Forstwesen betreffend, Berlin 1788. S. 139. m. I. K.

#### S. 450.

Die Erlen liefern mit funfzig bis sechzig Jahren sehr ansehnliches, dauerhaftes Zimmerholz zum Wasserbau. Allein in freyer Witterung ist dieses Holz nur von geringer Dauer, indem es sehr bald faul und wurmstichig zu werden pflegt. Will man dasselbe ja im Wetter gebrauchen; so muß es vorher ein paar Jahre unter Wasser gelegen haben. Sonst aber hat es im Wasser und in feuchter Erde eine beständige Dauer. Daher wird es auch meistens zum Wasserbau, zu Pfahl- und Rostwerken genommen. Inzwischen muß es zu allem Gebrauch beym Baumwesen, sogleich, nachdem es gefällt worden ist, von seinem Splinte befreyt werden, wenn es nicht stockig und wurmstichig werden soll. Will man also Erlenholz-Vorräthe lange mit Sicherheit aufbewahren; so muß man sie in große Gruben legen, und mit Erde bedecken.

Gleditsch vermischte Abhandlungen II. 422. Breslauer Natur- und Kunstgeschichte 17. Vers. 171. Franzmahdes Gedanken von Vermehrung der Festigkeit des Erleuholzes zum Gebrauch auffer Wasser, Eisenach 1779. Camerarius de Alni ligno, cui usui, cur in aquis non corumpatur. Syll. Memor. Cent. XII. S. 1058. 1061.

## §. 451.

Mit Erlenholze werden Dungkauten und Stallungen gebohrt. Man verfertigt Bronnen, und Wasserrohren daraus. Es giebt schöne Sägeblöcke für Tischler, Nutzholz für Dreher, gute Mulden, Backtröge, Schaufeln, Bettstellen, Spinden, Theerbuden. Man kann es so schön schwarz beizen, daß es dem Ebenholze gleich sieht, und sodann zu eingelegten Arbeiten gebrauchen. Man verfertigt seine Leisten, Schuhabsätze und Holzschuhe daraus. Als Brenn- und Kohlholz hat es ganz besondere Vorzüge. Die Kohlen sind bey denjenigen Oefen und Hüttenwerken, wo leichtflüssige Erze geschmolzen, Eisen und andre Metalle gefrischt werden, sehr gut. Die sogenannten leichten Kohlen nimmt man auch zur Bereitung des Büchsenpulvers. Die gleich nach der Fällung geschälte Rinde, nehmen die Färber und Hutmacher zum Schwarzfärben, sonst enthält sie wenig färbende Substanz, aber ihr harziges Wesen giebt ihr zur Befestigung andrer Farben, einen Werth, indem sie den Zeuchen zu einer guten Vorbereitung dient. Auch die Saamenkätzchen können in der Färberey benutzt werden und das Laub ist längst als ein gutes Futter für Melkvieh und Schafe bekannt.

Thunberg. japon. 76. Sieffert II. 227. Hellet 210. Pbraner I. 397. 485. 513.

## §. 452.

Die Schwarzerle gehört unter unsre sogenannten Wasserbäume. Sie liebt einen guten, feuchten Wiesengrund. Ihr Saame ist am leichtesten zu sammeln, wo dergleichen Bäume am Wasser stehen: denn da er im Winter ausfällt, schwimmt er bey dem Abgang des Eises auf dem Wasser und wird vom Winde auf die eine Seite hingetrieben, wo man ihn bequem auffischen, auf Lacken trocknen und dann durch Siebe reinigen kann. Auf einen Morgen (180 rhl. N. R.) werden anderthalb bis zwey Mehen (Berlin.) gerechnet. Die Saatzeit ist der März.

R 2

Die



Die Erfahrung hat aber bey Brüchern gelehrt, daß sie in der Mark durch die Erlensaat sehr wenig verbessert worden sind, indem nach der gewöhnlichen Lage derselben, der Saame öfters durch die Winternässe und Ueberschwemmungen weggespült wird, das Durchschneiden derselben mit Gräben aber, um auf deren Aufwürfe die Saaten anzulegen, nur wenigen Nutzen gestiftet habe. Es wurde dahero verordnet, mehr auf Bepflanzung der Brücher mit drey bis vierjährigen Erlen zu sehen, zu welcher Absicht an bequemen Orten Erlenkämpfe angelegt werden. Dadurch soll aber auf keine Weise das Ansäen der Erlen an Orten, wo weder Nässe noch Ueberschwemmungen die Saat hindern, ausgeschlossen werden, vielmehr wird sie als die natürlichste Methode, und die Anfertigung der Abzugsgräben, allenfalls mit kleinen Stauschleussen, um in trockner Zeit die nöthige Wässerung geben zu können, anempfohlen. Solche Erlenanlagen müssen aber gegen Wild und Vieh im ersten Antriebe, der so gerne abgefressen wird und alsdann unwiederbringlich verloren ist, wohl gesichert werden.

S. Königl. Preussisches Circulare an sämtliche Forstbediente, die Forstverbesserungen betreffend 1791. - Schrebers neue Cameralschriften IX. n. 6. - Nachrichten der schles. patr. Gesellschaft IV. 18. v. Burgsdorf Forsthandbuch 453. - Hartig 68. 89. Hesse 115. 150 — 153. Anweisung für die Heide-reuter 63.

S. 453.

Art. 126. Weiserle. B. *Alnus incana*. Linn.

*Synon.* *Betula incana*. Pallas russ. I. I. 151. Linn. suppl. 417. Ehrhard Beytr. III. 22. *Alnus altera*. Clus. hist. vol. I. 12. *Alnus hirsuta* Matth. comment. ed. 1674. pin. 133. *Alnus folio incano*. C. Bauh. pin. 428. *Alnus incana et hirsuta*. J. Bauh. hist. vol. I. 154. *Betula foliis mucronatis, acute serratis, subtus lanuginosio*. Hall. hist. n. 1631. L'Aune a feuilles blanchâtres. The hoary-leaved Alder. Noddische weisse Erle, rauhe weisgraue Erle,

Erle, langblättrige Erle, weisse, norwegische Erle, preussische Erle, litthauer Erle, pommerische Erle, nordische Erle, nordische Else.

Sudow 74. b) Oleditsch I. 408. n. 29. Linn. Sp. pl. ed. 3. II. 1394. Leonhardi 86. Borkhausen 361. v. Münchhausen V. 114. Du Roi I. 109. Schwed. Abhandl. XXVI. 222. v. Burgsdorf 148. Märter 46. Becker 33. Germershausen V. 197. von Wangenheim Bemerkungen über die nordische, weisse Erle, in den Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin IX. St. IV. Ehrhard III. 214.

§. 454.

Mit spitzigen, scharf und doppelt gesägten, unten weisswolligen Blättern, stumpfen, erhabenen Knospen, ästigen Blütenstielen.

Ein einheimischer, sommergrüner Baum, der nach neuern Beobachtungen eine eigne Art ist. Sie hat einen weit schnellern Wuchs als die Schwarzerle, mit der sie einerley Benützung hat, die jedoch bey dieser Art früher zu erlangen steht. Sie kommt auf den rauhesten Gebirgen, im kältesten Klima, und auch in Sandebenen fort. Die Rinde ist an jungen Stämmen und Zweigen grünlich, (am Stamme fast bleifarbig, an den Zweigen scherbenfarbig, mit weissgrau überzogen. Borkh. \*) Die Blätter sind eysförmig, spitzig, etwas eckig, ungleich, meistens doppelt und scharf gesägt, unten weissgrün, wollig, mit erhabnen Adern durchzogen. Sie blüht zugleich mit der vorigen Art. Die männlichen Käzchen sitzen an den Spitzen der Zweige, gemeiniglich zu drey fest, die weiblichen aber hängen an ästigen Stielen. Jene haben rostfarbige, diese braungrüne Schuppen, sind kleiner als bey der Schwarzerle. Die Staubweege ragen aus den Schup-

K 3

pen

\*) Die Rinde ist an ältern Stämmen weiss und glatt, und kommt dem äussern Ansehen nach — der am Buchenstamme nahe. v. Burgsdorf 149. Palmstierna von der Aussaat der weissen Erle. Schwed. akad. Abh. 1764. 212.

pen hervor. Die Saamenkapseln sind größer. Der Saame reift im Sept.

## §. 455.

Gatt. 38. Buxus. Buchsbaum. Laubholz.

Die männlichen Blüten kommen mit den weiblichen aus einer Knospe. Die männlichen Blüten haben eine dreyblättrige Blumendecke, eine zweyblättrige Blumenkrone, vier Staubfäden und eine Spur von einem Fruchtknoten. Die weiblichen Blüten haben eine vierblättrige Blumendecke, eine dreyblättrige Blumenkrone, drey Staubweege. Die Saamenkapsel ist dreyfächrig, drey schnabelig.

## §. 456.

Art. 127. Buchsbaum. B. arborescens.

Synon. Buxus sempervirens Scopoli carn. II. 234. Buxus sempervirens arborescens. Linn. Sp. pl. II. 1394. Le grand Buis des forets. The Box Tree. Baumartiger Buchs, hochstämmiger Buchsbaum.

Sudow 78. Borkhausen 354. Märter 134. Ehrhard IV. 175. Du Roi I. 118. Lecuwenhoek de spiraculis foliorum Buxi in Philos. Transf. n. 369. S. 232.

## §. 457.

Mit eyrund länglichen, zugespikten, immergrünen Blättern und baumartigen Buchs.

Ein immergrüner Baum dritter Größe, der in Nutzholz-Pflanzungen angezogen zu werden verdient, so wie er mit seiner Krone jedes Lustgebüsche ziert. Sein Vaterland ist der Orient und Süd-Europa. So findet man ihn auch in der Schweiz und im Herzogthum Crain wild wachsend. Die Blätter sind immergrün, eyrund länglich, zugespitzt, steif, glänzend, stehen einander gegenüber. Der Stamm theilt sich in zahlreiche, gelbliche Aeste, die eine regelmäßige Krone bilden. Die Kronenblätter sind von den Blättern der Blumendecke kaum zu unter.



unterscheiden. Auf jedem Fruchtknoten befinden sich drei Nectarien, welche mit den Staubweegen alterniren.

## §. 458.

Von diesem Baume giebt es verschiedene Abänderungen. Die gemeinste ist der, durch seine Einfassung unsrer Gartenbeete bekannte und durch gewaltsame Verkrüppelung entstandene

Ab. a) Zwergbuchs, *B. suffruticosa*, der zwergig bleibt, weder Blüten noch Früchte bringt, und mehr runde Blätter hat. H. N. Medicus ließ 1773 im Frühjahr von dieser Sorte etliche Stücke aus einer Rabatte ausheben, sie besonders setzen und ein wenig ausschneiden, um sie baumartig zu erziehen. Im ersten und zweiten Jahre behielten sie ihre rundlichen Blätter. Im dritten kamen sie sämmtlich in den stärksten Schuß, und an den jungen Aesten wurden die Blätter sämmtlich oval und wie am Buchsbaume. Die meisten waren über einen Zoll lang, schön glänzend und dunkelgrün.

Charpf. Bemerk. 1774. 156. Kräniz Enc. VII. 211.

## §. 459.

Der Buchsbaum wächst langsam. Sein natürlicher Standort ist im kalchigen, mit Kies gemischten Boden, doch kommt er auch in steifen Lehmboden gut fort, nur nasser Grund ist ihm zuwider. Wegen seiner Empfindlichkeit gegen unsre Winter erfordert er einen beschützten Stand. Das Holz desselben ist von einem so vorzüglichen Werth, daß es dem Gewicht nach verkauft wird. Es ist so dicht und schwer, daß es im Wasser untersinkt. Wegen seiner Härte ist es zu mancherley Arbeiten brauchbar. Man verfertigt Lineale, Schrauben, Rollhölzer, Spindeln, Schachsteine, Löffel, Kämme, Spuhlen, Stempfel, blasende Instrumente und allerhand feine Drehfabrikate daraus. Die allerleichteste Art, in wenigen Jahren eine ansehnliche Pflanzschule davon zu haben, aus der man nachher einen wahren Nutzen ziehen kann, wenn

man die jungen Bäume nach einigen Jahren aushebt, und im Frühling auf ihre bleibende Stelle verpflanzt, ist die im vorigen §. angegebene. Doch werden Saamenpflanzen viel größer.

Camerarius de Anatomia ligni buxei ejusque natura et facultate, in Sylloge Memorab. Cent. VII. 495. Osbek, de Buxo e seminibus educendo, in den schwed. akad. Abhandl. 1764. 80.

§. 460.

Gatt. 38. Quercus. Eiche. Laubholz.

Die männlichen Blüten stehen in Räschen. Die Geschlechtsdecke ist einblättrig, mehrentheils in fünf Abschnitte getheilt, und schließt fünf, acht, zehn und mehr Staubfäden ein. Nach der Befruchtung vertrocknen die männlichen Blüten und fallen ab. Die weiblichen Blüten stehen in besondern Knospen über den männlichen. Die rauhe, einblättrige, unzertheilte Geschlechtsdecke ist in der Blütezeit kaum sichtbar, vergrößert sich aber nach und nach mit der Frucht, und bildet sich mit dieser aus. Staubweege, zwei bis fünf, mit einfacher Narbe. Der Fruchtknoten ist sehr klein, eiförmig, er wächst zu einer eyrunden Nuß, welche mit einer lederartigen Haut bedeckt ist, und in der napfförmigen, bey der Reife der Frucht völlig ausgebildeten Geschlechtsdecke sitzt.

§. 461.

Art. 128. Traubeneiche. *Q. brevipeduncula*.

*Synon.* *Quercus robur* Linn. Sp. Pl. ed. 3. T. II. p. 1414. n. 12. *Quercus latifolia foemina*. C. Bauh. Pin. 419. *platiphyllus mas* Dalech. hist. 2. *Quercus latifolia mas*, quae brevi petiolo est. C. Bauh. Pin. 419. Le Chêne a grappes. The common Oak. Hanb. I. 163. Steineiche, Truseiche, Wintereiche, Knoppereiche, Spateiche, Bergeiche, Dürreiche, Harzeiche, Eiseiche, Eisholzeiche, Winterschlageiche, Viereiche.

v. Burgsdorf 119. Sudow. 257. v. Zanthier 82. Borkhausen 120. Märter 14. Becker 23. Hausvater V. 20. Gleditsch I. 477. Leonhardi 70. Du Roi II. 237.

Abbild. Etamer T. II. f. 2. 4. Delhafen II. t. 1—5.

§. 462.

Mit festern Blättern, welche vorwärts breiter sind, spitzigere Buchten und stumpfere Ecken haben, sehr kurz gestielten, kleinen Eicheln.

Ein einheimischer, sommergrüner, harter Baum, der eine vorzügliche Stärke erlangt. Sein natürlicher Standort sind bergigte, aber mit einem guten Boden versehene Gegenden, wo er wegen seines spät ausbrechenden Laubes von der länger fortdauernden Kälte nichts leidet. Die Blätter stehen abwechselnd auf kurzen Stielen, sind vorne breiter als an der Basis, am Rande wellenförmig ausgeschweift, aber nicht so tief, als an der folgenden Art. Die Ecken sind stumpfer, die untere Fläche ist lichter und matter. Sie brechen in der Mitte des Mayes aus, sterben im October ab, bleiben aber bis in den Frühling hängen. Die männlichen Blüten erscheinen mit dem Laube in langen, dünnen, herunterhängenden Kästchen am Ende der jungen Triebe. Die weiblichen Blüten sitzen in kleinen, rothen, ovalen Köpfchen, welche an den Spitzen der Zweige und den Achseln der Blattknospen hängen. Die Früchte stehen auf sehr kurzen Stielen in Trauben, sind klein, rund, und vorne zugespitzt, reifen im November. Die Rinde ist an den jungen Trieben glatt und röthlich grün, an ältern rauh, am Stamme braungrau und tief aufgerissen. Die Pfahlwurzel geht vier bis fünf Fuß tief, ist einfach, oder zwey- vier- auch fünffach. Die Seitenwurzeln breiten sich zwölf Fuß weit aus. Das Holz ist röthlichbraun.

§. 463.

Art. 129. Stieleiche. *Q. longipeduncula*.

Synon. *Quercus fructipendula*. Münchh. V. 249.

n. 1. *Quercus foemina* Mill. n. 2. *Quercus cum longo*



pediculo. C. Bauh. pin. 420. du Ham. n. 1. Quercus foliis mollioribus et tenuioribus magis divisis, glande ex longis petiolis bi- et trifloris pendula; ligno pallido. - I. Bauh. hist. P. II. p. 16. Le Chêne rouvre. The english Oak. Mastische, Waldeiche, gemeine Eiche, Ackerbaum, Früheiche, Sommerliche, Augsteiche, langstielliche Eiche, Walteiche, Rotheiche, Lohliche, Tanneiche, Haseliche, Vereiche, Ferkeliche.

Borkhausen 121. Leonhardi 72. Gleditsch I. 477. n. 2. Suckow 257. Schrank. 660. v. Burgsdorf 127. Du Roi II. 240.

Abbild. Cramer t. II. f. 1. 2. Delhafen II. t. 3. Kerner II. t. 178.

S. 464.

Mit kurz gestielten, mehr getheilten, oben schmahlern Blättern, langgestielten Früchten.

Ein einheimischer, sommergrüner, harter Baum, der von schnellerm Buchse ist, sich, aus dem Saamen gezogen, gleicher bleibt, und eine größere Höhe erlangt. Seinen natürlichen Stand hat er in Vorgebirgen und Landforsten von gutem Boden. Wurzel und Stammrinde sind wie bey der vorigen Art beschaffen. Am jungen Stämmen und Zweigen ist die Rinde erst lichtgrün, dann braun. Das Holz ist weislicher, zäher und biegsamer. Die Blätter sind mehr getheilt, oben nicht so breit, sitzen auf kürzern Stielen. Sie sind beynahe um die Hälfte länger, oben dunkel - unten hellgrün und haben stumpfere Buchten. Sie brechen vierzehn Tage früher aus, und fallen im Herbst ab. Die Blüte erscheint mit dem Laube. Die Früchte sind viel größer, süßer, beynahe walzenförmig, geben eine weit bessere Mast, hängen zu zwey bis drey mit einander verbunden, an langen Stielen, und fallen vierzehn Tage früher ab.

Ab. a) Masteneiche. Q. altera tenerius dissecta. Rupp. Das Laub ist schmähler, tiefer eingeschnitten, hat spitzigere Buchten und Ecken. Die Früchte sind schmähler und länger.

S. 465.

## §. 465.

Die Eichen gehören unter unsre nussbarsten Holzarten. Sie liefern ein sehr dauerhaftes Bauholz unter der Erde und im Wasser. In den Gebäuden nimmt man es zu Pfeilern, Säulen, Schwellen, Riegeln, Thür- und Fensterrahmen. Ferner gebraucht man es zu Pallisaden und Thorsäulen. Zu Balken und Trägern taugt es nicht, weil es nicht allein keine Last tragen kann, sondern auch vermöge seiner eignen Schwere in wenigen Jahren so krumm wird, daß ein Gebäude, in welchem es unrecht angebracht worden ist, in kurzer Zeit Schaden leidet. Auch wirft sich keine Holzart so leicht wie diese, es wäre denn, daß sie beständig im trocknen, oder beständig im nassen läge. Eben so wenig taugt dieses Holz, so lange es neu und nicht hinlänglich ausgelaugt ist, zu Cisternen und Wassertrögen, weil das Wasser eine braune Farbe und einen übeln Geschmack davon annimmt.

Hausvater II. 277. V. 74. v. Zanthier 102. Zinkens Leipz. Sammlungen B. IX. S. 306. Schwed. akad. Abhandl. XXXVIII. 174. Crells chym. Entd. III. 197. Italienische Bibliothek I. B. 360. S. Wittenberger Wochenblatt XII. 235. Forst-Magazin VI. 139.

## §. 466.

Als Werk- und Nutzholz ist Eichenholz nicht weniger geschätzt. Es giebt Wellen für Mühlen- und Hammerwerke, Schaufeln, Riegel und Böden für oberflächliche Räder (S. Ulme) Sohlenhölzer zu Hammer-, Blasebalg- und andern Gerüsten, die in oder auf die Erde gelegt werden. Ferner werden Tröge für Oehl- und Papiermühlen, Faßdauben und andres Stabholz daraus verfertigt. Die eichenen Reisstangen sind für feuchte Keller die besten. Die Wagner nehmen das Eichenholz zu Raben und Speichen, Streichbrettern, Pflugladen, Schlittenfüßen, Achsen. Auch Tischler und Dreher verarbeiten es häufig. Die dichten, knotigen Wurzeln können zum Einlegen gebraucht werden. Die Spähne dienen zum schwarz-

schwarzfärben, und die Sägspähne zum gerben des Kalbleders.

Helot. 214. 407. Wörner I. 351. Lewis Historie der Farben 144—196.

S. 467.

Zur Feurung nimmt man da, wo die Eichen selten sind, nur die Abfälle, und was zu dem kostbareren Nutzgebrauch nicht tauglich ist. Es giebt aber das Eichenholz keine schnelle, flüchtige Hitze, doch kann man, wenn man es mit andern Holzarten vermischt, eine starke und anhaltende Hitze dadurch bewirken. Die gerodeten und zerklümmten Stubben liefern, getrocknet, ein gutes Brennholz für die Brandweinbrenner. Die eichenen Holzkohlen löschen zwar in einem Feuer ohne Zug gerne aus, bey hohen Oefen aber, und mit andern Kohlen versetzt, haben sie gute Wirkung und versehen auch in dieser Mischung das Gebläse nicht. Da sie auch von besondrer Schwere sind; tragen sie, worauf bey hohen Oefen das meiste ankommt, eine stärkere Last Steine, als andre.

Die Rinde der Eichen ist von unsern einheimischen Holzarten die beste zum gerben. Ihre Wirkung kann überdieß durch wohlgewählte Zusätze sehr verstärkt werden. Die bereits gebrauchte Gerberlohe wird zu Mistbeeten genommen. Man verfertigt die bekannten Lohballen (Lohkäse) daraus, womit arme Leute sich im Winter warme Stuben verschaffen. Wenn die Lohe gehörig ausgewittert hat, ist sie zu Düngung schwerer Felder wohl zu gebrauchen. Auch hat man die Eichenrinde in verschiedenen Krankheiten, sowohl äußerlich als innerlich gebraucht, sehr wirksam gefunden. Die jungen Zweige, die Blätter und die sogenannten Knoppeln, leisten bey dem Gerben des Leders gute Dienste. Letztere werden zu Wien gemahlen und der Lohe beygemischt. Ja die Sägspähne von frischen Eichen sollen zum gerben noch Vorzüge vor der Rinde haben.

Münch-



Münchener Intelligenz-Blatt 1774. S. 205. von Burgsdorf in den Schriften der Berliner Gesellschaft IV. 3. Beckmanns Beiträge zur Oekonomie IV. 154. VI. 458. Fränkische Sammlungen V. 337. Göttinger Polizey Nachrichten 1756. S. 41.

§. 468.

Die Früchte sind die beste Mästung für wilde und zahme Schweine. Man kann sie auch zur Mästung des Rindviehes im Stall anwenden, in welchem Falle man sie schroten läßt, und mit Hechsel, Rüben, Kartoffeln u. d. vermischt. Auch den Schaafen bekommen die Eicheln sehr gut. Wenn sie aber zu viel davon erhalten, werden sie erhitzt und bekommen erbrechen. Man darf sie ihnen daher täglich nur einmahl, und nicht in zu großer Portion vorlegen, fünf Viertelpfund sind für ein Schaaß auf eine Mahlzeit genug. Nach neuern Versuchen kann man auch alles Hofgeflügel damit mästen. Der daraus bereitete koffeeartige Trank ist für viele Personen ein gesundes und stärkendes Getränk. Die Rapschen, worinnen die Früchte sitzen, dienen zum Färben. Vom Genuß des Laubes bekommt das Rindvieh Blutharnen, welches, wenn man nicht zeitig wirksame Gegenmittel braucht, tödlich wird.

v. Burgsdorf Versuch einer vollständigen Geschichte vorzüglicher Holzarten IIter Theil, welcher die einheimischen und fremden Eichenarten begreift. Berlin 1787. Mit 9. K. in 4. S. 234. ohne Vorrede. v. Salis in den Wiener Abh. 1764. II. S. 197. Hanobr. Magazin 1774 S. 1634. Marx die bestätigten Kräfte der Eicheln. Hanover 1776. Marx Geschichte der Eicheln u. s. w. Dessau 1784. Baldingers Magazin I. 183. Schröder von den Wirkungen der Eicheln bey Verstopfung der Drüsen. Göt. 1774. Reiser Unterricht von dem Nutzen und der besondern Heilkraft der Eicheln. Lemgo 1775. Fortsetzung 1781. Abgemüßigte Vorstellung und Bitte an das menschliche Geschlecht abseiten des Geschlechts der Schweine um Abstellung des Gebrauches des Eicheltrankes. Cassel 1782. Sammlung von Nachrichten, den Nutzen der Eicheln überhaupt, besonders des Eichel-Coffees betreffend. Cassel 1782. Herz von dem nützlichen Gebrauch der Eicheln in dessen Briefen, Ite Sammlung. Ein berühmter Botaniker, der zu früh verstorbene Gärtner, sagt in seinem Buche de fructibus et semini-

bus plantarum P.I. Optimum potus Coffeae succedaneum e depurato Galii apparines albumine paratur. Bekanntlich nennen Grewius und Gaertner Albumen, was v. Gleichen den Saamenkuchen, andre Botaniker aber Cotyledon (den unter der Saamenhaut (Samara) liegenden Kern des Saamens) nennen. Galium opparine wächst überall häufig wild. Wie wird wohl dieser Coffee bereitet?

## §. 469.

Bei der Kultur dieser nützlichen Bäume kommt die Absicht, welche man mit ihnen vorhat und die Lage, Mischung und Tiefe des Bodens in Betrachtung. Will man Zimmerholz erwarten, so muß man einen frisch liegenden, aus guter schwarzer Modererde mit Lehmen oder Sand gemischten Boden, der fünf und mehr Fuß ohne Schichtenwechsel in die Tiefe setzt, aussuchen. Die Stieleiche liebt einen mehr feuchten Grund und eine geschütztere Lage, als die Traubeneiche, welche zur Noth mit einer rauhen und höhern Gegend vorlieb nimmt. Die Bereitung des Feldes zur Eichelsaat geschieht auf verschiedene Art, wie es die Natur und Lage desselben rathsam machen. Ein sehr verwachsener Grund wird zuvor mit andern Früchten bestellt, wozu man, wenn er bindend ist, solche wählt, welche ein fleißiges behacken erfordern. Hat man Wald- und Haselmäuse zu befürchten; so legt man die Furchen in Form des gebrochenen Staabs an.

v. Burgsdorfs Forsthandbuch S. 445. Anweisung für die Heidereuter S. 45. 52. Hesse vom Holzanbau 97. v. Zanthier 85. 88. Hartig 64. Hausvater V. 35. Bühl 39. Maurer 8. Gedanken über verschiedene Gegenstände der Forst- Cameral- Wissenschaft S. 87. Königl. Preuß. Circulare an sämtliche Forstbediente, die Forst-Verbesserungen betreffend. dd. Berlin d. 12. Aug. 1788.

## §. 470.

Auf einen Morgen werden zweyhundert und funfzig Pfund Eicheln gerechnet, und auf deren Güte beruhet mit ein großer Theil des glücklichen Erfolgs der Eichenzucht. Die beste Zeit sie zu sammeln ist dann, wenn sie häufig anfan-

anfangen abzufallen, und auf dem Baume selbst eine Kastanienbräune annehmen. Man hat indessen verschiedne, in den Schriften der Praktiker beschriebene Methoden, sie bis in das Frühjahr aufzubewahren. Ist der Boden zubereitet, so werden die Eicheln gesäet. Zur Bepfaat schicken sich aber Haseln besser, als die Birken. Das unterbringen geschieht mit der Egge, weil man die Eicheln selbst in einem leichten Boden mit Dornsträuchern nicht so tief unterbringen kann, als zu ihrem gedeihlichen Fortkommen erforderlich ist.

Will man Eichen verpflanzen; so müssen die Setzgruben schon im Herbst ausgeworfen werden. Am besten schicken sich kleine, dreyfüßige Eichen zum verpflanzen, bey welchem Geschäfte dann die bey der Holzpflanzung vorgeschriebenen Regeln zu beobachten sind. Man setzt sie sechs Fus im Verband aus einander. Setzt man aber größere Eichen und in weiterer Entfernung als der angegebenen; so werden Nüstern, Eschen, Hornbäume u. d. dazwischen gepflanzt, um zu verhindern, daß sich die Eichen nicht zu weit ausbreiten, wodurch sie nie einen dichten Schluß erhalten und also auch nicht sehr in die Höhe treiben würden. Es ist aber das Eichenpflanzen nur da, wo man von dieser Holzart Köpfpflanzungen oder Gartenwände anlegen will, rathsam, weil sich von versetzten Eichen schwerlich Zimmerholz erwarten läßt.

Jacobi Abhandlung von der rechten Art die Eichbäume zu säen, zu pflanzen und zu erhalten. Halle 1761. steht auch in Schrebers Samml. VII. 36—70. und im Forst-Magazin I. 300. Mills Abhandlung von der Eichenzucht, Leipzig 1765. Schmerzhalt vorzüglichste Art der Eichenzucht im Hamb. Magazin XV. 66. und im Forst-Magazin III. 105. Obbels ausführliche Nachricht von der Eiche, in den dt. Nachrichten VIII. 125. 141. 252. 349. Ebenb. Anmerkungen zu den Mülling. Polizen-Nachrichten von Pflanzung der Eichen. Ebendas. IX. 75. Von Pflanzung und Wartung der Eichen in den Müll. Polizen-Nachrichten 1755. S. 211. und in Justis Finanzschriften I. S. 465. Von der Kultur der Eichen im kalten Erdreiche. Hamb. Magazin XXIII. 281. Delon. Nachrichten von der Kultur



Kultur des Eichen- und Kastanienholzes. Ebend. XXIV. S. 172. Dekon. Nachricht von Pflanzung der Eichen in den Stuttg. phys. dk. Auszügen III. 158. Brocke vom Anbau der Eichen. Forstmag. XI. 16. Beschreibung einer bequemen Art Eichen zu pflanzen in Schrebers neuen Sammlungen V. 148. Fahrenholz von der Eichenanpflanzung in Oberösterreich und Geldern. Dek. Nachrichten V. 43.

§. 471.

Art. 130. Weiße E. *Q. alba*.

*Synon.* *Quercus alba* Banisteri. du Ham. n. 16. *Quercus foliis superne latioribus, opposite sinuatis, sinibus angulisque obtusis.* Gronov. virg. 117. 149. Le Chêne blanc. The white Oak. Hanb. I. 164.

Suckow 263. v. Wangenheim 12. Marschal 219. v. Zanthier 113. Carrer 411. Du Roi II. 270. Mönchs Verzeichniß 95. Miller n. 11.

Abbild. v. Wangenheim F. VI. Du Roi l. c. t. V. f. 5.

§. 472.

Mit Blättern die in schiefe Querschnitte getheilt sind, welche stumpf, und besonders die untern und obern wellenförmig sind.

Waterland: Nordamerika. Sie wird siebenzig bis achtzig Fuß hoch und erwächst mit hundert bis hundert und fünfzig Jahren zu Baumholz. Gleich unsern Landeichen hat sie eine Pfahlwurzel. Ihre schönen Blätter sind an den Seiten in schiefe Querschnitte getheilt, welche stumpf und besonders die untern und obern wellenförmig sind. Die Rinde ist weißlich und schuppig. Das Holz ist weiß, ins bräunliche fallend, fein und sehr dauerhaft. Die Frucht ist klein, oval, braun, an der Spitze ein wenig gedrückt, sitzt in einem kleinen flachen Nüsschen.

Diese Eiche liebt die Sommerseite und verlangt in den ersten Jahren den Schutz anderer Bäume. Ihre Rinde giebt nur eine mittelmäßige Loh, die Amerikaner gebrauchen sie ausserdem zum Färben, auch besitzt sie Heilkräfte. Das Holz ist sehr fein, ziemlich zähe und fest.

Beym

Beym verarbeiten nimmt es mehr Glanz und Politur als unser Eichenholz an. Man verwendet es hauptsächlich zum Schiffbau und zu Stabholz, ausserdem zu vielen Sortimenten Werk- und Nutzholz. Nicht weniger giebt es ein gutes Brenn- und Kohlholz, und die Früchte sind eine vorzüglich gute Mast.

§. 473.

Art. 131. Rothe Rieseneiche. *Q. rubra maxima*.

*Synon.* *Quercus rubra*. Linn. Sp. Pl. Pl. T. II. 1413. n. 9. *Quercus foliorum sinubus obtusis, angulis lanceolatis, seta terminatis, integerrimis, vix divisis.* Gronov. virg. 117. Le Chêne rouge. The red Oak. Rothe Eiche, Scharlacheiche.

v. Wangenheim 14. Sudow 261. Borkhausen 368. Marschal 229. Du Roi II. 265 v. Zanthier 112. Mönch 94.

Abbild. v. Wangenheim f. VII. Du Roi I. c. t. 5.

§. 474.

Mit großen, eyrunden Blättern, deren Buchten nicht tief eingeschnitten sind. Die Ecken der Buchten endigen sich in haarförmige Spizen.

Waterland. Nordamerika. Sie treibt eine kurze dicke Pfahlwurzel, wird siebenzig bis achtzig Fuß hoch und vier, fünf, auch zuweilen sechs Fuß dick im Durchmesser gefunden. Ihre Stärke behält sie auf eine beträchtliche Höhe, ohne in Seitenzweige zu treiben, die sich nur an dem Gipfel ausbreiten. Die Rinde ist schwärzlichbraun, bey alten Bäumen gerissen; Die Blätter stehen abwechselnd und sind nicht alle von einerley Form. Gewöhnlich sind sie acht bis neun Zoll lang, gegen fünf Zoll breit, buchtig, aber nicht tief eingeschnitten. Die Buchten sind stumpf, die hervorstehenden Ecken endigen sich in haarförmige Spizen, und haben bisweilen zur Seite Zähne, die sich gleichfalls in haarförmige Spizen endigen. Die obere Fläche ist glänzend, die untre glatt, der Länge nach

S

mit

mit einer rothgelben, erhabenen Nerve durchzogen, die sich in verschiedene Aeste theilt, in welchen eine weißliche Wolle sitzt. Die Früchte sind lang, oval, braungelb, an der Spitze platt gedrückt. Sie sitzen an den Seiten der Zweige am jährigen Holze.

Der Buchs dieser Eiche ist außerordentlich schnell und ihre Anzucht mit der Cultur unserer Landeichen in den meisten Stücken dieselbe. Nur darf man die Eicheln nicht so tief legen. Das Holz dieses Baumes kommt an Güte unserm Eichenholze nicht gleich. In Amerika nimmt man es zu Stabholz für Zucker- und Syrupfässer, da es für geistige Getränke zu porös ist. Zu Zimmer- und Werkholz wird es nur in Ermangelung eines bessern Holzes genommen. Als Brenn- und Kohlholz ist es nur mittelmäßig. Die Rinde giebt eine mittelmäßige Lohe. Die Früchte geben eine gute Schweinmast und sollen sich ein ganzes Jahr halten, ohne von Würmern angegriffen zu werden.

§. 475.

Art. 132. Kastanieneiche. *Q. Prinos*.

*Synon.* *Quercus Castaneae foliis procera*, arbor americana, Du Ham. n. 18. Le Chêne a feuilles de Châtaigner. The Chestnut-leaved Oak. Hanb. Kastanienblättrige Eiche.

v. Wangenheim 15. Du Roi II. 276. Marshal 237. Sukow 263. v. Zanthier 116. von Burgsdorfs vollständige Geschichte II. n. 3.

Abbild. v. Wangenheim f. VIII. Du Roi l. c. T. VI. f. 3.

§. 476.

Die Blätter sind eyrund, am Rande ausgezackt und mit runden, gleichförmigen Zähnen versehen.

Waterland. Nordamerika. Der Stamm dieser überaus nussbaren Eiche wird vierzig und mehr Fuß hoch und über zwey Fuß dick. Die Rinde ist gefurcht und halbbraun. Die Blätter sind von ansehnlicher Größe, dem Ka-



Kastanienlaube einigermaßen ähnlich, am Rande ausgezackt und mit runden, gleichförmigen Zähnen versehen. Die Adern laufen in schiefer Richtung von der Hauptribbe nach den Hervorragungen und stehen parallel über einander. Gegen die Basis laufen sie spizig zu. Die Früchte sind sehr gros und schön, anderthalb Zoll lang, einen halben Zoll breit, der Länge nach schön gelb und braun gestreift, an der Spitze mit einem Knöpfchen geziert.

## §. 477.

Die Rinde dieser Eiche giebt eine sehr gute Gerberlohe, und die Früchte liefern die vorzüglichste Schwel-nemast. Das Holz hat viele Aehnlichkeit mit dem Holze des zahmen Kastanienbaumes. Es ist zu Umzäunungen und sonst noch zu mancherley Nutzung brauchbar. Der Baum wächst schnell, und kommt auf öden, unfruchtbaren Heiden und Viehhuten gut fort. Nach Hrn. von Wangenheim können weite, unfruchtbare Districte, wo nichts als Heide wächst und selbst die Kiefer spärlich gedeiht, durch die Kastanieneiche in nutzbare Wäldungen umgeschaffen werden. Sie verlangt aber in der Jugend Schatten, und wird nach den Erfahrungen des Hrn. von Burgsdorf in einem frischen Boden, zum verwundern bald groß.

## §. 478.

Art. 133. Cerreiche, Q. Cerris.

*Synon.* Quercus calice hispido, glande minore. C. Bauh. pin. 420. Du Ham. n. 6. Le Chêne de Bourgo-gne. Oak with prickly cups and smaller Acorns. Hanb. Burgundische Eiche.

Linn. sp. pl. T. II. p. 1415. Borkhausen 367. Märter 20. von Zanthier 108. Suckow 264. Du Roi II. 259. Mönchs Verzeichniß 97. v. Burgsdorfs vollständige Geschichte T. II. n. 8. Miller n. 5.

Abbild. Du Roi l. c. T. V. f. 1.

§. 479.

Mit leyerförmigen, in spizige Queerstücke zertheilten Blättern, und stachelichten Fruchtnäpfchen.

Vaterland. Spanien, Burgund und Oestreich. Sie wächst eben so geschwind als unsre Landeichen und ist gegen unsre Winter gar nicht empfindlich. Die Blätter sind lang, schmahl, leyerförmig, in spizige Querschnitte getheilt, auf der obern Fläche hellgrün und so glänzend, als ob sie mit Firniß überzogen wären, auf der untern etwas weißlich und wollig und mit einer der Länge nach laufenden, weißlichen, wolligen Ader, die sich in kleine Nebenäste theilt, durchzogen, übrigens steif und von lederartiger Substanz. Aus den Blätterachseln brechen dünne, blätterähnliche Fäden in Büscheln hervor. Die Fruchtnäpfchen sind mit Stacheln besetzt. Bey den ziemlich erwachsenen Bäumen bleibt das trocken gewordene Laub bis in das folgende Frühjahr hängen.

§. 480.

Gatt. 39. Carpinus. Hornbaum. Sommergr. Laubholz.

Die männlichen Blüten bilden ein lockres Közchen, das aus gefranzten, einblütigen Schuppen zusammengesetzt ist. Staubfäden zehn, sechzehn, mit haarigen, zusammengedrückten, zweytheiligen Staubbeuteln. Die weiblichen Blüten bilden ein walzenförmiges, aus einblütigen Schuppen zusammengesetztes Közchen. Die Blumenkrone ist einblättrig, in sechs Einschnitte getheilt. Fruchtknoten zwey sehr kurze, mit zwey, drey gefärbten Staubweegen, deren Narben einfach sind. Frucht eine kleine, eprunde, eckige Nuß, mit weißlichem Kern.

§. 481.

Art. 134. Gemeiner H. C. Betulus. Linn.

Synon. Ostria ulmo similis fructu in umbilicis foliaceis. C. Bauh. pin. 427. Carpinus Dodon. Pempt. 841. Carpinus. Hall. hist. n. 1627. Le Charme comun. The common Hornbeam. Hainbuche, Weisbuche, Steinbuche

buche, Zwergbuche, Heckebuche, Hagebuche, Haubuche, Hachenbuche, Zaunbuche, Kollholz, Flegelholz, Hartholz, Rauchbuche, Hornrauchbuche, Witibuche.

v. Burgsdorf 171. 154. Märter 63. Becker 39. Borkhausen 101. Sudow 267. Germershausen IV. 241. V. 160. Gleditsch I. 456. n. 31. Leonhardi 79. Linn. Sp. pl. ed. 3. II. 1416. Pollich palat. II. 619. n. 911. Scopoli carn. II. 243. n. 1189. Du Roi I. 123. Du Hamel I. 92. Gleditsch vermischte Abhandlungen II. 417. Krünitz Encyclopädie VII. 314.

Abbild. Delhasen II. t. 13. 14. 15. Cramer t. 4.

§. 482.

Mit eyrund zugespikten, gezahnten, mit parallelen Falten versehenen Blättern, pfeil- oder lanzettförmigen, glattrandigen, an der Spitze zurückgebogenen Schuppen der weiblichen Kätzchen.

Einheimisch, dauerhaft, ein Baum erster Größe. Der Stamm ist selten rund, und man findet ihn von verschiedner Höhe. Die Aeste wachsen oft sehr unregelmäßig und der Topf bisweilen etwas windig. Die starke, ästige Wurzel geht drey Fuß tief und breitet sich sechs Fuß weit aus. Die Blätter kommen aus ziemlich spizigen Knospen, brechen zu Anfang des Mayes aus, fallen zu Ende des Octobers ab. Sie stehen abwechselnd auf runden, feinbehaarten, kurzen Stielen, an deren Basis eine röthliche, eysförmige Drüse sitzt. Die Blätter sind drey Zoll lang, anderthalb Zoll breit, eyrund zugespitzt, am Rande eingeschnitten, mit eysförmigen Zähnen gesägt, und mit parallel laufenden Falten versehen. Die Blüten erscheinen im May. Die männlichen kommen einzeln aus den Blattknospen, sind anfangs eysförmige Knospen, werden endlich lange, hängende Kätzchen, deren cylindrische, glänzende, glatte, glattrandige Schuppen sich ganz weitläufig decken und auseinander stehen. Die weiblichen Blüten erscheinen in einem kleinern, walzenförmig gebildeten Kätzchen, und sind gleichfalls anfänglich Knospen. Die



Schuppen der ausgebildeten Käzchen sind lanzettförmig, an der Spitze zurückgebogen, gelblichgrün, am Rande kaum bemerkbar gefranzt, weitläufig auseinander stehend. Staubweeg und Narbe sind purpurfarbig. Der Saame reift im October.

§. 483.

Dieser Baum liefert eines der besten Brennholzer. Die aus seinem Holze gebrannten Kohlen geben eine sehr starke und anhaltende Hitze. Das schwere, spaltige Nuzholz ist sehr weis, hart, fest und zähe. Die Zimmerleute suchen es, um es im trocknen zu verarbeiten. Nur im Wetter und in der Erde ist seine Dauer nicht sonderlich. Ferner gebrauchen es die Wagner, Dreher und Tischler. Es werden Schrauben, Pressen, Walzen, Rollen, Dehlstampfen, Lavetten, Kammräder, Flachsbrechen, Deichseln, Dreschflegel, Hebel, Sättel, Kummeter, Eymmer, Kübel und andres festes, dauerhaftes Handwerkzeug daraus verfertigt. Der Kern vollkommner Stämme, besonders von deren Ende, das schön braun gestreift zu seyn pflegt, kommt an Härte und in der Art, wie es sich bearbeiten läßt, dem Ebenholze gleich. Die Rinde könnte vielleicht in der Färbererey benutzt werden.

Man baut diesen Baum in verschiedenen Absichten, nämlich zu Baumholz — welches im großen nicht rathsam ist, oder zu Schlagholz — wo er weit mehr Vortheile gewährt, oder zu Kopfholz auch zu Hecken an. Die Erziehung geschieht am besten in Kämpen. Er nimmt mit allerley Boden vorlieb, wenn eine Schicht Dammerde darauf befindlich, und die Lage nicht hoch und trocken ist. Der Boden wird zur Saat blos wund, nicht locker gemacht, und der Saame (geflügelter drey Scheffel, abgeflügelter vier Meßen Berliner Maas auf einen Morgen a 180 rhl. R.) mit einem Dornstrauch eingeschleppt. In den ersten Jahren verlangen die Pflanzen Schatten. Die Pflanzzeit ist der Herbst.

v. Burgsdorf 454. Hartig 66. 77. 87. Gazette litteraire, Lausanne 1768. Auch zu Hopfenbäumen können die Hornbäume gebraucht werden. In Hecken bringen sie weder Blüten noch Früchte. Bey Nauheim ist die Chaussée doppelt mit Hornbäumen besetzt, die zu Kopfbäumen eingerichtet werden. In Turin soll man das Laub den Seidenraupen füttern.

## §. 484.

Art. 135. Hopfen: H. C. ostrya.

Le bois dur. The Iron - Wood, Hop - Hornbeam.

Suckow 268. n. 2. Du Roi I. 127. Gronov. virg. 118. Kalm's Reisen II. 220. III. 603. von Wangenheim 48. Marshall 49.

## §. 485.

Mit größern Blättern, aufgeblasenen Schuppen der weiblichen Zapfen.

Waterland. Nordamerika, Italien, Krain. Ein Baum der ersten Größe, der ein ziemlich schnelles Wachsthum hat. Die Stammrinde ist aschgrau. Die Blätter sind oval, zugespitzt, dunkelgrün, um ein merkliches größer als bey der vorigen Art, am Rande fein gezahnt. Der Saame sitzt in kleinen aufgeblasenen Beuteln, wovon mehrere beysammen stehen, und das Ansehen eines Hopfenkopfes haben. Er ist noch dauerhafter als unser Hornbaum, mit dem er Cultur und Benutzung gemein hat.

## §. 486.

Art. Morgenländischer H. C. orientalis. Mill.

Le Charme du Levant. The eastern Hornbeam. Morgenländische Hainbuche.

Suckow 269. n. 4. Miller. n. 3. Du Roi I. 131. Münch's Verzeichniß 19.

## §. 487.

Mit kleinen, eckrund länglichen, gesägten Blättern, sehr kleinen Fruchtzapfen.

Ein dauerhafter, sommergrüner Baum dritter Größe, der von unten auf mit waagrechten Zweigen dicht

besezt ist. Die Rinde ist dunkelgrau, mit weissen Punkten häufig besezt. Die Blätter sind eyrund lanzettförmig, am Rande gesägt, klein, die Saamenzapfen sehr kurz. Er bleibt klein, ist nicht so dauerhaft als unser Hornbaum, verdient aber in Gegenden, die ein gemäßigtes Clima genießen, wegen seiner dicht wachsenden Zweige zu Hecken den Vorzug.

§. 488.

Art. 136. Duinischer H. *C. duinensis*. Scop.  
Duinische Hainbuche.

Sudow 269 n. 5. Scopoli carn. II. 243.

Abbild Scopoli t. 60.

Mit fast herzförmigen Zapfen, eyrund zugespikten, glatten, doppelt gesägten Blättern.

Scopoli fand diese Art bey Duin in Kärnthén. Sie hat keinen hohen aber einen ausgebreiteten Wuchs. Die Blätter sind kurzgestielt, eyrund zugespitzt, glatt, doppelt gesägt, mit zwey abfallenden, borstenförmigen Nebenblättchen versehen. Die Schuppen der fast herzförmigen Fruchtknoten sind am Rande doppelt gezahnt.

§. 489.

Gatt. 40. *Corylus*. Hasel. Sommergrünes Laubholz.

Die männlichen Blüten erscheinen in langen, dünnen, cylindrischen Rätzchen, deren Schuppen röthlich, wollig, einblütig, nach aussen breit und aufgebogen, in drey Lappen getheilt sind, von denen der mittlere breite die beyden andern bedeckt. Staubfäden, sechs, acht, zehn sehr kurze. Die weiblichen Blüten stehen zu zehn und mehrern, wie kleine Knöpfe dicht unter jenen oder davon entfernt. Sie sind von einer Knospe und jedes Knöpfchen mit einer lederartigen, dicken, in mehrere Einschnitte getheilten Blumendecke umgeben. Die Blumenfrone fehlt beyden Blüten. Der Fruchtknoten ist sehr klein, hat zwey rothe Staubweege mit einfachen Narben.

Frucht



Frucht eine Nuß, die in der ausgewachsenen Blumen-  
decke sitzt.

§. 490.

Art. 137. Gemeiner H. Strauch. *C. avellana*. Linn.

*Synon.* *Corylus silvestris*. *C.* Bauh. pin. 418. *Corylus sepium*. Hall. hist. n. 1625. *Avellana nux sylvestris*. Fuchs. hist. 398. Le Noissetier des Bois. The common Hazel. Haselstaude, Haselnußstrauch, wilder Haselstrauch, Waldhaselstaude.

Suckow II. 936. Borkhausen 115. Linn. sp. pl. ed. 3. T. II. p. 1417. Pollich palat. II. 620. n. 912. Scopoli carn. II. 244. n. 1192. Schrank bavar. I. 658. Gleditsch I. 446. Leoncardi 119. Märter 120. v. Burgsdorf 419. Hirschfelds Fruchtbaumzucht I. 107. Du Roi I. 173. Bonare Dict. d'hist. nat. 419. v. Münchhausen III. 826. Kalm in Schrebers neuen schwed. Mag. I. 67.

Abbild. Blackwell. t. 293.

§. 491.

Ein ganzer Strauch, mit eyrunden, stumpfen Blattansätzen, länglichen, glatten Nüssen, welche theils einzeln, theils traubenförmig sitzen.

Ein einheimischer, dauerhafter, ganzer Strauch, der unter unsre Masthölzer gerechnet wird. Die Rinde des Stammes ist aschgrau, der Aeste hellbräunlich, weiß punktiert. Die Blätter stehen abwechselnd an haarigen Stielen, sind groß, weich, verkehrt eyrund, in eine lange Spitze auslaufend, am Rande doppelt sägezählig eingeschnitten, runzlich, auf beyden Flächen behaart, oben dunkel unten hellgrün, mit eyrunden, stumpfen Nebenblättchen versehen. Alter der Vollkommenheit, zehn, zwölf Jahre. Die Früchte stehen theils einzeln, theils traubenförmig. Jede Nuß sitzt in einem hohlen, vielfach gespaltenen Nüpfchen, das sie nicht ganz bedeckt. Die Nüsse sind länglicht rund, stumpf, etwas plattgedrückt, glatt, einsaamig, da wo sie in dem Nüpfchen sitzen rauh. Der Kern ist weiß, mit einer zimmetfarbigen Haut bekleidet.

Dieser so sehr verkannte und doch so nützliche Strauch, verdient eine wirthschaftlichere Behandlung. In unsern Wäldern kommt er meistens im Unterholze vor und nimmt mit dem Schatten andrer Bäume Vorlieb, so wie er die aufkeimenden Eichen- und Buchenpflanzen gegen Frost und Hitze schützt. Man kann ganz abgetriebene, entblößte Oerter, felsige Anhöhen der Gebirge oder verödete Distrikte in Waldungen durch ihren Schutz in Anwachs bringen und ihnen damit zu einer künftigen Anzucht von nutzbareren Holzarten die erste Vorbereitung geben. Wo man ihn zu Befriedigungen nimmt, giebt er zwar eine feste Hecke, hat aber wegen seiner stark kriechenden Eigenschaft die größte Aufsicht nöthig.

von Burgsdorf Geschichte einiger vorzüglicher Holzarten I. 48.

#### §. 492.

Sein Holz ist zu verschiednen Absichten brauchbar, es dient zu verschiednen Schirrarbeiten, die reinen derben Stücke zu Zeichen- und Pulverkohlen, guten Wellenholz. Ein Revier von Haseln Unterbusch kann alle zwölf Jahre abgetrieben werden und schlägt immer sicher wieder aus. Der größte Schaden wird ihnen durch den Sommerhieb zugefügt, wodurch die Stöcke geschwächt und zum Theil ganz getödtet werden. In Gegenden wo das Fasreißholz guten Absatz hat, verzinsen sie sich reichlich, wobei noch insbesondre die Cultur oben erwähnter edlerer Holzarten begünstigt wird. Die Früchte gehören unter die Mastfrüchte. Wo man sie in Menge sammeln kann, kann man sie auf Dehl benutzen, welches sehr süß und angenehm schmeckend ist. Durch sie geschieht auch die Vermehrung dieses Strauches. Man legt sie am besten gleich an ihre bleibende Stelle.

Wittenb. Wochenbl. IV. 434. Garmann de Coryli pulvere in seinen Epist. S. 150. Von einem wohlschmeckenden Dehle aus den männl. Blüten. Handb.: Mag. 1774. 1086. Berl. Samml. VII. 602. Hamburger Mag. T. XVI.

#### §. 493.

## §. 493.

Art. 138. Großer H. Strauch. *C. maxima*. Mill.

*Synon.* *Corylus sativa*, fructu oblongo rubente. *C.*  
Bauh. pin. 417.

Miller I. 850. n. 2. Du Roi I. 176. Borkhausen II 7. Su-  
chow 937. n. 2.

## §. 494.

Mit länglichen Nebenblättchen, wenig eingeschnittenen  
Blumendecken, länglichen, an der Spitze mit einer  
feinen Wolle bekleideten Nüssen.

Gewöhnlich ein Strauch, bisweilen ein niedriger  
Baum, der mehr eine eigne Art, als eine Spielart zu  
seyn scheint. Die Rinde ist dunkler, die Zweige stehen  
mehr aufrecht. Die Blätter stehen abwechselnd auf haar-  
rigen Stielen, sind größer, runder, braunroth, auf  
beyden Flächen behaart, am Rande sägezählig einge-  
schnitten, vorne mit einer kürzern Spitze versehen. Die  
Nebenblättchen sind länglich. Die Blumendecke hat we-  
nige Einschnitte, steht über die Frucht, die sie ganz be-  
deckt, hervor. Diese ist länglich, an der Spitze mit  
einer feinen Wolle besetzt, dünnchaliger. Die Kernhaut  
ist dunkelroth.

## §. 495.

Art. 139. Haselbaum, *C. arborescens*. Linn.

*Synon.* Le Noissetier a fruits en grappes. The Clu-  
ster nut. Baumartiger Haselnußstrauch, baumartige Ha-  
selnusstaude.

Suchow 937. Schrank I. 659. Borkhausen II 8. von  
Münchhausens Hausvater V. 142. Du Roi I. 178.

Mit einer fleischigen, mit gefranzten Einschnitten verse-  
henen Blumendecke, kugelförmig, oben glatter Nuß,  
baumartigen Stamme.

Er erreicht oft die Höhe der stärksten Birnbäume.  
Daubenton erwähnt eines solchen Baumes, der acht und  
vierzig Fuß hoch war, und zwey Fuß im Umkreis hielt.  
Ein



Ein andrer von gleicher Höhe, und dessen Stamm, wo er am dicksten war, zehn Fuß und drey Zoll im Umfang hatte, befand sich noch im Jahr 1750 in Frankfurt am Mayn im Haseltischen Garten. (S. Kesslers Reisen. Ausgabe 1751. Band I. S. 78.) Die Rinde des Stammes ist aschgrau und glatter als an den andern Arten. Die Blätter stehen abwechselnd auf dünnen, wenig-behaarten Stielen. Sie sind zarter, eysförmig, mit einer Spitze die bald länger, bald kürzer ist, am Rande regelmäfiger gesägt, auf der untern Fläche hellgrün, auf der obern nur ein wenig dunkler und dünner behaart. Die Blumendecke ist in ihrem Boden sehr fleischig, am Rande mit sehr vielen gefranzten Einschnitten versehen, welche die Frucht nicht decken. Diese ist kugelrund, oben platt, hart und dickschalig und schließt einen vollen, süßen Kern ein. Sie reift frühe und fällt dann von selbst aus der Blumendecke.

§. 496.

Gatt. 41. Juglans. Wallnuß. Sommer Laubholz. Die männlichen Blüten sitzen in schuppigen Kästchen. Einblütige Schuppen, vertreten die Stelle der Blumendecke. Die Blumenkrone ist sechstheilig. Staubfäden, acht, zwölf, sechzehn, achtzehn. Die weiblichen Blüten sitzen zu zwey, drey, und stiellos beyammen. Ihre Blumendecke ist vier bis acht spaltig und hinfällig. Die Blumenkrone ist vierspaltig. Der Fruchtknoten, welcher sich unter der Blume befindet, hat zwey Staubweege, die bey der gemeinen Art fehlen. Die Frucht ist eine zweyschalige Nuß mit einem runzlichen, öhlichten Kerne, der durch die vier Wände des sogenannten Sattels in vier Theile getheilt ist, welche gegen den Stiel zusammengewachsen sind.

§. 497.

Art. 140. Gemeine W. Juglans regia.

Synon. Le Noyer ordinaire. The common Wallnut.

Suckow

Sudow 270. Borkhausen 109. Schrank I. 740. n. 728. Linn. sp. pl. ed. 3. II. 1415. Scopoli carn. II. 241. n. 1186. Märter 76. Becker 60. Ehrhard III. 174. Medicus botanische Beobachtungen 1782. S. 346. Hirschfeld Fruchtbaumzucht I. 54. Büchner diss. de Nuce iuglande. Erford 1743. 4. Hasenow. Merkwürdigkeiten III. 237. Eph. nat. cur. Vol. V. 374. Neue gesellschaftliche Erzählungen IV. 142. Du Hamel II. 39. Du Roi I. 323. v. Münchhausen III. 835.

Abbild. Cramer t. 22. Delhasen II. 34. 36.

§. 498.

Mit gefiederten, mehrentheils aus fünf eyrundlichen, glatten, etwas gezahnten, einander fast gleichen Blättchen zusammengesetzt.

Sein Vaterland ist Persien. Er wird ein Baum erster Größe. Die Rinde ist aschgrau. Die Blätter sind mehrentheils aus fünf eyrundlichen, auf beyden Flächen glatten, am Rande etwas sägezähnigen Blättchen, von denen das äußerste am größten ist, zusammengesetzt. Die Blüten erscheinen im May. Die Narben sitzen in der weiblichen Blüte ohne Staubweege fest auf. Die Früchte sind mittelmäßig groß, länglicht rund, reifen im Sept. Unter unsern Wallnußbäumen ist dieses die vorzüglichste Sorte. Sonst sind noch folgende bekannt:

a) Pferdnuß, Roßnuß. I. 1. fructu maximo. La Noix de Jauge. The large Wallnut.

Die Früchte sind sehr groß, dünnshaalig, die Kerne sind von einem weniger angenehmen Geschmack und der Baum erfriert leicht.

b) Grübelnuß, Steinnuß. I. 1. fructu perduro. Mit dick und hartschaaligen, kleinen, schwer auszukernenden Früchten.

c) Dünnshaalige Wallnuß. I. 1. fructu tenero et fragili putamine. Le Noix Melange. The thin-shelled Wallnut.

Die Nuß ist von derselben Größe, hat eine dünne, zerbrechliche Schale und einen angenehm schmeckenden Kern.

Der

Der Baum leidet aber gewöhnlich von Vögeln, und in Niederdeutschland besonders von nassen Sommern, wodurch der Kern zeitig faul oder doch wässerig und unschmackhaft wird.

d) Späte Wallnuß, Johannisnuß. I. 1. fructu scrotino. Le Noyer de St. Jean. The late ripe Walnut.

Der Baum schlägt erst um Johannis aus und ist daher dem Erfrieren weniger ausgesetzt.

Samml. der Berner ökon. Ges. I. V. St. III. S. 105.

#### §. 499.

Der gemeine Wallnußbaum ist einer der schönsten und nützlichsten Bäume. Er ist leicht zu erziehen, in Ansehung des Bodens sehr genügsam, hat einen geschwinden Wuchs, erreicht ein hohes Alter, und ist fast nach allen seinen Theilen nützlich. Insekten beschädigen weder seine Blüten noch Blätter. Wenn er hundert Jahre und drüber gestanden hat, fällt ihn der Besitzer, nimmt den Abraum zur Feurung und verkauft Stamm und Wurzel, die beyde ein schönes gemasertes, hartes Holz liefern, das von Drehern, Tischlern und Büchsenmachern sehr gesucht wird, um ein beträchtliches. In der Bergstrasse rechnet man den jährlichen Ertrag für Nußbaumholz auf 10,000 Gulden, welches noch eine Kleinigkeit gegen das ist, was die Schweizer aus ihren Nußbäumen lösen. Dieses Holz läßt sich sehr leicht und gut poliren, und die Wurzeln der am Wasser stehenden Bäume geben schöne, leichte, biegsame Spazierstöcke.

Philos. Transf. n. 58. Ephem. nat. cur. Dec. II. an. 5. S. 412.

#### §. 500.

Die Blätter dienen zur Vertreibung der Insekten. Auf Garn, Wolle und Holz geben sie eine beständige, hellbraune Farbe und für das Vieh ist das abgefallene gesammelte Laub ein gutes Streu-Materiale. Die im Frühjahre



jahre hervordachsenden rothen Knospen und zarten Blätter dienen getrocknet als ein gutes Gewürz an Suppen und andern Speisen. Die abfallenden Blütenkäzchen hat man bey Würmern und der von ihnen herrührenden Epilepsie sehr wirksam gefunden. Die Rinde besitzt färbende Eigenschaften und verdient Versuche in den Gerbereyen.

Sieffert II. 132. Hellet 206. Ehrhards Beiträge III. 172. Handw. Mag. 1779. S. 815.

### §. 501.

Die Früchte des gemeinen Wallnußbaumes reifen zu Anfang des Octobers. Man schüttet sie auf Haufen, wodurch die äußern Schaalen anfangen in Gährung zu kommen und sich leicht ablösen. Sobald sie abgenommen sind (ein Geschäft das in manchen Gegenden ausläufere heißt) packt man die ausgenommenen Nüsse schichtweise mit Sand in einen weitläufig geflochtenem Korb, dessen Boden besonders durchlöchert ist und setzt sie sodann unter freyen Himmel in den Garten (unter Alfreds Regierung, wo man goldene Ringe an die Bäume der Landstrassen hängen konnte, sehr rathsam!) da sie nun hier immer dem Regen und Schnee ausgesetzt sind; so halten sie sich frisch, so daß man sie den ganzen Winter hindurch bis in den Merz, wo sie anfangen auszukeimen, genießen und die Kerne so leicht abschälen kann, als ob sie erst vom Baume kämen.

Diese Früchte sind durch ihren allgemeinen, häufigen Genuß bekannt genug. Die unreifen werden eingemacht, und sind eine gute Magenstärkung. Infundirt man sie mit Weingeist; so erhält man das in der Schweiz gebräuchliche Nußwasser. Aus den grünen Schaalen der halbreifen Nüsse wird in den Apotheken das Roob nucum juglandum bereitet. Die grünen Schaalen der reifen Früchte werden in der Färberey benutzt. Auch bereitet man das Extractum nucum juglandum in den Officinen dar-

daraus. Die innern harten Schaalen, werden an manchen Orten zum Einheizen genommen, wozu sie sehr gut taugen. Auch werden sie in verschlossenen Gefäßen für die Kupferdrucker gebrannt. Aus den Nüssen selbst wird für die Küchen ein Extrakt bereitet, der an Ragouts und andre braune Speisen gethan, ihnen einen sehr angenehmen, gewürzhaften Geschmack giebt. Selbst der sogenannte Sattel soll sich in schweren Krankheiten sehr wirksam bewiesen haben.

Fischer comment. de Anthelmintico novo (extracto, n. j.) Erf. 1751. 4. Bremisch verdisches Hebopfer, Beytrag II. n. II. Hamburger Magazin XVI. 84. Fungosa substantia, nuclei Juglandis lobos intercedens et separans, exsiccata et pulverisata, in vino exhibita, modica quantitate, exercitum anglicanum in hyberna dyssenteria gravissima, Medicorum solentiam eludente, aliisque remediis inexpugnabili, laborantem feliciter curavit. Dale Pharmacolog. ed. 4. p. 300. Ehrhards Beiträge IV 173. Vom schweiz. Nußwasser, S. Andrea Briefe aus der Schweiz. S. 301.

### §. 502.

Eine Hauptbenutzung der Nußkerne ist endlich die zu Oehl. Das daraus erhaltene Oehl, welches man von den geschälten Kernen, die man zuvor einige Minuten in kochendes Wasser wirft, durch pressen erhält, kommt dem Provenceröhl in vielen Stücken nahe und behält seine Güte sechs Jahre lang. Man macht dieses Oehl besonders in der Pfalz und in den Schweizerländern. In der Bergstrasse wird das Oehl, das gemeiniglich drey Centner wiegt, auf der Stelle zu 55 fl. verkauft und selbst nach Holland geführt. In der Schweiz vertritt es in der Küche die Stelle der Butter und des Olivenöhl, und ist das gewöhnliche Brennöhl. Die Oehlkuchen sind ein nahrhaftes Futter für das Vieh, und werden in der Schweiz auch von armen Leuten gegessen.

Num. 1) Zum einschmieren des Leders soll es weniger taugen, weil es spröde davon wird. Selbst die damit geschmierten Räder und Thürangeln, bewegen sich schwerer und die Mahler finden.

finden, daß es schneller als andres Oehl trockne. Klings vermischte Schriften, Mannheim 1789. S. 243. Stumpf, die Landwirthschaft Böhmens. B. II. S. 46.

2) Von dem medicinischen Gebrauch dieses Oehls.

a) Gegen den Bandwurm. S.

Neue Sammlungen auserlesener Wahrnehmungen, B. V. S. 436.

b) Gegen die weissen Flecken im Auge.

Roux Journale de Medecine. Vol. 59. May. Rozier Obs. sur la Physique. T. XVI. S. 39. Sammlung für praktische Aerzte. Vol. VI. S. 445. Auszüge aus den französisch. period. Schriften, Vol. III. 386. Sammlung für praktische Aerzte, Vol. IX. 667.

3) Von dem Färbgebrauch der Schalen. Pörner, Sieffert l. I. c. c. Neue gesellschaftl. Erzähl. Vol. I. 104.

§. 503.

Man erzieht den Walnußbaum aus seinen Früchten. Diese werden am besten gleich an die Stelle, wo der Baum ein für allemahl bleiben soll, gelegt, weil er das Versetzen nicht wohl verträgt. In Gegenden, wo man einen frühen, sich gleichen, warmen Frühling erwarten kann, kann man die Nüsse im Frühjahr legen, sobald der Frost vorüber ist. Zu dieser Absicht muß man sie aber den Winter durch an einem gemäßigten Ort, im trocknen Sande, und zwar am besten in ihrer äußern grünen Schale aufbewahren. Sie werden zwey Zoll tief, mit jener äußern Schale, die sie gegen die Mäuse sichert und so gelegt, daß ihre Spitzen aufwärts, das dicke Stielende aber nach unten zu liegen kommt. Die Herbstsaat geht im Frühling, die Frühlingsaat nach sechs bis acht Wochen auf. Bey anhaltender Dürre begieset man die Pflanzen gelinde, und gegen den Winter bedeckt man sie mit Laub, damit ihre zarten Spitzen nicht vom Froste gedrückt werden. Schon nach acht Jahren fangen die Bäumchen an zu tragen. Oculiren und andre Veredlungsarten sind unnöthig.



Hirschfeld 92. Hesse 153 — 156. Sammlung der Berner  
Botan. Gesch. I. 169. Gothaer Wochenblatt, Jahrgang III.  
St. 8. Journal für die Gärtnerei, St. XI. S. 411.

## §. 504.

Auf Aecker, Wiesen und in Gärten schicken sich diese  
Bäume nicht, weil sie stark beschatten, alles unter sich  
verdämmen, mit ihren Wurzeln weit umher wuchern und  
ihre Laub den abfließenden Regen und Thau bitter und für  
den Unterwuchs schädlich macht. Besser pflanzt man sie  
um Dungkauten, zwischen die Häuser, wo sie die Luft  
reinigen, weniger als im freyen Stande erfrieren, die  
Verbreitung eines ausbrechenden Feuers aufhalten, die  
Gebäude gegen Windstürme sichern, und wo ihre Früchte  
auch gegen Nachstellungen sicherer gestellt werden können.  
Auch an Berge, Waldränder und auf andre öde, sonst  
nicht leicht zu benutzende Ländereien, schicken sie sich gut,  
und solche Anlagen verzinßen sich reichlich. In Ansehung  
des Bodens sind sie bekanntlich sehr genügsam: denn sie  
kommen in thonigem, steinigem und fettem Grunde fort.  
Nur Nässe ist ihnen zuwider. Der beste Boden für sie,  
ist ein aus Lehm mit Dammerde gemischter, auf Ebenen  
und Anhöhen, wenn nur ihr Stand geschützt wird.

Denso phys. Bibliothek. Vol. I. 531.

## §. 505.

## Nordamerikanische Wallnußbäume.

## a) Schwarze.

Art. 141. Schwarzer W. *J. nigra*.

Synon. Le Noyer a fruit noir. The black Wallnut.

Suckow 271. Marshal 107. Borkhausen 112. v. Münch-  
hausen III. 836. Churpfälz. Bemerk. 1774. 229. 1789. von  
Wangenheim 20. Du Roi I. 329. Medicus botan. Beobacht.  
1782. 346. Ebend. über das sicherste Mittel dem Brennholz-  
mangel abzuhelpen, Mannheim 1791. Hirschfelds Frucht-  
baumzucht 85. Münch 53. Ebend. Gartental. 1785. 219.

Jacquini

Jacquini Miscell. auct. 1. Vol. II. n. 1. Kalm in den schwed. akad. Abhandl. Vol. XXIX. 55. Philos. trans. n. 273. p. 908. Linn. sp. plant. II. 1415. Gronov. virg. 189.

## §. 506.

Mit gefiederten Blättern, lanzettförmigen, sägezähnigen Blättchen, Seitenknospen welche über den Blätterachseln stehen, sehr harten, nussförmig eingerissenen, krausgefurchten Nüssen.

Waterland. Nordamerika. Er hat viele Aehnlichkeit mit dem gemeinen Wallnussbaum. Die Blätter sind ungleich gefiedert, aus eilf, dreyzehn, siebenzehn, ein und zwanzig lanzettförmigen, am Rande gezahnten Blättchen, von denen die äußern kleiner sind, zusammengesetzt. Blätter und Blattstiele sind glatt, und haben gerieben einen balsamischen Geruch. Die Blüte erscheint im Jun. und Jul. In den weiblichen findet man zwey deutliche Staubweege. Die Pfahlwurzel ist kurz und dick, die Seitenwurzeln sind stark und breiten sich sehr weit aus. Er bildet im freyen Stande eine eben so große Krone als die Eiche, mit starken Aesten. Die Früchte sitzen zu zwey bis drey beysammen. Die äußere, wohlriechende, saftige Schaale sitzt so fest an, daß sie sich nur durch Fäulniß von der innern trennt. Diese ist schwarz, steinhart, kraus und tief eingerissen, nathlos. Inwendig findet sich zwischen dem Kern noch eine zwote Nuß, welche an mehreren Stellen mit der äußern verwachsen ist. Der Kern ist klein und so lange die Nüsse frisch sind, von einem schlechten Geschmack, wenn sie aber einige Zeit gelegen haben, verbessert er sich sehr. Die Stammrinde ist dunkelgrau, in das bräunliche fallend, gerissen, das Holz geflammt, oft maserig, dunkelrothbraun, in das schwarze fallend.

a) Mit runder Frucht. v. Wangenheim 20. Marschal 104.

b) Mit länglicht runder Frucht. Marschal 209.

## §. 507.

Dieser Baum liebt einen lockern, fetten, feuchten Boden in Niedrigungen. Da er aber allen Unterwuchs erstickt; so muß man ihn an Orten anziehen, wo er keinen Schaden thun kann. Er wächst schnell und erfriert nicht leicht, wie er denn im Jahr 1760. in Finnland, da die gemeinen Wallnußbäume alle erfroren sind, unbeschädigt blieb. Auch leidet er wegen seiner späten Blüte, selten von Frühlingsfrösten. Sein Holz und seine starken Wurzeln haben eine schöne Farbe. Es nimmt eine schöne Politur an und wird in Nordamerika fast eben so hoch geschätzt als das aus Westindien kommende Mahagoniholz. Man verfertigt Tische, Schränke, Uhrgehäuse und allerhand seines Hausgeräthe daraus, und schon mit fünf und zwanzig bis dreißig Jahren liefert diese Art ansehnliche Nußholzstämme. Die Abfälle geben gutes Brennholz. Die Rinde und äußere Fruchtschale dienen zum Färben; und die Früchte, wenn sie einige Zeit in Wind und Wetter gelegen haben, zur Schweinmast.

Medicus über das sicherste Mittel 2c. Ebend. über nordamerikanische Bäume. Mannh. 1792. S. 41.

## §. 508.

## b) Weise.

Art. 142. Butternußbaum, I. alba oblonga. Marsh.

Synon. Juglans cinerea. Linn. Sp. pl. II. 1415. Juglans oblonga, foliolis cordato-lanceolatis, inferne nervosis, pediculis foliorum pubescentibus. Mill. n. 3. The shag bark Walnut tree, the Butternut tree. Graue Wallnuß, grauer nordamerikanischer Wallnußbaum.

von Wangenheim 21. Marshal 110. Borkhausen 113. Suckow 272. Churpfälz. Bemerk. 1774. 230. Carver 416. Münchhausens Hausvater III. 835. Du Roi I. 335. Suckow 272. Medicus bot. Beobacht. 1782. 348.

Abbild. v. Wangenheim 21. F.

## §. 509.



## §. 509.

Mit gefiederten Blättern, eils bis siebenzehn länglich eiförmigen, sägezähnigen, scharf zugespitzten, meistens abwechselnd stehenden Blättchen, haarigem Blattstiele.

Waterland. Nordamerika. Der Baum wird dreyßig bis vierzig Fuß hoch, und gegen zwey Fuß im Durchmesser dick. Die Pfahlwurzel ist kurz und dick. Die Rinde ist am Stamme aschgrau, gerissen, an den Aesten rauh anzufühlen. Die Blätter stehen auf behaarten, etwas flebrigen Stielen und sind aus eils, funfzehn bis siebenzehn länglich eiförmigen, scharf zugespitzten, an der Basis schiefen, sägezähnigen, etwas haarig flebrigen, meistens abwechselnd stehenden Blättchen, von denen das äußerste am rundesten ist, zusammengefezt. Staubfäden acht, zwölf. Staubweege drey. Die Blumendecke der weiblichen Blüte ist achtpaltig. Die Früchte sitzen zu zwey, drey am Hauptstiele, sind groß, etwas birnförmig. Die innre Schaale ist sehr höckrig, mit rinnenartigen Vertiefungen, holzartig, einen viertels Zoll dick, sehr fest, läßt sich aber doch bey der Reife leicht zerdrücken. Die äußere Schaale ist hellgrün, behaart und flebrig und sitzt so fest auf, daß sie nur durch die Fäulniß losgeht. Der Kern ist sehr öhlreich und hat einen sehr angenehmen Geruch.

Das Holz ist ein treffliches Brenn- und Kohlholz, aber auch als Nußholz sehr schätzbar, da es eine schöne Politur annimmt. Wenn die Früchte einige Zeit auf dem Boden gelegen haben, geben sie eine gute Schweinmast. Rinde und Fruchtschaale geben eine fast nie verbleichende braune Farbe. Das Extract der Rinde giebt ein gelind abführendes Mittel. In seinem Waterlande fängt er da an häufiger zu wachsen, wo der vorhergehende wegen der zunehmenden Kälte seltener wird. Er liebt einen aus Lehm mit Sand und etwas Dammerde gemischten Grund.

## §. 510.

Art. 143. Höckernbaum, I. a. acuminata. Marsh.  
 Synon. Juglans alba. Linn. Le Noyer blanc de  
 l'Amerique. The white Wallnut, Hickery Wallnut.  
 Weiße Wallnuß, weiße Höckern Wallnuß.

Sudow 272. Marshal 112. Carver 418. v. Wangen-  
 heim 23. Du Roi I. 333. Hirschfeld 86. Ralm in den  
 schwed. Abhandl. XIII. 152. XXXI. 117. Mönchs Verzeich-  
 niß 52.

Abbild. v. Wangenheim F. XXII.

## §. 511.

Mit ovaler, an beyden Enden zugespitzter, vierkantiger  
 Nuß.

Waterland. Nordamerika. Der Baum wird vierzig  
 bis funfzig Fuß hoch und achtzehn Zoll bis zwey Fuß im  
 Durchmesser dick. Wo es der Boden zuläßt, treibt er  
 eine Pfahlwurzel und von dieser hängt sein Wuchs ab.  
 Die Rinde ist weisgrau, und glatt, bey alten Bäumen  
 etwas gerissen, und an jungen Stangen so zähe, daß  
 man sie als Bast gebrauchen kann. Die Blätter sind aus  
 fünf, sieben, neun gezahnten, lanzetförmigen Blättchen,  
 von denen das äußerste stiellos ist, zusammengesetzt. Ge-  
 rieben riechen sie wie die Blätter unsers gemeinen Wall-  
 nußbaumes. Die Gestalt der Früchte wechselt sehr ab.  
 Gewöhnlich sind sie oben und unten zugespitzt, in der  
 Mitte am breitesten. Die äußere Schaale spaltet sich in  
 vier Theile. Die innere ist sehr hart, glatt, der Länge  
 nach mit vier scharfen Ecken versehen. Ihre Nähte ste-  
 hen den Abtheilungen der äußern Schaale entgegen. Der  
 Kern ist klein und von einem angenehmen Geschmack.

Dieser Baum kommt in allerley Lagen und Boden  
 fort, der nur gemischt, und eben nicht fett zu seyn braucht.  
 Man findet ihn auf Bergen, Ebenen und an Wänden.  
 Seine Blüten leiden durch den Frost nur selten Schaden,  
 und er liefert alle Jahre eine Menge Früchte, die, wenn  
 sie

sie einige Zeit unter den Bäumen gelegen haben, eine treffliche Schweinmast geben. In Nordamerika preßt man Oehl daraus. Die Rinde wird von den Färbern benutzt. Das Holz ist zähe, es werden Artstiele, allerley Werkzeuge, Wagner- und Böttcherwaaren daraus gemacht. Als Brennholz hat es noch Vorzüge vor unserm rothbuchenen. Die daraus gebrannten Kohlen geben eine anhaltende Hitze und machen den Baum in der Nähe von Schmelz- und Hüttenwerken schätzbar. Aus dem Gaste, den man im Frühling durch das anbohren der Stämme erhält, bereiten die Nordamerikaner Zucker. Die letztere Benützung bleibt immer zweydeutig. Carver versichert, daß aus dem Holze bey'm verbrennen, ein vortrefflicher Zucker heraustäufelte. Es ließe sich also wohl die Einrichtung treffen, bey'm verbrennen und verkohlen des Holzes den Zuckersaft als Nebennützung zu erhalten, ohne die Stämme zu beschädigen.

## §. 512.

Gatt. 42. Fagus. Rothbuche. Sommer Laubholz.

Die männlichen Blüten sind in Közchen vereinigt. Die Geschlechtsdecke ist einblättrig, glockenförmig, fünf bis sechsspaltig und enthält mehrere Staubfäden mit länglichen Staubbeuteln. Die weibliche Blüte enthält einen Staubweeg mit dreytheiliger Narbe, der nebst dem Fruchtknoten bis an die Narbe von einer dreyeckigen Kapsel umschlossen ist, welche von einer vierblättrigen, außen borstigen Decke umgeben wird. Die Frucht ist eine sogenannte Eker, welche zwey bis drey Saamen enthält.

## §. 513.

Art. 144. Deutsche Rothbuche. *F. silvatica*.

Synon. *Fagus* Dodon. Pempt. 832. C. Bauh. pin. 419, Du Hamel I. 166. Le Hedre. Beech - Tree. Hanb. I. 8. Buche, Bücke, Buchbaum, Raubbuche, Mastbuche, Büche, Beuhbaum.



Siebertsch I. 463. Sudow 273. Märter 21. Linn. Sp. Pl. T. II. 1416. n. 3. Pollich pal. II. 617. Scopoli carn. II. 242. Schrank I. 741. Vorkhausen 106. Dörrien 258. von Burgsdorf Versuch einer vollständigen Geschichte vorzüglicher Holzarten I. T. Du Roi I. 230. Krünitz Encycl. VII. 271. von Burgsdorf Forsthandbuch 141. Hausvater IV. 240. V. 112. Ehrhards Beiträge IV. 176.

**Von den Figuren und Charaktern im Buchenholze handeln:**

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. an. 9. 10. p. 287. Dec. II. an. 7. p. 453. Cent. III. et IV. 224. Dec. III. an. 5. et 6. pag. 189. Dec. I. an. 6. 7. p. 9. Kulmi diss. de litteris in ligno Fagi repertis. Gedani 1730. Trew de literis in Fago repertis. in Commerc. Noriberg. 1733. p. 137 und 145. Adami Gedanken über das seltene in einem gefällten Buchenbaume. Breslau 1756.

Abbild. Cramer t. 3. Delhafen t. 6. 7. 8. von Burgsdorf vollständige Geschichte I. m. 26. R.

S. 514.

**Mit eckrund zugespitzten, am Rande etwas sägeförmig eingeschnittenen Blättern.**

Dieser schöne, dauerhafte und nuzbare Baum wächst in allen Gegenden von Europa. Selbst auf den Azoren findet man ihn noch, wie denn Fayal, eine der größten dieser Inseln ihren Namen von den Buchen (port. Faya), die daselbst unter Eschen und Myrthen häufig wachsen, (S. Forsters Reise um die Welt. II. S. 455.) führt. In den ersten sechzehn Jahren ist das Wachsthum der Buche nicht sehr beträchtlich. Nach Beschaffenheit des Bodens endigt sie ihr stärkstes Wachsthum mit etlichen sechzig Jahren. Ihr Schatten ist allem Unterwuchs nachtheilig, und so weit ihr Laub auffällt, kann nichts aufkommen. Auch haben neuere Beobachtungen gelehrt, daß der Bliß eben so gut in Rothbuchen als Eichen schlage. Im Alter wird dieser Baum leicht hohl und von unten herauf abständig, ob er gleich noch lange stehen kann. Seine Äste bilden eine offne, regelmäßige, weit ausgebreitete Krone, deren Abhauung zur baldigen Stammfäule viel

viel be trägt. Ein theil des Laubes bleibt auch den Winter über hängen und nimmt sodann eine braune Farbe an. Gegen Frost ist die Buche sehr dauerhaft, und nur späte Frühlingsfröste machen bisweilen die Stämme eisklöstig und verderben die jungen Saatzpflanzen in den frey liegenden Schonungen.

Praxis im allgem. ökon. Magazin I. 50. Mosers Forstarchiv. I. 310.

§. 545.

Die männlichen Blüten erscheinen im May unterwärts der neuen Triebe, in Rätzchen, welche an langen, rauhen Stielen abwärts hängen. Der Staubfäden sind neun bis zwölf, die Staubbeutel sind blasgelb, die Geschlechtsdecke ist ein einziges, glockenförmiges Blatt, welches gelblichgrün, behaart, halb sechsspaltig ist und spitzige Einschnitte hat. Die weiblichen Blütenköpfchen sitzen an den jungen Zweigen, von jenen abgesondert und stehen aufrecht. Der kleine Fruchtknoten hat einen Staubweg mit einer dreytheiligen, fedrigen, zurückgebogenen Narbe. Dieser Staubweg ist bis an die Narbe mit einer grasgrünen, pergamentartigen Decke, welche drey erhabne Nahten (Suturas) hat, eingeschlossen. Die äußere Decke dieser Corolle, besteht aus vier dicht anschließenden, herzförmigen, außen grau und rothborstigen, innwendig mit feinen, silberweisen, glänzenden Haaren bekleideten, dicken Blättchen. Beyde Decken (die innre und äußre) bleiben, erhärten und liefern bey der Reife, zwey, selten drey, braunschaalige, dreyeckige, öhlichte Saamenkerne, die fest an einander hängen. Sie fallen im October als eine einzige Frucht, aus der sodann ausspringenden äußern Geschlechtsdecke aus, und gerade herab.

Die Blätter kommen aus spitzigen Knospen, die fast perlfarbig und außen mit glänzenden, harten, dunkelgelblichen Schuppen bedeckt sind. Sie sind eyrund zugespitzt, am Rande etwas sägenförmig eingeschnitten, anfangs weich, hellgrün und etwas wollig, werden aber in der

Folge glatt, steif, glänzend und dunkelgrün. Sie stehen abwechselnd an den Zweigen auf kurzen Stielen, brechen mit der Blüte zugleich aus, nehmen leicht unbeständige Veränderungen an und sind auch zu monströsen Auswüchsen geneigt. Die Rinde ist an jungen Bäumen glatt und graugrün, an alten dunkelgrau, wird aber immer heller. Die Wurzel geht zwei Fuß tief und breitet sich sechs Fuß weit aus.

Ab. a) Mit gelbgestreiftem Laub. b) Mit weißgestreiftem Laub. c) Mit schwarzrothem Laub.

Bei Rheinhausen ohnweit Göttingen steht eine Rothbuche, deren Stamm nicht mit einer glatten Rinde bekleidet ist, sondern sie ist sowohl der Länge nach, völlig wie an Eichen tief gefurcht, als auch in die Quere, so daß die Borke ganz in Stücke, die etwa einen Cubitzoll halten mögen, getheilt ist. S. Beckmanns Grundsätze der deutschen Landwirthschaft. Ed. 3. S. 355.

#### §. 516.

Die Rothbuche gehört unter die harten Holzarten. Ihr Holz ist zwar sehr fest, wird aber von Würmern leicht angegriffen, reißt gern aus, so lange es noch saftig ist, und, wenn es ausgetrocknet ist, wird es brüchig. Daher geben die Stämme kein gutes Bau- noch Schwellholz, und man nimmt es nur im Nothfall zum bauen. Wenn es frisch ins Wasser kommt, soll es ziemlich dauerhaft seyn, nur Abwechslung von Trockniß und Nässe richten es bald zu Grunde. In England hat man Dampfmaschinen erfunden, um das buchene Holz, vor dem Gebrauch auszutrocknen, wodurch seine Dauer vermehrt und der Wurm abgehalten wird. Das Holz, so lange es grün ist, läßt sich gut hauen und schneiden, wie man es denn zu Buchbinder- Brandsohlen- und Spiegelbrettern, sehr dünne haben muß. Trocken hingegen stumpft es die Werkzeuge sehr ab. In der Rinde dauert es am allerwenigsten, diese aber ist zur Lohgare brauchbar.

Berner Abhandl. I. 722. Gleditsch Abhandl. I. 23. Beiträge zu dem Heiligenstädter Intelligenzbl. Erster Jahrg. S. 37.

#### §. 517.



## §. 517.

Die Buche, gleich in der Jugend unter der Scheere gehalten, giebt gute und schöne Lusthecken in Gärten. Das starke, vom Saft befrepte Nußholz dient bey Hütten- und Pochwerken, Mehl- Wind- Oehl- und Papiermühlen auch Hammerwerken, zu Preßblöcken, Balken, Blasbalggerüsten, Keil- und Stangenwerken. Ferner wird es zu Wagnerholz, zu Schrauben, Oehlstampfen, Rollen, Keltern, Stühlen, Bettstellen, Mulden, Kisten, Schlittenkufen angewand. Das schwächere giebt allerley Schirrholz, Wurf- und Kornschauffeln, Ruder, Spaden, Flachsbrechen, Joche, Achsen, Felgen, Holzschuhe, Absäße, Kummel- und Sattelhölzer, Handschlitten, Zeller, Wassereymmer, Degen- und Messerscheiden.

Gleditsch Abhandl. II. 417.

## §. 518.

Unter unsern einheimischen Holzarten ist es das beste Brenn- und Kahlholz, welches eine helle Flamme giebt, und ohne zu prasseln oder zu springen, Glut und Hitze lange hält. Die daraus gebrannten Kohlen sind hart, schwer und im Feuer dauerhaft, halten die Hitze lange, und die Asche ist zu Pottasche, ingleichen für Glashütten und Seifensiedereyen eine der allerbesten. Die Spähne dienen zur Läuterung des Weines. Das Laub kann zur Ansfüllung der Bettsäcke genommen werden, die weit länger und besser als die mit Stroh gefüllten halten. Die Früchte geben, mit Eicheln vermischt, eine sehr gute Schweinmast. Sonst hat man sie auch geröstet, statt des Koffees vorgeschlagen, wozu sie aber wegen ihrer narotischen Eigenschaft nicht zu taugen scheinen.

Museum rusticum. II. n. 111. Forstmagazin II. 6. 36. Aspetini amoen. acad. lin. I. 533. Fischerström schwed. Abhandl. 1761. S. 278. Seelig diss. de hydrophobia ex nimio fructuum fagi esu, orta. Erl. 1762.

## §. 519.

## §. 519.

Besser ist es sie auf Oehl zu benutzen. Dieses Oehl wird in vielen Gegenden an die Speisen genommen. Es ist blasgelb, hell, durchsichtig, und hat einen angenehmen Geschmack. Zur Gewinnung desselben müssen die Bucheckern geschält werden, weil die Schalen viel Oehl einschlucken, und dem ausgepreßten Oehle selbst einen herben, widerlichen Geschmack mittheilen. So dürfen die Bucheln auch nicht frisch, sondern erst nach Verlauf einiger Monate geschlagen werden, weil sie sodann mehr Oehl liefern. Das Mark, welches beim schlagen und pressen zurück bleibt, ist ein mästendes Futter für Rindvieh, Schweine und Geflügel. Getrocknet giebt es ein Mehl, so wie auch Stärke und Puder, welche man auch aus ungepreßten Bucheln erhalten kann. Außer dem Gebrauch des Oehls an Speisen, nimmt man es in England auch zum Wollwaschen. Beim brennen giebt es eine helle Flamme ohne übeln Geruch und in der Kälte gesteht es nicht so leicht als Baumöhl.

Monatsschrift von und für Mecklenburg 1790. S. 13. Carlier's Abhandlung von der Auspressung und den Eigenschaften des Buchöhl's in Klings vermischten Schriften, Mannheim 1789. Ehrhards Beiträge V. 171. Beckmanns ökon. phys. Bibliothek XVI. 191. Stumpfs Landwirthschaft Böhmens I. 45. Schwed. Abhandl. 1769. 80. Leipziger Intelligenzblatt 1768. Rheinische Beiträge 1789. Heft 9 und 10. Wittenberger Wochenblatt. B. VII. S. 153. Hist. de l'Academie royal. a Berlin. 1766. S. 11. Auszüge aus den franz. period. Schriften, B. IV. 229.

## §. 520.

Der vielfache Nutzen dieses Baumes empfiehlt dessen stärkere Cultur. Er liebt eine kühle Lage gegen Osten oder Norden, und verlangt in den ersten Jahren Schatten. Ein mit Gries und kleinen Steinen gemischter, frischer, lockrer Waldgrund ist für die Rothbuche der zuträglichste Boden. Will man sie auf neuen Gehauen, von welchen Fichten abgetrieben worden sind, anbauen, so

so läßt man, wenn der Gehau von Reißig und Stubben gereinigt ist, den Boden mit eisernen Harken wund und locker machen, und die Bucheln (115 — 126 Pfund auf einen Morgen) möglichst egal umher streuen, und mit der eisernen Harke, aber nicht zu tief unterbringen. Hat man aber alte, verraste Gehäue, die man mit dem Pfluge nicht zubereiten kann; so muß man sie mit scharfen, breiten Hacken, einige Monate vor der Saat fleißig umarbeiten, und dazwischen einmahl mit der Egge überziehen, um die Rasen zu zerreißen und den Boden mürbe und locker zu machen. Kurz vor der Saat wird er noch einmahl geharkt.

Beiträge zur Forst-Kameral-Wissenschaft S. 92. Maurer 85. Hartig 77. 85. Bühl 40. Hesse vom Holz-Anbau 104. 107. 147.

## §. 521.

Gatt. 43. Castanea, Kastanienbaum. Som. Laubholz.

Die männlichen Blüten stehen in cylindrischen Köpfchen. Staubweege, viele, borstige. Frucht, eine zweyhäutige Nuß, in einer großen, runden, mit langen Stacheln dicht besetzten Kapsel.

## §. 522.

Art. 145. Europäischer K. *C. sativa*. Scop.

Synon. *Castanea silvestris et sativa*. C. Bauh. pin. 418. *Castanea foliis ovato-lanceolatis, serratis, dentibus aduncis*. Hall. hist. n. 1623. *Fagus castanea*. Linn. Sp. pl. II. 1416. Le Chataigner. The Spanish Chestnut. Handb. I. 122. Kästenbaum, Köstenbaum, zahmer Kastanienbaum.

Suckow 275. Borkhausen 365. Scopoli carn. II. 242. Märter 79. Hirschfelds Fruchtbaumzucht I. 69. Du Roi I. 270. Du Hamel I. 96. Miller I. 584. Schrebers Samml. VI. 425. Churpf. Bem. 1781. 380.

Abbild. Cramer t. 23. Delhasen II. 40. 41.

## §. 523.

Mit lanzettförmigen, scharf zugespizten, sägenartig gezahnten, auf beyden Flächen glatten Blättern.

In den wärmern Gegenden unsers Erdbodens einheimisch. In Portugal und Spanien trifft man ganze Wal-



Waldungen davon an. Auf Madera fanden die H. Forster dergleichen. Sicilien ist nicht weniger reich daran, und besitzt auch die drey größten Kastanienbäume. In ganz Italien findet man sie. Sie haben sich aber auch weit gegen Norden ausgebreitet. Verschiedene Gegenden der Schweiz sind voll davon. Selbst auf den rauhen Appeninen trifft man ganze Waldungen davon an. England cultivirt sie sehr, und in Deutschland findet man beträchtliche Anlagen. Sogar bis auf Jütland ist dieser Baum vorgedrungen und bringt noch reife Früchte. Er erwächst zu einem Zimmerbaum. Die Stammrinde ist schwarzbraun. Die Blätter sind lanzettförmig, scharf zugespitzt, sägenartig gezahnt, auf beyden Flächen glatt, kurzstielig, stehen abwechselnd. Die Blüten erscheinen im May, die männlichen in langen, cylindrischen Räschen mit acht, neun, zehn Staubfäden. Die weiblichen in Knöpfchen, unterwärts jener, mit fünf Staubweegen. Die Früchte reifen im October.

DeKon. Nachrichten II. 36 — 79. Hirschfeld. I. 94. Brydonnes Reisen nach Sicilien I. S. Forsters Reisen I. 12. Gedanken über verschiedne Gegenstände der Forst-Kameral-Wissenschaft 402. Hier stehen einige Bäume an der Straße nach Grünberg. Hamb. Mag. XXII. 132. Eph. Nat. Cur. Cent. III. et IV. p. 90. Philos. Transf. Vol. LXI. 136.

§. 524.

Dieser Baum gewährt uns so vielerley Nuzungen, die ihn schätzbar machen, daß sein Anbau sehr zu empfehlen ist. Sein Holz ist, ohngeachtet seines geschwinden Wachsthum, ziemlich dauerhaft. Es ist hellbraun, hart und hat mit dem Eichenholze eine sehr große Aehnlichkeit, und daher beynahe dieselbe Nuzanwendung. Ja in Frankreich und Italien zieht man es zum bauen, besonders zu Dachstühlen dem eichenen Holze vor, weil es stärkere Lasten trägt, von seiner eignen Schwere weniger leidet und vom Wurmfisch frey bleiben soll. Weniger dient es zur Feurung. Es springt und knistert, und hinterläßt keine dauerhafte Kohlen.

Die

Die jungen Stangen geben Weinspäße, Hopfenstangen, Faßreise, Gabelstiele. Das Stammholz ist ein gutes Werk- und Nutzholz für Tischler und Dreher, läßt sich glatt poliren und gut lackiren. Man versertigt daraus schöne dauerhafte Tische, Stühle, Bettstellen, Schränke u. d. Für feuchte Keller giebt es die besten Faßdauben, denn wenn das Holz die Feuchtigkeit einmahl eingesogen hat, behält es seine Größe, quillt nicht auf und schwindet nicht ein. Seiner feinen Poren wegen soll auch der Wein in solchen Fässern weniger ausdünsten und stärker und angenehmer werden. Die Rinde ist zum Gerben brauchbar. Das Laub giebt ein gutes Streumaterial für das Vieh und einen guten Dünger. Die Einwohner der Provinz Limpsin bedienen sich desselben statt des Bettstrohes. Nach Suckows Versuchen lassen sich von den belaubten Zweigen mit schicklichen Zusätzen verschiedene schöne, dauerhafte Farben erhalten.

Montet in Acad. Reg. Parlf. 1762. 650.

§. 525.

Die Früchte werden in den Küchen auf mancherley Art zubereitet. Sie werden theils gekocht an Saucen, Ragouts und Kohl gethan, theils geröstet mit oder ohne Citronensaft und Zucker genossen. Man kann eine Art Chokolade und Kaffee, auch Stärke daraus bereiten. Doch sind die aus deren Mehl versertigten Kuchen und Brod schwer zu verdauen. In Italien wird alljährlich ein Theil in Backöfen getrocknet, um sie den Winter über aufzubewahren. Der Ueberschuß wird den Schweinen als eine treffliche Mast gefüttert. Auch Hirsche lieben die Früchte sehr, weswegen der Kastanienbaum einen Platz in Thiergärten verdiente.

Rozier obl. sur la Physique 1772. Jan. 237. 1771. Dec. 210.

§. 526.

Der Kastanienbaum läßt sich durch seine Früchte sehr leicht fortpflanzen, wenn sie nur wohl reif, vollkommen gesund



gesund und frisch sind. Er nimmt mit ganz geringen, trocknen Boden vorlieb, und liebt einen mehr hohen als niedern Stand. Der Boden wird von Unkraut und Gesträuche gereinigt. Dann legt man die Nüsse ein und einen halben Zoll tief, einen Fuß von einander, im Verbande, so daß die Keimspitze nach oben zu stehen kommt. Richtet man sein Augenmerk auf die Holznutzung; so darf man die Pflanzen weder versehen noch durchziehen. Auch bedarf die Saat Schutz gegen Feldmäuse; und die jungen Pflanzen Reinhaltung vom Unkraut. Den Maronier vermehrt man durch Voredlung. (am besten durch teicheln) auf Kastanien-Wildlingen.

Münchhausens Hauspater III. 847. Allgemeine Haus- und Landwissenschaft I. 614. Ehrhard III. 175. IV. 31. Hirschfeld 100—106. v. Wille 618—624. Parmentier Traité de la Chataigne. a Bastia et Paris 1780. Wietsch Abhandlung von Erziehung und Pflanzung der Kastanienbäume. Halle 1766. Die Kastanienbäume tragen nach den Bemerkungen des Herrn Chapelle gewöhnlich, wenn die Eichen tragen. Marquis von Puismarest sagt in seinem Unterricht von der Erziehung der Kastanienbäume im Journal économique. Nov. p. 40. 1754. Der Kastanienbaum ist ein Geschenk, womit die göttliche Vorsehung die Menschen in gewissen Landschaften gleichsam darum begnadigt hat, um die Unfruchtbarkeit (des Landes) zu ersetzen. Natur- und Kunst-Magazin I. 578. Gerthings Gedanken, Wünsche und Vorschläge zur Emporbringung der Gärtnerey. Jena 1788. S. 136. Hamb. Mag. XXIV. 172. Schrebers Samml. VI. 425. DeBon. Nachr. VII. 887. Mem. de la Soc. oec. de Berne 1765. I. n. 1. Stuttg. phys. dt. Auszüge III. 158.

Art. 146. Amerikanischer K. C. dentata.

Synon. Fagus castanea dentata. Marsh 82. Fagus castanea americana Burgsd. Holzcultur 93. Fagus castanea foliis lanceolatis, acuminato ferratis, subtus nudis Gron. virg. 1. 50. Le grand Chataigner de l'Amerique. American Chesnut Tree.



v. Wangenheim 47. Hirschfelds Fruchtbaumzucht I. 97.  
 Marshal 82. Du Roi I. 270.

§. 528.

Mit hellgrünen, lanzettförmig zugespitzten, scharf gezahnten, auf beyden Flächen glatten Blättern, dünner, sparsamer Krone.

Seinem Bau nach scheint er von der vorhergehenden Art nicht verschieden zu seyn, wohl aber durch seine härtere Natur: denn er wächst in seiner Heimat, weit über den ein und vierzigsten Grad nördlicher Breite hinaus, dessen Klima dem sechs und vierzigsten Grade in unserm Erdtheile gleich kommt. Die Rinde ist graylich, an jungen Stämmen glatt, an ältern gerissen, die Farbe des Holzes weiß, ins bräunliche fallend. Die Blätter sind lang, lanzettförmig, zugespitzt, am Rande scharf gezahnt, hellgrün, auf beyden Flächen glatt. Die Früchte haben einen süßen, angenehmen Geschmack. Der Wuchs des Baumes ist schnell, und er erreicht eine Höhe von sechzig und mehr Fuß, und eine Stärke von drey bis vier Fuß im Durchschnitt.

Für die nördlichen Gegenden von Deutschland wird der Anbau dieses Baumes vor der vorigen Art empfohlen, da er in den kältesten und rauhesten Gegenden fortkommt. Sein Holz ist leicht und in der Luft von Dauer. Es spaltet leicht und giebt ein gutes Bau-, Werk- und Nutzholz. Zur gewöhnlichen Feurung wird es wenig geschätzt, doch wird es zum Gebrauch der Grobschmiede verkohlt. Die abgeschälten Früchte werden getrocknet und in manchen Haushaltungen statt des Kaffees getrunken. Sie haben einen angenehmen süßen Geschmack und geben auch eine gute Mast für Schweine und Federvieh.

§. 529.

Art. 147. Zwerg-*R. C. pumila*.

Synon. *Fagus pumila* Linn. *Fagus castanea pumila*.  
 Marsh 84. Le Chataigner de Virginie. The Chinqua-  
 11 pin,

pin, the virginian dwarf Chesnut tree, dwarf Chesnut tree. Zwergkastanienstrauch, virginische Kastanienbuche, Chinquapinbaum.

Gronov. virg. 118. Linn Sp. pl. 1416. n. 2. Sukow 277. Du Roi I. 275. Münch's Berz. 41. Marshal 84. v. Wangenheim 57. Hirschfeld 97.

§. 530.

Mit fadenförmigen, knotigen Blütenkästchen, kleinen, lanzettförmig-eyrunden, scharf sägeförmig gezahnten, unten filzigen Blättern.

Waterland. Nordamerika. Sein Wuchs ist strauchartig und man findet ihn selten über zwölf Fuß hoch. Seine Blätter sind sehr klein, lanzettförmig-eyrund, scharf, sägeförmig gezahnt, auf der untern Fläche weißfilzig. Die Blütenkästchen sind kurz, fadenförmig, knotig. Die Früchte sitzen zu fünf, sechs nebeneinander, sind von der Größe und Form einer Haselnuß, süß, wohlschmeckend und können frisch gegessen werden.

§. 531.

In denjenigen Gegenden von Nordamerika, wo dieser Strauch in Menge wild wächst, giebt der Ueberfluß der Früchte, welche er reichlich zu tragen pflegt, eine treffliche Mast für die Schweine, wovon sie sehr fett werden, und ihr Fleisch einen weit angenehmern Geschmack, als von einer andern Mastung bekommt. Das Holz ist weißlich und nicht sehr schwer. Wegen der geringen Stärke, die es erlangt, wird es nur zu Dreher- und andern kleinen Nußarbeiten verwendet.

§. 532.

Gatt. 44. Platanus. Platanus. Sommergr. Laubh.

Blütenstand, kugelförmige Kästchen. Die männlichen Blüten haben eine kaum bemerkbare Blumenkrone, und viele Staubfäden, mit denen die Staubbeutel von unten

unten verwachsen sind. Die weiblichen Blüten haben eine vielblättrige Blumenkrone. Fruchtknoten, viele, Ihre Staubweege haben gekrümmte Narben. Die Samen sind rundlich, oben mit einer Spitze, unten mit einer Haarkrone versehen.

Platanus, nach der 4. aëriea platanus Virgil. in Culic. 123. Heyne.

§. 533.

Art. 148. Abendländischer Pl. P. occidentalis.

Synon. Le Platane de Virginie. American Plane-Tree, Large Button Wood, Western Plane Tree, Water Beech, Water Poplar. Amerikanischer Platanus, Wasserbuche.

Sudow 278. Borkhausen 105. Linn. Sp. pl. II. 1418. n. 2. Marshal 185. Du Roi II. 134. v. Wangenheim 31. Du Hamel II. 134. Miller III. 617. Germershausen V. 308. Mönch's Berz. 77. Forstmagazin VII. 56. Mem. et Obs. de la soc. occ. de Berne II. n. 4. Gronov. virg. 119. (151.) Churpf. Bemerk. 1774. 238.

Abbild. v. Wangenheim. F. XXXI.

§. 534.

Mit dreylappigen, unten mit zwey kleinen Ansätzen versehenen Blättern.

Waterland. Virginen. Er wird sechzig bis siebenzig Fus hoch und drey, vier Fus dick. Seine Wurzeln laufen seitwärts flach aus. Die Blätter haben zwey Haupteinschnitte, und drey stumpfe Lappen, an denen sich unten noch zwey kleinere befinden. Sie sind zwey, drey, fünfmahl mit spizigen Hervorragungen gezahnt, sehr groß, auf der Unterfläche wollig, sitzen auf wolligen Stielen. Die Rinde ist weisgrau und glatt, der Baum wirft sie, so wie er dicker wird, jährlich ab. Das Holz ist weisgelb. Der Saame hat keine eigentliche Decke oder Gehäuf: denn die Blumendecke ist viel zu klein, als daß man sie davor ansehen könnte. Treflich und weit über alles Lob



erhaben ist das, was H. R. R. Medicus über die Charakteristik dieses Baumes sagt in seinen Beyträgen zur schönen Gartenkunst S. 297.

Unter allen Kopfbäumen entspricht keiner dieser Absicht besser und geschwinder, als der Platanus: denn er hat einen weit geschwindern Trieb als die Weiden, erwächst schon mit funfzehn Jahren zu Schlagholz, mit vierzig zu Baumholz. Das Köpfen kann alle vier Jahre wiederholt werden, und schadet dem Stamme selbst nicht im mindesten, der nun noch mehr in die Dicke wächst. Diese zuletzt übrig bleibenden, gesunden Stämme geben ein ziemlich gutes Brennholz, welches stark und geschwind feuert, und keine schlechte Kohle hinterläßt. Auch als Nutzholz ist es schätzbar, indem man Eimer, Schachteln, und andre kleine Gefäße daraus verfertigt.

Kalms Reisen II. 214. Borrowstons Almanach 1783. S. 185. Ehrhard IV. 78. Hirschfelds Gartenkalender auf 1787. S. 180. 189. Er ist auch nach Suckows Versuchen in der Färberey brauchbar.

#### S. 535.

Sein gerader Stamm, die prachtvolle Krone mit ihrem ansehnlichen Laub empfehlen ihn zu Alleen in windstillen Thälern und Ebenen. Zu dieser Absicht muß er aber aus dem Saamen gezogen werden. Bedeckung verträgt der Saame, aber nur wenig, dagegen bekommt es ihm wohl, wenn man das Beet immer feucht und schattig erhält. Der Boden, den er liebt, muß mit guter Dammerde gemischt, feucht, und seine Lage gegen Windstürme geschützt seyn.

#### b. Vermachsene Staubfäden.

#### S. 536.

Gatt. 45. Thuja, Thujia. Nadelholz.

Männlicher Blütenstand: Kästchen. Einzelne Schuppen, welche die einzige Geschlechtsdecke ausmachen, ent-

enthalten vier kleine, mit einander verwachsene Staubfäden. Weiblicher Blütenstand: Zapfen. Jede Schuppe ist zweiblütig und enthält zwei Staubweege, wovon jeder zu einer Nuß erwächst.

§. 537.

Art. 149. Abendländische T. *T. occidentalis*.

Synon. Thuja Theophrasti, du Ham. n. 1. Arbor vitae, Hanb. I. 52. L'Arbre de Vie de Canada. The american arbor vitae, the white Cedar of Canada. Canadische weiße Ceder, Lebensbaum, gemeiner Lebensbaum, westindischer Lebensbaum.

v. Wangenheim 7. Marshall 312. Münch 135. Du Roi II. 455. Linn. Sp. pl. II. 1421. n. 1. Sudow 392. Medicus in den Churpf. Bemerk. 1774. S. 217. Kalm's Reisen III. 473.

Abbild. v. Wangenheim F. III.

§. 538.

Mit glatten Zapfen, deren Schuppen abgestumpft sind.

Immergrün. Vaterland: Sibirien, Nordamerika und das nördliche Europa. Die Wurzeln laufen seitwärts, auch findet man eine kleine Pfahlwurzel. Der Wuchs des Baumes ist langsam, und es verfließen wohl hundert und zwanzig Jahre, bis Bretter daraus geschnitten werden können. Der Stamm treibt viele Seitenzweige von sperrigem Wuchs. Die Zweige stehen unregelmäßig, beynahe horizontal. Die jüngern, platten sind mit Nadeln bekleidet. So wie die Zweige älter werden, werden sie runder und verlieren nach und nach ihre Befleidung. Alle jüngere und Nebenzweige haben ein gegliedertes Ansehen, durch die kleinen Nadelblättchen, die sich rund herum über einander legen. Sie stehen anfangs zu sechs neben einander, entfernen sich aber, so wie der Zweig älter wird, immer mehr von einander. Zwey einander gegenüber stehende sind in der Mitte zusammen gefaltet und begränzen die Ränder der Zweige. Die vier andern, von

denen zwey auf der obern Fläche des Zweiges, zwey auf der untern neben einander stehen, sitzen oberhalb jener, und legen sich an die Zweige platt an. Die scharf zugespitzten Blättchen schmiegen sich dicht an den Schuß, daß man nur die Spitze abbringen kann. Sie sind ferner in einander geschoben und liegen daher wie Fischschuppen übereinander. Jede solche Blattschuppe trägt eine kleine Warze, die man an den obern platten, auf dem Schusse liegenden am deutlichsten wahrnimmt. Die ganze untre Seite der jüngsten Schüsse ist anfänglich concav, die obere aber conver, dieses geht nachher ins plattgedrückte, und endlich bey den ältern Zweigen ins runde über. Die Rinde ist an jungen Bäumen dunkelbraun und glatt, wird aber nachher rissig. Die Frucht ist ein kleiner, länglichter, oben abgestumpfter Zapfen, mit langen, glatten, braunen Schuppen. Der Saame ist an der Spitze eingekerbt, und auf beyden Seiten mit einem ausgeschnittenen, häutigen Flügel umgeben.

Ab. a) Scheckige Thuja, *T. o. variegata* West. b) Wohlriechende Thuja, *T. o. odorata*. An Wuchs und Größe der Mutterart gleich. Zweige und Blätter duften gerieben einen angenehmen Geruch aus. Die Zweige hängen nieder.

### §. 539.

Die Thuja zeigt sich auch bey uns ausnehmend dauerhaft. Das Stammholz ist weisröthlich. Es ist in der Luft, in den Wohnungen, auf und in der Erde, auch im Wasser außerordentlich dauerhaft. Aber die Länge der Zeit, bis der Baum das Alter seiner Vollkommenheit erreicht, macht dessen Anbau im großen bey uns nicht rathsam. Sonst liefert er eines der schätzbarsten Bau- und Nutzholzer, giebt feine, schöne Bretter und sehr dauerhafte Schindeln.

### §. 540.



## §. 540.

Gatt. 46. Pinus. Pinus. Nadelholz.

Diese Gattung, deren sämtliche Arten bis auf zwey immergrün sind, besteht aus vier Untergattungen: Kiefern, Fichten, Tannen, Lerchen. Männliche Blüten erscheinen in traubenförmigen Büscheln. Die Geschlechtsdecke besteht aus vier kleinen, offenstehenden Schuppen. Staubfäden, viele, in eine Säule verwachsen. Nach der Befruchtung vertrocknen die männlichen Blüten und fallen ab. Die weiblichen Blüten bestehen aus Zapfen, welche aus vielen kleinen, steifen, länglichen, in einander geschobenen, zweyblütigen Schuppen zusammengesetzt sind. Staubweeg, einer, pfriemenförmig, endigt sich in eine einfache Narbe. Nach der Befruchtung wachsen die Zapfen mit den zwischen den Schuppen befindlichen Sacmenstöcken, und letztere verwandeln sich bey der Reife in zwey Nüsse, deren Einfassung bey den meisten Arten ein häutiger Flügel ist.

v. Lengefeld, Anmerkungen von den auf dem Thüringer Walde bekanntesten drey Arten Nadelhölzer. Nürnberg 1762.

4. Runze von Anbauung der Nadelhölzer. Deimold 1788.

## §. 541.

Erste Untergattung. Kiefern.

Zwey bis drey Nadeln kommen aus einer gemeinschaftlichen Scheide.

Art. 150. Deutsche K. P. silvestris.

Synon. Pinaster I. feu austriacus major. Clus. hist. p. 31. Pinus silvestris genevensis vulgaris et Taeda. I. Bauh. hist. I. 252. Picea Caesalp. Syst. p. 130. Piceaster Kellonii. Pinus foliis binis, convexo-concavis, conis masculis solitariis, alaribus. Hall. hist. n. 1660. Pinus Pinaster Mawe. Le Pin des bois. The wild Pine. Hanb. I. 33. 232. Kiehnbaum, Föhre, Mändelbaum, Fichtbaum, wilde Fichte, Fiechtbaum, Forren, Förling, Forrenbaum, Forcheln, Forle, Fackelfor, Schleißfor, Kuhn-  
fichte,

fichte, Feurenfahre, Föhre, Harzbaum, Krähsichte, Gränholz, Wirbelbaum, Zirbelbaum, Eirbelbaum, Rißferbaum, Festenbaum, Tällen, Kernholz, Kieferholz, Kienföhre, Kuhnbaum, Füre, Forchenbaum, Ferche, Mädelbaum, Ziegenholz, Verge, Thäle, Spanholz.

Linn. Spl. Pl. T. II. 1418. Pollich palat. II. 622. Scopoli carn. II. 247. Sudow 380. Märter I. Du Roi II. 13. Borkhausen 10. v. Burgsdorf 280. Gleditsch I. 345. v. Zanthier 119. Becker 14. Leonhardi 145. Hausvater V. 317. Forstmagazin I. 98. Dörrien 263. Leers herbort 214. Eph. nat. Cur. Dec. III. an. 7. et 8. Schrank bavar. II. 230.

Abbild. Delhafen I. t. 1—4. Lengefeld t. 5. 6. v. Gleichen t. 28. Cramer t. 26.

§. 542.

Die Nadeln kommen zu zwey, selten zu drey aus einer gemeinschaftlichen Scheide, liegen im Anfang auf einander, trennen sich aber nachher und stehen an den Zweigen im Kreise herum. Die Zapfen sind kegelförmig und haben längliche, stumpfe Schuppen.

Die Kiefer wächst fast in allen Gegenden unsers Erdtheils, und ist wegen der Menge ihres Harzes, das sich besonders in der Wurzel sehr anhäuft, gegen die Kälte äußerst unempfindlich. Die Pfahlwurzel dringt, wenn es der Boden erlaubt, ziemlich tief ein, die Seitenwurzeln sind stark und laufen weit umher. Es erreicht dieser Baum in einem, seiner Natur gemäßen Boden und geschlossenem Stande, eine Höhe von achtzig, neunzig bis hundert Fus. Die Nadeln sind lang, hellgrün, glänzend, schmahl, zugespitzt, auf der einen Seite gewölbt, erhaben und gestreift, auf der andern flach, endigen sich in eine scharfe Spitze. Sie liegen anfangs auf einander, trennen sich aber bald, und stehen an den Zweigen im Kreis herum. Sie erscheinen zu zwey, selten zu drey aus einer abgeschnittenen Scheide. Die ältesten verlieren sich nach und nach, wenn der Frühlingstrieb ins volle Wachsthum kommt. Die Blüten erscheinen im May,

die





§. 544.

Die Kiefer ist für uns ein sehr wichtiger Baum. Die mit dieser Holzart bestandenen Wälder, liefern Holzländerholz, welches zu Mastbäumen, Kielen und Rähnen genommen wird. In Ermangelung der Eichen geben die Kiefern gute Hammervellen, reine, dauerhafte Sägeblöcke, Bohlen, Pfosten, Diehlen, allerley Bauholz über und unter der Erde. Auch verarbeiten die Tischler vieles Kiefernholz zu Fensterstöcken, Fußböden, Tischblättern. Das feinere suchen die Orgelbauer, Clavier- und Instrumentenmacher. Die Böttcher nehmen das mittelmäßige zu Staabholz. Als Brennholz giebt es eine helle Flamme und geschwinde Hitze, verbrennt aber schnell. Aus den Stubben wird Theer, Kiehnöhl und Pech und aus den unreinen Ueberbleibseln Kiehruß gewonnen. Das kleine Holz und die Wurzeln dienen zum verkohlen.

Nachrichten der Schles. patr. Gesellschaft B. II. S. 200.  
Gunk in den schwed. Abhandlungen 1754. S. 96. Forstmagazin I. 98. Berliner Sammlungen VII. 630.

§. 545.

Die Kiefer nimmt mit einem sehr geringen Boden vorlieb, wenn er nur nicht ein Spiel der Winde ist. Allein die Güte ihres Holzes und Wuchses hängt doch sehr von der Lage und Güte des Bodens ab. In einem nähresten Boden wächst die Kiefer zwar anfänglich ziemlich schnell und scheint recht gut fortzukommen, allein mit-ten in ihrem Wachsthum bleibt sie stehen, und geht zeitig aus. Ein thoniger, sehr steiniger oder kalschichter Boden sind ihr, so wie ein Sumpfsgrund gleichfalls zuwider. Der beste Boden ist Sandland mit etwas Walderde vermischt, so daß der Sand die Oberhand hat, und sich unter der obern Schicht keine, der Kiefer nachtheilige Erdlage findet.

Der Boden wird zur Aufnahme des Kiefernsaamens den Sommer oder Herbst zuvor, durch einsähriges pflügen zubereitet. Ist er verwildert; so müssen erst die Stubben ge-

gerodet werden, weil sonst vieler Saame unnöthig verschwendet würde: denn der auf die Stubben fallende geht nicht auf, zudem wird durch das Stockroden viel neuer Boden gewonnen. Die Gruben werden eingeebnet, das Land vom Strauchwerk gereinigt und der Boden wund gemacht. Hat man gebundene Sandschollen, so werden diese bloß mit der Egge überzogen, oder wenn sie bedeckt sind, gar nicht gerührt. Uebrigens geschieht die Bearbeitung des Bodens, wenn er abhängig ist, nicht von oben herunter, weil sonst das Wasser den Saamen und die jungen Saatzpflanzen auswaschen und wegspülen würde, sondern von unten hinauf.

S. 546.

Der Kiefernsaame erreicht seine Reife zu Ausgang des Octobers. Von da bleiben die Zapfen den Winter durch noch bis in den März fest geschlossen und diese Reife der Zapfen, ist der schicklichste Zeitpunkt, sie zu brechen. Die Erfahrung hat gelehrt, daß der Saame, von den zu dieser Zeit gebrochenen Zapfen, zum aufgehen allemahl geschickt sey. Man muß aber nur diejenigen Zapfen sammeln, welche bereits vor zwey Jahren geblühet haben. Sie sind von zimmetbrauner Farbe, geschlossen, und sitzen einen Jahrtrieb besser vorwärts, als diejenigen, welche schon vor drey Jahren geblühet haben und deren Schuppen auseinander stehen. Auch würde es für die Bäume selbst sehr nachtheilig werden, wenn man die Zapfen nicht pflückt, sondern mit den Ästen abbrechen wollte. Bis zur Saatzeit hebt man sie an einem luftigen Orte auf, oder klangelt sie gleich aus.

Der Saame ist aber etwas schwerer auszubringen als der Saame aus Fichten- und Tannenzapfen, indessen kommt es hauptsächlich auf eine geschickte Behandlung an. Häufig geschieht das ausklingeln in besonders dazu eingerichteten Zimmern, die mit den bereits geleerten Zapfen geheizt werden. Rings herum an den Wänden werden

Hor-



Horden von fünf Fuß Länge und ein Fuß Breite, je eine einen Fuß hoch über der andern, angemacht. Hierein werden die Zapfen gelegt und zwar erst in die entfernten Horden, wo sie bisweilen mit Wasser besprüht werden. Wenn man nun ein feines Knaken bemerkt, bringt man sie auf die näher bey dem Ofen stehenden Horden, rüttelt sie bisweilen und rührt die Zapfen mit den Händen um, da denn der Saame auf die untergebreiteten Lacken fällt. Die leer werdenden Horden werden immer aufs neue belegt. Der gesammelte Saame wird mit den Händen abgerieben und in einer Wanne geschwungen. So von seinen Flügeln gereinigt, bringt man ihn gleich an einen kühlen Ort, schüttet ihn leicht auf, und sticht ihn fleißig um, wo er sich zwey bis drey Jahre hält.

Anweisung wie reiner Kiefersaame gesäet und abgeflügelt werden müsse. Auf Königl. Preussischen Befehl publicirt, dd. Berlin den 15. Nov. 1779.

#### §. 547.

Man hat aber zwey Methoden Kiefern anzubauen: a) durch die Saat der Zapfen: b) oder des Saamens.

Die Saat der Zapfen zieht man vor, wenn man von der Güte des Saamens nicht hinreichend überzeugt ist, ferner auf freyen, der Sonne ausgesetzten Blößen, auf Sandfeldern und unbedeckten Schollen. Der Saamensaat bedient man sich zur Ausbesserung in den wund gemachten Schlägen, zum nachsäen in den leeren, aufgehackten Flecken, in den ältern Schonungen und in den mit Strauchwerk gedeckten Plätzen der Sandschellen. Auf einen Morgen rechnet man sechs bis acht Pfund Saamen und zieht den ungeflügelten Saamen dem geflügelten vor. Beyder leidet aber keine Bedeckung über sich. Endlich läßt sich die Kiefer auch leicht verpflanzen. Man muß zu dieser Absicht junge Pflanzen nehmen, die nicht im Dickigt gestanden, sondern im freyen der Luft und Sonne ausgesetzt gewesen sind. Die beste Pflanzzeit ist der März und April.



April. Man darf sie anfangs nicht über vier Fuß auseinander setzen, sonst breiten sie sich zu sehr in die Aeste aus und erwachsen zu keinen hohen schlanken Stämmen.

v. Burgsdorfs Forsthandbuch, S. 461 — 67. Hesse vom Holzanbau S. 194. v. Zanthier 119. Vorschläge zur Verbesserung der Kiefernfaat, Berlin 1785. Zinkens Leipziger Sammlungen V. 358. Delib. et Mem. de la Societe de Rouen. T. I. n. 11. Berner Abhandl. IV. Jahrgang IV. St. S. 55. Handbr. Magaz. 1771. S. 290. Besonders das Königlich Preussische Circulare an sämtliche Forstbediente, die Forstverbesserungen betreffend, d. d. Berlin 2ten Aug. 1788. Kämpfers Gutachten wie bey dem An- Fort- und Ausgang eines Kiefernwaldes zu verfahren, Eisenach 1772. Titius neue gesellsch. Erzähl. I. 108.

§. 548.

Art. 151. Krumholz: *P. montana*. Münchh. V. 217.

*Synon.* *Pinaster pumilis* seu *IVtus austriacus*. Clus. hist. p. 32. *Pinus foliis binis, convexo-concavis, conis masculis solitariis alaribus.* (Var.  $\beta$ .) Hall. hist. n. 1660. *Pinus mughus*. Scopoli carn. II. 247. n. 1195. *Pinus silvestris montana*. Du Ham. n. 6. Le Pin de Montagne, le Torchepin. The Mugho-Pine. Krummholzbaum, Legföhre, Bergfichte, kleine Alpenkiefer, Legföhren, Legföhre.

Borkhausen 12. Sudow 382. Du Roi II. 31. Miller III. 5. Märter 5. Mönch 66. Mathioli Kräuterbuch 22. Hausvater V. 325. Schrank bay. II. 230. und in den Naturhist. Briefen II. 289. und in seinen bayrischen Reisen, München 1786. S. 64.

§. 549.

Mit zwey, aus einer Scheide kommenden, dunkel schmutzig grünen Nadeln, kriechendem Buchs, kegelförmigen Zapfen, deren Schuppen länglicht rund und auf der äußern Seite mit erhabnen Warzen besetzt sind.

Ein immergrüner Baum, der sich mit Stamm und Aesten an die Erde drückt, auf welcher er wohl zwanzig Fuß

Fuß weit fortkriecht und sich dann, jedoch selten über drei Ellen hoch aufrichtet. Er wächst auf den Gebirgen in Ungarn, Tyrol, auf dem Birtenberger-Schwarzwalde und den Schweizer Alpen. Die Rinde ist bräunlich schwarz. Die Nadeln erscheinen zu zwey aus einer Scheide, sind schmutziggrün, länger und stärker als an der vorigen Art. Das Holz ist bräunlich, harzreich und riecht sehr balsamisch. Die Zweige sind sehr zähe. Die Zapfen sind kegelförmig und ihre Schuppen länglicht rund, aussen mit erhabenen Warzen besetzt, bald aufrecht, bald hangend. Nach Hallern, Schrank u. a. ist sie nur eine Varietät der gemeinen Kiefer.

## §. 550.

Wegen ihrer biegsamen Zweige leidet diese Kiefer nichts von Schneelasten, welche unsre Kiefer so oft beschädigen. Ihr Holz dient zur Verfertigung verschiedner, kleiner Geräthschaften und die sehr biegsamen Zweige zu Bändern und Fagereifen. Nach einigen soll dieses der Baum seyn, von dessen öhlichem Harze in Ungarn, vorzüglich aber auf den carpathischen Gebirgen, von den dasigen Einwohnern das sogenannte Krummholzöhl bereitet und durch ganz Deutschland verkauft wird. Aus dem freiwillig ausschwitzenden Harze soll in Ungarn der bekannte Ungarische Balsam gemacht werden. Das Krummholzöhl aber soll man im Frühjahr aus den jungen Sprossen dieser Kiefer bereiten. Wegen seines krummen, buschichten Wuchses dient dieser Baum zu natürlichen Verschanzungen, und die krummen Nutzholzstücke werden bekanntlich bey dem Schiffbau sehr gesucht.

Forstmagazin IX. 323. Breynius de Oleo carpathico (Krummholzöhl) in Eph. Nat. Cur. Cent. VII. VIII. S. 4. Reusner vom Krummholzöhle. Ebend. Cent. X. S. 432. Crells Chem. Archiv. B. II. S. 135. Sollte diese Art wohl Alstroemer Pinus viminalis seyn? S. Schwedische Abhandl. XXXIX. S. 294. Schedels Waaren-Lexicon. f. v. Linbaum Bruckmann de Kofzodrewina. Brunswig 1727.

## §. 551.

§. 551.

Art. 152. Jersey K. P. virginiana. Mill. n. 9.

*Synom.* Pinus canadensis bifolia, foliis curtis et falcatis, conis mediis incurvis. Du Ham. n. 10. Pinus foliis geminis; squamis conorum oblongorum aculeatis. Gronov. virg. 152. Le Pin gris de Virginie. Jersey Pine. Two leaved Pitch Pine. Wang. 74. Two leaved Virginian or Jersey Pine. Marsh. 179. Jersey two-leaved, prickly-coned Pine. Mawe. Nordamerikanische, zweynadeliche Pechkiefer.

Sudow 383. Du Roi II. 35. Miller III. 9. Marshal 179. v. Wangenheim 74.

§. 552.

Mit kurzen, dunkelgrünen Nadeln, kurzen, an der Spitze mehrentheils etwas krummen Zapfen, deren Schuppen mit einer scharfen, braunrothen Spitze bewafnet sind.

Ein immergrüner, dauerhafter, nordamerikanischer Baum, der bey uns guten Saamen bringt und in vielen Lustwäldungen angetroffen wird. Der Schaft ist selten gerade und theilt sich in mehrere Aeste. Die Rinde ist bräunlich und tief gerissen, das Holz rothgelb, schwammig, harzreich und doch von geringer Dauer. Dieses Harz schwißt durch die Risse der Rinde und giebt den Aesten das Ansehen, als ob sie mit Zucker kandirt wären. Die Nadeln sind zwey Zoll lang, breit, hart, steif, gerade, zugespitzt, auf der äußern Seite abgerundet, auf der innern gesurcht und von dunkelgrüner Farbe. Sie erscheinen zu zwey aus einer gemeinschaftlichen Scheide, in Büscheln, die so dicht beisammenstehen, daß man den jungen Zweig kaum sehen kann. Die Zapfen sind klein, kegelförmig, an der Spitze mehrentheils gebogen. Die Schuppen sitzen fest auf und sind, so weit sie hervortragen holzartig. Vorne haben sie eine scharfe, braunrothe Spitze. Die Brüchigkeit seines Holzes macht seinen Anbau nicht rathsam. In Amerika benutzt man ihn auf

Theer



**Theer und Pech.** In einigen Gegenden heißt er Sprossenkiefer, welches vermuthen läßt, daß seine Sprossen zur Verfertigung des Spruce-Biers gebraucht werden.

## §. 553.

**Art. 153. Stachelkiefer.** *P. echinata* Mill. n. 12.

**Synon.** *Pinus virginiana praelongis foliis.* Du Ham. n. 15. Le Pin - Cypre. The two and tree - leaved Bastard Pine. Wang. 74. Virginia tree - leaved prickly-coned Pine. Mawe. Bastard Pine. Hanb. I. 232. Zwey und dreyblättriche, virginische Bastardkiefer, nordamerikanische Kiefer mit stachlichten Zapfen, Ngelkiefer, nordamerikanische, zwey und dreynadeliche Bastardkiefer, stachelzappfige Kiefer.

v. Wangenheim 74. Marshal 172. Sudow 383. Mönch. 67. Du Roi II. 38. Miller III. n. 12.

## §. 554.

**Mit zwey und drey Nadeln aus einer Scheide und Zapfenschuppen, die sich in einen langen, zurückgebogenen Dorn endigen.**

**Waterland. Virginien.** Am häufigsten wächst dieser Baum an den Seeküsten, sowohl in einem trocknen als feuchten Boden. Mit einer Höhe von funfzehn bis zwanzig Fuß theilt sich der Stamm in mehrere, ziemlich starke, sperrige Aeste. Die Rinde ist bräunlich und aufgerissen. Die Nadeln sind schmahl, dunkelgrün, lang, kommen zu zwey bis drey aus einer gemeinschaftlichen, kurzen Scheide und endigen sich in eine scharfe Spitze. Die Nadelbüschel stehen weitläufig von einander entfernt. Die Zapfen sind kegelförmig, dünne, die gelbbraunen Schuppen endigen sich in einen etwas zurückgebogenen Dorn und bedecken jede, zwey kleine, geflügelte Saamenkerne. Sie wird in Nordamerika bloß auf Theer und Pech benutzt.

## §. 555.

## §. 555.

Art. 154. Virginische Büschelkiefer. *P. rigida.*  
Mill. n. 50.

*Synon.* *Pinus americana* foliis praelongis subinde ternis, conis plurimis confertim nascentibus. Du Ham. n. 17. Le Pin à trôchet. Virginia cluster - coned Pine. Mawe. The common tree-leaved Virginian Pine. Marsh. The tree-leaved Pine, the tree-leaved Virginian Pine. Wangenh. Virginische dreyblättrige Kiefer, rauhe nordamerikanische Kiefer, gemeine virginische Kiefer.

Sudow 384. n. 12. Miller III. n. 10. Du Roi II. 46. Münchs Verzeichniß 68. v. Wangenheim 41. Marshal 174.

## §. 556.

Waterland. Virginien, Maryland und Pennsylvania. Sie wird so hoch und stark als unsre Landkiefer, vor welcher sie jedoch keine Vorzüge hat. Sie zeigt sich auch bey uns zwar dauerhaft und bringt guten Saamen, doch leiden ihre Zweige leicht vom Schnee. Die Nadeln sind hellgrün, von starker Substanz, zwey bis drey Zoll lang, zugespitzt, auf der obern Fläche glatt, auf der untern mit einer flachen Furche versehen. Ihr Rand ist mehrentheils sehr fein gezahnt. Die Zapfen sind kegelförmig, vorne etwas gekrümmt, zwischen drey bis vier Zoll lang, glänzend, gelbbraun und stehen oft büschelweise rings um die Zweige herum. Jede Schuppe ist äußerlich erhöht und mit einer holzartigen Spitze versehen. Der geflügelte Saame ist etwas kleiner als der Saame unsrer Kiefer.

## §. 557.

Art. 155. Benrauch. *R. P. Taeda.* Linn.

*Synon.* *Pinus foliis longissimis ex una theca ternis.* Colden. Noveborac. 230. Le Pin de Taeda. Frankincense tree-leaved American Pine. Mawe. Frankincense Pine. Hanb. I. 232. New Jersey Pitch Pine. Wangenh. Virginian Swamp or Franc incense Pine. Marsh. Vir-

ginische Weyrauchkieser, Weihrauchfichte, Weyrauchbaum, schwarze Fichte, neu Jersey-Pechkieser.

obn. v. Wangenheim 41. Marshal 178. Du Roi II. 48. 63. Sudow 384. n. 11. Münchs Verzeichniß 68. Miller III. n. 11.

§. 558.  
Mit hellgrünen, über eine Spanne langen Nadeln, länglichen, stumpfen, zurückgebogenen Zapfenschuppen.

Sie wächst in Nordamerika bis gegen den zwey und vierzigsten Grad N. B. und hat einen etwas flatterigen Wuchs. Ihre Nadeln sind schön hellgrün, fünf bis sechs Zoll lang, schmahl, auf der äußern Seite platt, auf der untern gefurcht. Sie kommen zu drey aus einer gemeinschaftlichen Scheide und stehen sperrigt auseinander. Das Holz ist sehr harzreich. Die Zapfen sind ziemlich lang, und ihre Schuppen sind länglich stumpf, in der Mitte mit einer holzartigen, ausstehenden, rückwärts gebogenen Spitze versehen. Die Rinde ist graulich und bey alten Bäumen gerissen. Der Baum zeigt sich auch bey uns dauerhaft und bringt guten Saamen. Den größten Nutzen gewährt sein Harz. Aus diesem wird ein trefflicher Terpentin bereitet und sowohl mit diesem, als mit dem Theer und Pech ein ansehnlicher Handel getrieben.

### §. 559.

Art. 156. Weymouths = R. P. *strobis*. Linn.

Synon. *Pinus canadensis quinquefolia*, fl. albis, conis oblongis et pendulis, squamis *Abieti* fere similibus. Du Ham. n. 19. *Pinus foliis quinis, conis oblongis, pendulis, squamis ovalibus, planis, laxis*. Du Roi II. 57. Le Pin du Lord Weymouth, Pin blanc de Canada. White Pine, called the Weymouth Pine. Hanb. I. 39. 232. The Lord Weymouths Pine. Weymuthsfichte, Tannenfichte, weisse Kieser.

Sudow



Sudow 386. Du Roi II. 57. Borkhausen 13. v. Wangenheim 1. Marshal 175. Hausvater V. 326. Mönchs Beschreibung 70. Linn. Sp. Pl. II. 1419. Miller III. n. 13.

Abbild. v. Wangenheim f. 1.

§. 560.

Mit zu fünf beisammen stehenden, dreyseitigen, am Rande fein gekerbten Nadeln.

Waterland. Nordamerika. Sie erreicht in einem dicht geschlossenem Stande eine Höhe von 100, 120, 130 bis 150 Fuß und drüber. Dabey ist ihr Wachsthum sehr schnell. Die Rinde ist bey jungen Bäumen dunkel silbergrau und so glatt als ob sie mit Taffent überzogen wäre. Bey alten Bäumen fällt sie ins bräunliche und ist mit einem feinen wohlriechenden Harze durchzogen. Die Pfahlwurzel geht ziemlich tief. Die Zweige sind sehr zähe. Das Holz ist weisgelb, mittelmäßig hart, und sehr fein. Die Nadeln sind drey Zoll lang, hellgrün, dreyseitig, am Rande kaum merkbar gekerbt, kommen zu fünf aus einer gemeinschaftlichen Scheibe. Die Zapfen sind anderthalb Fuß lang, etwas gekrümmt. Die Schuppen sind rund, glatt und liegen lose auf einander.

§. 561.

Das Holz dieses, für Länder welche Schifffahrt haben, so wichtigen Baumes ist sehr dauerhaft und wird beym bearbeiten glatt und glänzend. Ausser dem mannichfaltigen Verbrauch für Werk- und Staabholz liefert diese Kiefer alle Arten von Masten, Sparren, von dem größten Linienschiffe an, bis zu dem kleinsten Fahrzeug, auch alle andre Arten von Schiffbauholz, die zum innern Bau der Schiffe, so weit diese über das Wasser reichen, erfordert werden. Es geht daher wenig von ihr verlohren, da fast jedes Stück bis zum Gipfel zu verschiedenem Gebrauch nützlich verwandt werden kann. Das Holz dauert über der Erde, so lange als irgend eine andre Nadelholzart, hingegen zum Grundbau, zu Schwellen, zum Schiffbau.

bauchholz, das unterhalb Wasser dauern soll, ist es weniger als Eichen, Küstern, Lerchen und andre Holzarten geschickt. Ferner liefert dieser Baum ein sehr feines Harz, aus welchem ein guter Terpentin bereitet werden kann. Die Cultur ist wie bey unsrer Kiefer, auch nimmt sie mit einem geringen Boden vorlieb.

## §. 562.

Art. 157. Zirbelsiefer. P. Cembra. Linn.

Synon. Pinus foliis quinis, cono erecto, nucleo eduli. Du Ham. n. 20. Le Pin d'Arove. Cembro Pine. Hanb I. 232. Mountain sibirian Pine. Cedernsichte, Cembrobaum, Arove, russische Ceder, sibirische Ceder, Zürbe, Ziernußbaum, Arbe, Leinbaum, sibirische Bergkiefer.

Miller III. n. 6. Mawc n. 6. Du Roi II. 51. Sudow 385. Münch's Verz. 69. Hirschfeld's Gartenkal. 1788. S. 210. Haller. p. 315. n. 1659. Hauss. V. 385. Schrank II. 233.

## §. 563.

Mit vier bis fünf dreyseitigen Nadeln aus einer Scheide, aufrechtstehenden, eyrunden Zapfen, deren Schuppen eyrund und vertieft sind, und einen keilsförmigen, dreneckigen, flügellosen Saamen, dessen Kern essbar und schmackhaft ist, enthalten.

Immergrün. Ein Baum erster Größe. Man findet ihn auf den tyroler, tridentinischen Gebirgen, in Isenbourg am Harz, und auf dem Schneeberge des Grindelwaldes. Seine Wurzel geht tiefer, als bey unsrer Landkiefer. Die Rinde ist aschgrau und reißt im Alter auf. Die Nadeln sind dreyseitig, schmahl, hellgrün, spizig, auf der untern, braungrünlichen Fläche durch einen erhabenen, glänzenden, hellgrünen Strich getheilt, kommen zu vier bis fünf aus einer gemeinschaftlichen Scheide und bekleiden die Zweige dicht und rings herum. Die Zapfen sind eyrund, stehen aufrecht, und haben eyrunde, vertiefte Schuppen. Die Saamen sind keilsförmig, dreneckig,

dreieckig, ungeflügelt, ihr Kern ist schmackhaft und essbar.

§. 564.

Dieser Baum ist ausnehmend dauerhaft und wird von Schneelasten nicht beschädigt. Das Holz ist weich, mittelmäßig fest, und von einem angenehmen Geruch. Die Nüsse haben frisch einen guten Geschmack, der aber mit der Zeit ranzig wird. Man bereitet daraus eine, bey hektischer Schwäche sehr heilsame Emulsion. Der Saame wird im Herbst gesäet und die Nüsse einen halben Fuß hoch mit lockerer Erde bedeckt. Erst im dritten Frühling versetzt man die Pflanzen neun Zoll weit, in anderthalb Fuß weit von einander entfernten Reihen. Wenn sie eines Fußes hoch sind, setzt man sie drey Fuß weit aus.

Fischer von dem carpathischen Linbaume in der Breslauer Natur und Kunstgeschichte, Vers. II. S. 331. Im Jahr 1787. wurden aus dem Berner Staate zehn bis zwölf Centner Zirbelnüsse nach Deutschland gebracht. S. Hirschfeld l. c. Was H. Schedel in seinem Waaren Lexico von den Zirbelnüssen sagt, sind nicht die Früchte von *P. Cembra* sondern von *Pinus pinea*. Also fehlt jener Artikel. Die Pineolen-Kiefer aber ist bis jetzt in Ziegenberg, sobald sie in das Land gesetzt wurde, ausgegangen und laum Hoffnung da, daß sie sich werde naturalisiren lassen.

§. 565.

Zwote Untergattung. Fichten.

Mit schmahlen, steifen, rund um die Zweige stehenden Nadeln.

Art. 158. Deutsche F. *P. Picea*. Camer. epit. 47.

Synon. *Picea major prima* f. *abies rubra*. C. Bauh. pin. 493. *Pinus foliis solitariis, tetragonis, mucronatis* Hall. hist. n. 1656. *Pinus Abies* Linn. sp. pl. T. II. p. 1421. n. 11. *Abies picea*. Mill. n. 2. *Abies tenuiori folio, fructu deorsum inflexo*. Du Ham. n. 5. Tourn. inst. 493. *Abies mascula* Plinii. *Picea Matthioli*. 97. *Picea latinorum* f. *Elate*. J. Bauh. hist. II. 238. *Sapinus* Bellon. Conif. 27. La Pesse. The comon Pitch Fir.



Norway Spruce Fir. Hanb. I. 234. Rothtanne, rothe Tanne, roth Dannenbaum, Bechtanne, schwarze Tanne, schwarzer Thannenbaum, Feuchttanne, Fiechttanne, Rothfichte, sächsische Fichte, Pechbaum, Harztanne, Grannenholz, norwegische Tanne.

Märter 6 Dörrien 263. Leers herb. 214. Glebitch I. 366. Sudow 376. Du Roi II. 110. Schrank II. 236. von Burgsdorf 293. Borkhausen 4. Forstmagazin I. 56. Abbild. Blackwell t. 198. Delhafen I. t. 9. 16. 31. Cramer t. 34. v. Kengefeld t. 3. 4.

§. 566.

Mit schmahlen, vierseitigen, steifen, stehenden, am Ende etwas frum gebogenen Nadeln, länglichen, herabhängenden Zapfen, deren Schuppen eyrund, platt und am Rande wellenförmig zerrissen sind.

Die Fichte ist eine der gemeinsten Holzarten, von welcher man große Waldungen antrifft, wie denn der ganze Harzwald damit bestanden ist. Die Pfahlwurzel fehlt diesen Bäumen, und daher sind Fichtenwälder den Windbrüchen so sehr ausgesetzt. In dicht geschlossenem Stande erreicht sie eine Höhe von 80, 100 bis 150 Fuß. Alle ihre Theile sind mit einem balsamischen Harze durchdrungen, und sehr wohlthätig haben daher praktische Aerzte die Ausdünstungen der Fichtenwälder zur Blütezeit für Brustkranke gefunden. Die Rinde ist rothbräunlich, zähe und biegsam. Die Nadeln stehen auf allen Seiten und ohne Ordnung. Sie sind steif, vierseitig, stehend, schmahl, am Ende etwas gekrümmt und stecken anfänglich in einer braunen Haut. Die Blüten erscheinen in der Mitte oder zu Ausgang des Mayes. Die männliche Inflorescenz ist eyförmig und gleicht einer Erdbeere. Jede Schuppe bedeckt zwey Staubfäden. Die weibliche ist ein Kößchen, welches die Gestalt eines Zapfens im kleinen hat. In der Folge wird sie hellbraun oder braungelb. Sie hängen dann unter sich und enthalten frisch ein wohlriechendes Harz. Unter jeder Schuppe liegen in besondern

bern Vertiefungen zwey geflügelte Saamen, die gewöhnlich im Febr. und März, bisweilen aber schon im October ausfliegen. Indessen hat man auch hier (auf dem Oberharz) eine Jahreszeit, in welcher die Luft ein Gas mit sich führt, welches jeden Nerven belebt, und das Gefühl der Gesundheit recht anschaulich macht. Dieß ist die allgemeine Blütezeit der Tannen und Fichten. Gesunder kann die Luft wohl zu keiner Zeit seyn und ein Aufenthalt von drey Wochen in dieser herrlichen Luft, würde nach der Vermuthung des Hrn. D. Lentins, vielleicht die langwierigsten Lungenschäden sicher und weit angenehmer heilen, als das Contubernium im Kuhstalle.

S. Gatterers Anleitung den Harz und andre Bergwerke mit Nutzen zu bereisen, IV. Nürnberg 1792. S. 81. § 96. Hierher kann man auch folgende Abhandlung rechnen: R. W. Crause progr. de Pinetorum aëris verni et aestivi salubritate in morbis. Ienae. 1712. 4. R. I.

#### §. 567.

Fast keine Holzart ist so häufig Zerstörungen des Maywaxes ausgesetzt als man bey jungen Fichten im geschlossenen Dickigen findet. Besonders verlegt der Fichtensauger (*Chermes Pini*) die neuern weichen Enden des Maywaxes, worinnen er sich aufhält, daß es lauter elendes Krippel- und Strauchholz wird. Ganz junge Pflanzen leiden von späten Nachtfrösten und dem Sonnenbrande. Oft stehen junge Fichten ab, wenn sie in einem schlechten Boden mit ihren Wurzeln auf derbe Erdlagen, brüchige oder scharfe Erdschichten kommen. Eine andre besondre Erscheinung ist das in manchen Jahren sich ereignende häufige abfallen der jungen Zweige. Die Menge der abgefallnen Zweige ist sich nicht zu allen Zeiten gleich. Diese abgefallnen Zweige nennen manche Schriftsteller Absprünge, so wie das abfallen der Zweige selbst, abspringen. Es nimmt seinen Anfang mit dem December, nur selten früher, meistens später. Der diesjährige Trieb ist alsdann schon völlig geendigt. Solcher Zweige findet

man zweyerley. Die starken und gesunden haben zu der Zeit schon wirklichen Splint, die kleinen Späthlinge haben zwar mit jenen gleiche Anlagen und Bauart, können aber keinen reifen Splint mehr absetzen.

Ueber die Ursache dieser Erscheinung S. Gleditsch vier hinterlassene Abhandlungen das praktische Forstwesen betreffend, Berlin 1788. S. 1 — 28. Schreiben des Gräfl. Stollberg-Werniger. Forst-Secretarius Hrn. Unzers an den Herausgeber des Forstarchivs, über des Hrn. Prof. Gleditsch Abhandlung das abfallen der jungen Fichtenzweige betreffend, in Mozfers Forstarchiv, IV. 300.

### §. 568.

Aber eine der fürchterlichsten Krankheiten der Fichtenwälder ist die Trockniß. Sie entsteht bisweilen an einzelnen Bäumen aus innern Ursachen, aus einer allgemeinen Stockung und Verderbniß der Säfte: allein eine allgemeine Trockniß ganzer Reviere, wie sie sich vor einigen Jahren auf dem Harz mit eben der Wuth, als die Pest unter den Menschen, und die Seuche unter dem Rindvieh, gezeigt hat, hat wohl mehrere Ursachen. Schon im J. 1772 zeigte sich diese Krankheit am Communionharz. Bis 1779 nahm sie immer zu, und von 1779 — 1781 wurde sie sowohl in dem einseitigen als Communionharze höchst furchtbar, indem blos in den Forsten des letztern 182,451 Bäume trocken wurden. Im folgenden Jahre wuchs diese Anzahl auf 259,000 und nicht weniger als 3359 Waldmorgen waren zu Grund gerichtet. Dieses Uebel wurde in dem darauf folgenden Jahre 1783 nicht vermindert, denn jetzt stieg die Anzahl der abgestorbenen Bäume auf 260,900. Ganz ausnehmend nahm die Krankheit im Jahre 1784 zu. In dem folgenden betrug die Zahl der abgestorbenen Stämme 137,642, und vom December 1785 — 1786 wurden aufs neue 38,886 Stämme trocken. Der einseitige Harz war nicht weniger hart mitgenommen. Man zählte daselbst

im



|                      | im Jahr | trockne Bäume. |
|----------------------|---------|----------------|
|                      | 1781    | 64,490.        |
| Diese Zahl stieg     | 1782    | auf 171,537.   |
| —                    | 1783    | — 472,000.     |
| Man zählte           | 1784    | 225,714.       |
| Diese Zahl fiel      | 1785    | auf 116,967.   |
| Aufs neue verborrten | 1786    | 3530.          |
| und im Jahre         | 1787    | 3046.          |

## §. 569.

Sehr allgemein nahm man an, daß diese schreckliche Verheerungen durch Borkenkäfer verursacht würden. Aber man schränkte diese Meinung dahin ein, daß diese Käfer nur kranke Bäume angriffen, die gesunden aber verschonten. Dieß behaupteten nicht nur die meisten der Königl. Ober- und Nieder-Berg-Hütten- und Forstbedienten am einseitigen Harz, sondern auch Ahlers, v. Etz, Dettelt, Eichelmann, Grübel und Maurer. Sie gaben aber zu, daß es nicht ganz unmöglich sey, daß der Käfer, wenn er in außerordentlicher Menge zugegen wäre, so daß er in kranken Bäumen nicht mehr genugsame Nahrung fände, aus Hunger auch gesunde Bäume anfiele. Fiele er aber diese bloß allein an; so müßte sich die Wurmtrockniß alle Jahre zeigen. Bemann, Dettelt, Eichelmann und Grübel bezeugten auch, daß neben wurmtrocknen Bäumen eine Menge grüner und gesunder stehen geblieben sey, die der Wurm nicht angegriffen habe. Ähnliche Beobachtungen führen Kemme, Hase, Otto, Biez, Hund, Brül und v. Uslar an. Ja Grübel und Ahlers erachten sich durch ihre Beobachtungen für berechtigt, zu glauben, daß der Wurm nicht einmahl kranke Bäume allezeit tödten könne. Wenn aber die Säfte einmahl stockten und die innre Fäulniß sich einfände; könne der Käfer nicht nur die Bäume leichter überwältigen, sondern werde auch durch ihre Ausdünstungen immer mehr herbeigeloct. Dieser Meinung sind Gleditsch,

v. Staff, Cramer, Bickmann, Steiner, v. Göchhausen.

Kurz: diese Krankheit kann aus mehreren Ursachen entstehen. Eine der prädisponirenden Ursachen haben wir nach Moser, Carlowitz, Heppel, Böse, Cramer, Ahlers, Grübel und Maurer in dürrern Sommern, die auf einander folgen, zu suchen. Auch soll dieses Uebel und seine Verbreitung sehr von dem Boden, auf welchem die Fichten stehen, abhängen. Ein fester, steiniger Boden habe vielen Antheil daran, ingleichen ein saurer Sumpfgrund. Im fetten, mürben Boden greife das Uebel gleichfalls geschwinder um sich. Eine Hauptveranlassung der Trockniß würden die Windstürme, welche die Fichten sehr leicht erschüttern, verschieben und ihre flach laufenden Wurzeln entblößen oder zerreißen, wodurch das aufsteigen des Saftes gehemmt wird: denn als diese Krankheit weiter einriß, waren die Stürme am Harz häufiger und gewaltsamer als jemahls. Trifft, vorzüglich Schastrifft und eine starke Wildbahn haben auch Theil an der Veranlassung zu dieser Krankheit, die auch oft die Folge einer schlechten Forstwirthschaft seyn könne.

Gmelins Abhandlung über die Wurmtrockniß, Leipz. 1787 8. m. K. Jägers Beyträge zur Kenntniß und Vertilgung des Borkenkäfers der Fichte, Jena 1784. (Maurer) etwas über den Borkenkäfer oder die Bauntrockniß fichtener Waldungen, Leipz. 1786. 8. Steiners Versuch über die Herkunft des Borkenkäfers, Weimar 1785. 8. Göthe kleine Harzreise, Leipz. 8. Leonhardis allgemeine theor. und practische Stadt- und Landwirthschaftskunde, Leipz. 1789. Kob, die wahre Ursache der Bauntrockniß, Nürnberg 1786. 4. Handvr. Magazin, 1783. St. 102. 77. 1784. St. 20. Schriften der Berliner Gesellschaft, B. IV. VIII. Hamburger Magazin 8. B. IV. 1749. Forstmagazin 8. B. V. 1764. Schwedische akad. Abhandl. B. XIII. Gothaische deutsche Zeitung 1785. St. 24. Gleditsch vermischte Schriften II. 423.

S. 570.

Halbarten:

- a) Graufichte. *P. P. cinerea*. La Pesse de Prusse. Die Borke ist fein und weißgrau, die Nadeln sind kurz und spizig. Man findet sie in Schlessen und auf dem Harze. Gleditsch I. 344. n. 23. Borkhausen S. 6. Hier hat man aus dem Saamen niemahls die Rothfichte sondern die Graufichte erhalten. Vergl. Bemerkungen über die graue preußische Fichte, in den Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, B. IX. St. IV. Jahr 1783.
- b) Weißfichte. *Pinus Picea alba*, Becman. Kommt mit der Rothfichte in allen Stücken überein, außer, daß sie eine weiße Rinde hat.
- c) Kranzfichte, langzapfige Cornwallistanne. *Pinus Abies Picea longa*. West. The long-corned cornish Fir. Mawe. Unterscheidet sich von der Rothfichte bloß durch ihre längern Nadeln und Zapfen, wiewohl auch dieser Unterschied nicht sehr beträchtlich ist.
- d) Zwergfichte, Steinfichte. *Pinus Picea uana*. Wahrscheinlich nur Variet. Wächst in den hohen Gebirgen Böhmens und Schlesiens. Sie ist die gewöhnliche Rothfichte, die aber in dem rauhen Klima und der hohen Lage jener Gebirge ganz niedrig bleibt und ihre Zweige überall sehr weit von sich treibt.

S. 571.

Der ökonomische Gebrauch der Fichten ist von einem weitläufigem Nutzen. Sie geben gute Mastbäume, Balken, Bretter, Latten, Schindeln, Tischler- und Orgelbauerholz. Ferner reichen sie ein gutes Brennholz und den Stahl- Eisen- Blech- und Sensen- Hämmern, Rohr- Waffen- Huf- und Nagelschmieden, Schlossern und Garniturgiesern in gebirgigten Gegenden die meisten Kohlen, nicht weniger Weisböttchern das beste Holz zum schwunghaften Betrieb ihres Handwerks, mit deren ver-

fer-



fertigten Waaren ein ziemlich vortheilhafter Handel getrieben wird. Das Harz selbst ist in großen Fichtenwäldern eine Hauptnuzung.

Maurer S. 48. Dettelt von der Pechnuzung der Harzwaldungen 1791. Hausvater V. 311. Forst-Cameralwissenschaft 80. Scopoli Annus hist. nat. IV. 138.

§. 572.

Die Fichte kommt sowohl in rauhen Gebirgen, als in Ebenen im mittlern Clima von Deutschland fort. Der Boden braucht nur mittelmäßig gut und nicht tiefgründig zu seyn. Er kann aus Lehmen bestehen, wenn dieser mit Kies und milder Dammerde gemischt ist. In schwerem und nassem Boden wird das Holz schwammig und im losen Sande sind die Fichten Windbrüchen ausgesetzt. Sät man Fichten auf ganz magern Boden; so vertraut man diese Holzart einem Lande an, das von der Natur nicht für sie bestimmt ist. Bitten würden sich da weit besser verinteressiren.

Ist der Boden fett; so besät man ihn ein paar Jahre mit Haber, um ihm seine überflüssige Gailung zu entziehen, welche die Ursache des häufigen, nachtheiligen Grasschwundes ist. Dann erst kann man zur Fichtensaat schreiten. Auf Boden, der mit hohem, filzigem Grase überzogen ist, darf man gleichfalls nicht säen. Ist aber die Blöße mit kurzem Grase, dem etwas Moos beygemischt ist, bekleidet, so kann man die Saat wohl wagen. Die Feuchtigkeit des Moores beschleunigt das Keimen des Saamens und schützt die zarten Wurzeln der Pflanzen gegen Austrocknung.

Die Bereitung des Bodens zur Fichtensaat richtet sich also nach dessen Beschaffenheit. Ist er mit langem Grase bedeckt, so muß man ihn größtentheils umgraben (denn mit dem pflügen ist in den Gebirgen wenig auszurichten). Oder man zieht, um Kosten und Saamen zu ersparen, zwey Fuß breite Rinnen in vier Fuß weiter Ent-

Entfernung, von welchen der Rasen mit einer scharfen Hacke weggenommen wird, ohne den Boden locker zu graben: denn das Land zur Fichtensaat so rein und sorgfältig wie zur Getreidsaat zuzubereiten, würde im großen außerordentliche Kosten verursachen.

Die Saat wird im April bis in die Mitte des Mayes unternommen. Würde man es wagen, auf, im Frühjahr tief und locker, neu umgegrabenen Boden Fichten zu säen; so würde der Saame zwar aufgehen, sich aber bey anhaltender Hitze, zumahl an Sommerwänden gänzlich verlieren, weil die lockre Erde die zarten Würzelchen nicht gegen Hitze schützen kann. Besser ist es den Boden schon im Herbst umzuarbeiten, damit er im Winter vom Schnee zusammengedrückt wird, und ihn im Frühjahr zu besäen.

Der Fichtensaame leidet keine Bedeckung über sich. Es ist auch bey den Fichten gar nicht nöthig, wenn sie im May gesäet werden, die Rinnen mit Reissig gegen die bisweilen zu der Zeit noch eintretenden, schädlichen Fröste, zu decken, da das Gras ihnen oft mehr Bedeckung zu geben pflegt, als man wünscht, und Fichten auch nicht so weichlich als Tannen sind. Auf geackerten oder mit Hacken umgearbeiteten Boden, kann man im ersten oder zweyten Jahre nach der Saat das Gras ohne Gefahr niederhauen lassen: denn durch jene Zubereitung wird der Boden hüglicht und ungleich gemacht, der Saame aber geht in den Vertiefungen auf, und der Hieb der Sense geht also drüber hin.

Ein Dresdner Scheffel besügelter Saame ist genug 160 Q. R. zu besäen. Dieß gilt jedoch nur von frischem Saamen, der das erste Frühjahr, nachdem er ausgeflügelt worden ist, wieder gesäet wird. Wenn er aber drey, vier Jahre alt ist, muß man erwähnter Quantität zusehen. Aelteren Saamen zu säen ist nicht rathsam, weil kaum die Hälfte aufgehen würde. Ist die Blöße groß, so daß sie nicht in einem Jahre besäet werden kann, so fängt man die Arbeit in Ost und Nordost an, setzt sie gegen West und

und Südwest fort, und zwar wegen der künftigen An-  
 hängung.

Der Saame wird, wie bereits erinnert worden ist, zu Ende Octobers reif, und fliegt bisweilen in schönen Herbstern schon im November aus. Werden nun Fichten in einem Jahre, da man Saamen von ihnen erwartet, stark auf Harz genutzt; so findet man die Zapfen fast auf allen Bäumen taub. Die Zapfen fängt man am besten schon vom November an zu sammeln. Der Saame ist leicht auszubringen. Der auf sogenannten Suberten durch die Sonnenwärme ausgeklengelte wird für den besten gehalten. Da nun oft erst das fünfte oder sechste Jahr ein Sonnenjahr ist, und sich der Fichtensaame sehr gut hält; so thut man wohl, wenn man bey Saamenjahren sich einen guten Vorrath anlegt.

Fichten allein gesäet, trägt ein Morgen (160 Q. R.) wohl 20,000 und mehr Pflanzen, aber nicht länger als vom ersten bis zwanzigsten Jahre. Im vierzigjährigen Alter stehen kaum noch 2000 und im sechzigjährigen selten 8 — 900 Stück. Je älter sie werden, desto mehr nimmt ihre Zahl ab, weil sie alle einerley Nahrung aus dem Boden einsaugen, die stärkern aber so viel einziehen, daß die schwächern ausgehen müssen. Vermischt man aber Fichten mit Tannen und wo es die Lage erlaubt mit Kiefern \*) so hat man weit weniger Abgang. In niedrigen Gegenden vermischen sich die Birken gerne damit, und sie würden von außerordentlichem Nutzen seyn, wenn sie nicht den Fehler hätten, daß ihr geschwinder Wuchs, welcher bis in das zwanzigste Jahr die Fichten übertrifft, die letztern am Gipfel beschädigte, wodurch diese dürrer werden und im Wachsthum zurück bleiben.

Auf

\*) Diesen Vorschlag thut Maurer. Andre widerrathen diese Mischung, weil die Kiefern im Anfang weit geschwinder wachsen und die Fichten unterdrücken.



Auf die Saat folgt das pflanzen, besonders auf alten, sehr mit Gras verwilderten Gehauen, doch nicht auf den äußersten Höhen der Gebirge. Selbst da, wo auch die gute Anstalt getroffen ist, daß alle abgetriebene Gehäue im ersten Frühjahr nach der Abholzung gleich wieder aus dem Sack besäet werden, ist das pflanzen nicht ganz zu entbehren: denn es werden bey den häufigen kurzen Sommerjahren immer noch Zeiten eintreten, wo gar nicht oder sehr wenig gesäet werden kann. Pflanzen aber kann man alle Jahre. So ist auch in Gebirgen, wo oft in sechs bis acht Jahren keine reiche Saamenernde eintritt, und wo Fichten die herrschende Holzart sind, ihr Anbau durch Pflanzung als eine unentbehrliche Anstalt, die Wälder immer im gleichförmigem Ertrage zu erhalten, zu betrachten. Dieses Mittel allein ist geschickt einem Revier mit wenigem Aufwand, jährlich so viele Stämme wieder zu geben, als aus solchem genommen worden sind.

Man hat hiezu keine besondern Pflanzschulen nöthig. Die von der Natur oder aus dem Sack angesäeten, sehr dicht bewachsenen Schönungen, nicht weniger die, welche an den Rändern der alten Hölzer öfters häufig aufgehen, und verderben müssen, liefern hiezu so viele junge Pflanzen, als man bedarf. Nur müssen sie nicht zu alt seyn, noch im Schatten gestanden haben. Fünf bis achtjährige, die sechs bis neun Zoll lang sind, schicken sich hiezu am besten. Man setzt sie in acht bis zehn Zoll tiefe, zwölf, achtzehn Zoll von einander entfernte Löcher, nicht zu tief ein, und drückt die Erde mäßig an die Pflanzen an. Die Pflanzen kommen im Vaterland eine vier Fuß von der andern zu stehen. Die beste Zeit hiezu ist der März bis zu Anfang des Mayes. Je näher die Pflanzen vor ihrem jährlichen, natürlichen Triebe, der zu Ende des Mayes anfängt, versetzt werden, desto glücklicher ist ihr Fortkommen. Man kann sie auch im October und November versetzen, aber bisweilen mit etwas Verlust, weil sie der Frost

Frost gerne aufzieht, welches man im Frühjahre nicht zu befürchten hat.

Maurer 220. Hardig 96. 79. Buel 46. Beckmanns Holzsaat I. 91. Hesse 192. Anleitung für die Heiderenier 29. 31. 38. Forst-Cameralwissenschaft 80. Neue gesellschaftl. Erzähl. I. 108. Neues Hamb. Mag. St. 115. S. 28. Schwed. akad. Abhandl. XXXI. 257. Defon. Nachr. II. 465. Allgem. Mag. III. 359.

§. 573.

Art. 159. Weise *P. laxa*. Ehrh. Beytr. III. 24. *Synon.* *Abies canadensis*. Mill. n. 4. *Pinus Abies canadensis*. Marsh. 181. *Pinus Abies laxa*. Münchh. *Pinus canadensis*. Du Roi II. 124. *Abies piceae foliis brevioribus, conis parvis biuncialibus laxis*. Du Ham. n. 8. *L'Epinette blanche*. New Foundland Spruce - Fir. Hanb. I. 234. The white Spruce Fir. Wangenh. 5. Newfoundland Spruce. Marsh. 181. Canadische weisse Tanne, weisse amerikanische Tanne, weisse nordamerikanische Sprucefichte, nordamerikanische weisse Fichte, neuländische Sprucefichte.

v. Wangenheim XXXVII. 5. Marshal 181. Sudow 378. Ehrhards Beyträge III. 24. Müncchs Verzeichniß 73. Schwed. Abhandl. XIII. 197. Hirschfelds Kalender 1783. 290. Du Roi II. 124. Borkhausen 9. Du Hamel. n. 8.

Abbild. v. Wangenheim F. II.

§. 574.

Mit stumpfen, krumm gebogenen, vierseitigen Nadeln. Kleinen, herunterhängenden Zapfen, deren Schuppen locker stehen.

Ein immergrüner, dauerhafter Baum. Den Namen weisse Fichte führt er von seiner Rinde, welche weisser als von andern amerikanischen Fichten ist. Sprucefichte wird sie von dem Extract genannt, der aus ihren Sprossen verfertigt wird. Sie wächst in Nordamerika vom drey und vierzigsten Grad N. B. weiter nördlich. Südlicher hingegen verschwindet sie, weil sie zu ihrem

voll

vollkommen Buchse ein sehr kaltes Klima verlangt. Sie besetzt in ihrer Heimat die Spitzen der höhern Gebirge, welche für die Weymouthskiefer zu rauch und zu schlecht sind. Ihr Wuchs ist vollkommen so ansehnlich, als bey unsrer Rothfichte. Sie wird 100, 150 Fuß hoch, und zwey bis drey Fuß im Durchmesser dick. Die Blüte erscheint im May. Die Zapfen sind zwey, dritthalb bis drey Zoll lang, hängen unterwärts. Die Schuppen sind glattrandig, rundlich, beynabe verkehrt eysförmig, dünne, locker auf einander liegend. Je eine bedeckt zwey ovale, kleine, geflügelte, schwarze Saamenkerne. Die Nadeln sind vierseitig, hell und immergrün, gekrümmt, laufen in eine stumpfe Spitze aus. Sie sind auf ihren beyden Flächen mit einer blasgrünen Furchung versehen, einen halben Zoll lang und stehen dichter als die Nadeln unsrer Fichte. Von dem Ende eines jeden Blättchens läuft auf der sehr glatten Rinde, eine Nath oder Narbe herab. Ihre Wurzeln laufen gewöhnlich flach, nur im lockern Boden und auch dieses sehr selten, treibt sie bisweilen eine kurze Pfahlwurzel.

Die Rinde giebt eine gute Gerberlohe. Das Holz ist sehr dauerhaft. Es dient zu gutem Schiffbauholz, zu Masten, Seegelstangen, Bohlen, Brettern, andern geringen Bau- und Staabholz. Mit hundert bis hundert und funfzig Jahren erwächst diese Fichte zu Bauholz. Das Brenn- und Kahlholz davon ist sehr gut. Das bey warmer Witterung gewonnene Harz liefert einen guten Terpentin und an denjenigen Orten, wo das Holz nicht abgesetzt werden kann, nützt man diese Fichte vorzüglich auf Harz. Außer der Holznußung zieht man noch einen andern Vortheil von ihr, indem man sie zur Vereitung eines Produktes benützt, das in die weiter südlich liegenden Provinzen und sogar nach England versührt wird. Zu diesem Fabrikate können zwar auch andre in Nordamerika wachsende Fichten genutzt werden, allein diese Art soll vorzüglicher dazu seyn. Dieses Produkt heißt Spruce



und wird von den Nadeln und jungen Schüssen im Frühjahr, wenn sie in voller Kraft sind, verfertigt. Man kocht sie so lange in Wasser, bis durch das Einkochen ein bitterer, flebrichter, harziger aber wohlriechender Extrakt entsteht, der so viel spirituöses hat, daß er sich in der größten Hitze hält, und keiner Gährung unterworfen ist, weswegen er auch über die See versendet werden kann.

Von diesem Extrakt wird in dem größten Theil von Nordamerika ein Bier gebraut, das sehr gesund ist, und besonders für sehr zuträglich gegen den Scorbut gehalten wird. Dabey hat es einen angenehmen Geschmack, und die Art dieses Bier zu brauen ist ganz einfach. Man kocht Wasser, und nach der Güte und Stärke des Extractes wird auf zwanzig Maas, ohngefähr ein Eßlöffelvoll Spruce gethan. Man schüttet alsdann das Ganze in Kühlbottiche, und mischt, wenn es kalt wird, so viel Syrup hinzu, bis das Getränk die bestimmte bittere Süße hat. Alsdann füllt man es in Fässer, wo die Gährung geschwinde vor sich geht. Das Bier wird sehr hell, bekommt eine schöne braune Farbe und einen angenehmen Geschmack, der demjenigen der deutschen Biere, die auf Pech liegen, gleicht, ohne deren berauschende Kraft zu haben, so daß man ohne Beschwerde so viel davon trinken kann, als man will.

Die Gründe aus welchen H. v. Wangenheim und v. Burgsdorf die Cultur der weissen Fichte uns Deutschen empfehlen, sind folgende: weil sie einen Baum der ersten Größe liefert, dessen Holz zu einem großen Nutzgebrauch geschickt ist, ohne ihrer andren nuzbaren Produkte zu gedenken — weil die kalten Rücken hoher Gebirge diejenigen Gegenden abgeben, wo sie am liebsten wächst. Der sehr mittelmäßige Boden, mit welchem sie vorlieb nimmt, kann steinig und kieselig seyn, wenn er nur mit etwas Walderde vermischt und trocken ist. Die Cultur ist wie bey unsrer Fichte. Die Saat muß etwas dicht geschehen, und man kann so lange bis der Saame derselben in  
Deutsche

Deutschland häufiger und wohlfeiler zu haben ist, ihn mit unsern Fichtensaamen vermischen.

Da nun diese Fichte die kältesten Oerter der Gebirge annimmt, wo es nach Erfahrung öfters sehr schwer hält, Holzarten durch Säen anzuziehen; so kann hier die Pflanzung vorzüglicher als die Saat seyn. Die Pflanzung aber wird im Frühjahr und höchstens mit fünfjährigen Pflanzen vorgenommen. Diese müssen so dicht als möglich gesetzt werden. Wenn auf solchen hochliegenden, kalten Winden ausgesetzten Stellen nur erst etwas in die Höhe gekommen ist; dann können die dazwischen liegenden Plätze, welche nun durch die erste Anpflanzung geschützt sind, mit geringer Mühe und mit gutem Erfolge angesät werden.

v. Burgsdorfs Holz-Cultur II. S. 168.

§. 575.

Art. 160. Schwarze F. *P. mariana*. du Roi II. 127.

Synon. *Abies mariana*, foliis linearibus acutis, conis minimis. Mill. 5. *Pinus Abies mariana*. Münchh. V. 224. L'Épinette noir. The new Foundland black Spruce-Fir. Schwarze nordamerikanische Sprucefichte.

v. Wangenheim 75. Sukow 379. Münch 74. Ehrhard III. 23.

§. 576.

Mit Kurzbehaarten Zweigen, vierseitigen, dunkelgrünen Nadeln, am Rande gekerbten Zapfenschuppen.

Sie bleibt in ihrem Buchse niedriger als die vorige Art, und ihre Triebe kommen später. Bey uns zeigt sie sich sehr dauerhaft und bringt auch guten Saamen. Wo sie frey steht, reichen ihre Aeste bis zur Erde herab. Die Rinde ist schwärzlich. Die Aeste und Zweige sind mit ganz kurzen, feinen, schwärzlichen Haaren besetzt. Der Saft dieses Baumes ist mit feinen, terpentinartigen Theilchen angefüllt. Die Nadeln sind etwas über einen halben Zoll lang, schmahl, vierseitig, immergrün und von dun-

kelgrüner Farbe. Die Zapfen sind kegelförmig, zugespitzt, anderthalb Zoll lang, am Boden einen Zoll breit und hängen herunter. Die Schuppen sind rothbraun länglicht, glatt, am Rande gekerbt und liegen dicht aufeinander.

Das Holz dieser Fichte ist weisröthlich, leicht und grobkaderig. Im Nothfall macht man bey'm Bau kleiner Fahrzeuge und Fischerböte Gebrauch davon. Im Frühjahr bereitet man aus den Nadeln und jungen Zweigen, Spruce, worinnen die Hauptnahrung dieser Fichtenart besteht. Sie wächst in Nordamerika auf einem kalten Boden, der oftmahls mit einem sauern, eisenhaltigen Sande gemischt und meistens naß oder doch feucht ist. Dennoch erreicht sie eine Höhe von dreyßig bis vierzig Fuß. Wenn sie sich nun auch für Deutschland nicht zur Saat im Großen empfiehlt; so ist sie doch zur Anpflanzung in manchen Lagen sehr brauchbar.

§. 577.

Art. 161. Amerikanische Rothfichte, *P. rubra*.

Synon. *Pinus americana rubra*. Wangenh. 75. L'Épimette rouge. New Foundland red Spruce - Fir. Wangenh. l. c.

v. Wangenheim 75. Du Roi II. 19.

§. 578.

Mit schmahlen, hellgrünen, vierseitigen Nadeln, braunrother Rinde, glatten Zapfenschuppen.

Dieser Baum wächst am häufigsten in neu Schottland und auf Newfoundland, wo er auf nassen, kalten Boden steht, eine Höhe von zwanzig bis dreyßig Fuß, und eine geringe Stärke erreicht. Sein Wuchs ist in jenen nebligten Gegenden; welche ein neun Monate langer Winter drückt, ästig und struppig. Die Rinde ist braunroth, an jungen Zweigen glatt, an ältern gerissen. Das Holz ist leicht und weisröthlich. Die Nadeln sind nicht über einen halben Zoll lang, zugespitzt, schmahl,  
pler.



vierseitig, hell- und immergrün. Die Zapfen sind einen Zoll lang, stumpf, rothbraun, die Schuppen länglicht und glatt. Bey der Reife tritt das Harz häufig aus den Schuppen und überzieht sie ganz. Da sie auch unter der schwarzen Fichte ihre Eigenschaften beybehält; so hält man sie für eine eigne Art. Ihr Holz wird zur Feuerung und zu Fischerböten genommen. Die jungen Schüsse und Nadeln dienen zum Bierbrauen.

## §. 579.

## Dritte Untergattung. Tannen.

Mit breiten, weichen Nadeln, die auf zwey Seiten der Zweige fahrmartig stehen.

Art. 162. Weisstanne. P. Abies. Du Roi II. 95.

Synon. Abies conis sursum spectantibus, seu mas. C. Bauh. pin. 505. Pinus foliis solitariis, planis, pectinatis, emarginatis. Hall. hist. 1657. Pinus Picea Linn. sp. Pl. II. 1420. n. 8. Abies Taxi folio, fructu sursum spectante. Tourn. 473. Abies foemina seu Elate Teleja. I. Bauh. hist. II. 231. Abies candida Trag. 1117. Le Sapin a feuilles d'If. The Yew-leaved or Silver-Fir. Edeltanne, Silbertanne, taxblättrige Tanne, Dannenbaum, Mastbaum.

Sudow 374. Gleditsch I. 386. v. Burgsdorf 288. Märter 8. Schrank. II. 235. Borkhausen I. Pollich palat. II. 623. Scopoli II. 245. Leonhardi 153. Kengfeld 12.

Abbild. Delhafen t. 5 — 8. Blakwell. t. 203. Cramer t. 25. Kengfeld t. 1 — 2.

## §. 580.

Mit breiten, gegen das Ende ausgeschnittenen Nadeln, welche unten mit zwey vertieften, weissen und drey erhabenen, grünen Streiffen bezeichnet sind.

Ein einheimischer, immergrüner Baum, der unter unsern Nadelhölzern die größte Höhe und Stärke erlangt. Die Wurzel ist stärker als bey der Rothfichte und geht bey

erwachsenen Bäumen tief unter sich. Schon im vierten Jahre bildet sich eine Pfahlwurzel, welche in der Folge drey Fuß tief geht. Die Aeste stehen aufwärts, haben einen schönen, gleichen Wuchs und geben der Krone im freyen ein angenehmes, pyramidalisches, regelmäßiges Ansehen. Die Rinde ist weiß, oft silbergrau, glatt, dick, spröde. Die Nadeln stehen kammartig, sind breit, am Ende ausgeschnitten, oben glänzend dunkelgrün, auf der untern Fläche mit zwey vertieften, weißen und drey erhabnen, grünen Streiffen gezeichnet. Die männlichen Blüten erscheinen im May als ein rothes Käzchen. Sie stehen gewöhnlich zwischen den Nadeln einander gegenüber. Die weiblichen Blüten sind schon im Sommer des vorigen Jahres als braune Knöpfe vorhanden. Sie stehen aufrecht und einzeln, sind größer, länger und dicker als die Zapfen der Kiefern und Fichten. Die Schuppen sind breit, dick und gleichsam rauh, so bald sie trocken werden, fallen sie von der Spindel ab. Die innern sind herzförmig, oben abgerundet und enthalten die zwey Saamenkörner. Die äußern sind dünne, schmähler und aus ihrer Mitte ragt eine spizige Zunge. Aus den Zapfen träuft zuweilen ein schöner flüssiger Balsam.

## §. 581.

In einem Alter von siebenzig bis achtzig Jahren liefern die Weistannen Stämme zum Schiff- und Häuserbau, wo sie zum letztern Gebrauch besonders zu Balken gewählt werden, da sie zäher und elastischer als andres Holz sind. Das mittlere Tannenholz benutzt man zu Röhren, Dachrinnen, Brettern, Schreiner- Dreher- und Fasbinderarbeit, so wie man es auch zu Brenn- und Kahlholz anwendet. Da es leicht, biegsam und sehr fein maserig ist; so wird es zur Verfertigung musikalischer Werkzeuge, zu Schachteln und Siebrändern gebraucht. Da es sich auch weder in Wärme noch Feuchtigkeit merklich ändert; wird es vor andern zu Brettern für Barometer,

ter, Thermometer, und dergleichen Werkzeuge gesucht. Die Blasen, welche auf der Stammrinde zum Vorschein kommen, enthalten den gemeinen Terpentın, den man vorzüglich in der Schweiz zu sammeln pflegt.

Die Tanne liebt einen etwas tiefgründigen, aus Sand, Lehm und Kieß gemischten Boden in frischer Lage, auf Ebenen, Hügeln und Mittelgebirgen. Man macht den Boden bloß wund und säet sechzehn Pfund Saamen auf einen Morgen. Es tragen aber die Tannen erst gegen das vierzigste Jahr Saamen. Sobald sich nun gegen das Ende des Septembers oder Anfang des Octobers die Schuppen im geringsten zu öffnen beginnen, bricht man sie, weil sie sonst mit dem Saamen abfallen. Zeitiger gesammelt, würden sie leicht faulen, und wollte man länger warten, der Saame ausfallen. Beim aufschütteln und abtrocknen bersten die Schuppen sehr leicht auf, und der Saame fällt mit ihnen von der Spindel ab. Sodann wird er durch wölfeln und sieben gereinigt. Da nun der Saame sehr viele öhlichte, wäßrige Theile enthält; so behält er seine Keimungskraft nicht leicht länger als bis in das folgende Jahr.

Forst-Cameralkunst 80. Hartig 96. 76. Bruel 47. Hesse 188. Anweisung für die Heiderente 30. 34 — 38.

### §. 582.

Die beste Saatzeit ist der Herbst. Denn die Frühlingsaat schützt sie keineswegs gegen Fröste. Ueberhaupt ist diese Holzart unter unsern Nadelhölzern die weichlichste. Ein später Frost, eine, kurze Zeit anhaltende Hitze, verwüstet oft in einer Nacht oder einem Tage viele tausend Pflanzen. Ueberdies haben sie am Wildpret, besonders den Rehen, so wie an dem zahmen Vieh, wegen ihrer weichen, balsamischen Nadeln, gefährliche Feinde. In zarter Jugend lieben sie Schatten. Diesen giebt man ihnen, indem man das besäte Land mit grünem Fichten oder Tannenreißig bedeckt und diese Bedeckung,



wenn die Reiser zu Ausgang des Mayes die Nadeln haben fallen lassen, wiederhohlt. Man kann auch unter den nicht allzudicht stehenden fünf bis sechsjährigen Fichten, die Blößen wund machen und sie mit Tannensaamen besäen. Auch sucht man immer besser die Nordseite zur Tannensaat aus.

Das Verpflanzen vertragen die Tannen sehr gut. Junge gesunde Pflanzen von acht bis zehn Zoll Länge schicken sich am besten dazu. Man wählt dazu denselben Boden wie zur Saat in schattiger Lage und pflanzt Fichten darunter. Noch besser ist es, wenn die Gegend es gestattet, sie mit Kiefern abwechselnd, in vier Fuß weiter Entfernung anzupflanzen, welche den Tannen eine sehr schnelle Beschirmung zum bessern Wuchs verschaffen. Wird die Pflanzung durch einen Vorstand von alten Holze gedeckt; so ist es desto besser. Alle Mühe aber ist vergebens, wenn man dergleichen Anlagen nicht gegen das zahme und wilde Vieh auf das sorgfältigste verheeget.

## §. 583.

Art. 163. Balsamtanne, *P. balsamea*. Linn.

Synon. *Abies balsamea*. Mill n. 3. *Abies Taxi folio*, *odore balsami Gileadensis*. Du Ham. n. 3. Le Sapin dit Baumier de Gilead. Sweet - scented Yew - leaved - Fir, Balm of Gilead - Fir. Ham. I. 233. Gileadische Balsamtanne.

v. Wangenheim 40. Linn. Sp. pl. II, 1421. Marshal 180. Gronov. virg. 154. Mündch. 72. Du Roi II. 103. Borkhausen 7.

## §. 584.

Mit kurzen, breiten, stumpfen, an der Spitze mehrtheils gekerbten Nadeln, deren Unterfläche mit zwei Reihen heller Punkte bezeichnet ist.

Immergrün. Vaterland. Nordamerika. Sie liebt daselbst die Winterseite der Berge in den nördlichen Provinzen, und erreicht eine Höhe von dreßzig bis vierzig Fuß.

Fuß. Der Stamm ist fast von unten auf ästig und die mit Nadeln dicht bekleideten Zweige geben dem Baume ein sehr verzierendes Ansehen. Die Rinde ist weißgrau und glatt. Zwischen ihr und dem Holze sitzen Beulen die ein terpentinartiges Harz enthalten, das unter dem Namen Kanadischer Balsam bekannt ist. Die Knospen, welche zu den künftigen Jahrestrieben schon im Herbst aufschwellen, sind schön braun und schwitzen eine Art Terpentin aus, der für ächten Balsam aus Gilead verkauft wird. Die Nadeln sind kürzer, breiter, stumpfer als die Nadeln unsrer Tanne und an der Spitze mehrentheils gekerbt. Auf der untern Fläche sind sie mit zwey Reihen heller Punkte bezeichnet. Sie sitzen fahrmartig in mehreren Reihen und mit den Spitzen nach innen zu gebogen. Die Zapfen sind eiförmig, bräunlich, stehen aufrecht und haben beynahe runde, platte, am Rande zugespitzte Schuppen. Im Herbst fallen sie in Stücken auseinander. Das Holz hat nichts vor unserm Tannenholze voraus.

§. 585.

Art. 164. Schierlingstanne. *Pinus americana*. Du Roi II. 107.

*Synon.* *Abies americana*. Mill. n. 6. *Abies minor pectinatis foliis, virginiana, conis parvis subrotundis.* Du Ham. n. 6. *Abies minor Taxi foliis, conis parvis subrotundis deorsum spectantibus.* Clayton in Gronov. virg. S. 191. *Abies foliis solitariis, confertis, obtusis, membranaceis.* Gronov. virg. S. 191. *Pinus canadensis.* Linn. sp. pl. ed. 2. 1421. *Pinus Abies canadensis.* Münchh. V. 223. Le Sapin de Virginie. American Hemlock Spruce-Fir. Mawe. Hemlock-Fir. Hanb. I. 234. Schierlingstanne, taxblättrige Tanne, Hemlockstanne.

v. Wangenheim 39. Marshal 183. Sudow 378. Münch 72. Ehrhard III. 23. Carver. 415.

Abbild. von Wangenheim F. XXVI. Pluk. Alm. II. t. 121. f. 1.

## §. 586.

Mit mehr stumpf- als spizigen Nadeln, die auf der Unterfläche mit weissen Strichen versilbert sind.

Immergrün. Vaterland. Nordamerika. Der Stamm ist dünne und mit etwas waagrecht stehenden Zweigen besetzt. Die jährigen hängen krumgebogen nach der Erde, und richten sich im Frühjahr wieder in die Höhe. Da, wo sie aus dem Stamm hervortreten, ist ein Wulst. Die Rinde ist glatt und weisgrau. Die Nadeln gleichen denen vom Wachholder, sind breitgedrückt, schmahl, an beiden Enden stumpf zugespitzt, und die untre Fläche ist mit weissen Strichen versilbert. Die Zapfen sind kleiner als Lerchenzapfen, länglicht rund, hängen abwärts. Die Schuppen sind abgerundet, glatt und braungelb. Sie empfiehlt sich blos in Lustwäldungen, da sie nichts vor unsern Nadelhölzern voraus hat, und noch dazu einen guten Boden verlangt.

## §. 587.

## Vierte Untergattung. Lerchen.

Büschelweise aus einer gemeinschaftlichen Scheide hervorkommende Nadeln.

Art. 165. Lerchenbaum. P. Larix. Linn.

Synon. Larix. C. Bauh. pin. 493. Larix foliis fasciculatis deciduis. Hall. hist. n. 1658. Larix folio deciduo conifera. Du Ham. n. 9. Larix decidua. Mill. n. 9. La Mélese. Larch-Tree. Hanb. I. 152. Leerbaum, Lierbaum, Rothbaum, Lerchtanne, Lorchbaum, Schönbaum, Leertanne, Terpentibaum.

Encow 386. von Burgsdorfs 276. Gleditsch I. 345. Borkhausen 14. Märter 10. Marshall 184. Hausvater V. 327. Du Roi II. 61. Becker 19. Schrebers Sammlungen I. 149. 166. Forstmagazin I. 1. 158. Handbr. Magazin 1767. St. 96. Linn. Sp. Pl. II. 1421. Pallas ross. I. I. I. Scopoli carn. II. 248. Leonhardi 146. Leipziger Intell. 1775. S. 53. Neue schles. ökon. Nachr. 1780. S. 39. 43. Defon, Bedenken St.



St. IV. S. 288. Hanows Seltenheiten, B. II. 42. Titius neue gesells. Erzähl. I. S. 145. Schrank II. 232.

Abbild. Delhafen t. 17 — 21. Cramer t. 28. Jc. pl. med. t. 89. Blackwell. t. 477.

S. 588.

Mit zugespikten, sommergrünen Nadeln, die in Büscheln rund um die Zweige herumstehen.

Die Lerche wächst sowohl in mittlern Gebirgen, als auf Ebenen, treibt einen hohen, schlanken Schaft und wird im geschlossenen Dickigt gegen achtzig Fuß hoch. Die männliche Blüte erscheint (hier) im April in Erbsen grossen Köpfchen. Diese kommen aus den Knospen der Nadelbüschel und bestehen aus vielen kleinen, weislichen Schuppen, deren jede zwey gelbliche Staubfäden enthält. Die weiblichen Blüten sitzen an den nämlichen Zweigen. Sie bilden kleine, ovale, schuppige Zapfgen von röthlicher oder purpurrother Farbe, und erwachsen zu einem Zapfen der über einen Zoll lang, regelmäßig oval ist, auf gebogenen, steifen Stielen gerade in die Höhe steht und im October seine Reife erlangt. Die Schuppen sind eyrund, etwas rauh, am Rande zerrissen und jede Schuppe enthält zwey Saamen. Die innern Schuppen sind stumpfrund, fleischig und sehr kurz, vergrößern sich aber bis zur Reife des Saamens sehr ansehnlich und werden grün. Nach ausgefallnem Saamen bleiben die Zapfen bis ins dritte Jahr sitzen. Der Saame ist gelblich, klein, oval, zugespitzt, plattgedrückt, mit einem kurzen, breiten, eckigen Flügel umgeben. Die Nadeln erscheinen an den vornjährigen Trieben in Büscheln. An den neuen stehen sie einzeln und rund um die Zweige. Sie entspringen aus einer gemeinschaftlichen Knospe, die nach dem Ausbruch der Nadeln die Stelle einer Decke vertritt. Die Rinde ist an alten Stämmen ziemlich stark, mit vielen Rissen, braunroth, an den jungen Trieben gelblich gestreift. Die Nester hängen herab. Das Holz ist mit harzig balsamischen Theilen reichlich durchzogen.

Halbart.

Halbart. a) Rothe Lerche. Marschal 184. Pinus Larix rubra. Common red Larch - Tree. Mawe.

Abarten. aa) Weiße Lerche. Pinus Larix alba. With Larch - tree. Mawe.

bb) Schwarze Lerche. Borkhausen 17. Pinus Larix nigra, Pinus laricina. Black Larch - tree. Mawe.

Du Roi II. 63. 83. von Wangenheim 42. Marschal 185.

Pinus Larix 589.

Ein wichtiger Baum für Länder welche Schiffbauholz nöthig haben: denn nach den Versuchen die man mit dem Lerchenholz bey der russischen und venetianischen Marine angestellt hat, giebt es ein eben so gutes und dauerhaftes Materiale zum Schiffbau als die Eichen nimmermehr, daher die Lerche wegen ihres schnellen Wachsthums als Surrogat der Eiche um so mehr cultivirt zu werden verdient, als sie auch in magern Gegenden fortschlägt. Dieß eröffnet der Industrie und einer weisen Polizei, ein weites Feld, ihren wohlthätigen Einfluß auf Wohlstand und Landescultur an den Tag zu legen. Mit einem ganz geringen Aufwande von Mühe und Kosten, gewinnt die geschäftige Hand des Fleißes durch die Cultur dieser so nützlichen Holzart kahlen Bergen und öden Gegenden, wo sonst kaum eine Spur der Vegetation anzutreffen war, ein neues Produkt ab, und schafft in wenig Jahren Büschen in die schönsten Gehölze um.

Aber dieser Baum ist nicht weniger wichtig für die Kunst- Land- und Hauswirthschaft. Die Balken dienen zu allerhand Civilbauholz, Mühlenwellen und Röhren. Im Wasser ist das Lerchenholz noch weit dauerhafter als in der freyen Luft und erhält eine beynahe steinartige Härte. Man nimmt es daher zum Mühlenbau, zu Salinen und zum Grubenbau. Die Böttcher verfertigen Wein- und Bierfässer daraus. Die aus diesem Holze gebrannten Kohlen übertreffen die aus andern Nadelholzern geschmolzen sehr. Aus dem Harze wird durch das an-

anzapfen der Stämme der ächte venetianische Terpentin gewonnen.

Neue gesellschaftliche Erzählungen I. 145. Allgemeines Forstmagazin I. S. 1 und 258. Du Hamel I. 231.

J. 590.

Der Lerchenbaum gedeiht nicht in einem fetten, nassen, fliegenden und bindenden Boden. Jedes andre Erdreich, in jeder Lage, ist ihm willkommen. Er gedeiht in rauhen Gebirgen wie in Ebenen. Nur ein zu warmes Klima ist ihm zuwider. Man hat seinen Anbau in Italien in den Gärten vergeblich versucht, ob er gleich eben daselbst auf den hohen Gebirgen in aller Schönheit prangt. Zur Aussaat im großen, wählt man einen recht frischen Boden, der bloß wund gemacht wird. Der Saame bleibt unbedeckt. Nach vier Wochen pflegt er aufzugehen. Die Pflanzen wachsen schnell, und leiden nichts vom Frost. Wegen ihrer Pfahlwurzel muß man sie aber jung versehen. Dieß geschieht im Frühjahr (bey dürrm Boden im Herbst) vier Fuß weit im Verband.

Oekonomische Nachricht von dem Anbau und Nutzen des Lerchenbaumes 1791. Vom Anbau des Lerchenbaumes in Schrebers Samml. I. S. 149 und 166. Vom Lerchenbaum und dessen Anbau. Zinks Leipziger Samml. IX. 1069. Von Pflanzung der Lerchenbäume. Handbr. Samml. 1759, S. 15. Stuttgarter ökon. phys. Auszüge, B. II. S. 486. Von Pflanzung und Wartung der Lerchenbäume. Handbr. Samml. 1758. S. 233. Handbr. gelehr. Anzeig. 1753. St. 19. 30. 61. 1756. St. 6. Beantwortung der Aufgabe, wie mit Verpflanzung der Lerchenbäume auf eine zuverlässige Art verfahren werden müsse. Handbr. Samml. 1757. St. 46. Beiträge zur Forst-Cameralwissenschaft S. 83. Mosers Forst-Archiv X. 211. v. Burgsdorfs Abhandlung über die Vortheile vom ungesäumten, ausgedehnten Anbau einiger in den Königl. Preussischen Staaten noch ungewöhnlichen Holzarten. Berlin 1790.

Allein der Saame ist mühsam auszuklengeln. Gewöhnlich bricht man die Zapfen im November wobey man da-



dahin zu sehen hat, daß nicht leere anstatt der vollen gesammelt werden. Wegen des zu dieser Zeit in den Zapfen annoch befindlichen terpentinartigen Wesens ist der Saame schwer auszubringen. In der Wärme wird dieses Harz flüßig, dadurch kleben aber die Schuppen immermehr zusammen und in einer zu starken Hitze leidet die Keimungskraft des Saamens. Der Dampf vom kochenden Wasser, den man sonst anwendet, giebt zwar dem Saamen ein schönes Ansehen, ist aber auch höchst nachtheilig für ihn. Weit besser ist es nach Zanthiers Rath, die Zapfen den Winter über an den Bäumen hängen zu lassen; so wird ihr terpentinartiges Wesen durch Schnee, Frost und Regen nach und nach verzehrt und da die Zapfen aufrecht stehen, hat man das schnelle ausfallen des Saamens auf einmahl nicht zu befürchten.

Nach Beschaffenheit der Witterung spürt man im Febr. und zu Anfang des März bei windiger Witterung auf dem Schnee nach, und wenn man ausgefallnen Saamen wahrnimmt; dann ist es Zeit die Zapfen ungesäumt zu brechen, da der Saame nun seine vollkommene Reife hat und leicht auszubringen ist. Man schneidet den Stiel am untersten Ende ab, sticht mit einem spizigen Messer in den Kern und spaltet ihn. Diese Hälften werden abermahls gespalten, nur muß man sie nicht schneiden, als wodurch vieler Saame verlegt wird. So bricht man nun eine Schuppe nach der andern mit dem Messer los, da denn der verborgene Saame ganz rein und unverlegt herausfällt.

S. auch: Anweisung wie der Lerchensaamen auszusäen. Auf Königl. Preussischen Befehl publicirt. d. d. Berlin den 8. Dec. 1779.

§. 591.

Art. 166. Libanons-Ceder. *P. Cedrus*. Linn.

Synon. *Larix Cedrus*. Mill. n. 3. *Larix orientalis fructu rotundiore obtuso*. Du Ham. n. 2. Le Cedre du Liban. Cedar of Libanon. Hanb. I. 34. 233. Wahre Ceder.

Vort-

Borthausen 16. Du Roi II, 84. **Suckow** 358. Allgemeines Forstmagazin Frankf. und Leipzig 1764. B. IV. S. 249 — 70. Hausvater V. 331. Mönch 71. Trew hist. Cedri. Noriberg. 1757. Trew Apologia et Mantissa, observationes de Cedro Libani Norib. 1767. Observations extraites; S. 420.

Abbild. Trew. I. e.

### §. 592.

Mit immergrünen Nadeln, rundlich stumpfen, rundschuppigen Zapfen.

Immergrün. Der Baum wird nicht sonderlich hoch aber sehr dick. Seine Aeste streckt er rings umher waagrecht, auf eine angenehme, ungezwungene Art aus. Die Zweige sind an der Spitze niedergebogen und dicht mit Nadelbüscheln bekleidet. Unter allen Bäumen erreicht dieser das höchste Alter und bleibt dabey gesund. Die Nadeln sind anderthalb Zoll lang, kommen zu ein paar Duzend aus einer gemeinschaftlichen Scheide. In den ersten Jahren trägt die Ceder lauter männliche Blüten. Diese sind einen Zoll lang, dick, länglich und voll gelben Blumenstaubs. Die weiblichen Blüten sitzen auf besondern Aesten in eckrunden Käzchen, die anfangs purpurroth aussehen, nach der Befruchtung aber braun werden. Die Zapfen sind rundlich, stumpf, fünf Zoll lang, vier Zoll dick, und stehen aufwärts unmittelbar an den Zweigen. Die runden Schuppen liegen fest auf. Das Holz ist zunächst unter der Rinde weis und weich, tiefer hinein aber hart und braunroth, von feinem Gewebe und mit einem wohlriechenden Harz durchdrungen.

Anmerk. Die Reisenden sprechen von den alten Cedern auf Libanon mit einer Art Begeisterung. In der hintersten Wdlung eines entzückenden Thals erheben sich, durch ihr Alter ehrwürdige Cedern, welche die warme Phantasie des Morgenländers unmittelbar aus der Hand des Schöpfers entspringen läßt; denn sie datirt ihren Geburtstag in den dritten Schöpfungstag zurück. Sehr alt sind sie auch ohnstreitig, wie ihre Dicke beweiset. Von diesen uralten Cedern sind höchstens noch sechs und dreyßig vorhanden. Ihr Stamm ist von verschiedener Höhe,

Höhe, die höchsten haben vier und zwanzig Fuß. Die dicksten Stämme vermögen sechs Männer nicht zu umklammern. Vermuthlich würden aber auch diese alten Cedern nicht mehr stehen, wenn nicht ehemahls ihre Mißgestalt sie zum bauen unbrauchbar und der über ihre Beschädiger in neuen Zeiten ausgesprochene Bann sie gleichsam zu Heiligthümern geweiht hätte. S. Drüts Erdbeschreibung, I. S. 613.

## §. 593.

Dieser Baum, der auch in Deutschland recht gut fortkommt, verdiente wegen seines feinen Holzes in Nutzholzpflanzungen, häufiger angezogen zu werden. Anfangs ist sein Wachsthum etwas langsam. Gegen die Kälte unsrer Winter zeigt er sich sehr dauerhaft, und wenn auch die Spitzen bey strengem Froste etwas leiden; so treiben sie doch bald wieder. Das Holz ist ausnehmend dauerhaft, fault nicht, und bleibt vom Wurmsfraß verschont. Es wird zu den feinsten Nugarbeiten gesucht. Aus den jungen Bäumen träuft in der Hitze des Sommers von sich selbst und ohne Einschnitte ein klares, durchsichtiges, weisliches Harz, das erhärtet und von den Materialisten Cedria genannt wird.

Wallerius de modo, quo Cedria eiusque aqua praeparari solet. in Eph. Nat. Cur. Vol. IX. 244. Marggraf Examen chemicum ligni Cedrini. Acad. reg. Berol. 1753. S. 73. deutsch in dessen chem. Schriften, T. I. n. 14. und in Cartheusers vermischten Schriften, St. V. S. 323. Das Cedroöhl kommt aber nicht von der Ceder sondern wird aus den frischen Schalen der Cedratfrüchte, eine Art Citrus, bereitet.

## §. 594.

Gatt. 47. Cypresse. Cupressus. Nadelholz.

Männlicher Blütenstand. Kätzchen. Die einzige Geschlechtsdecke sind Schuppen, welche vier Staubbeutel, denen die Staubfäden fehlen, bedecken. Weiblicher Blütenstand. Fast runde Zapfen. Die einzige Geschlechtsdecke sind Schuppen, die mehrere erhabne, an der Spitze ausgehöhlte Punkte, welche man statt der Staubweege wahr-



wahrnimmt, bedecken. Die Frucht ist eine kleine, eckige, zugespitzte Nuß.

## §. 595.

Art. 167. Immergrüne *C. C. sempervirens*. Linn.  
Le Cyprés comun. Common Cypress - tree. Hanb.  
I. 42. 213. Gemeine Cypresse.

Sudow 389. Borkhausen 22. Scopoli carn. II. 249.  
Wdnch 33. Miller I. 936.

## §. 596.

Mit viereckigen Zweigen, immergrünen, Dachziegelförmig übereinander geschobenen Nadelblättchen.

Dieser Baum wächst vorzüglich auf der Insel Creta, dem heutigen Candien, auf sehr hohen Gebirgen, wo seine balsamische Ausdünstungen der Luft, den Kranken die sich in jene Wälder begeben, sehr heilsame Eigenschaften mittheilen. Das Holz ist gelbröthlich, hat einen sehr angenehmen Geruch und widersteht der Fäulniß so stark, daß es fast keiner Verwesung unterworfen ist. Das flüssige Harz dieses Baumes soll mit dem Terpentin übereinkommen. Der Stamm ist aufrecht, gerade, wird dreßsig bis vierzig Fuß hoch, und ist fast ganz von unten auf rings herum mit dicht stehenden Aesten besetzt. Die Zweige sind vierseitig. Die Nadelblättchen sind sehr klein, etwas dunkelgrün und dachziegelförmig übereinander geschoben.

Dieser Baum schlägt auch in Deutschland bey gehöriger Behandlung gut fort und verdiente in Nußholzpflanzungen mehr angezogen zu werden. Sein Holz ist zum bauen das allerdauerhafteste. Es wirft sich nicht, bekommt keine Sprünge und breitet beynahe immerwährenden Wohlgeruch aus. Es verdient daher zu Schreinerarbeiten vor vielen andern Holzarten den Vorzug, wie es denn auch zu allen Zeiten im höchsten Werth gestanden ist und Plato wollte, daß man alle Gesetze auf Tafeln von Cypressenholze schreiben sollte, um ihnen eine ewige

Dauer zu geben. Die Saamenkörner fallen bey einer mäßigen Wärme von selbst aus. Da es nun nach den Erfahrungen des Hrn. R. R. Medicus am besten ist, den Saamen gleich an seine bleibende Stelle zu säen; so sucht man eine Stelle aus, die gegen die Nord- und Ostwinde geschützt ist. Die zwey oder drey ersten Winter können die Pflanzen mit Laub bedeckt werden.

Churpfälz. Bemerkungen 1774. S. 188.

§. 597.

Art. 168. Thuja - C. C. thyoides. Linn.

Le Cedre blanc. Small blue - berried Cypress. Hand. I. 214. Maryland blue - berried Cypress. Marsh 71. The white Cedar - Tree. Wangenh. 8. Weiße Cedar, weiße Cypresse, Lebensbaum-Cypresse, kleine blau-beerige Cypresse.

Linn. sp. Pl. II. 422. Sudow 391. Borkhausen 23. Mönchs Verzeichniß 33. Marshal 71. v. Wangenheim 8. Kalms Reisen II. 175. Du Roi I. 198.

Abbild. v. Wangenheim F. IV.

§. 598.

Waterland. Die gemäsigt liegenden Provinzen des nördlichen Amerikas, vorzüglich der westliche Theil von neu Jersey und die Delaware Grafschaften, wo diese Cypresse in Sümpfen ihre größte Vollkommenheit erlangt. Hier treibt sie ihre Wurzeln flach aus und das stehende Wasser geht drüber weg. Auch ist der Frost in diesen Gegenden selten so strenge, daß er bis an die Wurzeln bringen und diese beschädigen sollte. Der Wuchs des Baumes ist im dichten Stande schlank und gerade. So wie sein Wachsthum zunimmt, reinigt er sich. In den ersten Jahren wächst er geschwinde, so wie er aber in die Höhe geht, erfolgt dieses langsamer. Seine Nadelblättchen gleichen denen von der Thuja. Sie liegen geschuppt über einander, und haben einen starken Geruch. Der Saame

Saame ist eine kleine, winkliche Nuß. Das Saamenbehältniß, das derern mehrere enthält, ist ein kleiner, runder, aus eckigen Schuppen zusammengesetzter Zapfen, der bey seiner völligen Reife bräunlich, zuvor aber blaulich ist. Die Rinde ist glatt, braun in das röthliche fallend.

§. 599.

Die Thuja-Cypresse erreicht das Alter ihrer Vollkommenheit mit achtzig bis hundert Jahren. Ihr Holz ist weis, weich, leicht, und doch über der Erde von besondrer Dauer, so daß es von Wind und Wetter nicht beschädigt wird. Die aus den dicken Stämmen gehauenen Rähne hält man in Amerika für die besten. Sonst liefert dieser Baum gutes Schiffbauholz, Bretter und Staabholz. Die daraus gehauenen Balken sind von einer ganz vorzüglichen Güte. Man verfertigt auch Pfosten und ausnehmend dauerhafte Schindeln daraus, ferner Zuber, Eimer, Butterfässer. Die Amerikaner trinken den Absud der Spähne als Gesundheitshee und reisen nach den Sümpfen, worinnen diese Bäume stehen wie wir nach Gesundbrunnen, um den verlohrnen Appetit, durch das zwischen den Bäumen stehende Wasser wieder herzustellen.

Anmerk. In Ziegenberg stehen mehrere Exemplare am Fuß einer Bergwand in einem frischliegenden, gemischten Waldboden von eben nicht besondrer Güte, unter unsern Fichten und Tannen und andern amerikanischen Holzarten.

§. 600.

Art. 169. Zweyzeilige *C. C. disticha*. Linn.

*Synon.* *Cupressus virginiana* foliis *Acaciae* deciduis. Du Ham. n. 4. Le Cyprés a feuilles d'Acacia. Deciduous Cypress - Tree. Hanb. I. 114. The deciduous Cypress of Virginia, the bald Cypress, the bald Cedar of Virginia. Wangenh. 43. Virginische Cypresse, Cypresse mit abfallenden Nadeln, virginische, acacienblättrige Cypresse.



v. Wangenheim 43. Marsbal 68. Du Roi l. 201. Wbndch  
34. Sudow 390. Linn. sp. pl. 1422.

## §. 601.

Mit sommergrünen Blättern, welche zwey Reihen an den Zweigen bilden und von einander abstehen.

Waterland. Virginien, Carolina und die Gegenden am Missisipi, wo sie in einem niedrigen, sumpfigen Boden am besten gedeiht. Selbst in England wächst dieser Baum nicht schwelgrischer als an Flüssen, Seen, Teichen, und auf wässerigem Grunde. Gegen die Kälte ist er sehr unempfindlich. Nach dem Gipfel zu theilt er sich in viele Aeste. Sein Schaft ist im eigentlichen Verstande genau kegelförmig. Aus der Wurzel entspringen sechs Fuß hohe, mit einer röthlichen Rinde bekleidete, an der Spitze kolbige, kahle, pyramidenförmige Auswüchse, die selbst Theile der Wurzel sind. Die Stammrinde ist glatt und braunroth. Das Holz ist weißgelblich, schwer, mit feinem Harze durchdrungen und ziemlich fest. Die Nadelblättchen wachsen rund um die Zweige, legen sich aber in zwey abgesetzten Reihen neben einander hin. Der Zapfen ist rundlich und mehrentheils funfzehnsährig. Die Fächer sind aussen mit eckigen, holzartigen Schuppen, von ungleicher Größe und Gestalt bedeckt, welche nicht eher als nach erhaltener Reife des Saamens sich öffnen und diesen fallen lassen.

## §. 602.

Dieser Baum macht den Bewohnern seiner Heimat fast alle andre Holzarten entbehrlich. Sein Holz, welches sehr dauerhaft ist, wird zu Mastbäumen, Seegelsstangen, Planken, Canots, Schindeln, und zu anderen Bau- Werk- und Nutzholz, besonders zu Staabholz genommen. Diese vielfachen Nutzungen machen, daß man des vorzüglichen Terpentins nicht achtet, der von ihm gewonnen werden kann. Demohngeachtet ist nach der Meinung des Hrn. v. Wangenheim, der Anbau dieses Baumes

meß im großen für Deutschland nicht anzurathen, wohl aber im kleinen, z. B. in Nußholz-Plantagen. Man wählt dazu niedrige, gegen kalte Winde geschützte Plätze. Der Boden muß fett, sandig, leicht und feucht seyn, wie man ihn in abgelassenen Zeichen findet. Er wird vor der Saat wohl locker gemacht, der Saame vor Ausgang des Aprils gesäet und in solchem feuchten Grunde nicht bedeckt.

### III. Unter=Classe.

Zwitter- und männliche Blüten auf einem Stamme.

§. 603.

Gatt. 48. Zürgelbaum, Celtis. Laubholz.

Zwitter und männliche Blüten auf einem Stamme. Die Zwitterblüten haben eine fünfspaltige Blumendecke, oder eigentlicher Geschlechtsdecke, denn die Blumenkrone fehlt. Die Staubbeutel liegen anfänglich an den fünf kurzen Staubfäden und bedecken sie. Einer erhebt sich nach dem andern, bis sie endlich alle aufrecht stehen und einen Stern bilden. Der Fruchtknoten ist eyrund zugespitzt, hat zwey ausgebreitete, sehr lange, verschiedentlich gebogene, fein behaarte Narbenblättchen. Frucht, eine eifernige Steinfrucht. Die männlichen Blüten sitzen unter den Zwitterblüten, denen sie in allem ähnlich sind, nur daß sie eine sechsspaltige Geschlechtsdecke und sechs Staubfäden haben.

§. 604.

Art. 170. Amerikanischer Z. C. occidentalis. Linn.

Synon. Celtis fructu obscure purpurascente. Du Ham. n. 2. Celtis procera, foliis ovato-lanceolatis serratis fructu pullo. Gron. virg. 158. Le Micocoulier de Virginie. Occidental Nettle tree. Hanb. I. 102. Purple fruited Nettle tree. Hanb. I. 102. American Nettle tree.

Wangenh. Westlicher Lotusbaum, westlicher Bürgelbaum, virginischer Bürgelbaum, virginischer Lotusbaum.

v. Wangenheim 48. Linn. Sp. Pl. 1478. n. 3. Du Roi I. 141. Mörch 20. Marshal 54. Suckow 161. Medicus bot. Beobacht. 1782. S. 335.

§. 605.

Mit eyrund scharf zugespizten Blättern, deren eine Hälfte länger als die andre ist.

Vaterland. Nordamerika. Die Blätter sind eyrund scharf zugespizt, und mit Ausschluß der Spitze und des untern Theils nur an den Seiten gezahnt. Die eine Hälfte ist länger als die andre. Die Blüten stehen den Blättern auf ziemlich langen Stielen gegenüber. Bey der männlichen Blüte ist die Geschlechtsdecke grasgrün und besteht aus fünf eyrunden, eingebogenen, abfallenden Blättchen. Die Staubbeutel sind grasgrün, anfänglich unter sich gebogen, liegen an den Fäden fest an, und in dieser Stellung stehen alle fünf dicht nebeneinander, so daß ihre Spitze in fünf kleinen, auf dem Grunde der Geschlechtsdecke befindlichen Oefnungen, welche um den Fruchtknoten herumstehen, trichterförmig und mit kurzen, steifen Haaren umsetzt sind, stecken. Hierauf erhebt sich ein Staubbeutel nach dem andern, so, daß wenn der Staubfaden des ersten ausgewachsen ist, sich die Spitze des Staubbeutels aus seinem kleinen Loch erhebt, mit Macht in die Höhe springt, sich zurück beugt und seinen Saamenstaub ausstäubet. Diesem folgt der zweyte, dann der dritte, u. s. f. bis sie alle fünf in Gestalt eines Sternes ausgebreitet sind. Doch ist der erste nebst seinem Deckblatt meistens schon abgefallen, ehe der fünfte seine Richtung vollendet hat. Bey der Zwitterblüte sind die Geschlechtsdecke und Staubfäden wie bey der männlichen, nur sind beyde Theile oft in der Zahl von sechs da. Der Stamm ist gerade, die Rinde ist an den jungen Stämmen zuweilen glatt und dunkel, an ältern rauch und heller. Die Zweige sitzen an allen Seiten dicht neben ein-

an



ander. Die Früchte sind erbsengroße, runde, braunrothe Beere, bey ihrer Reife von einem angenehmen Geschmack.

Dieser Baum ist auch in Deutschland sehr dauerhaft und erreicht bey uns eine ansehnliche Höhe. Er bringt auch zuweilen nach warmen Sommern im October Samen. Wenn er aber gleich in seinem Vaterlande auf feuchtem Boden gefunden wird; so darf er diesem bey uns nicht erhalten, da er in einem solchen unfehlbar vom Froste leidet. Die kleinen Stämme und Stangen liefern ein gutes Nutzholz zu Spazierstöcken, Peitschenstielen, Ladstöcken. Etwas stärkere Stämme geben gute Waagenbäume, Rollen, Radzähne. Das Holz ist auch ein gutes Brennholz. Die Beere haben einen angenehmen Geschmack und officinelle Tugenden.

## Zwoote Classe.

### Getrenntes Geschlecht.

§. 606.

Gatt. 49. Hippophaë. Seekreuzdorn. Laubholz.

Männliche Blüte. Geschlechtsdecke, nur eine, zweispaltig, enthält vier gleich lange Staubfäden. Weibliche Blüte, Geschlechtsdecke nur eine, mehrtheilig. Der Fruchtknoten ist klein und hat nur einen Staubweeg. Die Frucht ist eine einsaamige Beere.

§. 607.

Art. 171. Seekreuzdorn. H. Rhamnoides. Linn.  
Sommergrün.

Synon. Rhamnoides salicis folio angustiore, fructu flavescente. C. Bauh. pin. 477. Rhamnoides florifera salicis folio. Tourn. Coroll. 53. Oleaster germanicus.

**Cord. hist. 186.** Rhamnus primus Dioscoridis creditus. **Lob. obs. 598.** Le Rhamnoide a feuilles de Saule. **European Sea Buckthorn. Hanb. I. 129.** Weidenblättriger Seekreuzdorn, Weidendorn, weidenblättriger Stechdorn, deutscher Stechdorn, deutscher Sanddorn, Meerdorn, Kreuzdorn, dünen Besingstrauch, Streitbesiensstrauch, finnische Beere, weegdornartiger Sanddorn, Hasdorn, rother Schlehendorn.

**Du Roi I. 306. Sudow 80. Gleditsch II. 184. Füber IV. 388. Viborg II. Du Hamel II. 166. von Münchhausen III. 450. v. Burgsdorf 223. Cord. obs. 223. Schrank I. 412. Beckmanns Bibl. XIV. 404.**

**Abbild. Lobel. l. c. Kerner III. 362. Viborg l. c. sehr gut.**

§. 608.

**Mit schmahlen, lanzettförmigen Blättern.**

Ein einheimischer, sommergrüner, harter, ganzer Dornstrauch, der auf Klippen und Felsen und im Fluglande wächst. Er treibt seine Wurzeln tief und ihre Zweige breiten sich weit aus, so daß er wie die Sandweide zur Befestigung des Fluglandes dient. Die Rinde ist erst grau, dann schwarzbraun und rostig. Die häufigen Dornen sind lang, stark und hart, und diejenigen in welche sich die Zweige endigen, sind sehr spizig. Die Blätter sind schmahl, lanzettförmig, auf der obern Fläche meergrün, auf der untern mit einem silberweißen Filz und mit schildförmigen, haarigen Schuppen besetzt. Die männlichen Blüten kommen unter den Blättern zwischen einer einschaaligen Knospe und einem Zweige zu mehreren hervor. Die weiblichen sitzen einzeln in den Winkeln der untersten Blätter. Die Beere sind von der Größe einer Erbse, goldgelb, enthalten einen gelben, herben, sauern, färbenden Saft,

**Anmerk.** In Ziegenberg fand ich diesen Strauch 1791 und zwar war es das erstemahl, daß mir ein Exemplar desselben zu Gesicht kam. Ich brach mir daher ein kleines Zweiglein für  
mein

mein Herbarium zum guten Glück ab. Denn im folgenden Jahre 1792 als ich dieses Tempe gerade zu derselben Zeit (im Anfang des Jun.) wieder besuchte, war dieser Strauch, der in einem wahrhaften Waldgrunde stand, (welches wahrscheinlich die Ursache war) ausgegangen.

## §. 609.

Im bothnischen Meerbusen, wird aus den Beeren eine Lattwerge bereitet. Das Holz, welches sehr hart ist, ist zu mancherley Nutzgebrauch geschickt. Von den belaubten Zweigen erhielt Hr. Suckow verschiedne vortrefliche Farben. Auch kann man diesen Strauch nach Viborg zur Bepflanzung der Sanddünen, gebrauchen. In Lustwäldungen wird er wegen seines sonderbaren Ansehens im Winter geschätzt, indem seine vierjährigen Schüsse alsdann sehr dicht mit großen, aufgeblasenen, schuppigen Knospen besetzt sind, welche eine dunkelbraunere Farbe als die Zweige haben; und ihm ein so sonderbares Ansehen geben, daß er allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Um das Ende Febr. pflegen diese Knospen an Größe stark zugenommen zu haben. Auch machen seine Blätter mit ihren zweyerley Farben einen guten Effect.

v. Burgsdorfs Holzcultur II. Suckow in den Vorlesungen der churpf., phys. ökon. Gesellschaft. Mannheim 1788. S. 95.

## §. 610.

Gatt. 50. Myrica, Myrika. Laubholz.

Blütenstand: Kößchen, welche aus mondförmigen einblütigen Schuppen zusammengesetzt sind. Die männl. Blüten enthalten vier bis sechs Staubfäden. Die weibl. Blüten haben einen Fruchtknoten mit zwey Staubwegen. Die Frucht ist eine einsaamige Beere.

## §. 611.

Art. 172. Gemeine M. M. Gale. Linn.

Synon. Rhus myrtifolia belgica. C. Bauh. pin. 414. Chamaeleagnus Dod. Pempt. 780. Gale florifera et frutifera. Vaill. Botan. Paris. p. 77. Gagel. Dod. hist.



1223. Gagel Germanorum. I. Bauh. hist. I. 244. Le Piment royal. Gale or sweet Willow. Hanb. I. 149. Duch Myrtle. Niederländischer Myrtenstrauch, deutscher Kerzenbeerstrauch, Dehlmyrte, Gerbermyrte, Myrtenheide, Gagel, Torfmyrte, Heidelbeermyrte, deutscher Talgbusch, brabantische Myrte.

Gleditsch I. 329 v. Burgsdorf 247. Ehrhard III. 130. IV. 143. Du Hamel I. 182. Miller. III. 242. n. 1. Sudow 83. Tournefort de Gale. Acad. reg. Paris. 1706. p. 103. Hamburger Magazin XXIII. 210. Mönch 64. Lüder IV. 391. Schoepff mat. med. 148.

Abbild. Ic. pl. med. t. 217. Kerner III. 282.

§. 612.

Mit lanzettförmigen, etwas sägenartig gezahnten Blättern.

Ein einheimischer, niedriger, sommergrüner Strauch, der in feuchten Niedrigungen wächst, aber nach den eignen Erfahrungen des Hrn. v. Burgsdorf, auch in trockenem, mit Dammerde gemischten Sand, im schattigen Stande, frisch und munter, fortschlägt. Die Wurzel kriecht im feuchten Moorboden, weit umher. Die Blätter stehen abwechselnd, sind hart, lanzettförmig, etwas sägenartig gezahnt, auf der Unterfläche weislich. Die Blüten erscheinen im Sommer in kleinen, aufrechtstehenden, glänzenden, hellbraunen, dichten Kößchen einzeln in den äußersten Zweigen zwischen den Blättern. Die Frucht ist eine runde, schwarze, saftige Beere, welche im Octob. frey wird, und einen braunen Saamenkern enthält.

Man pflegt dieses Erdholz zu Pulver zu mahlen, und dieses, seines angenehmen Geruchs wegen, aromatischen Salben bezumischen. Auch legt man es zwischen Kleider und Zeuche, um Motten abzuhalten. Ehemahls setzte man auch die äußersten Enden der blühenden Zweige mit Hopfen dem Biere bey. So lange dieses Erdholz frisch ist, hat es einen angenehmen, etwas flüchtigen Geruch, der balsamisch und dauerhaft ist, den Kopf unvermerkt

merkt einnimmt, und Kopfsweh und Schwindel verursacht. Wohlgetrocknete Sträucher riechen viel gelinder, und angenehmer. Der Geschmack ist bitter, öhlicht, etwas zusammenziehend und balsamisch, und verräth Heilkräfte. Die Gerber bedienen sich dieses Strauchs zur Bereitung der Oberleder und schwachen Felle.

Ehrhard l. c. v. Burgsdorfs Holzcultur 182. 152.

§. 613.

Gatt. 53. *Rhus* (dioecium) Sumach. Laubholz.

Männl. Blüte. Fünfblättrige Blumendecke. Blumenkrone, fünfblättrig. Staubfäden, fünf, Fruchtknoten, klein, unfruchtbar. Weibl. Blüte. Blumendecke und Blumenkrone, fünfblättrig. Staubfäden fehlen, bey einigen finden sich drey, vier, fünf, mit staubleeren Staubbeuteln. Staubwege, drey mit kugelförmigen Narben. Frucht, eine Beere. Die meisten Arten haben Honigdrüsen auf dem Blumenboden.

§. 614.

Art. 173. Hirschholzen: *R. typhinum*. Linn.

Synon. *Rhus virginianum*. C. Bauh. pin. 517.

Dill. elth. 253. *Rhus* Sumach. Blackwell. herb. Le Sumac de Virginie. Virginian Sumach. Hanb. I. 169. Stagshorn's Sumach, new England Sumach. Wang. 95. Virginischer Sumach.

Linn. Sp. pl. I. 380. Amoenit. IV. 311. Du Roi II. 291. Marshal 248. v. Wangenheim 95. Borkhausen 381. Suckow 155. Medicus bot. Beob. 228. Ehrhard IV. 67. VI. 89. du Ham. II. 170. Lüder II. 119.

Abbild. Blackw. herb. ed. norimb. t. 541.

§. 615.

Gefiederte Blätter. Strich: lanzettförmige, scharfgesägte, oben glatte, unten wollige Blätter.

Waterland: Virginien, Carolina. Die Blätter sind gefiedert, aus sechs bis sieben lanzettförmigen, scharfgesägten, oben glatten, unten wolligen Blättchen zusammen-

mengesetzt. Die Blüten erscheinen an den Enden der Zweige in gelblichgrünen, langen Sträußern. Die Früchte sind rothe, haarige Beere, die so dicht beysammen sitzen, daß sie im Herbst eine Kolbe bilden. Die Rinde ist bräunlich grau und glatt, an ältern Stämmen gerissen, die jungen dicken Triebe sind braunroth, daunig, an Farbe und Textur, Hirschkolben ähnlich.

Ab. a) Großer H. S. Large virginian Sumach. Hanb. I. 169. b) Niedriger H. S. Dwarf. Sumach.

### §. 616.

Die Blüten werden von den Bienen sehr gesucht. Die Beere haben eine angenehme Säure, so daß man sie zur Noth zum Punsch nehmen kann. Nach den Sukow'schen Versuchen, geben die Blätter verschiedene brauchbare Farben. In Neu-England gerbt man das Leder damit, auch nehmen die dasigen Hutmacher, die Beeren mit Alaun gekocht, zum schwarz färben. Hr. Imposit-Secretair Schulze, hat mit den Blättern Leder gegerbt, welches nach dem Zeugniß eines verständigen Schuhmachers, sich gut verarbeiten, und nach seiner eignen Erfahrung sich gut hat tragen lassen. Auch hat er sich eine schwarze Tinte daraus bereitet, welche gut schwarz schrieb, ferner Farben daraus bereitet, gelb, grün und schwarz. Die Blätter haben auch, ein an Farbe und Geruch, dem Tabak ähnliches Product gegeben, des aus den Einschnitten fließenden, milchigten Saftes, der zu einem Gummi erhärtet, und von welchem Du Hamel glaubt, daß er einen Firniß, gleich dem schinesischen geben könne, nicht zu gedenken. Dieser Baum ersetzt also die Stelle des weiblichen *R. coriaria*. Sein schönes gestammtes, goldgelbes Holz, dient zu feinen Schreinerarbeiten. Er nimmt mit jedem Erdreich vorlieb und kommt sogar in unsern dürrsten Heidegegenden fort, und die öden Heiden der Lüneburger Heide, könnten durch diesen Baum urbar gemacht werden.



Er steht auch einigemahl im botanischen Garten. *Rhus coriaria* ist aber letztern Winter erfroren. Hirschfeld Gartenkal. auf das Jahr 1788. S. 214. Vorlesungen der Ehurpfälz. phys. ökon. Gesellschaft. Mannheim 1788. S. 120. v. Burgsdorfs Holzcultus 207. 214.

## §. 617.

Art. 174. Glatter *S. R. glabrum*. Linn.

*Synon.* *Rhus angustifolium*. Du Ham. II. 171. Le Sumac a feuilles étroites. New England smooth Sumach. Mawe. n. 3. Smooth pensylvanien Sumach. Marsh. 247. Glatter, nordamerikanischer Sumach.

Sudow 156. Medicus bot. Beob. 221. Du Roi II. 294. Münchs Verzeichniß 99. Marshall 247. Schoepff mat. med. am. 37. Linn. sp. pl. 380. Gronov. virg. 148. Cold. novbor. 63. Catesby carol. III. 3. Läder II. 120.

Abbild. Catesby. l. c. t. 3.

## §. 618.

Mit gefiederten Blättern, lanzettförmigen, sägezahnigen, auf beyden Flächen glatten Blättern.

Waterland. Nordamerika, wo er an Bäumen und auf den Aeckern wächst. Er wird sechs bis acht Fuß hoch. Die Zweige sind markig, etwas eckig und mit immer glatter Rinde bekleidet. Die Blätter sind groß, ungleich gefiedert. Die Blättchen (siebenzehn, neunzehn bis ein und zwanzig) sind lanzettförmig, sägenartig gezahnt, auf beyden Flächen glatt.

a) Männliche Staude. Die Blumendecke ist fünfblättrig, jedes Blättchen ist schmahl, spizig zulaufend, oben etwas eingebogen, von Farbe gelblichgrün. Die Blumenkrone ist fünfblättrig, die Kronenblättchen sind unten breitlich, endigen sich aber in eine ovale Spitze. Die obere Hälfte, ist rückwärts gebogen. Staubfäden fünf. Die Fäden sind weiß, breitlich, in eine Spitze auslaufend. Der Staubbeutel ist eben so groß, als der Faden. Die fünf Staubbeutel neigen sich einwärts, und überwölben die Narbe. Sie sind etwas größer, als die Kronenblätter, bis dahin, wo sie ausgebreitet sind. Der  
birn-

birnförmige Fruchtknoten, hat drey kleine, unfruchtbare Staubweege, deren Narben knopfförmig sind. Auf dem Blumenboden findet man zwischen dem Fruchtknoten, und den Kronenblättern, eine drüßige Narbe, mit fünf feichten Einschnitten, zwischen welchen die Staubfäden hervorkommen. Von den Einschnitten laufen feichte Furchen bis zu dem Fruchtknoten.

b) Weibliche Staude. Die Blumendecke ist wie bey der männlichen. Eben so auch die Blumenkrone, nur ist die innre Seite jedes Kronenblättchens mit zarten Haaren besetzt, und die Spitze des Blättchens läuft gegen innen zu, hakenförmig bey. Die Staubfäden fehlen, doch nimmt man in vielen Blüten, da wo sie stehen sollten, schwarze Punkte wahr. Der Staubweg ist wie bey der männlichen Blüte beschaffen, nur ist hier alles viel größer. Die Narben sind große, breitgedruckte Kugeln, gelb von Farbe und glänzend von Saamenfeuchtigkeit. Die Frucht ist eine rothe, mehliche, saure Beere. In Ziegenberg, wo ich sie aber nicht blühend antraf, und daher H. Medicus Beschreibung anführe. Man hat zwey Arten.

a) Mit rothen Blumen. R. g. canadense. Marsh. Canadian Red-flowering Sumach. Lüber II. 121. Marshall. 247. von Wangenheim 96. Du Roi II. 297. Du Hamel. II. 171. b) Mit scharlachrothen Blumen. R. g. carolinense. Marsh. Carolinian scarlet-flowering S. Lüber II. 121. Marshall. 248. Miller n. 4. du Hamel. II. 171. v. Wangenheim, 95?

#### §. 619.

Die Bienen fliegen den Blüten dieses Sumachs sehr nach und H. Stumpf empfiehlt daher seinen Anbau den Bienenliebhabern. Sein Holz, welches so leicht als Stroh ist, wird zu eingelegten Arbeiten genommen. Besonders suchen die Tischler die Wurzel, welche gelbbraun,  
vio-

violett geflammt und gemasert ist. Hr. Suckow hat in ihm auch ein vorzügliches Färbgewächs gefunden.

Churpfälz Vorlesungen, Mannheim 1788. 122. v. Burgsdorfs Holzcultur 215. Kalm's Reisen II. 211. Stumpfs Einladung an die Bienenliebhaber. Leipziger Magazin 1784. I. St. S. 79. Pharm. Sumach semina, folia, sal essentielle, radix. Qual. Baccae, acida styptica. Vis, adstringens, coriaria. Vfus. Dysenteria (decoct. cort. rad.) tinctorius. Baccae Rhois glabrae, media aestate saepe efflorescentia alba, quasi salina, obductae sunt; saporis valde acidi. Indigenae hac substantia ad carnes condiendas utuntur. Ex baccarum libris duabus, elixatione et evaporatione, crystallos puras pellucidas ad pondus drachmarum. 6. et sal acetosellae analogas, obtinuit cel. Trommsdorf. V. Taschenbuch für Scheidekünstler, 1781. S. 12. Folia Tabaco intermixta fumum aromaticum et gratum Indigenis reddunt. Schoepff. l. c.

### §. 620.

Art. 175. Firniß: *S. R. Vernix Linn.*

*Synon.* Toxicodendron pinnatum Mill. n. 4. Toxicodendron carolinianum du Ham. II. 258. Rhus toxicodendron vernix Marsh. 251. Rhus foliis pinnatis integerrimis. Gronov. virg. 148. Colden noveborac. 64. Le vrai Vernis. Poison Añh. Hand. I. 170. Varnish-Tree Marsh. 251. Poisonwood-tree, Poisonous Alder, Swamp Sumach. Wangenh. 92. Giftbaum, Gistsche, Firnißbaum.

Linn. sp. Pl. 380. Mat. med. 235. Du Roi II. 306. Linder II. 124. Schoepff mat. med. amer. 38. Marshal 251. v. Wangenheim 92. Carver 423. Medicus bot. Beob. 223. Suckow 156. Wbuck. 99.

Abbild. Kaempff. amoen. 791. t. 792.

### §. 621.

Mit gefiederten Blättern, ungegliederten, gleichen Blattstielen, glattrandigen, glanzlosen Blättchen.

Waterland. Nordamerika und Japan. Man findet ihn als einen Strauch, und auch in unsern Pflanzungen sehr dauerhaft. Die Blätter sind ungleich gefiedert. Die



Die Stiele sind ungegliedert, gleich, verwandeln ihre Farbe im Herbst in eine purpurrothe. Die Blättchen sind oval, glattrandig. Die gelblichgrünen Blüten erscheinen in schlaffen Rispen, aus den Achseln der Blätter. Die Blumendecke der männl. Blüten ist klein, fünfblättrig, oben bezogen, die Blumenkrone ist fünfblättrig, die Blättchen sind gleichbreit, milchweis, länglicht, noch einmahl so groß als die Blättchen der Blumendecke, über welche sie sich in Gestalt eines Sternes ausbreiten. Staubfäden, fünf, noch einmahl so lang als die Kronenblätter. Die Fäden sind weißlich, die Staubbeutel gelblich und setzen oben weit von einander ab. Der kaum sichtbare Fruchtknoten hat einen kleinen, säulenartigen Staubweg, mit drey Warzen, welche die Narben vorstellen sollen. Das Holz ist gelb, mit einem terpentinartigen Saft angefüllt.

§. 622.

Dieser Baum ist wegen seiner giftigen Ausdünstung merkwürdig, doch ist er einem Menschen schädlicher als dem andern. Manche verletzt er schon durch seine Ausdünstung in einer Entfernung von acht bis zehn Fuß, andre leiden nur dann erst, wenn sie ihn berühren. Wiederum sind die Grade der Verlegung auch bey verschiedenen Personen verschieden. Außerst fürchterlich sind seine Wirkungen, wenn sein giftiges Bestandwesen durch Feuer entwickelt wird, und wenn nicht schleunige Hülfe geleistet wird, ist der Todt eine Folge derselben. In Japan wird dennoch der Firniß in großer Quantität von diesen Bäumen gesammelt.

Kalms Reise II. 211. Neueste Mannichfaltigkeiten, erster Jahrgang. S. 347. von Burgsdorfs Holzcultur 216. wo aber das Citatum aus Wangenheim falsch ist, und zwey und neunzig statt fünf und siebenzig gelesen werden muß. Haec vera est arbor Vernicem japonicam selectissimam stillans, vernicem chinensem et siamensem multum superantem. Cortex arboris cultro vulneratus lacteum succum fundit, humore quodam crystallino ex aliis ductibus stillante permixtum, in

acre

aëre nigrescentem. surculi divulsi, foliorum petioli et nervi eundem succum produnt, nullius omnino saporis, sine acedine parum calefacientem. Liqueur ex caudicibus praecipue triennibus excipitur, iterata sectione, donec exsucci marescant. Succo orbatu caules amputandi, et nova e radice proveniet soboles. Per duplicatam chartam subtilissimam, telae araneae pene similem, torqueri solet, ut a particulis heterogeneis mundetur, mundatae centesima circiter pars Olei Toi dicti, e Bignoniae tomentosae fructu expressi, admiscetur, et sic vasis ligneis indita, vel pura, vel colorata, cinnabari nativa, sive atramenti materia, per Iaponiam venalis fertur. Oleum seminum expressum pro candelis inservit. Thunberg. Flor jap. S. 12.

## §. 623.

Art. 176. Wurzelschlagender S. R. radicans. Linn.

Synon. Toxicodendron volubile Mill. n. 6? Rhus Toxicodendron radicans. Marsh. 256. Le Sumac a trois feuilles luisantes. Radicant Toxicodendron. Hanb. I. 170. Poison Vine. Marsh. 256. Trailing Poison Oak, rooted Poison Vine. Wang. 93. Wurzelschlagender, giftiger Sumach, wurzelnder Giftbaum, wurzelnder Sumach.

Linn. sp. pl. 381. Gronov. virg. 33. Cold. novebor. Kalm. II. 296. 214. Schoepff. 39. Suckow 159. Borkhausen. 382. Linder II. 123. Du Roi II. 305. Mawe dict. n. 7. Marshal 256. von Wangenheim 93. Churpfälz. Bemerk. 1777. S. 77. Medicus bot. Beob. 1782. 225. Wöndts Verzeichniß 102.

## §. 624.

Der Stamm schlägt Wurzeln. Die Blätter sind aus drey kleinen, gestielten, eyrunden, nackten, glattrandigen Blättchen zusammengesetzt.

Waterland. Nordamerika. Er klettert wie der Epheu, Bäume und Mauern hinan. Der Hauptstamm hält sich durch fast unzählige Wurzelsfasern an seiner Stütze fest. Die Blätter stehen an langen Stielen und sind aus drey eyrund zugespizten, ganz glatten, glattrandigen, gestiel-

A a

ten

ten Blättchen zusammengesetzt. Die Blüten erscheinen aus den Achseln der Blätter in zusammengesetzten Trauben.

a. Männlicher Strauch. Die Blumendecke ist einblättrig, über zwey Drittel in fünf kleine, schmale, aufrechtstehende Einschnitte zertheilt. Die Blumenkrone ist fünfblättrig, nach einmahl so lang, als die Blumendecke, die Kronenblättchen sind weiß und so zurückgeschlagen, daß ihre obere Hälfte mit ihrer äußern Seite an der Blumendecke anliegt. Staubfäden, fünf, länger als die Blumenkrone, stehen aufrecht, wie die an der Seite der Staubfäden befestigten Staubbeutel. Der Fruchtknoten ist sehr klein, der Staubweg halb so groß als der Staubfaden und narbenlos.

b. Weiblicher Strauch. Die Blumendecke besteht aus fünf aufrecht stehenden, kleinen, bald abfallenden Blättchen. Die Blumenkrone ist wie bey dem männlichen Strauch beschaffen, nur die obere Hälfte ist tellerförmig ausgebreitet, dicklich, und grünlich-weiß. Staubfäden, fünf, auch mehrere sehr kurze, mit kleinen, anfangs gelblichen, nachher bald braun werdenden Staubbeuteln. Der große Fruchtknoten hat einen weißlichen, kleinen Staubweg, mit drey Narben, die man bald abstehend, bald mit einander verwachsen findet. Die Frucht ist eine grünliche, gestreifte, ovalrunde, trockne Beere.

S. 625.

Der Saft dieses Sumachs ist milchig und von weißgelber Farbe. Er ist corrosiv, so daß ein Messer, mit welchem man einen Zweig abschneidet, wenn es nicht gleich abgeputzt wird, davon angegriffen wird, und giftig, jedoch nicht so heftig als die vorhergehende Art. Wegen seiner, zwar nicht großen, aber schönen Blumen, empfiehlt er sich zwar zu Lauben, da man aber Beispiele hat, daß Menschen, welche in solchen Lauben gegessen haben, von den Ausdünstungen derselben bössartige Geschwüre



schwüre bekommen haben; so ist seine Cultur zu dieser Absicht gar nicht rathsam. Bey Verwundungen giebt er einen braungelben Saft, welcher eine sehr starke färbende Kraft besitzt. Hr. Suckow erhielt von ihm unter andern sehr brauchbaren Farben, eine feuergelbe, welche alle Aufmerksamkeit und fernere Untersuchung, in wie weit er den Gebrauch des Orleans ersetzen könnte, verdient. Endlich ist merkwürdig, was H. D. Schöppf anführt, daß man die Wurzeln dieses Sumachs im chronischen Asthma in Lancaster mit gutem Erfolg gebraucht habe.

Churpfälz. Vorlesungen, Mannheim 1788. S. 119.

§. 626.

Art. 177. Gift. S. R. Toxicodendron. Linn.

*Synon.* Rhus foliis ternatis: foliolis petiolatis, nunc integris, nunc sinuatis. Gronov. virg. 149. Herbe a la Puce. Poison Oak. Hanb. I. 170. Marsh. 255. Upright poison Oak. Wangerh. 94. Gisteiche, Giftbaum, eichenblättriger Giftbaum.

Suckow 159. von Wangerheim 34. Linn. sp. pl. I. 381. Borkhausen 383. Lüder II. 123. Marshal 255. Schöppf. 39. Du Roi II. 303. Mönchs Verzeichniß 102.

§. 627.

Die Blätter bestehen aus drey gestielten, eckigen, etwas haarigen Blättchen. Der Stamm schlägt Wurzeln.

Waterland. Virginien und Canada. Ein Kriechgewächs, wie die vorige Art. Die Blätter sind langgestielt, aus dreieckigen, glattrandigen Blättchen zusammengesetzt. Die kleinen weißen Blüten erscheinen in zusammengesetzten Trauben aus den Achseln der Blätter. Die Beere sind rundlich, gestreift, glatt, gelblichgrün, wenn sie reif sind. Sein Stamm wird selten über drey Fuß hoch, wenn er nicht gestützt ist, und seine Schößlinge an der Erde Wurzel treiben können. An Mauern steigt er aber ziemlich hoch. Dem Eichenlaub gleichen

seine Blätter wenig oder gar nicht. Hier und da findet man ein Blatt, dessen einer oder beyde Ränder eingekerbt sind.

Der ganze Baum enthält einen milchigen Saft, welcher an der Luft gleich schwarz wird und Papier und Leinwand dergestalt färbt, daß die schwarze Farbe nicht wieder herauszubringen ist. Er zeigt übrigens auf giftige Eigenschaften, soll aber nur wenigen Menschen schaden, und wenn es geschieht, blos an heißen Sommertagen, da die Poren geöffnet sind, und der Saft in den Körper dringen kann. An den verletzten Stellen entsteht ein Jucken, nachher Blasen, die nach einigen Tagen abtrocknen und abfallen. Zu Bekleidungen der Lauben ist er so wenig als die vorhergehende Art zu empfehlen. Ingenhouß hat den Aerzten seine Blätter zu Versuchen empfohlen, und H. D. Schöppf versichert, daß der einem Hunde eingegebene Saft, demselben nicht geschadet habe.

Kalm's Reisen II. 318. Schoepff. l. c. Ingenhouß Versuche mit Pflanzen 184. Die englischen Handelsgärtner führen drey Abarten an:

- a) Smooth-leaved Poison-Oak. Mit glatten Blättern.
- b) Downy-leaved Poison Oak. Mit etwas haarigen Blättern.
- c) Upright growing Poison-Oak. Aufrechter Gift-Sumach.

§. 628.

Art. 178. Copal-S. *Rhus copallinum* Linn.

*Synon.* *Rhus foliis pinnatis integerrimis petiolo membranaceo articulato.* du Ham. II. 171. *Rhus elatior, foliis impari pinnatis, petiolis membranaceis articulatis.* Gronov. virg. 149. Le sumac a la gome copal. Lentiscus-leaved Sumach. Hanb. I. 169. Marsh. 244. Mountain Sumach, Beech Sumach. Wangenh. 245.

Linn. sp. pl. I. 380. Gronov. virg. 149. Du Hamel I. 171. Schoepff mat. m. a. 39. Du Roi II. 298. v. Wangenheim 96. Marshal 244. Luder II. 121. Suckow 157. Medicus botan. Beobachtungen 1782. 225. Mönch's Verzeichniß 101. Fabricii Enum. method. 409.

§. 629.

## §. 629.

Die Blätter sind gefiedert, die Blattstiele häutig und gegliedert, die Blättchen glattrandig.

Waterland. Nordamerika. Er wird sechs, acht und zuweilen zehn Fus hoch. Die Rinde ist gespreckelt. Die Blätter sind ungleich gefiedert. Der Blattstiel ist geflügelt, der Stiel und die Blattrippe roth. Die Blättchen sind schmahl und glattrandig.

Weiblicher Strauch. Die Blumendecke ist klein, einblättrig, mit fünf spizigen, sternförmig ausgebreiteten Einschnitten. Die Blumenkrone ist fünfblättrig, jedes Blättchen ist ausgerichtet, mit einem weissen oder röthlichen Rande bezeichnet, und wenigstens drey-mahl so groß, als die Blumendecke. Staubfäden, fünf, halb so groß als die Kronenblätter, die Fäden sind kurz und steif, die Staubbeutel von gleicher Größe, grünlicht, staubleer. Der birnförmige Fruchtknoten hat drey kurze Staubwege. Jeder endigt sich mit einer rundlich platten, wulstigen, röthlichen Narbe. Auf dem Blumenboden stehen etliche Honigdrüsen in einem Kreise. Die Frucht ist eine röthliche, mit graulicher Poncefarbe gespreckelte, sehr saure Beere. Bey dem männl. Strauch sind die Staubfäden länger, als die Kronenblätter, die bey dem weiblichen kaum halb so groß sind.

Ab. a) Canadischer Copal-Sumach. *R. c. canadense*. Weston. bot. I. 242. Canada lentiscus-leaved Sumach. Hanb. und Mawe. l. l. c. c. Außer dieser soll es noch einige Abarten geben.

## §. 630.

Man findet diesen Sumach auch bey uns in vielen Lustpflanzungen. Er dauert gut bey uns aus, bringt aber keinen Saamen und auch keinen Copal. Dieses Harz, welches aufgelöst den besten und dauerhaftesten Lack giebt, erhalten die Amerikaner, indem sie den Stamm im Frühjahr vermunden, wo ein resinöser Saft ausfließt und sich verhärtet. Dieses Harz aufzulösen, hielt



man lange für ein Geheimniß. Hr. Hofmann hat dieses dem Publico mitgetheilt. (S. Marshall. c.) So viel ist gewiß, daß unser Copal nicht von diesem Baume kommt. Es wird von mehreren Bäumen erhalten, unter andern von einem, der in dem Herb. R. parisiensi. Cerparil bifolia genennt wird. Wir erhalten es aus Südamerika und der Levante, theils in großen Stücken von  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  Pfund, theils in kleinen Stückchen und Tropfen. Die erstere Sorte, welche Electa heißt, ist die vorzüglichste und theuerste.

Schedels Waaren-Lexicon I. 220. Lehmanni disq. histor. et chem. Gummi Copal in Acad. Reg. Berol. 1758. S. 34. Auch das Anime Gummi wird öfters mit dem Copal verwechselt. S. Heuschreckenbaum in der deutschen Encycl. B. XV. S. 394. Bloch und Klaproths Beitrag zur Naturgeschichte des Copals in den Beschäftigungen der Berliner Gesellschaft II. 91 535. rec. in Fuesli neuem entomolog Magazin I. 94. Belmanns ökon. phys. Bibl. VII. 535. v. Burgsdorfs Holzcultur 215. wo durch einen Druckfehler R. copalium steht.

### §. 631.

Art. 179. Perucken. S. R. Cotinus Linn.

Synon. Cocconitea sive Coggygia. C. Bauh. pin. 415. Rhus racemis plumosis, foliis ovatis. Hall. hist. n. 827. Cotinus coriaria. du Ham. I. 139. Le Fustet. Cocygia or Venetian Sumach. Hamb. I. 170. Paruckenbaum, Farbholz, Gelbholz, Fistelholz, Ferberbaum, falsches gelbes Brasilienholz, Gelbholz = Sumach.

Du Roi II. 300. Mill. dict. n. 15. Märter 145. Lüber II. 122. Suclow 160. Medicus botanische Beobachtungen 1782. 227.

### §. 632.

Mit einfachen, verkehrt eyrunden Blättern.

Waterland. Crain, die Schweiz, Oestreich, Levante. Ein fünf bis zehn Fuß hoher Strauch. Die Rinde ist am Stamme rauh und aschfärbig, an den jungen Zweigen grünlich und glatt. Die Blätter sind verkehrt eyrund, auf beyden Flächen glatt, auf der obern glän-

glänzend dunkelgrün, auf der untern meergrün, mit gelblichen, ästigen Nerven bezeichnet, glattrandig, stehen abwechselnd auf rothen Stielen. Die kleinen grüngelblichen Blüten erscheinen im May an den Enden der Zweige in ansehnlichen Rispen. Die Blüte der weiblichen Staude hat eine fünfblättrige Blumendecke. Die Blättchen sind klein, oval, aufrecht stehend. Die Blumenkrone ist fünfblättrig. Die Blättchen sind oval, noch einmahl so lang als jene, die obere Hälfte ist zurückgebogen und glockenförmig ausgebreitet. Staubfäden fünf überaus kleine, mit ganz kleinen Staubbeuteln. Sie liegen an den Fruchtknoten an, sind nur in der jungen Blüte sichtbar und verwelken gar bald. In vielen Blüten fehlen sie gänzlich, oft sind auch nur drey oder vier da. Der Fruchtknoten ist herzförmig, platt gedrückt, und steht nur auf der einen Seite an, daher er wie halb umgefallen aussieht. Er hat drey kurze Staubweege, die auf den drey Ecken aus einander stehen, und von denen der eine etwas länger als die zwey andern ist. Jeder hat eine kugelförmige Narbe, die im Befruchtungszustande gelblichgrün und glänzend ist, aber bald zusammenschrumpft und schwärzlich wird. Um den Fruchtknoten herum, ist der Blumenboden in einen Kreise mit gelben Honigdrüsen besetzt.

Die gegen das Ende des Julius reisenden, eyrunden, glatten, schwärzlichen Beere, welche auf langen, krausen, haarigen Fäden stehen, geben diesem Strauche ein sehr schönes Ansehen, empfehlen ihn zur Zierde und Abwechslung in Lustgärten. Alle seine Theile haben eine zusammenziehende Eigenschaft. Das Holz ist seidenhaft hart, weiß, im Kerne gelbgrünlich, unter unsern einheimischen Nuzzhölzern eines der schönsten und dient zu verschiednen Journier- und andern feinen Arbeiten. Es giebt nebst der Rinde eine etwas unbeständige Orangefarbe und in Servien sollen es die Aerzte der Chinarinde substituiren.

tuiren. Laub, Zweige und Sprossen werden von den Gerbern gebraucht.

Hellot 300. v. Burgsdorfs Holzcultur 256.

§. 633.

Gatt. 52. Gleditsia. Gleditschie. Laubholz.

Die männlichen Blüten sitzen in einem walzenförmigen Kötzchen. Die Blumendecke ist einblättrig, oben in sechs schmale Einschnitte getheilt, die Blumenkrone fehlt. Der Staubfäden sind sechs. Die weiblichen Blüten haben Blumendecken wie jene und die Blumenkrone ist sechsblättrig. Der breite, zusammengedrückte Fruchtknoten hat einen kurzen, zurückgelegten Staubweg, dessen Narbe oben behaart ist. Frucht, eine große, breite, sehr zusammengedrückte Schoote, die in einer markigen Substanz die Saamen einschließt. Man kann sie am sichersten unter die Bäume mit ganz getrenntem Geschlechte rechnen, denn die wenigen vorkommenden Zwitterblüten sind wohl nur Ausnahmen, und bey Bäumen von so häufigen Blüten nichts seltenes.

§. 634.

Art. 180. Drenstachelige G. *G. triacanthos*. Linn.

Synon. *Gleditsia spinosa*. Du Ham. n. 1. Marsh. 94. *Gleditsia Gronov. virg.* 183. *Le fevier d'Amerique a feuilles d'Acacia*. Triple - thorned Acacia. Hanb. I. 126. Triple - thorned Honey - Locust. Marsh. 94. The Honey Locust - tree, the tree thorned Acacia. Wangenh. 81. Dornige Gleditschie, die wahre Acacie, der honigtragende Heuschreckenbaum.

Sudow 176. Du Roi I. 292. Marshal 94. von Wangenheim 81. Gronov. virg. 183. Schoepff. 154. Linn. Sp. Pl. 1509. Münch 44. Churpf. Bemerk. 1774. 208. Medicus bot. Beobacht. 1782. 230.

§. 635.



J. 635.

Mit Stacheln bewafnet.

Waterland. Nordamerika. Ein sommergrüner Baum, der auch in unsern Gegenden gut fortkommt und sich leicht zu einem ansehnlichen Baum erziehen läßt. Die Blätter stehen abwechselnd und sind aus zwanzig bis dreißig kleinen, länglich eyrunden, paarweise stehenden, oben abgerundeten, feingekerbten Blättern, glattrandigen, auf beyden Flächen glatten Blättchen zusammengesetzt, die von hellgrüner Farbe sind und sich nach Sonnenuntergang schließen. In den Ecken der markigen Zweige sitzen Stacheln. Der Hauptstachel ist zwey, drey bis vier Zoll lang, an jungem Holze gewöhnlich ohne Nebenstacheln, oder nur mit einem Nebenstachel versehen. Aber bey den meisten findet man vier, fünf und mehrere, kaum bemerkbare Spitzen, die bey zunehmenden Jahren alle in Nebenstacheln auszuwachsen scheinen, und die Stacheln am alten Holze haben alle vier, fünf und mehrere Nebenstacheln, die eisenhart sind.

a) Männlicher Baum.

Blütenstand. Drey bis vier Zoll lange Körschen, die dicht mit Blüten besetzt sind. Die Blüten kommen meistens paarweise oder zu drey aus einem gemeinschaftlichen Punkte mit kaum bemerkbaren Stielgen, selten zu vier oder gar einzeln hervor. Die Blumendecke ist klein, gelblichgrün, die untre Hälfte ganz und glockenförmig, die obere in sechs spizige Einschnitte zertheilt, von denen drey etwas schmähler als die andern sind. Die Blumenkrone fehlt. Der Staubfäden sind gewöhnlich sechs. Sie entspringen da an der Blumendecke, wo sie sich in Einschnitte zertheilt, über welche die langen, grünlich weißen Fäden weit hervorragen. Die Staubbeutel sind an dem einen Ende in Gestalt eines engen Hufeisens befestigt, und die Staubfäden an ihrem Ursprung mit feinen Haaren besetzt. Die Höhle der Blumendecke ist gewöhnlich

ganz leer, doch findet man, wiewohl sehr selten, eine kaum merkliche Hülse, ohne Narbe. Häufig hat auch die Blumendecke vier, fünf, sieben, acht Einschnitte und so trifft man auch vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn Staubfäden an.

### b) Weiblicher Baum.

**Blütenstand.** Sechs bis acht Zoll lange Trauben, an welchen die Blüten abwechselnd, ziemlich weit auseinander stehen und an deutlichen Stielen entspringen. Die Blumendecke ist einen viertels Zoll lang. Die untere Hälfte ist ganz, die obere aber in sechs schmale, lanzettförmige Einschnitte getheilt, von Farbe grünlichgelb. Die Blumenkrone hat sechs Blättchen. Sie entspringen da, wo die Blumendecke sich zertheilt, sind breiter als jene, oval, haben einen weissen, nach innen bezogenen Rand. Staubfäden sind meistens sechs vorhanden. Die Fäden sind röthlich von gleicher Länge mit der Blumendecke. Die Staubbeutel sind verschiedentlich gestaltet, am Ende meistens haarig, fehlen oft ganz. Der Fruchtknoten hat einen verlängerten Fruchtsiel, ist gerade gestreckt, breit zusammengedrückt, mit einer feinen Wolle bekleidet und ragt über die Blume hervor. Der Staubweg ist kurz, die Narbe breitlich, zurückgeschlagen, daß sie auf jenen anliegt. Die äußere Seite ist mit Warzen besetzt. Aber auch hier ist die Zahl der Kelchabschnitte, der Kronenblätter und der Staubfäden verschieden.

**Ab. 2) Dornlose G.** Ein schönes Exemplar findet sich in dem Krausenschen Garten zu Berlin. *Gleditsia inermis* du Roi L. 296. ist die *Gleditsia aquatica* Marsh 95, *Acacia abruae folio triacanthos* Catesby. L. 43. t. 43. und wo nicht eine eigene Species. doch gewiß Subspecies, wenigstens keine Varietät von *G. triacanthos*. Linnée nannte diese Gattung *Gleditsia* nach dem verdienstvollen Gleditsch. Einer der schönsten Bäume aus der Zegel'schen Plantage beschattet seine Ruhestelle.

Gle.

*Gleditsia triac.* fand ich auch in Ziegenberg wo sie recht gut fortkommt.

## §. 636.

In Amerika zieht man Hecken von dieser Holzart, wozu sie wegen ihrer starken, häufigen und scharfen Stacheln sehr dienlich ist, welche die Wilden im südlichen Amerika zu ihren Pfeilen gebrauchen. Das Holz dieses Baumes und sein schnelles Wachsthum empfehlen seinen Anbau in Nußholzplantagen. Die Schooten werden nach Marshal wegen ihres süßen Marks zum Bierbrauen genommen und nach Clayton sind sie ein angenehmes Winterfutter für das Vieh. Endlich ist dieser schöne Baum für Lustwaldungen nicht genug zu empfehlen.

Ich bitte die Leser, die treffliche Anmerkung des H. R. Medicus in seinen Beiträgen zur schönen Gartenkunst, S. 305. nachzulesen. Von seiner Cultur, S. von Burgsdorf Holzcultur 101. Vorlesungen der Ehurpfälz. phys. ökon. Gesellschaft 1789 — 90.

## §. 637.

Gatt. Populus. Pappel. Sommergrünes Laubholz.

Männlicher Blütenstand. Kötzchen welche aus einblütigen Schuppen zusammengesetzt sind. Die Schuppen sind am Rande zerrissen. Die Blumenkrone besteht in einem schiefen, kräuselförmigen, unzertheilten Honigbehälter. Staubfäden, acht sehr kurze. Weiblicher Blütenstand, Kötzchen oder Trauben. Die Blüten kommen mit jenen überein. Staubweeg, einer, mit einer zwey, drey, auch viertheiligen Narbe. Saamenkapsel, ein auch zweysährig. Sämmtliche Bäume gehören unter unsre weiche Holzarten.

## §. 638.

Art. 181. Weis-P. *P. alba*. Linn.

Synon. *Populus foliis angulosis, subtus tomentosis, subrotundis, dentato - angulatis*. Hall. hist. n. 1634. *Arbor admirans vulgo*. Schwenkf. Cat. 163. *Le Peuplier blanc*. White Poplar. Aspe, Pappelweide, Albe, Abele,



Abele, Arbielbaum, Abelfen, Tabelken, Alber, Albernbaum, Alberbrust, Weißalber, Schneepappel, Bellweide, Bollweide, Belle, Bolle, Alaprobst, deutscher Silberbaum, Pappierbaum, Wunderbaum, Heiligenholz, Gögenholz, Saarbachsbaum, weisse Espe.

Linn. sp. pl. II. 1463. Pollich palat. II. 643. Scopoli carn. II. 265. Schrank bavar. I. 655. Märter 33. Du Roi II. 146. Sudow 193. Gleditsch I. 525. Leonhardi 105. Becker 37. von Burgsdorf 155. Borkhausen 126. Lüber IV. 404.

### §. 639.

Mit gezahnten Blättern deren Unterfläche und Stiele mit einer weissen Wolle bekleidet sind.

Sie erreicht in fünf und zwanzig Jahren eine Höhe von achtzig Fuß und drüber, Ihre Wurzeln laufen flach fort. Die Rinde ist aschgrau und glatt, wird aber an dem Stammende alter Bäume rissig. Die Blätter stehen abwechselnd auf wolligen Stielen, sind auf der untern Fläche mit einer weissen Wolle bekleidet, die sich im Alter derselben nach und nach verliert. Auf der obern Fläche sind sie hellgrün und glatt, am Rande gezahnt, übrigens in ihrer Bildung sehr verschieden, indem sie bald rundlich oder geschoben viereckig, bald unzertheilt, bald in drey, vier, fünf, ungleiche Einschnitte getheilt sind. Die jungen Triebe sind mit weisser Wolle besetzt, welche dicht aufsitzt.

Das gesunde, reife Stammholz der Weispappel, als worauf sich die vorzüglichste Benutzung dieses Baumes einschränkt, ist das beste Holz die Fußböden der Zimmer damit zu täfeln, indem es sich nicht wirft noch aufreiset. Auch wird es zu verschiedenen Polier- und Lackarbeiten als zu Schränken, Chatoullen, Reißbrettern, Brett- und Schachspielen, allerhand andrer Bildhauer- Dreher- und Tischlerarbeit genommen. Große Stämme geben das beste Werkholz zu Back- und Brunnentrögen. Die Wurzel liefert einen überaus schönen Maser, dessen Schönheit durch

durch Eisensolution mit Scheidewasser sehr erhöht wird. Als Brennholz hat es keinen Werth, und wenn man wüßte Plätze, um dem Brennholzmangel zu steuern, mit Holz anbauen will; so ist die Birke, die mit so geringem Boden vorlieb nimmt, die weiße Erle, die glatte Ulme, die ebenfalls sehr genügsam in Ansehung des Bodens sind, weit vorzuziehen. Zu Kopspflanzungen ist überhaupt weder diese noch irgend eine andre Pappelart zu empfehlen, da selbst die Baumweiden weit stärkere Aeste, worau es doch beim Köpfen angesehen ist, liefern.

Man hat zwei Sorten Weispappel. a) Großblättrige.

Mill. dict. n. 4. C. Bauh. pin. 429. Abele tree.

b) Kleinblättrige du Ham. n. 2. White Poplar.

#### §. 640.

Die Pappeln werden durch Saßstangen oder Steckzweige fortgepflanzt. Eine Pflanzschule von solchen Reifern ist das beste Mittel diese Holzart schnell zu vermehren. Die besten Reiser aber sind diejenigen, so von ganz jungen Pappeln, wenn sie auch nur ein Jahr alt sind, genommen werden, ältere sind schon weniger für eine Pflanzschule tauglich. Es können die kleinsten, einjährigen Reiser, wenn sie nur einen Fuß lang sind, dazu dienen, und sie treiben eben so gut als große. Auch lassen sich solche Reiser weit versenden, ohne Schaden zu nehmen, nur muß sie derjenige, der sie erhält, vor dem pflanzen, einen halben Tag in Wasser legen. Die Pflanzschule muß des Jahrs ein paarmahl flach aufgeharkt werden. Im vierten Jahre sind die Pappeln schon zum aussetzen tüchtig.

Mit dieser und einigen folgenden Arten werden jetzt die Strassendämme häufig besetzt, so daß man durch meilenlange Pappel-Alleen reiset, wodurch die eckelhafteste Einförmigkeit entsteht. Und was nützen uns diese Pappel-Alleen, von deren Anlage Ausländer vor einigen Jahren so überaus große Vortheile versprochen? Schatten und Schutz vermögen die Pappeln der Strasse und dem

Wan-

Wandrer nicht zu geben. Früchte liefern sie gleichfalls nicht. Als Kopfholz kommen sie fast in gar keine Betrachtung, weil sie schlechtes Brennholz und nicht einmal so dicke Aeste als die Baumweiden liefern. Der Platanus, die Küstern, Hainbuchen (von denen man eine schöne doppelte Allee bey Nauheim in der Wetterau findet) Eschen, Lehen u. a. schicken sich weit besser zu dieser Nutzung. Wollen wir Nußhölzer erziehen; so sind Linden, Wallnußbäume, Ebereschen, Kastanien weit vorzüglicher zur Besezung der Strassen. Das Pfälzer Museum sagt von solchen Pappel-Alleen: III. 299.

Sieh Wandrer! brüderlich sieh hier

Das Bild der Vornwelt und der unsern gatten.

Der Nußbaum-Reihe dort, der alten Strasse Zier

War unsrer Väter Werk, die Pappeln pflanzten wir  
Hochschwankend ohne Frucht und ohne Schatten!

Sehr viel lehrreiches über die Besezung der Landstrassen mit Bäumen, sagt der verdienstvolle H. Ehrhard in seinen Beyträgen IV. 109. Will man Bau- und Nußholz erziehen, wozu sich einige Arten sehr gut schicken; so legt man lieber besondere Pflanzungen an.

#### §. 641.

Art. 182. Schwarz-P. *P. nigra*. Linn.

Synon. *Populus nigra*. C. Bauh. pin. 429. *Populus foliis glabris, cordato-rhomboides, serratis*. Hall. hist. 1632. Le Peuplier noir. Black Poplar - Hanb. I. 29. Schwarze Pappel, Pappelweide, Schwarz-Alberbaum, Garbacher, Garbaum, Garbachbaum, Garbacken, Wolkenbaum, Gelbaum, Salbenbaum.

Linn. Sp. pl. II. 1464. Pollich palat. II. 654. Scopoli carn. II. 265. Schrank bavar. I. 657. Suckow 194. Gleditsch I. 525. Leonhardi 105. Borkhausen 128. Märter 30. Becker 38. v. Burgsdorf 159. Hausvater IV. 236. V. 267. Schrebers Samml. XVI. 396. Forstmagazin VI. 335. Gleditsch verm. Abhandl. II. 11. Du Roi II. 139. Gleditsch verm. Schriften I. 249. Dörrien 264. Lüber IV. 405. Marschal



ſhal 196. Schoepff. m. m. a. 150. Abhandl. der Akademie zu München II. 275.

Abbild. Cramer t. 11. Kerner's ökonomiſche Pflanz. II. S. 194.

ſ. 642.

Mit faſt deltaförmigen, unten gerundeten, oben in eine Spitze verlängerten Blättern, deren Rand mit runden Zähnen beſetzt iſt.

Sie iſt in Deutschland und Nordamerika einheimiſch. Ihr natürlicher Stand ſind die Ufer und Ränder der Gewäſſer, überhaupt feuchte Niedrigungen. Sie iſt ſchnellwüchſig, hat eine dunkelgraue Rinde. Die Blätter ſind von dicker Subſtanz, deltaförmig, unten gerundet und oben in eine lange Spitze geendigt. Im Sommer ſind ſie oben ſchwarzgrün, unten graulich, auf beyden Flächen glatt, auf der untern mit einer erhabnen Ader bezeichnet, am Rande mit runden Zähnen beſetzt, ſtehen abwechſelnd auf langen gelben Stielen. Ihre Wurzel treibt ſie tiefer als die vorhergehende Art, und bisweilen erreicht ſie eine außerordentliche Höhe und Stärke. Die Blüte erſcheint ſehr zeitig im Frühjahr. Die weißröthlichen Käſchen der weiblichen Bäume laſſen ihren wolligen Saamen ſchon beim Ausbruch des Laubes oder kurz nachher abfliegen.

An der Wiſſel beim Selterthor.

ſ. 643.

Das Holz wird zu Faſchinen und Pallisaden gebraucht. Das Mark der Stämme gebrauchen die Nordländer zu Stöpfeln ſtatt der Korke. Die aus der Wurzel treibenden Löhden, ingleichen die abgeſchnittnen Aeſte geben gute Faſchinen zum Waſſerbau. Sonſt wird das Holz auf dieſelbe Art als das Holz der Weispappel angewandt, von dem es ſich noch durch ſeine Leichtigkeit unterſcheidet. Die Rinde giebt eine ſehr geſättigte Färbbrühe, und nach Beſchaffenheit der Zuſätze laſſen ſich manche brauchbare Farben daraus erhalten. Mit der Saamenwolle

wolle hat D. Schäfer in Regensburg Versuche angestellt, und H. Prof. Herzer und H. Dallarmi (Banquier in München) haben eine Fabrike von sehr feinen und leichten Hüten, zu denen auch Pappelwolle genommen wird, in München etablirt.

Franks landwirthschaftliche Polizen III. 159. Siffert I. 88. 95. Geschichte verschiedener tieländischer Baumwollenarten, Salzburg 1788. Schäfers Pappierversuche, Regensb. 1772.

§. 644.

Art. 183. Pyramiden-P. *P. italica*. Weston. Flora. 26.

Synon. *Populus nigra italica*. Du Roi I. 141. Le Peuplier de Lombardie. Lombardy Poplar, Italian Poplar. Italienische Pappel, lombardische Pappel, Belle, Sandbelle.

Du Roi II. 141. Pallas ross. I. I. 156. Suckow 195. Borkhausen 130. Märter 30. Hesse vom Holzanbau 176. Becker IV. 406. Von der Art den italienischen Pappelbaum zu pflanzen, Leipz 1764. v. Münchhausen V. 230. Mönchs Verzeichniß 79. (Hdck) ökon. Pflanzengeschichte der Weiden und Pappeln, Hanau 1782. Munds landwirthschaftliches Magazin II. Jahrgang IV. Quartal, S. 178. Beckmanns ökon. phys. Bibliothek. XVI. S. 71.

§. 645.

Mit mehr zugespizten, nicht so breiten Blättern, und immer geraden, pyramidenförmigen Wuchs.

Sie ist aus der Lombardie zu uns gekommen und unterscheidet sich von der vorigen Art hauptsächlich durch den Stand ihrer Aeste, welche weniger ausgebreitet und niederhängend sind, sondern mehr aufgerichtet am Stamme liegen, wodurch der Baum ein pyramidenförmiges Ansehen bekommt. Die Blätter sind deltaförmig, mehr zugespizt, nicht so breit, schön dunkelgrün, am Rande stumpf gezahnt. Die Zweige sind weit biegsamer. Die Rinde ist lichtgrün, glänzend, wie an Wallnußbäumen, und behält diese Eigenschaft bis zu ihrem Untergang.

Anmerk.

Anmerk. Unfre Chausseen sind häufig damit besetzt, aber sie leiden fast alle Jahre, wenigstens in hiesiger Gegend, theils von einer Art Blattlaus, theils von den Raupen verschiedener Phalänen, von denen einige selten vorzukommen scheinen.

§. 646.

Das Holz dieser Art ist weit härter als das Holz der Schwarzpappel, auch wächst sie in funfzehn Jahren stärker als andre in dreißigen. Schon mit zwanzig Jahren kann man die schönsten Bretter und Bohlen aus den Stämmen schneiden. Die Zweige dienen zu allerley Flechtwerk, zu Korbmacherarbeit, Faschinen, Zäunen, Reiffen. Die Stämme geben gute Balken und Dachsparren, die so dauerhaft als von Fichten und Tannen gefertigte, seyn sollen. Fünf und zwanzig jährige Bäume geben Bauholz und sehr gute Mastbäume, die man besonders in Frankreich schätzt. Sonst dient dieses Holz zu Täfelungen, zu Bildhauer- und Dreherarbeit, zu Spinnrädern, Tellern, Löffeln, Mulden, Stühlen, Schaufeln und zu anderm Geräthe.

§. 647.

Art. 184. Zitter-P. *P. tremula*.

*Synon.* *Populus foliis glabris, orbiculatis, acuminatis, laxe serratis.* Hall. hist. n. 1633. Le Peuplier tremble. Trembling Poplar, Aspen tree. Hanb. l. c. Aespe, Espe, Espenbaum, Flatteresche, Katteler, Zitteresche, Flitteresche, Kattelesche, Pattelesche, Baberesche, Beberesche, Flatteraspe, Ipbische Pappel.

Linn. sp. pl. II. 1464. Pollich pal. II. 644. Scopoli carn. II 265. Schrank. bavar. I. 660. Suclow 195. Gleditsch I. 526. Leonhardi 106. Borkhausen 125. Lüder IV. 405. Märker 35. Becker 35. v. Burgsdorf 157. Hausvater IV. 339. V. 272. Marshal 197. Wiborg. 32. Abhandl. der Hallischen Naturforschenden Gesellschaft I. 199. Schrebers neue Cam. Schriften III. 540. Du Roi II, 148. Dörrien 264. Du Ham. n. 7. Pallas ross. I. I. 154.

Abbild. Cramer t. 13.



## §. 648.

Mit rundlich zugespitzten, am Rande gezahnten und eckigen, steifen Blättern, gebogenen, langen, schwachen Blattstielen.

Ein einheimischer Baum, der in allerley Lagen und Boden vorkommt. Die Rinde ist am Stamme glatt, weißgrünlich oder graulich und borstet nach dreißig bis vierzig Jahren unterwärts stark auf. Die Blätter sind rundlich zugespitzt, am Rande weitläufig und ungleich eingeschnitten, steif, dick, auf beyden Flächen glatt, stehen abwechselnd auf langen, gebogenen, schwachen Stielen und werden von dem geringsten Lüftgen in Bewegung gesetzt. Sie brechen zu Anfang des Mayes aus, fallen in der Mitte des Octobers ab. Das Holz ist weiß, glatt, leicht und weich. Ihr Wachsthum, welches sie bis in das funfzigste Jahr fortsetzt, ist schnell, und die Blätter variiren nach Lage und Boden sowohl in der Größe als Farbe. Die Blüte erscheint zu Anfang des März. Die Wurzel geht drey Fuß tief und breitet sich gegen acht und zwanzig Fuß weit aus.

Aus dem Espenholze werden Spinnräder, Zeller, Becher, Büchsen, Scheffel, Eimer und verschiedne andere Gefäße für Keller, Fruchthäuser, Küchen und Ställe gemacht. Auch nehmen es die Bildschnitzer zu Rahmen, Laubwerk und verschiednen Einfassungen. Inwendig in den Gebäuden ist es zu Stichelhölzern der geschnittenen Decken sehr brauchbar. Zu Faschinen und zum Wasserbau, ist es wegen seines schnellen Wuchses und starken Bervielfältigung den Weiden vorzuziehen. Als Brennholz verlobert es zu schnell, doch thut es als Reißig unter Brau- und Waschkesseln auch auf Abtreiböfen noch so ziemliche Dienste. Als Kohlholz leistet es blos bey Verfertigung des Schießpulvers Nutzen. Die wohlgetrocknete Stammrinde brennt mit einer hellen Flamme, man bedient sich ihrer an manchen Orten statt der Lichtspähne. Sie soll auch eine Lohe geben und nebst den

Knospen und Blättern dient sie dem Wilde zur Nahrung. Im losen Sande, so wie auf andern verödeten Stellen, ist der Anbau dieses Baumes von Nutzen.

§. 649.

Art. 185. Tacamahac: P. Populus Tacamahaca.

Subs. a) P. balsamifera foliis ovatis serratis, subtus albidis stipulis resinosis. Linn. sp. pl. 1464. Mat. med. 600. P. balsamifera foliis ovatis serratis, subtus pallidis. Pallas ross. I. I. 158. Le Peuplier baumier a rondes feuilles. The round leaved Tacamahac - Poplar.

Sudow 196. Borkhausen 131. von Wangenheim 85. Miller III. 653. n. 6. Ehrhpf. Dem. 1774. 233.

Abbild. v. Wangenheim t. 68.

Sie wächst in Sibirien und Nordamerika und trägt auch unser Klima recht gut. Die Rinde ist aschgrau, die Blätter sind eiförmig länglich, ungleich gekerbt, auf der obern Fläche dunkelgrün, auf der untern weißlich. Die Knospen enthalten im Frühjahr einen zähen, gelblichen Saft, der wahrscheinlich den Tacamahac für die Apotheken giebt.

Ab. a) T. P. mit lanzettförmigen Blättern. P. balsamifera lanceolata. Marsh. 199. P. balsamifera foliis variegatis. Burgsdorf Holzcultur 178. Le Peuplier baumier panaché. The T. p. with striped leaves Burgsd. the Lance-leaved Balsam tree. Marsh.

Subsp. b) P. nigra caroliniana folio maximo, gemmis balsamum odoratissimum fundentibus. Cat. carol. I. 34. Du Ham. n. 6. Balsam-Pappel, Tacamahacbaum, rothe B. P. Balsam tree, Tacamahac Tree.

Marshall 198. Schoepff. mat. med. 151.

Abbild. Cat. t. 34.

Stamm und Zweige sind mit einer lichtbraunen Rinde bekleidet. Die Blätter sind groß, etwas herzförmig

förmig, an den Rändern leicht gekerbt, voll balsamischer Substanz, werden daher bald braun, wenn man sie in Herbarien aufbewahrt. Die obere Fläche ist dunkelgrün, die untre weißlich. Die Knospen schwitzen ein flebriges Harz aus.

## §. 650.

Die Balsam- oder Takamahakpappel wächst auch bey uns schnell und hat ein dichtes, ziemlich festes Holz, welches sich sehr gut bearbeiten läßt. Der aus den Knospen im Frühjahr ausschwitzende Balsam wird als ein Wundmittel gebraucht. Die Irkusker destilliren aus den mit Brandwein übergossenen Knospen, einen diuretischen Liqueur, der gegen den Scorbut sehr wirksam ist. Diese Bäume erfordern warme, feuchte Lage und einen dichten Stand.

Munds landw. Magazin l. c. 179. Ehrhards Beiträge I. 22. Schwed. akad. Abhandl. XXXVII. 345. Crells chem. Entd. III. 171. Fuchs über das Harz der Balsampappel in Crells Beiträgen zu den chemischen Annalen. B. I. St. II. S. 63.

## §. 651.

Art. 186. Virginische P. P. heterophylla. Linn.

Synon. Populus angulata Aiton. Populus balsamifera. Miller n. 5. Populus magna virginiana. Du Ham. n. 9. ? Populus cordifolia. Burgsdorf Holzcultur 177. Virginian Poplar. Hanb. I. 155. Virginian Poplar tree. Marsh. 195. Carolina blak Poplar tree. Wangenh. 85. Carolinische Pappel (Suckow).

Linn. sp. pl. II. 1464. Gronov. virg. 194. 157. v. Wangenheim 85. Marshal 195. Münchhausen V. 232 Gleditsch Pflanzenb. 277. Du Roi II. 150. Münch 80. Suckow 196. n. 5. Borkhausen 133.

## §. 652.



§. 652.

Mit vier- bis fünfeckigen Zweigen, herzförmigen, am Rande gekerbten Blättern, welche in der Jugend haarig sind.

Waterland. Nordamerika. Erreicht eine ansehnliche Höhe, macht einen dicken Stamm und hat einen schnellen Wuchs. Gegen unsre Winter zeigt sie sich noch etwas zärtlich. Die Rinde ist grau, an den Aesten glatt, am Stamme rissig. Die Blätter stehen abwechselnd, auf langen, glatten, auf beyden Seiten zusammengedrückten Stielen, sind überaus groß, steif, herzförmig (wechseln aber sehr) oder rundlich, am Rande stumpf gesägt, in eine ungekerbte Spitze auslaufend, oder auch stumpf zugedrundet, in der Jugend etwas haarig, manche gegen die Basis mit Drüsen besetzt. Die jungen Aeste und Zweige sind drey- vier- bis fünfeckig, manche aber mehr rund als eckig. Wegen des großen Laubes ist es nicht rathsam diese Bäume isolirt zu pflanzen.

§. 653.

Art. 187. Carolinische Pyramiden. *P. P. carolinensis.*  
Le Peuplier de la Caroline en pyramide. Carolina Poplar.

Borkhausen 134. Sudow 191. Mönchs Verzeichniß n. 81. von Burgsdorfs Holz-Cultur 176. Munds landwirthschaftliches Magazin, Zweyter Jahrgang. Viertes Quartalstück, S. 179.

§. 654.

Mit herzförmigen, gekerbten, auf der Oberfläche drüsigen, in eine glattrandige Spitze auslaufenden Blättern, runden Aesten und Zweigen.

Waterland. Nordamerika. Sie übertrifft noch an Schönheit und vortrefflichem Ansehen, so wie an Höhe, Stärke und Dauerhaftigkeit die italiänische Pappel und wächst ebenfalls pyramidenförmig und bewundernswürdig schnell. Am besten wächst sie auf einem frischen, etwas

sandig und thonigen Boden. Im dichten Stande, wo sie sich von den untern Aesten reinigt, giebt sie gerades, hohes und starkes Bauholz. Sonst hat sie viel ähnliches mit ihr, so daß man sie fast für eine Abart derselben ansehen könnte. Die Aeste und Zweige sind rund, doch auch bisweilen eckig. Der Stamm hat eine graugelbe, rissige Rinde, die an den jungen Stämmen und Aesten glatt ist. Die Blätter sind fast eben so groß, herzförmig, am Rande stumpf gesägt, laufen in eine Spitze aus, die bald länger, bald kürzer, bald spizig, bald stumpf, bald glattrandig, bald gezahnt ist. Unten sind sie hell, oben dunkelgrau und mit Drüsen besetzt. Sie stehen abwechselnd an langen, blaulichgrünen Stielen, welche nach ihrer Basis hin rund, nach dem Blatt zu aber etwas zusammengedrückt sind.

## §. 655.

Art. 188. Canadische P. *P. canadensis*.

*Synon.* *P. nigra foliis acuminatis dentatis ad marginem undulatis.* Du Ham. n. 56. Le grand Peuplier de Canada á larges feuilles. Canada Poplar tree. Wangenh. 85. Canadian Poplar. Mawe. n. 6.

Borkhausen 135. Mund l. c. 180. Sudow 197. n. 7. Mönchs Verzeichniß n. 81. Läder IV. 405.

## §. 656.

Mit etwas Kleinern, herzförmigen, drüsenlosen Blättern.

Eine der schönsten Pappelarten, die Canada zum Vaterland hat, und in Ansehung der Dauer, Schönheit, Härte und des Wachses, für die vorzüglichste Art dieser Gattung gehalten wird. Ihr Wachsthum ist in einem feuchten Sandboden das schnellste, und ihr Holz ist ziemlich dicht und fest. Ihre Aeste breitet sie sehr weit und beynahe horizontal aus. Die Rinde ist am Stamme aschgrau und rissig, an jungen Stämmen und Aesten glatt, ins grünliche spielend. Die schönen großen Blätter stehen

hen abwechselnd auf langen, röthlichen Stielen, sind herzförmig, mehr oder weniger scharf zugespitzt, auf beiden Flächen glatt und drüsenlos, oben dunkelgrün, unten etwas heller. Die Blüten erscheinen im April. Die Saamen reifen und fallen ab im Julius.

## §. 657.

Art. 189. Griechische P. *P. graeca*.

*Synon.* *Populus heterophylla atheniensis*. West. Flora. 26. *Populus atheniensis*. Ludw. 35. Le Peuplier grec. Athenian Poplar. Mawe. n. 7. Atheniensische Pappel.

Ludwig 35. Mawe n. 7. West. Flora. 26. v. Burgsdorfs Holz- Cultur 178. Loddiges Cat. 1783. S. 18. Läder IV. 406.

## §. 658.

Mit langen, herzförmigen Blättern, weislichem Stamm.

Dieser Baum ist erst seit kurzer Zeit in England bekannt geworden. Wegen seines schnellen Wachses und seiner schönen Blätter, zieht man ihn für Lustwäldungen allen andern Arten vor. Der Stamm ist gerade, weislich, treibt in einem Jahre sechs bis sieben Fuß lange Schüsse. Die Blätter sind lang, herzförmig, schön grün. Er läßt sich am besten durch pfeifen auf die italienische Pappel fortpflanzen, muß aber, weil er den Pfeifstamm überwächst, dicht über der Erde gepfeift werden.

## §. 659.

## b) Verwachsene Staubfäden.

Gatt. 54. *Juniperus*. Wachholder. Nadelholz.

Die männlichen Blüten erscheinen in kegelförmigen Köpfchen. Die Geschlechtsdecke besteht in Schuppen, deren jede drei, vier, acht in eine Säule verwachsene Staubfäden enthält. Die weibliche Blüte hat eine dreitheilige Blumendecke, eine dreiblättrige Blumenkrone, und beide Geschlechtsdecken sind beständig. Der mit drei Staub-



wegen versehene Fruchtknoten erwächst zu einer dreysädmigen Beere, welche oben mit drey kleinen Höckern oder Knöpfchen versehen ist.

§. 660.

Art. 190. Gemeiner W. *J. communis*.

Linn. Sp. Pl. II. 1470. Scopoli carn. II. 268. Pollich palat. II. 650. Suckow 402. Gleditsch II. 271. Leonhardi 159. Borkhausen 27. Märter 130. Mönch 53. Lüder IV. 417. A. O. Bang. diss. de Junipero. Hafniae. 1708. R. L. Camerarius diss. de Junipero. Tub. 1712. 4. I. G. Wilhelm diss. de Junipero. Argent. 1715. I. C. Klein diss. de Junipero. Altd. 1719. 4. P. Lundman diss. de Junipero. Harderov. 1727. Schrank II. 215.

§. 661.

An der männlichen Pflanze erscheinen die Blütenkästchen beynahe ohne Stiele, und die Blüthen so zusammengeordnet, daß immer drey einander an der Achse gegenüber stehen. Solcher Blüthen sind zehn in einem Kästchen vorhanden. Jedes Blüthen enthält drey, vier bis acht verwachsene Staubfäden, deren Staubbeutel von einander stehen, welches man an der Spitze des Kästchens am deutlichsten wahrnehmen kann. Nach Erfüllung ihrer Bestimmung vertrocknen die Blättchen und fallen mit dem Kästchen ab. Die Blumendecke der weiblichen Blüten ist klein, dreysach getheilt, und an den Fruchtknoten fest angewachsen. Die Blumenkrone besteht aus drey steifen, spizigen Blättern, welche wie jene nicht abfallen. Auf dem runden Fruchtknoten stehen drey kurze Staubweege, die sich in sehr feine Narben endigen. Die Frucht ist eine runde, fleischige, aromatische Beere, mit drey Erhabenheiten versehen und anfangs grün. Sie enthält drey Saamenkörner, welche hart, länglicht, auf der einen Seite rund erhaben, auf der andern aber platt gedrückt sind. Zu ihrer Reife sind zwey Jahre erforderlich und in der Erde liegen sie funfzehn Monate bis sie keimen.

Der

Der Wachholder wächst langsam. Die Rinde ist röthlichbrann, rissig, das Holz kleinjährig, starkriechend, weis mit bräunlichen Adern durchzogen, öhlicht, im Kerne gelblich, schwer, dicht und zähe. Frisch gehauen hat es eine graue Farbe, welche aber mit der Zeit röthlich oder braun wird. Weil es sehr ästig und seine Adern sehr mit einem balsamischen Oehle durchdrungen sind, läßt es sich schwer bearbeiten und reisset oft ein. Mit der Zeit wird es knochenhart. Zwischem dem Holz und der Rinde sammlet sich in warmen Ländern ein helles, wohlriechendes Harz Sandarach. Dieses trägt zu der außerordentlichen Dauer des Holzes, sehr vieles bey. Die Wurzel ist gleichfalls von diesem Harze durchdrungen, und greift flach und weit um sich. Die Nadeln stehen zu drey Stück ausgebreitet beyammen, sind steif, schmahl, platt, zugespigt, auf der untern Fläche blaulichgrün oder weisgrau, am untern Ende etwas hohl und etwas länger als die Beere.

Sowohl das Holz als die Beere machen den Wachholder zu einem nußbaren Forstgewächse. Der Wachholder wird zu Faschinen und auch wo Mangel an Brennholz ist, an einigen Orten als Strauchholz genuzet und schlagweise abgetrieben \*). Die Beere dienen zum räuchern, auch macht man in der Haushaltung und den Apotheken einen mannichfaltigen Gebrauch davon \*\*).

B b 5 Holz

\*) Schlagholz im Nadelholze giebt es eigentlich nicht. Doch kann man den Wachholder, der wieder an der Wurzel ausschlägt, und womit in einigen Forsten ansehnliche Reviere bestanden sind, annehmen. H. Hemmerts Anweisung zur Taration der Forsten. Berlin und Stettin. 1791. 8. m. K. S. 16.

\*\*) F. D. Bruch. diss. Observatt. practicae deradicis Juniperi decocto Argentor. 1736. 4. Kalm Diss. Oeswer Eenens egenkaper och Nyttä. Abo. 1770. Gränt. Samml. VIII. S. 398. O. Dekberg. Beskrifning huru en haellamt win i Sverige lött kan tilwätkas efter gahrs försök utgifwen. Stockh. 1755. Anweisung den gegohrnen Wachholdertrauf zu verfertigen, im Ha-  
nover.

Holz wird von Drehern und Kunstischlern zu allerhand feinen Arbeiten gesucht und hat in Ansehung seiner Dauer den Werth des Cedernholzes. Auch wird es von Wurmern nicht leicht angegriffen.

## §. 662.

a) Deutscher Wachholderstrauch. *I. communis.* α Linn.

*Synon.* *I. communis.* Mill. n. 1. *I. vulgaris fruticosa.* Du Ham. n. 1. Common shrubby english Juniper. Mawe. English Juniper. Hanb. I. 45. 220. Wachholder, Wefholder, Kechholder, Kchstaude, Kechstaude, Kachholderstaude, Machandel, Sachandel, Feuerstaude, Krametstaude, Krametsbeerstaude, Kranewetstaude, Kraneweckenstrauch, Cronwitt, Wegstaude, Kadig, Kamilstaude, Knickel, Kranzeriz, Kranzbeerstaude, Elupers, Feldcypress, Feleppeß, Duyenstaude.

Die unter *Juniperus communis* angeführten Schriftst. Du Roi. I. 338. Hausvater V. 333. Märter 130. Becker 22. Wiborg 36. Dörrien 261. Lüber IV. 418.

Abbild. Blackwell. t. 187. Delhafen t. 22. Cramer t. 22. Gleichen t. 23.

## §. 663.

Man findet diesen Strauch sowohl im freyen als im Schatten andrer Hölzer, auf Ebenen und auf Anhöhen. Oft

ndver. Magazin, 1776. S. 854. Vorschrift zur Verfertigung des Wachholdertranks in den Auszügen aus den franz. periodischen Schriften. I. 336. I. C. Acoluth *Diabetes lethalis ex usu baccarum juniperi* in Eph. Nat. Cur. X, S. 201. C. G. Hennicke *de juniperi decocto euporisto contra vitilignes* in Nov. Act. Nat. Cur. T. II. S. 124. Boccone *de Oleo Juniperi.* G. Seger *Epilepsia ex incauto usu olei juniperini* in Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. II. S. 27. I. L. Hannemann *de Olei junuperini virtute.* Ebend. Dec. III. an. V. et VI. S. 128. Laurenz und Erxlebens Farbversuche mit dem Wachholder, S. Gött. gel. Anz. 1777. S. 737. Vom Anbau des Wachholders. S. v. Burgsdorfs Holzcultur, S. 121. Unterricht vom Anbau des Wachholders in den Berl. Sammlungen, IX. S. 241.



Oft bekleidet er die steilen, kalten Mittelgebirge, Klippen, rauhe, steinige, unfruchtbare Anhöhen. Man findet ihn auch im Fluglande, (Viborg 36.) auf den höchsten Sandhügeln, die dem Winde am meisten ausgesetzt sind. Sein Wuchs ist sperrhaft. Steht er in einem guten Boden und im geschlossenem Stande; so findet man ihn auch baumartig. Diese Veränderung des Wuchses kann auch die Cultur bewirken. Ob aber dieser zum Baum gewordene oder erzogene Wachholderstrauch mit dem folgenden Wachholderbaume einerley sey, ist noch eine ganz andre Frage. Die Beere sind schwarz und haben einen blauen Beschlag.

Ab. a) Mit oben weiß gestreiften Nadeln. Vorkhausen 29. b) Mit breiten, nicht stechenden Nadeln. Schrank in den Naturhist. Briefen II. S. 291. c) Windischer Wachholder. Gleditsch l. c. Die Nadeln sind etwas länger, die Beere drey-mahl größer, länglicher, blau.

## §. 664.

b) Wachholderbaum. *J. communis*. *β*. Linn.  
*Synon.* *Juniperus suecica*, foliis ternis patentibus, acutioribus, ramis erectioribus, bacca longioribus. Mill. n. 2, *Juniperus vulgaris arbor*. Du Ham. n. 2. Swedish Juniper. Mawe and Hanb. l. l. c. c. Schwedischer Wachholder.

Eudow 402. b. Du Roi II. 338. Miller II. 637. n. 2. Läder IV. 418. *β*. Dresdner gelehrte Anz. 1762. Man findet ihn in Dännemark, Norwegen, Schweden und hin und wieder in Teutschland. Die Zweige sind von aufrechtem Wuchs und die Nadeln etwas schmaler.

Anmerk. Bey Rumeksch in Ostpreussen, anderthalb Meilen von Insterburg, hat ein solcher Baum gestanden, der sechzehn Ellen hoch und zwey und drey viertel Ellen dick gewesen war. J. Bernoullis Reisen III. 137. Auch diejenigen Bäume, von welchem Bellermand die Stücke in sein Holzkabinet genommen hat, hatten eine Höhe von acht und dreyßig Fuß, und standen bey Teicheröde, zwey Stunden von Rudolstadt.

## §. 665.

## §. 665.

Art. 191. Sevenbaum. I. Sabina. Linn.

Sabina folio Tamarisci. Du Ham. n. 1. Le Sabine. Sowin. Hanb. Sadebaum, Segelbaum, Sadewachholder.

Linn. sp. pl. II. 1472. n. 9. Scopoli carn. II. 268. Surow 404. Borkhausen 32. Linder IV. 422. Handbr. gel. Anz. 1753. St: 62. Buddaei Miscell. I. 26. Eph. Nat. Cur. Vol. II. 271. Wedel Diss. de Sabina. Ienae 1707. Du Roi I. 350. Du Ham. II. 187. Miller H. 638. Haubvater, V. 342.

Abbild. Delhasen, I. t. 26.

## §. 666.

Die Nadelblättchen liegen auf den Zweigen fest auf, abwechselnd bald gefiedert, bald in zugespitzter Gestalt, bald paarweis gegeneinander überstehend und einen plattgedrückten Zweig bildend.

Wächst in Portugall, Spanien, Italien, Sibirien, in der Schweiz und nach Scopoli auch in Kärnten wild. Die Rinde der ältern Schüsse ist lichtbraun, an den jüngern, welche mit in einander laufenden Nadelblättchen bekleidet sind, lichtgrün. Das Holz ist hart und röthlich. Die Zweige haben eine natürliche Neigung waagrecht zu wachsen. Man findet ihn als einen Strauch oder als ein vier Fuß hohes Bäumchen. Gerieben haben Zweige und Blätter einen widrigen Geruch. Die Nadelblättchen liegen an den Zweigen fest auf, sitzen abwechselnd bald in zugespitzter Gestalt, paarweis einander gegenüber, oder halbgefiedert oder in zugespitzter Gestalt stehend, bilden einen plattgedrückten Zweig. Die Beere sind dicker als die gemeinen Wachholderbeere und röthlichblau. Ein schädliches Gewächs in den Händen der Unwissenheit und Bosheit, das die Dorfpolizeyen, aus den Gärten und Gartenhecken vertilgen sollten, da wir weit bessere, nützlichere Heckenpflanzen haben.

Ab.

- Ab. a) Portugiesischer S. I. Sabina. B. Linn. Juniperus lusitanica. Mill. n. 11. Sabina folio Cupressi. du Ham. n. 2. Upright Savin. Mawe. Hanb. I. 222. Berry-bearing Savin. Lüber IV. 422. Sudow 404 b.
- b) Scheckiger S. I. Sabina foliis variegatis. Sabina folio variegato. Du Ham. n. 3. Le Sabine panaché. Variegated Savin. Hanb. Mawe. Lüber IV. 423. Burgsdorfs Holzcultur 124.
- c) Tamariskenblättriger S. I. tamariscifolia. Sabina folio Tamarisci. Du Ham. Le Sabine a feuilles de Tamariske. Spreading Savin. Hanb. Lüber IV. 422. v. Burgsdorfs Holzcultur 124. n. 271. Boccone de Sabina folio tamarisci. in Museo di Fisica. S. 148.

§. 667.

Art. 192. Oxycedrus. I. Oxycedrus. Linn.

Synon. Juniperus major bacca rufescente. Le Cade, Le genevrier, a fruit rougeatre. Spanish Juniper. Hanb. Cedermachholder, spanischer Wachholder, slavonische Ceder.

Linn. l. c. Sudow 406. Du Roi I. 344. Du Hamel I. 224. Lüber IV. 418. Miller n. 12. Hausvater V. 338.

§. 668.

Mit zu drey beysammen sitzenden, breiten, langen Nadeln, die auf der Oberfläche eine seladongrüne Rinne haben.

Er wächst in Narbonne und Spanien wild, kommt aber auch in unsern Gegenden fort. Die Nadeln stehen zu drey beysammen und sind an den Zweigen schön ausgebreitet. Sie sind breiter und länger als die Nadeln unsers Wachholders, aber kürzer als ihre (des Ox.) Beere. Auf der obern Fläche haben sie eine seladongrüne Rinne. Die Beere sind von der Größe einer Haselnuß und röthlichbraun. Der Baum wird nur zehn bis funfzehn Fuß hoch und ist von unten bis oben hinaus, dicht mit Zweigen besetzt. Wegen seines ansehnlichen Wachses verdien-

te



te er Anpflanzung. Aus den Beeren wird das in der Thierarzneykunst bekannte hiule de Cade bereitet.

§. 669.

Art. 193. Weihrauch-Bachholder. *I. thurifera*. Linn.  
*Synon.* *Juniperus hispanica* Tourn. et Mill. n. 13.  
*Cedrus hispanica* procerior, fructu maximo nigro. Du  
 Ham. n. 3. Le grand Genevrier d'Espagne. Spanisch  
 Cedar. Hanb. I. 221. Spanische Ceder (bey Miller  
 und Tournefont).

Linn. l. c. Suckow 404. Hausvater V. 340. Lüber IV.  
 419. Mawe. n. 3. v. Burgsdorf Holzcultur 123.

§. 670.

Die spizigen Nadelblättchen liegen in vier Reihen über  
 einander geschoben.

Waterland. Portugall und Spanien. Er wird  
 daselbst dreyßig Fus hoch und drüber. Aber auch in un-  
 sern Gegenden dauert er aus und bringt guten Saamen.  
 Wenn seine Zweige verschont bleiben, hat er einen schö-  
 nen regelmäßigen, pyramidenförmigen Wuchs. Die Na-  
 delblättchen sind schön grün, spizig und liegen in vier Rei-  
 hen dachziegelförmig über einander geschoben, so daß sie  
 viereckige Zweige bilden. Die Beere sind schwarz, sehr  
 groß und erscheinen an den jungen Zweigen in großer  
 Menge.

§. 671.

Art. 194. Virginischer W. *I. virginiana* Linn.

*Synon.* *Juniperus virginiana*, folio ubique juni-  
 perino. Du Ham. n. 8.? Le Cedre rouge de Virgi-  
 nie. Red virginian Cedar. Hanb. I. 44. 220. the red  
 Cedar tree. Wang. g. Marsh. 118. Rothe Ceder, rothe,  
 virginische Ceder.

Linn. sp. pl. II. 1471. Gronov. virg. 157. Schöpff m.  
 m. a. 151. v. Wangenheim 9. Suckow 405. Du Roi I. 346.  
 Lüber IV. 420. Mönch 55. Borkhausen 30. Marshall 118.  
 Churpfälz. Bemer. 1774. 286.

Abbild. Wangenh. F. V.

§. 672.

## §. 672.

Mit zu drey beyeinander stehenden Nadelblättchen, von denen die jüngern in einander geschoben sind, die ältern aber flach auseinander stehen.

Waterland. Nordamerika, eigentlich soll es Westindien seyn. Dieser immer grüne, auch bey uns dauerhafte Baum, treibt eine kurze aber starke Pfahlwurzel. Steht er auf Felsenlagen; so streichen seine Wurzeln flach aus, und der Baum erreicht keine so ansehnliche Höhe, als in einem tiefen, lockern Boden. Nach Kalm erreicht er in Nordamerika eine Höhe von funfzig, achtzig bis hundert Fus. Die Rinde ist bräunlich, mit einem dünnen Oberhäutchen überzogen, welches bey ältern Stämmen aufspringt und in viele schmale Streiffen zerreißt. Das Holz ist röthlich, fest und wohlriechend. Der Kern ist bey starken Bäumen mit einem Splint umgeben, der weich, weißgelblich und einer baldigen Verwesung unterworfen ist. Aber der innre Kern wird weder von Fäulniß noch Wurmsfraß angegriffen. Der Stamm treibt viele Seitenzweige unter rechten Winkeln. Die Nadeln sind schmahl, obsolet vierseitig, auf der obern Fläche etwas platt und gegen die Basis etwas hohl, gebogen. Die jüngern liegen gleich denen an der Thuja - Cypresse in einander geschoben, die ältern stehen zu drey flach auseinander, daher die Zweiglein fast eine pyramidenförmige Gestalt haben. Ihre Farbe ist dunkelgrün. In strenger Kälte werden sie violet, nehmen aber im folgenden Frühjahr wieder ihre grüne Farbe an. Die Beere sind purpurfärbig, länglichrund, von der Größe und Geschmack unsrer Wachholderbeere, mit einem weissen Beschlag überzogen, der sich leicht abwischen läßt. *Juniperus virginiana* und *Sabina* haben beyde *folia decurrentia*, in *ramulis majoribus terna*, in *minoribus opposita*, *mox patentia*, *mox erecta*. Erstere bringt *baccas erectiusculas* letztere *cernuas*. Ehrhards Beyträge IV. 54. Sie steht auch im Siegenberg.

## §. 673.

## §. 673.

Ein sehr schätzbarer Baum für Sandgegenden. Das Holz ist in der Luft, im Wasser und auf der Erde fast unverweslich. Die daraus gebauten Schiffe werden von den Würmern, denen vermuthlich der Geruch und Geschmack des Holzes zuwider ist, nicht angegriffen. Man gebraucht es zur Täfelung der Zimmer und zu allerhand Tischlerarbeiten. Auch die englischen Bleystifte werden mit diesem Holze eingefaßt. Nach H. D. Schöpff werden die Beere, das Holz und das Harz in der Heilkunst gebraucht. Man trifft diesen nützlichen Baum bereits häufig in Teutschland an, wie denn in Harbke und Herrnhausen Saamen (1 Pfund p. 1 Thlr.) verkauft wird. Indeß ist es doch zu verwundern, daß dieser, alle Aufmerksamkeit verdienende Baum, bey den so glücklichen Versuchen noch nicht allgemeiner ist. Aber mancher praktische Forstmann weiß leider nicht (wie H. A. Medicus erinnert,) was der nachdenkende und forschende Gelehrte ihm zur allgemeinen Ausübung aufgefunden hat, und was er ihm so vaterländisch gesinnt, mit so vieler Wärme, zur allgemeinen Einführung anpreiset. Hausvater V. 339. Borrowskys Almanach 186. Medicus Beiträge zur schönen Gartenkunst, S. 35. Ehrhards Beiträge IV.. 79. Kalms Reisen III. 151.

## §. 674.

Art. 195. Carolinischer W. *J. caroliniana*.

Waterland. Nordamerika. Er kommt an Größe und Gestalt dem virginischen gleich, und wächst auch bey uns freudig fort. Die Nadeln stehen zu zwey einander gegenüber, sind sehr kurz, pfriemenförmig, liegen dicht an den Zweigen und dachziegelförmig über einander. Die obern sind länger und stehen an den zarten Zweigen flach ausgebreitet. Manche Zweige haben gar keine ausgebreitete Nadeln. Die Pfahlwurzel des Baumes dringt tief ein und die Seitenwurzeln breiten sich ziemlich weit aus.

Die



Die Rinde des Stammes ist rothbraun, das Holz weißlich. Die jungen Zweige sind grün. Die Blüten erscheinen in den Achseln der Nadeln. Die Beere sind dunkelpurpurroth.

Ab. a) *Juniperus virginiana*, foliis inferioribus juniperinis, superioribus Sabinam vel Cupressum referentibus. Du Ham. n. 6. Carolina Cedar. Hanb. I. 220. Red Carolinian Cedar Marsh. 119. Rothe carolinische Ceder. Die untern Nadeln gleichen einigermaßen den Wachholdernadeln, die obern denen am Saldebaum.

b) *J. virginiana* foliis ternis omnibus patentibus. Miller. n. 3. Virginischer Wachholder, Miller n. 3. Borkhausen 31. Mit zwey einander gegenüber stehenden Nadeln, die alle von gleicher Länge sind und alle flach ausgebreitet stehen.

## §. 675.

Art. 196. Phöniciſcher B. *J. phoenicea*. Linn.

Synon. *Cedrus folio Cupressi major*, fructu flavescens. Du Ham. n. 1. Le Genevrier grand de la Phoenicie a fruits jaunatres. Phoenician Cedar. Hanb. I. c. Phöniciſche Ceder.

Sudow 406. Linn. I. c. Miller. n. 7. Mawe. n. 6. Lüber IV. 420.

## §. 676.

Mit theils dreyfachen, theils dachziegelförmig übereinander liegenden Nadelblättchen.

Sein Vaterland ist der Orient und Südeuropa, doch kommt er auch in unsern Gegenden fort. Der Stamm wird zwanzig Fuß hoch und drüber. Er hat von unten auf einen schönen pyramidenförmigen Wuchs. Die Nadelblättchen sind theils dreyfach, theils dachziegelförmig, die untern je zu drey beisammen und abstehend, die obern stumpf und wie an der Cypresse sich in einander verlierend. Die Blüten erscheinen an den Enden der Zweige. Die Beere sind klein und gelblich. Sein dauerhaftes  
Cc wohl.

riechendes Holz, und sein ziemlich hoher Wuchs empfehlen seine weitere Cultur.

§. 677.

Art. 197. *Lyrischer B.* *I. lycia*. Linn.

*Synon.* *Cedrus folio cupressi media majoribus bacis.* Du Ham. n. 2. *Le Cedre moyenne grandeur a feuilles des cypres et a gros fruit.* Lucian Cedar. Hanb. I. 221. *Lyrische Ceder.*

*Suctow* 407. Linn. l. c. *Ludwig* 24. *Lüder* IV. 420. *Miller* n. 8. *Mawe*, n. 5. *du Ham.* n. 2.

§. 678.

Mit eyrunden, stumpfen, zu drey beyammenstehenden, überall dachziegelförmig auf einander liegenden Nadelblättchen.

*Vaterland.* Frankreich, Sibirien, Spanien und Italien. Er dauert aber auch bey uns aus. Der Stamm wird zwanzig bis fünf und zwanzig Fus hoch und ist mit einer röthlichen Rinde bekleidet. Die Zweige stehen aufrecht. Die Nadelblättchen sind klein, sehr schön, eyrund und stumpf, denen der Cypresse ähnlich, stehen zu drey beyammen, und liegen auf allen Seiten dachziegelförmig übereinander. Die Beere sind groß, eyrund, braun, pflegen überall an dem ganzen Baume an den Seiten der jüngern Zweige in Menge vorhanden zu seyn. Linne vermuthet, daß dieser Wachholder den Weyhrauch liefere, welches aber noch nicht entschieden ist.

§. 679.

Gatt. 55. *Taxus.* *Taxus.* Nadelholz.

*Männliche Blüte.* Die viertheilige Oefnung der Blütenknospe vertritt die Stelle der Geschlechtsdecke. Staubfäden zehn und mehrere auf einem gemeinschaftlichen Stiele. Staubbeutel plattgedrückt, schildförmig, fünffährig. Weibliche Blüten, gleichen jenen bis auf die Staubfäden. Der Fruchtknoten hat keinen Staubweg

weg, sondern bloß eine zugespitzte Narbe und erwächst zu einer Beere, welche in einen kugelrunden, saftigen, gefärbten, an der Spitze offenen Wulst verlängert ist, der endlich austrocknet, zusammenfällt und verschwindet.

## §. 680.

Art. 198. Gemeiner T. *T. baccata*. Linn.

Synon. *Taxus*. C. B. pin. 505. Du Ham. n. 1. *Taxus baccifera*. Hall. hist. n. 1663. L'lf. Yew tree. Hanb. I. 46. 245. Bogenbaum, Eibenbaum, If, Ibe, Eibe, Eve, Eue, Eiben, Euen, Ibenbaum, Echenbaum, Ebenbaum.

Linn. sp. pl. II. 1472. Sudow 400. Gleditsch II. 279. Leonhardi 136. Mündch 134. Borkhausen 25. Märker 70. Lüder IV. 427. Du Roi II. 451. v. Burgsdorfs Forsthandbuch 119. 255. Hausvater V. 340. De Taxinatura: Recueil des pieces lues dans les Assembl. de l'acad: de la Rochelle. T. II. Schrank. bavar. II. 238. Willich syll. reich. 142. Schrebers Sammlung VI. 253.

Abbild. Cramer t. 27. Delhafen, I. t. 23. 24. Kerner II. t. 165.

## §. 681.

Mit immergrünen, breiten, am Ende zugespitzten, nahe bey einander stehenden Nadeln.

Der *Taxus* kommt sowohl als ein Strauch, denn als Baum vor, der zwar stark aber nicht sonderlich hoch wird. So fand H. Ehrhard in dem Wald hinter dem Schloß Plesse, *Taxus*bäume, deren Stämme beynah mannsdick waren. (S. dessen Beyträge. Heft III. S. 32.) In Deutschland wird er überhaupt nicht selten auf Felsen und Gebirgen, sowohl zwischen Laub- als Nadelholz angetroffen. Seine Wurzel geht zwey Fuß tief und breitet sich sechs Fuß weit aus. Die Nadeln, welche perenniren, sind auf der obern Fläche glänzend und dunkelgrün, auf der untern hellgrün, stumpf zugespitzt, der Länge nach mit einer erhabnen Linie versehen, und sind dem Ansehen nach den Nadeln der *Weisstanne* ähnlich.



Unter jeder Nadel liegt auf der Rinne der jungen Triebe, eine grüne Schuppe. Die jungen Zweige sind grün. Die Blüten erscheinen im May aus den Achseln der Nadeln. Die Blütenknospen sind hart und grün. Bey der Oefnung zerspringen sie in vier (nach andern sechs) Theile und bestehen aus Schuppen, davon die innern kleiner und steiffer sind. Die Staubbeutel sind breit gedrückt, fleischfarbig. Die Frucht ist eine weiche, saftige, länglichtrunde, hochrothe Beere, die im September reif wird, und einen ovalen, schwarzen Saamenstein enthält, der zwey Jahre in der Erde liegt. Im Hangelstein, auf der Bollarer Koppe.

Ab. a) Mit breiten, glänzenden Nadeln. b) mit sehr kurzen Nadeln. c) Mit scheckigen Nadeln.

#### §. 682.

Man bediente sich ehemahls des Taxus sehr häufig zu Befriedigungen und Verzierungsflecken, und zu einzelnen, erkünstelten Figuren. Da er sehr dicht wächst, seine jungen Schüsse einen sehr regelmäßigen Buchs haben, und man ihm also mit der Gartenscheere sehr leicht eine jede beliebige Form geben kann; so erzwang aus ihm die luxuriöse Phantasie der Gärtner durch den künstlichen Schnitt, die unnatürlichsten Gestalten, welche der moderne, gereinigte Geschmack unsers Zeitalters mit Recht aus den Gärten verbannt hat. Jetzt achtet man solche Tändeleien nicht mehr, sondern pflanzt ihn in Lustgebüsche und andere Verzierungspflanzungen, besonders von immergrünen Bäumen, woselbst man ihn, wie andre Holzarten seinen natürlichen Buchs überläßt. Oder man stellt ihn zur Vermehrung der Mannichfaltigkeit, isolirt, in weit ausgedehnte, entfernte Oefnungen auf Grasgrund, in Parks, an die Seiten der Anhöhen, u. d. g. wo man ihn gleichfalls seiner Natur gemäß fortwachsen läßt. So schickt er sich auch zu innern Abtheilungshecken, sowohl zu solchen, die zur Verzierung, als zu solchen,

chen, welche zärtlichen Gewächsen zum Schutz dienen sollen, wegen seines dichten, ebenen und mäßigen Wuchses besser, als andre, immergrüne Bäume. Hingegen ist er zu äußern Befriedigungshecken weniger schicklich, noch zu Lauben, weil sich in seinem Walde Spinnen und andere Insecten in Menge aufhalten.

Lüders bot. pract. Lustgärtneren. S. 427.

### §. 663.

Seine Vermehrung geschieht:

#### a) Durch Saamen.

Es wächst aber der Taxus aus den Saamen sehr langsam. Man wirft die reifen Beere in ein Gefäß mit Wasser und zerdrückt sie, damit sie die Saamensteine herausgeben und zu Boden fallen. Dann wird das Wasser abgegossen und die Saamen zwischen Löschpappier getrocknet. Hierauf säet man sie sogleich in guten, frischen Waldgrund und bedeckt sie einen halben Zoll hoch mit Erde. Das Land muß immer feucht und schattig gehalten werden. Ueberhaupt liebt diese Holzart kalten, fruchtbaren, feuchten Boden und schattigten Stand.

b) Durch Abschnitte und Ableger, wodurch man aber nie so schöne Stämme erhält als aus Saamen.

Es hat aber der Taxus von den ältesten Zeiten her einen sehr zweydeutigen Ruf gehabt. Die Alten hielten seine Ausdünstung, ja sogar seinen Schatten für giftig. Heut zu Tag sieht man ihn in den Gehägen sehr gerne, weil die Biemer und Schnerrer seinen Beeren nachziehen, und sich auch bey kalter Witterung in seinem Walde aufhalten. Die Neuern haben die Angaben der Alten übrigens bald durch eigne Erfahrungen bestätigt, bald ihnen widersprochen, aber man findet beynahe keine einzige Angabe, die nicht von andern wieder geläugnet würde. Vergleicht man sie mit einander, so möchte das Resultat dieses seyn, daß der Taxus immer unter die verdächtigen

Bäume gehöre, bey deren Gebrauch man behutsam seyn müsse, weil er unter gewissen, noch nicht hinlänglich bekannten Umständen, sehr schädlich seyn kann.

Ballenstedt Progr. Auctoritas veterum cum recentiorum experimentorum fide, circa innoxiam Taxi naturam concilianda. Hanov. 1783. Göt. gelehrte Anz. 1783. I. S. 94.

§. 684.

Das Taxusholz ist schön gestammt, fein, sehr hart und dennoch zähe, daher es eines unserer besten Nuzshölzer ist. Es enthält weniger Harz als andre Nadelhölzer und nimmt, ohne Firniß zu erhalten eine Politur an, in welcher es dem kostbaren Mahagony Holze wenigstens gleich kommt. Schwarz gebeizt gleicht es dem Ebenholze vollkommen. Es ist zu den feinsten Arbeiten brauchbar, nur erfordert seine Bearbeitung gute Werkzeuge. Dreher, Instrumentenmacher und vorzüglich die Ebenisten (Hall. hist. n. 1663.) suchen es vor andern Hölzern, zu feinen, besonders Fournierarbeiten. Auch Bogen und Armbrüste können daraus verfertigt werden. Klein geraspelt und mit Taig vermengt, empfiehlt es Hr. von Burgsdorf als ein specifisches Mittel gegen den tollen Hundebiß, wenn man gleich nach demselben ein Loth schwer einnimmt. (dessen Holzcultur. S. 211.) Nach H. Prof. Gold verfertigen die Holzarbeiter um Traunstein (in Oberbayern im Rentamte Burghausen) Pipen für Wein und Bierfässer von diesem Holze.

Anmerk. Nach C. Bauhins Bericht sollen die Einwohner von Berchtesgaden aus diesem Holze Stöcke, Stockknöpfe, Löffel, Büchsen, feine Kästchen u. d. g. verfertigen und damit einen großen Handel treiben. Allein die dasigen Holzarbeiter verarbeiten bloß das Holz der Rothfichte, und alles Geräthe das man da herum verfertigt, wird meistens aus diesem Holze, oder aus Ahorn und Lehnholze, niemahls aber aus Ebenholze, wie H. v. Moll (Naturhist. Briefe II. 340.) bemerkt, verfertigt. Bauhins Irrthum, der auch in einige Schriften seiner Nachfolger übergieng, kommt daher, daß der gemeine Mann im ganzen bayerischen Kreise die Tannenzweie



zweige, Taxen und davon den Baum, Taxbaum nennt. (Schränk. II. 237.) Daher mag auch das in einigen Forstordnungen verbotene Dächsigbauen (Nadelreissighauen zum Gebrauch der Stallstreu) kommen, welches sodann Tächsig zu schreiben wäre.

## §. 685.

Nach Mönch sammelt man im Amte Borenden die Zweige und füttert Kühe damit, welche so viele Milch davon geben sollen, als vom geschroteten Korn. Andre halten diese Fütterung für höchst gefährlich. Graf Matschka (Flora sib. n. 728.) hält sie für alle Thiere schädlich. In Ansehung der Kühe, sagt Germershausen bin ich selbst einmahl ein Augenzeuge gewesen, da ein Gärtner die abgeschnittnen Taxuszweige auf den Misthof hinwarf und sie von den Kühen fressen ließ. Auch in den Schriften der Leipz. ökon. Gesellschaft findet man Versuche angeführt, welche die giftige Wirkung der gefütterten Taxuszweige außer Zweifel setzen, wiewohl solche durch Vermengung mit einem andern Futter vermindert wird, und dennoch bleibt es noch zweifelhaft, ob es nicht immer ein schleichendes Gift bleibe, wenn ihm auch die plötzliche Wirkung genommen worden ist.

Anm. 1. Vielleicht rührt die schädliche Wirkung der T. Zweige beyrn füttern mit von den vielen Insecten her, die diese Holzart bewohnen, und mit ihrer Brut und Auswürfen, die Zweige verunreinigen. Schriften der churf. sächs. Leipz. ök. Gesellschaft. T. VIII. Dresden, 1790. S. 156. Leipziger Intelligenzblatt, 1768. St. II.

2. Da ein neuerer Schriftsteller zur Ersparniß andrer Fütterungsmaterialien, den Taxus für Pferde empfohlen hat; so will ich ein Beyspiel aus einem, mir von ohngefähr in die Hände gekommenen Zeitungsblatt anführen, welches die Zweydeutigkeit dieses Futters, ohne Zweifel satksam darthun wird. Frankfurter Journals-Anhang. Ao 1777. Samstag, den 23. Aug. Nro. 134.

Frankfurt an der Oder. Vom 8. August.

Am Montage ließ ein Einwohner unsrer Stadt die Taxuspyramiden, die in seinem Garten etliche mit Gras bewachsene Terrassen zieren, beschneiden. Am folgenden Tag läßt er

auch das Gras auf diesen Terrassen, welches zu hoch geschnitten war, bis auf eine gewisse Höhe abmähen. Er schickt alsdann noch denselben Abend zu seinem Nachbarn, und läßt ihm, wie er öfters gethan, sagen: ob er sich nicht das abgeschnittne Gras von seinen Terrassen wiederum hoblen wolle. Der Nachbar macht sich dieses Anerbieten mit Dank zu Nuze und denkt seinen Pferden ein gutes Abendfutter dadurch zu verschaffen. Drey von seinen Pferden waren schon zu Hause, und vier erwartete er noch vom Felde. Er wirft indessen den erstern ihre Portion von dem Grase vor, und läßt, weil es warm ist, die Stallthüre offen. Die Pferde fraßen begierig in das schöne fette Gras: allein in weniger als einer halben Stunde, fangen sie an zu toben. Sie reißen sich los und eines von den dreien kommt auf den Hof gesprungen, wo es vor des herbeneilenden Eigenthümers Augen zu Boden fällt. Das zweyte fällt in der Stallthüre um, und das dritte im Stalle, alle drey auf der Stelle todt. Ehe noch Anstalt zu ihrer Wegschaffung gemacht werden kann, fangen sie an gewaltig aufzuschwellen, und werden wenigstens noch einmahl so dick, als in ihren gesunden Zustande. Der Mann muthmaßte natürlicher Weise, daß die Ursache eines so plötzlichen Todes an dem Futter liegen müsse und durchsuchte zu dem Ende das Gras. In diesem fanden sich Aestchen und Spitzen des Taxus, welche beym beschneiden der Pyramiden hineingefallen und ohne Bedenken mit dem abgemähten Grase, waren zusammengerafft worden. Derselbe Mann hatte zwar schon öfters dergleichen Gras von seinem Nachbarn gehohlet, allein es hatte sich noch niemahls, als gerade an diesem unglücklichen Tage getroffen, daß der Taxus und das darunter stehende Gras zu gleicher Zeit waren geschnitten worden. Beym aufhauen der Pferde hat man selbige, außer der Vergiftung vom Taxus, ganz gesund gefunden. Die Eingeweide waren auf eine ungewöhnliche Art aufgeschwollen und in ihrem Magen außer den Taxus nicht das geringste verdächtige. Daher kein Zweifel übrig bleibt, daß von diesem Baum die unglückliche Wirkung herrühre.

3. Auch Menschen sah man auf genoßene Taxusnadeln sterben. Percivall führt einen Fall an, wo drey Kinder starben, denen man eine kleine Portion getrockneter Taxusnadeln gegen Würmer gegeben hatte. *Essays medical, philosophical and experimental.* Warrington, 1790. S. 257. Sammlung für practische Aerzte. B. III. S. 710. Auszüge aus den franz

französis. periodischen Schriften. B. I. S. 414. Coment. Edimburg. Vol. VI. S. 31.

§. 686.

Nach Lobel essen die Knaben in England die Beere ohne Nachtheil, und H. Prof. Gold versicherte den H. P. Schrank, daß die Holzarbeiter um Traumbstein die Beere als ein durststillendes Mittel genossen. 2) In andern Gegenden hat der Genuß dieser Beere den Todt nach sich gezogen. 3) Dieß bewog die französischen Aerzte der neuesten Zeit mehrere Versuche mit dem Taxus anzustellen. Nach diesen hält Gattereau den Taxus nicht für sonderlich giftig. Er traut ihm sogar einige antiseptische Kräfte zu. Doch finden andre Aerzte seine Versuche sehr unvollkommen. Durch mehrere Erfahrungen bewies Harmand, daß der Taxus in der That giftige Eigenschaften besitze. Nach seinen und Percy's Versuchen kann er indessen in der Hand eines vorsichtigen Arztes in verschiednen Krankheiten mit Nutzen gebraucht werden. 4).

Anm. 1. Lobel Stirpium historia, cui annexum est Adversariorum volumen. Antw. 1576. Fol. S. 450.

2. Schrank. l. c. S. 240.

3. Cille führt in seinen neuen Beiträgen zur Natur- und Arzneywissenschaft T. I. Berlin, 1783. S. I (Vergleiche Schedels medic. Litteratur, T. I. S. 53.) einen solchen Fall an. Ein Kind welches Taxusbeere genossen hatte, bekam über den ganzen Körper Petechien von der schlimmsten Art, und Schmerzen an der Fußsohle. Es starb, nachdem es Schwäche in den Füßen, einen fieberhaften Puls, eine geschwollene Oberlippe und Erbrechen bekommen hatte, bey vollem Verstand.

4. Neueste Annalen der französischen Arzneykunde, übersetzt von Hufeland. Leipzig, 1791. Harmand brauchte Pulver und Extract der Rinde und Blätter mit Nutzen in der englischen Krankheit, Bleichsucht, Fallsucht, Sicht, viertägigem Fieber, und Convulsionen. Percy fand den Syrup und die Gallerte der Beere nützlich, bey Catarrhal- Zufällen, Coliken und Schwerharnen, vom Stein- und Blasencatarrh.



5. Nach Lobel sollen die Beere den Schweinen unschädlich seyn. Camerarius sagt (Hort. med. p. 166.) daß die Vögel, welche von den Beeren sehr begierig fressen, sinnlos davon würden, so daß sie leicht gefangen werden könnten.

### Zweite Abtheilung.

## Holzarten mit abwechselndem Geschlechtsstande.

§. 687.

Gatt. 56. Salix. Weide. Laubh. sommergr.

Blütenstand. Kätzchen. Geschlechtsdecke, eine häutige Schuppe von verschiedner Gestalt. Staubfäden, einer, zwey, drey und mehrere, welche theils einfach, theils zweyspaltig und theils zweytheilig sind. Staubbeutel, zweysädrig, bisweilen sind zwey zusammengewachsen. Der ovale Fruchtknoten hat einen, in zwey Theile getheilten Staubweeg. Die Saamenkapsel ist oval, zweyschaalig, einsädrig, vielsaamig. Saame sehr klein, schwarz, mit Wolle bekleidet, reift zeitig im Sommer. Auf dem Blumenboden befindet sich ein Honigbehältniß von verschiedner Form. Die Wurzel aller Weidenarten streicht in der Oberfläche weit fort.

Hoffmann historia salicum. Fasc. III. m. R. Lips. 1785. Borkhausen, S. 167. Beckmanns ök. phys. Bibl. XIV. 95. 369. Hagen über die preuss. nutzbaren Weidenarten in den Berliner Sammlungen. B. V. S. 117. (Höck) ökonom. Pflanzengeschichte der Weiden und Pappelbäume. Hanau und Offenbach, 1782.

§. 688.

Diese Gattung begreift eine beträchtliche Anzahl Bäume und Sträucher von verschiedner Größe, deren reine, botanische Auseinandersehung und Bestimmung äußerst schwer ist. Der Geschlechtsstand ist zwar bey den meisten Arten derselbe, so daß nämlich die Geschlechter ganz

ganz getrennt sind: allein man findet auch manche Art mit halbgetrenntem Geschlecht, andre mit Zwitterblüthen, und dieser Geschlechtsstand selbst variirt sehr. Ja es läßt sich bey mancher Sorte nicht einmahl mit Zuverlässigkeit angeben, ob sie Art, Unter- oder Abart sey. So lange die Gewächskunde noch in ihrer Kindheit war, glaubten manche, daß die Weiden ihren Geschlechtsstand jährlich veränderten. Andre Vermirrungen entstanden daher, daß man zu eilig Weiden als Arten annahm, die doch öfters nur Abarten, höchstens Unterarten waren. Denna bey dieser Holzgattung machen Boden, Klima, Alter und andre Umstände, die wir zum Theil noch nicht kennen, weit öftere und häufigere Veränderungen in einzelnen Theilen und dem ganzen Habitus, als bey andern Holzarten. Unterabtheilungen sind auch bey einer so weitläufigen Gattung nöthiger als bey irgend einer andern. Allein weder der Geschlechtsstand, noch die Zahl der Staubfäden, noch die Gestalt der Blätter können wegen ihrer Wandelbarkeit das Eintheilungsprincip abgeben. Die beste Eintheilung möchte also wohl diejenige seyn, welche uns die Natur selbst anweist — in Werffte und Weiden — weil sie charakteristisch und unveränderlich ist.

Von den Weidenrosen. S. L. S. Grassius de excrecentiis floriformibus in Salicibus luxuriantibus. Eph. Nat. cur. Dec. I. ann. III. S. 410. Hagen physif. Betrachtung über die Weidenrosen. Königsberg, 1769. 8.

§. 689.

#### A. Werffte.

Die Blüte erscheint vor Ausbruch des Laubes.

Art. 199. Rauher Werfft. S. caprea. Linn.

Synon. Salix foliis ovatis rugosis, subtus reticulatis, tomentosis, julis ovatis, stipulis amplexicaulibus ferratis. Hall. hist. n. 1653. Salix latifolia rotunda. C. Bauh. pin. 474. Du Ham. n. 28. Le Marceau ordinaire. Sallow. Hanb. I. 181. Werfft, Werff, großer Werfft, Palm-

Palmweide, Sohle, Sohlweide, Salweide, Sahlweide, Saalweide, Sale, Seilweide, Sälen, breite große Seilweide, Werstweide, Hohlweide, Streichpalme, Pfeiffenholz.

Linn. Sp. pl. II. 1448. Pollich palat II. 637. Hoffmann hist. sal. fasc. I. 25. Scopoli. carn. II. 253. n. 1205. Schrank bauar. I. 232. Suckow 45. Gleditsch II. S. 6. n. 48. und S. 31. Leonhardi, 113. Borkhausen 162. v. Burgsdorff Forsth. 165. Ebend. Holzcultur. S. 193. und 234. Becker 45. Ehrhard III. 115. Märter 51. Dörrien 271. Du Roi II. 404. Lüder IV. 372. n. 1. Gleditsch vier hinterlassene Abhandlungen. S. 134.

Abbild. Cramer t. 11. Kerner III. t. 210. Hoffmann fasc. I. t. 3. f. 1. u. 2. t. V. f. 4.

### §. 690.

Mit eyförmigen, rundlichen, am Rande wellenförmigen und gezahnten, unten filzigen Blättern und kleinen gesägten, den Stiel umfassenden Blattansätzen.

Er erscheint als ein Strauch oder Baum. Die Rinde ist graugrün, wollig und im Alter glatt. Die Blätter, die aber sehr variiren, sind meistens eyförmig, am Rande etwas wellenförmig gefaltet, oft glattrandig, oft leicht gekerbt, auf der untern wolligen Fläche mit einem Aderneze durchzogen, stehen abwechselnd auf runden, wolligen Stielen. Bey ihrem Ausbruch findet man gesägte Blattansätze, die den Stiel umfassen, aber leicht abfallen. Die Blütenkästchen sind eprund, wohlriechend, ihre Deckblättchen eyförmig und behaart. Das männliche Kästchen ist dick und groß. Die Schuppen sind kurz gestielt, fast deltaförmig, außen mit Haaren, welche länger als die Schuppe sind, dicht besetzt. Das etwas dicke Honigbehältniß ist herzförmig, an der Spitze mit einem eingedrückten Grübchen versehen. Jede Schuppe bedeckt zwey Staubfäden mit gelben Staubbeuteln. Die weiblichen Kästchen sind schlank. Ihre Schuppen sind stumpf, lanzettförmig, behaart. Der birnförmige Frucht-

Kno-



Knoten ist kurz gestielt. Die zwey Staubweege sind kurz, gelblich und haben gelbe, zweyspaltige Narben, Das Honigbehältniß ist cylindrisch, zusammengedrückt, abgestumpft. Die Saamenkapseln sind seidenartig. Die Zweige und jungen Lohden sind sehr zähe. Man findet diese Art mit mancherley Abänderungen. Manche Bäume haben auf der einen Hälfte männliche, auf der andern weibliche Käzchen. Bisweilen trifft man Bäume an, wo die weiblichen Käzchen bald einzeln, bald häufig reihenweise, auch ohne Ordnung unter den männlichen stehen.

## §. 691.

Von den acht bis zehnjährigen Stangen erhält man gute Reißstäbe. Das leichte, lockre Stammholz giebt brauchbare Kohlen für die Pulvermühlen. Die Zweige und Wurzelohden dienen zu allerhand Flechtwerk. Die Rinde dient zum gerben und zur Lederschwärze. Auch nehmen sie die Landleute, so wie die gespaltenen Ruthen zu Bienenkörben. Den Blüten fliegen die Bienen nach. Ausserdem ist das Holz dieser Art das Hauptnußholz der Sieb- und Korbmacher. Man haut die Bäume zu diesem Gebrauch im März kurz über der Erde ab. Die Stäbe werden in Thüringen, die Klafter zu 17 Thlr. 12 ggr. verkauft.

## §. 692.

Folgende Sorten sind wahrscheinlich Unterarten.

200. Subsp. a) Aschgrauer Weisst. *S. cinerea*. Linn.  
*Synon.* *Salix pumila* foliis utrinque candicantibus et lanuginosis. Gmelin sibir. I. 164. 20. Graue Weide.

Linn. sp. pl. II. 1449. Sudow 46. n. 33. Schrank. bavar. I. 232. n. 56. Borkhausen 160. Ehrhards Beiträg. III. 115.

Abbild. Gmelin, I. c.

Mit

Mit länglicht eiförmigen, unten filzigen Blättern, deren Rand mit drüsigen Zähnen besetzt ist, wie der Rand der halb herzförmigen Blattanfäße.

Wird bisweilen fünf bis sechs Fuß hoch, bleibt aber oft niedriger. Sein natürlicher Stand sind feuchte Oerter. Die Rinde ist aschgrau, an den jungen Zweigen mit weißer Wolle besetzt. Die Blätter sind länglicht eiförmig, zugespitzt und wie die halbherzförmigen Blattanfäße am Rande mit drüsigen Sägezähnen besetzt. Die männlichen Blüten sind zweifadig.

## §. 693.

201. Subsp. b. Salbey-Werfft. *S. aurita*. Linn.

*Synon.* Le Marceau a feuilles de Sauge. Round-leaved Eared Willow. Hanb. l. c. Kleine, rundblättrige Werfftweide, Salbeyweide, kleiner, raubblättriger Werfft, kleiner rundblättriger Werfft, geöhrte Weide.

Linn. sp. pl. II. 1446. Pollich palat. II. 633. Scopoli carn. II. 254. Schrank bavar. I. 235. Sudow 43. Gleditsch, S. 7. n. 51. und S. 35. n. 49. (ein Druckfehler, muß n. 51. heißen) Borkhausen 159. v. Burgsdorf F. 5. 170. Ebend. Holzcultur 237. Ehrhard III. 114. Becker 48. Lüder IV. 382. n. 21. Gleditsch 4. hinterl. Abh. S. 134. Ebend. Bienenstand 161. Hoffmann I. 31.

Abbild. Hoffmann. F. I. t. IV. f. 12. t. V. f. 3. t. XXII. f. 1.

## §. 694.

Mit verkehrt eyrunden, glattrandigen, auf beyden Flächen wolligen Blättern, die mit zwey nierenförmigen, schwach gezahnten Blattanfäßen versehen sind.

Ein Strauch der bisweilen baumartig vorkommt. Die Blätter stehen abwechselnd an runden, wolligen Stielen, sind klein, verkehrt eyrund, auf der obern Fläche fein behaart, auf der untern mit einer weißlichen Wolle besetzt, am Rande zuweilen ganz, zuweilen leicht gekerbt, und bald mehr bald weniger (manche auch gar nicht) wellenförmig gefaltet. Die zwey Blattanfäße sind  
nie.

nierenförmig, schwach gezahnt und gewellet, unten weißlich haarig. Die jungen Zweige sind dunkelroth und zähe. Man findet ihn

a) mit halb und

b) ganz getrenntem Geschlechte.

Die Blütenkästchen haben an ihrer Basis einige stumpfe, behaarte, glänzende Deckblättchen. Die männlichen Kästchen sind eiförmig. Ihre Schuppen sind eiförmig, lanzettförmig, stumpf, und überall mit Haaren, welche kürzer als die Schuppe sind, dünne besetzt. Sie bedecken zwei Staubfäden mit gelben Staubbeuteln. Das Honigbehältniß ist sehr klein, cylindrisch, an der Basis etwas breiter, an der Spitze stumpf und etwas geköpft. Die weiblichen Kästchen haben lanzettförmige, langgestielte Fruchtknoten. Die zwei Staubweege sind sehr kurz, braun, haben stumpfe Narben. Das Honigbehältniß ist walzenförmig, abgestumpft.

c) Mit Zwitterkästchen. *Salix aurita hybrida*, *amentis hermaphroditicis*. Gleditsch 4 hinterl. Abh. 135.

§. 695.

202. Subsp. c. Spitzblättriger W. *S. acuminata*.

Du Roi.

*Synon.* *Salix folio ex rotunditate acuminato*, Du Ham. n. 29. Oblong-leaved Sallow. Mawe. Spitzblättrige Weide.

Sudow 45. n. 31. v. Burgsdorfs F. Handb. 167. Besser 46. Borkhausen 164. Lüder IV. 372. n. 1. Schrank. I. Hoffmann. Fasc. I. 39. Mill. n. 14. Du Roi. II. 407. von Münchhausen V. 301.

Abbild. Hoffmann. l. c. T. VI. f. 1. 2. T. XXII. f. 2.

§. 696.

Mit länglich eiförmigen, oben glatten, unten filzigen Blättern, nierenförmigen Blattansätzen.

Ein Strauch der seinen natürlichen Stand in Rohrbrüchern hat. In seinem ganzen Habitus hat er viel ähn-



ähnliches mit dem rauhen Werfft. Die Blätter, welche abwechselnd auf runden, wolligen Stielen stehen, sind länglicht eiförmig, zugespitzt, meist glattrandig, etwas runzlicht, oben glatt (in der Jugend fein behaart) unten mit einem wolligen, weißlichen Ueberzug bekleidet, nicht von so dicken Bau als am rauhen Werfft. Die Blattansätze, welche gewöhnlich nur an den untern Blättern stehen, sind nierenförmig, unordentlich gezahnt. Die Blütenkäzchen haben an der Basis einige lanzettförmige, behaarte Deckblättchen. Die männlichen Käzchen haben verkehrt eiförmige, schwärzlichbraune, mit kurzen Haaren dicht besetzte Schuppen, welche zwey Staubfäden bedecken, die an ein birnförmiges Honigbehältniß, welches an der Spitze abgeschnitten ist, angewachsen sind. Die weiblichen Käzchen haben eiförmige, lanzettförmige, spitzige oder stumpfe Schuppen, einen eiförmigen, pfriemenförmigen, langgestielten, behaarten Fruchtknoten, mit zwey Narben auf einen kurzem Staubweg. Das Honigbehältniß ist kegelförmig, an der Spitze stumpf. Die wolligen Saamen sind lanzettförmig. Die Zweige sind eckig und oben filzig.

Ab. a) Mit scheckigem Laub.

§. 697.

Art. 203. Rosmarin-Werfft. *S. rosmarinifolia*. Linn.

Synon. *Salix humilis angustifolia*. C. B. P. 474. *Salix procumbens foliis lanceolatis subtus sericeis*. Hall. hist. n. 1644. *Salix pumila angustifolia*. I. Clus. pan. 103. Le Saule a feuilles de Romarin. Rosemary - leaved Willow. Hanb. I. 766. Rosmarinweide, Krebsweide, Girtweide, schmahlblättrige Grundweide, spizblättrige Moorweide, feine kleine Haarweide, kleine Buschweide, Strauchweide, Wandweide.

Linn. sp. pl. II. 1448. Schrank. I. 231. n. 53. Sudow 44. n. 28. Gleditsch II. S. 5 n. 45. und S. 30. Vorkhausen 154. Ehrhard III. 115. Wörter 54. Becker 47. v. Burgsdorf

Vorf. K. S. 167. Ebend. Holzcultur. S. 237. n. 570. Ldb.  
der IV. S. 383. n. 27.

Abbild. Kerner III. t. 215.

§. 698.

Mit stiellosen, länglicht zugespikten, gleichbreiten, unten filzigen, am Rande ganzen oder mit seichten, drüsigen Sägezähnen, weitläufig besetzten Blättern.

Eine von den niedrigen Werstarten, die in Torfböden und den niedrigsten Sumpfländern stehen. Die Zweige sind dünne, schwank und zähe, mit einer, ins braungrüne fallenden Rinde bekleidet. Die stiellosen Blätter stehen abwechselnd, sind sehr schmahl, unten mit weißgrauen, seidenartigen Haaren dicht besetzt, meistens am Rande ganz, manche aber weitläufig und sehr seicht sägezählig, und jeder Sägezahn mit einer Drüse besetzt. Sie sind nicht immer den Rosmarinblättern ähnlich, wie der Name vermuthen ließe, anfangs graulich, hernach oben grün, unten aschgrau. Die schwarze, faserige Wurzel läuft schräge. Die männlichen Kätzchen haben in jeder Schuppe zwey Staubfäden mit gelben Staubbeuteln, und zwey dicht beisammen stehende Honigbehältnisse, von denen das eine nur halb so groß als das andre ist. Die Saamenkapseln der weiblichen Kätzchen sind länglicheförmig, gelbgrün, bey der Reife bräunlich. Die Saamenwolle ist fein und weiß.

§. 699.

Art. 204. Korbwerst. *S. viminalis*. Linn.

*Synon.* *Salix folio longissimo angustissimo utrinque albido.* Du Ham. n. 4. C. B. P. 474. *Salix foliis prae-longis, obscure dentatis, subtus tomentosis, albicantibus.* Hall. hist. n. 1641. *Salix foliis angustis et longissimis crispis, subtus albicantibus.* I. B. H. I. 213. L'Osier a corbeilles. Ozier. Hanb. I. 32. 181. Fischerweide, Uferweide, Seilweide, Grundweide, große Krebsweide, große Korbweide, Hansweide, lange Haarweide, Spis-

weide, große Flachweide, große Haarweide, Uferweide, Arintsweide, Knepenbusch, große Wandweide.

Linn. sp. pl. II. 1448. Pollich palat. II. 638. Hoffmann I. 22. Scopoli carn. II. 257. Eucow 46. n. 32. Gleditsch II. S. 5. n. 46. und S. 28. Märter 52. Dörrien. 172. Du Roi II. 403. Linder IV. 373. Borkhausen 152. v. Burgsdorf. F. H. 168. Ebend. Holzcultur 192. 234. Ehrhard VI. 102.

Abbild. Hoffmann. F. I. T. II. f. 1. 2. T. V. f. 2. T. XXI. f. 2. I. Bauh. hist. Vol. I. f. 2. p. 212.

§. 700.

Mit sehr langen, schmahlen, lanzettförmigen, am Rande umgerollten, unten seidenartig bekleideten Blättern, ruthenförmigen Zweigen.

Wächst in wässerigen Gegenden, kommt mehrentheils als ein ganzer Strauch, selten als ein Baum vor. Da er an den Ufern der Elbe häufig wächst; so heißt er auch Elbweide. Selten findet man diese Art unter andern Weiden. Die Zweige sind sehr lang und ruthenförmig und die jungen Triebe und Blätter im May, bisweilen über und über mit einer silberweisen Wolle bekleidet, welche sich nach und nach verliert. Blätter und Blüten kommen aus verschiedenen Knospen. Die Blätter stehen abwechselnd, sind länglich zugespitzt, schmahl, sehr lang, am Rande gewellet, auch ganz umgerollt, kaum merkbar gezahnt, auf der obern Fläche hellgrün und glatt mit vertieften Adern bezeichnet, welche auf der untern Fläche Erhabenheiten bilden, die mit feinem, weißem, glänzendem Filz bekleidet sind. Die großen, wohlriechenden Blütenkästchen haben an ihrer Basis einen Büschel fedriger Deckblättchen. Die männlichen Kästchen haben fast eiförmige, stumpfe, gelbgrüne, haarige Schuppen, deren jede zwey Staubfäden mit gelben Staubbeuteln bedeckt. Die weiblichen Kästchen haben eiförmige, gestukte, bräunliche, behaarte Schuppen. Der Fruchtknoten ist eiförmig, anfangs fein behaart, im Alter glatt und trägt zwey



zwey glatte, gelbliche Staubweege mit gelben Narben. H. Borkhausen fand oft in einem und eben demselben Käzchen gestielte und ungestielte Fruchtknoten, und die Honigbehältnisse immer doppelt. Die Blätter werden von Insecten häufig besucht und erscheinen daher mit mancherley Auswüchsen.

Ab. a) *S. incana*. Schrank I. 230? b) *S. viminalis viridis*. Ehrh. VI. 101?

### §. 701.

Diese Art wird für eine der besten und dauerhaftesten Weisse gehalten und ihr Anbau daher sehr empfohlen. Die Fischer unterhalten sie, als die für ihr Gewerbe tauglichste Art an den Ufern und auf den Strominseln. Gärtner und Landleute ziehen sie in manchen Gegenden in feuchtem, lockern Boden in den Feldbüschen, zu einer nützlichen Stammweide. Ihre Vermehrung geschieht durch die abgeschnittenen, eingelegten, schwachen Ruthen. Bey der Anlegung großer Dämme, an reissenden und Hauptströmen, wird sie als eine, in Eis und unter Wasser dauerhafte Grund- und Wasserweide gebraucht. Die Ruthen geben das beste Fischerzeug und die vierjährigen Stangen die besten Reiffstäbe.

### §. 702.

Folgende Sorten sind wahrscheinlich Unterarten.

205. Subsp. a) Brauner W. *S. fusca*. Linn.

*Synon.* *Salix buxifolia*. *Salix pumila altera latifolia*. Clus. panon. 102.? Le petit Saule a feuilles lisses. Brown Willow. Hanb. l. c. Braune Weide, burbaumblättrige Weide.

Linn. Sp. pl. II. 1447. n. 26. Schrank bavar. I. S. 231. n. 54. Sudow. S. 44. n. 27. Borkhausen 161. v. Burgsdorfs Holzcultur. S. 236. n. 563. Lüder IV. 383. n. 26.

## §. 703.

Mit glattrandigen, elliptischen, oben glatten und glänzenden, unten feinbehaarten Blättern.

Ein kleiner, kaum zwei Fuß hoher Busch, der auf feuchten Trifften wächst. Die Rinde ist am Stamm aschgrau, an den Zweigen rothbraun, glatt und glänzend. Die Blätter stehen abwechselnd, sind elliptisch, glattrandig, oben glatt und glänzend, unten mit feinen, glänzenden Haaren dünne besetzt. Blattanfänge fehlen. Blätter und Blüten kommen aus besondern Knospen. Die Blütenfäzchen haben an ihrer Basis einige hellgrüne, eysförmig-zugespizte Deckblättchen, die auf der untern Seite mit weissen, seidenartigen Haaren besetzt sind. Die weiblichen Käzchen haben schmähle, lanzettförmige Schuppen, welche braun, mit langen, weissen Haaren besetzt, an der Basis aber grünlicht sind. Der Fruchtknoten ist etwas zusammengedrückt, an der Basis eysförmig, nach oben pfriemenförmig, gelblichgrün, mit feinen, weissen Haaren besetzt, steht auf einem schlanken, weissbehaarten Stiel. Das Honigbehältniß ist verkehrt birnförmig, oben abgestumpft und ein wenig eingetieft, von hellgelber Farbe \*).

## §. 704.

206. Subsp. b. Sandwerfft. *S. arenaria*. Linn.

*Synon.* *Salix pumila* foliis utrinque candicantibus et lanuginosis. C. B. P. 474. Le Saule de St. Leger. Sand Willow. Hanb. I. 765. Kleine, rauche Bruchwerfftweide, kleine, niedrige Sandweide, Steinweide, Ackerweide, kleiner Feld- und Sandwerfft, niedrige glatte Feldweide.

Linn. sp. pl. II. 1447. Pollich palat. II. 635. Sudow 43. Glebitsch II. S. 7. n. 50. und S. 35. n. 51. (ein Druck)

\*) Borkhausen l. c. Walter sagt in seiner Gartenkunst: Diese Art gäbe besonders schöne Hecken für Lustgärten. Sie muß also wahrscheinlich durch die Cultur größer werden.

Druckfehler, muß 50 heißen) Borkhausen 156. Ehrhard III. 114. v. Burgsdorfs Forsthandb. 170. Ebend. Holzcultur. S. 193. 235. n. 559. Wiborg. S. 9.

Abbild. Wiborg l. c. Gmelin sibir. I. T. XXXVI. f. 1.

§. 705.

Mit eyrund zugespizten, glattrandigen, an der Spitze etwas zurückgebogenen Blättern.

In Sanddünen, auf sandigen Tristen und Heiden, so wie auf nassen Hutwaiden und an Rainen. Die Wurzel geht sehr tief und die jungen Wurzelschüsse haben ein ganz andres Ansehen als die ältern Zweige. Die männlichen Räschen haben zwey weise Staubfäden mit gelben Staubbeuteln. An ihrer Basis stehen, wie an den weiblichen, vier lanzettförmige Deckblättchen. Die weiblichen Räschen haben einen gestielten Fruchtknoten, der vier Staubweege trägt. Der Sandwerfft welcher oben auf den Dünen wächst, erreicht eine Höhe von ein bis andert-halb Ellen und treibt ziemlich lange Zweige, welche grau-lich und mit feinen Haaren dicht besetzt sind. Die Blätter sind länglich (von der Länge eines Daumens) auf der untern Fläche mit einem silbergrauen, glänzenden Wese befleidet, auf der obern dunkelgrau, mit feinen, kurzen Haaren besetzt. Der Blattstiel ist kurz. An jeder Seite steht ein kleiner, zugespizter, eysförmiger Blattansatz. An den Wurzelschüssen trifft man lanzettförmige, schmälere und mehr zugespizte Blätter an. Auch diese haben eine völlig glatte Oberfläche und bisweilen ist ihr Rand fein gezahnt. Der Sandwerfft, der im Thale, auf feuchten Stellen, zwischen Sanddünen oder auf niedrigen Sandhügeln wächst, macht einen kleinen Busch eine viertel oder eine halbe Elle hoch, der sich über der Erde ausbreitet. Seine Zweige und Schößlinge sind alsdann unbehaart und röthlich, die Blätter klein, unten heller und oben weniger rauh als jene \*).

D d 3

§. 706.

\*) Wiborgs Sandgewächse. S. 9.



## §. 706.

Dieser Strauch hat seinen großen Nutzen bey Dämpfung des Flugsandes. Man gräbt ihn in niedrigen Gegenden zwischen den Dünen aus und bepflanzt die kahlen Sanddünen damit. Die Bewohner der Sanddünen bedienen sich dieses Werfftes häufig zur Feurung, zu geflochtenen Körben und zu anderm Hausgeräthe. Blätter und Schößlinge werden den Schaafen gefüttert. Mit der Rinde wird nach Pallas, in Arsenas das Tuchtenleder zubereitet. Im Brandenburgischen wird dieser Werfft nebst der folgenden Sorte frisch zu den Spinnhütten der Seidenraupen, wegen seiner Zweige, an denen man aber die Blätter stehen läßt, genommen. Er läßt sich sowohl durch seine Wurzeln, als durch abgestochene Zweige vermehren.

## §. 707.

207. Subsp. c. Matten-Werfft. *S. incubacea*. Linn.

*Synon.* *Salix pumila*, foliis ellipticis integerrimis, subtus glaucis, spica rotundiore. Haller helv. 153. Incubaceous Willow. Hanb. I. 766. Kriechender Werfft, Mattenweide, Koppelweide, kleine Feldweide, kleine Angerweide, kriechende Erdweide, liegende Erdweide, gelbe Erdweide, kleine Silberweide.

Linn. sp. pl. II. 1447. Schrank. bavar. I. 130. Entw. 44. n. 25. Gleditsch II. S. 6. n. 49. und S. 34. n. 50. (ein Druckfehler, sollte 49 stehen.) Borkhausen 155. Ehrhard III. 114. Lüder IV. 383. 24.

Abbild. Kerner, III. t. 216.

## §. 708.

Mit glattrandigen, lanzettförmigen, unten glänzendwolligen Blättern, eyrund zugespitzten, unten glänzendwolligen Blattansätzen.

Man findet diesen Werfft in nassem Boden, zwischen Aeckern und Wiesen, auf sandigen und solchen Wäldern,

den, wo die Feld- und Winterwasser länger stehen bleiben, und an niedrigen, unfruchtbaren Orten. Er bleibt sehr niedrig und blüht im April. Die Zweige sind mehr gestreckt als aufrecht stehend, sehr zähe, oberwärts meistens etwas wollig, unten glatt. Die Blätter stehen abwechselnd auf kurzen Stielen, sind klein, glattrandig, eilanzettförmig, oben glatt, unten mit glänzenden, seidenartigen, langen, anliegenden Haaren dicht besetzt. Die Blattansätze sind eiförmig zugespitzt, hinfällig. An der Basis der Blütenköpchen stehen einige kleine Deckblättchen. Die männlichen sind sehr kurz, weich und wollig und beynahe ganz rund. Die Schuppen enthalten zwei lange Staubfäden mit gelben Staubbeuteln. Die weiblichen sind beträchtlich größer. Beider Schuppen sind stumpf und behaart. Die Saamenseide ist häufig, weiß und sehr lang.

### B. Weiden.

Die Blüten erscheinen nach ausgebrochenem Laube.

§. 709.

Art. 208. Bachweide. *S. helix*. Linn.

*Synon.* *Salix nigricans folio serrato*. C. B. P. 472. *Salix monandra foliis serratis glabris, lineari-lanceolatis, superioribus obliquis*. Hoffmann. F. I. Le petit saule jaune. Rose - Willow. Hanb. l. c. Rosenweide, Hefweide, Bachweide, kleine Strauchweide, niedrige Strauchweide, Hagenweide, braune Rosenweide.

Linn. sp. pl. II. 1444. Pollich pal. II. 631. Schrank bay. I. 229. n. 49. Sudow 39. n. 10. Gleditsch I. S. 6. n. 47. Borkhausen 141. v. Burgsdorf Forsthandbuch 168. Eben. Holzcultur 234. n. 553. Du Roi II. 398. Doerrien 270. Lüsder IV. 376.

Abbild. Hoffmann l. c. F. I. T. I. f. 1. 2. T. V. f. 1.

## §. 710.

Mit gleichbreiten, länglich zugespizten, gesägten, glatten Blättern, die oben an den Zweigen dicht und gegeneinander über stehen.

Ein ganzer Strauch, der in Feldhecken, um die Dörfer, an Landstrassen, Gräben, Bächen und Teichen, häufig wächst, aber gewöhnlich nicht über vier Fuß hoch wird. Die Zweige sind dünne, eckig, ziemlich zähe, mit einer gelben oder grünlich röthlichen Rinde, die im Alter dunkler und rauher wird, bekleidet. Sie sind oft mit sogenannten Weidenrosen besetzt. Die Blätter stehen unten abwechselnd und weitläufig, oben gegeneinander über und dichte. Sie sind fast gleichbreit, länglich zugespizt, der Rand ist bey einigen bis auf die Hälfte fein gezahnt. Sie haben einen zarten Bau, sind glatt, steif, oben hellgrün, glänzend mit erhabnen Adern bezeichnet, unten sind sie matter, etwas meergrün, und gegen dritthalb Zoll lang. Sie stehen auf glatten, oben gefurchten Stielen, an deren Basis man keine Blattanfänge findet. In den Achseln der Blätter findet man drüsenförmige Körper. Die Blüte erscheint im April. Die beyderseits wolligen Käzchen stehen an den jüngern Zweigen einander gegenüber, an den ältern abwechselnd, und haben an ihrer Basis zwey bis drey Deckblättchen. Die Schuppen der sehr dünnen, männlichen Käzchen bedecken einzelne Staubfäden, die eyrunden Schuppen der weiblichen, welche bey dem Herausstreten der Wolle roth sind, hernach aber schwarz werden, enthalten zwey oder vier sehr kurze Staubweege. Man pflanzt diese Weide gern an sandige Landstrassen zu Hecken, auch auf Sandhügel und an sandige Ufer, um den Sand stehend zu machen.

## §. 711.

Art. 209. Purpurrothe Weide. *S. purpurea*. Linn.

Synon. *Salix vulgaris rubens*. C. B. P. 473. ? *Salix rubra* minime fragilis, folio longo angusto. I. B. H. I.



215. *Salix monandra*, foliis glabris, lineari-lanceolatis, serratis superne coniugatis, julis tomentosis. Hall. hist. n. 1640. L'Osier rouge. Purpl. or red Willow. Hanb. - Purpurne Weide, rothe Weide, gemeine rothe Weide, rothe Bandweide, Rothweide, rothe Haarweide, rother Wilgenbaum, Schußweide, zähe Weide, rothe Bindweide.

Linn. sp. pl. II. 1444. n. 10. Pollich palat. II. 631. n. 919. Hoffmann l.c. 18. Scopoli carn. II. 256. n. 1209. Schrank bay. I. 229. n. 50 und 226. n. 45. Sudow 40. n. 11. Merdich II. 4. n. 41. und S. 23. Leonhardi 114. Borkhausen 143. v. Burgsdorfs Forsthandbuch 167. Ebenb. Holzculiur S. 192. 236. n. 568. Ehrhard III. 114. Märter 52. Becker 46. Läder IV. 373. n. 4. Dörrien 270. Münchhausen V. 299. 2.

Abbild. Hoffmann Fasc. I. T. I. f. 2. T. V. f. 1.

S. 712.

Mit schmahlen, zungenförmigen, glatten, gesägten Blättern, die unten einander gegenüber, oben abwechselnd stehen.

In Niedrigungen und feuchten Wäldern, wo sie gewöhnlich als ein Baum dritter Größe vorkommt. Die Zweige sind sehr zähe. Die Rinde ist innen schwefelgelb, aussen fand sie H. P. Schrank an ältern Zweigen glatt, glänzend, an der Nordseite grüngrau, an der Südseite rothbraun, an den jüngern Zweigen roth oft auch nur grün. Die Blätter sind schmahl, zungenförmig, fein gesägt, auf beyden Flächen glatt, oben hellgrün, unten blaulich. Die feinen Sägezähne sind mit feinen Drüsen besetzt. Die untern Blätter stehen einander gegenüber, die obern abwechselnd. An den gelben Stielen der obern Blätter findet man bisweilen zwey zugespitzte, gezahnte, den Stiel umfassende Blattansätze. Blätter und Blüten kommen aus verschiedenen Knospen \*).

D d 5

der

\*) Man könnte daraus bey den Bersten und Weiden einen neuen, beständigen Unterabtheilungsgrund nehmen:

a) Mit

der Blütenfäzchen stehen drey bis vier Deckblättchen. Die Käzchen sind auf eine Seite gerichtet und haben wolliche Schuppen. Die männlichen enthalten einen langen Staubfaden mit einem rothen Staubbeutel, und ein einfaches gelbes Honigbehältniß. Die weiblichen haben einen haarigen Fruchtknoten, zwey Staubweege mit röthlichen Narben und ein einfaches Honigbehältniß. Viele halten sie für eine Abart der vorhergehenden. Sie schickt sich gut zu Stamm- und Kopfweiden und verdiente wegen ihrer zähen Ruthen in Gegenden die Weinbau treiben, am Fuß der Weinberge gezogen zu werden.

## S. 713.

Art. 210. Mandelweide. *S. amygdalina*. Linn.

*Synon.* *Salix folio auriculato flexilis*. Razi hist. 1420. *Salix folio amygdalino, utrinque virenti aurito*. C. B. P. 473. Du Ham. n. 3. Le Saule a feuilles d'Amandier. Almond-leaved Willow. Hanb. Mandelblättrige Weide, Pfirschweide, langblättrige Wasserweide, Schlikweide, Hagerweide, Pfahlweide, Schälweide, Buschweide, gemeine Korbweide.

Linn. sp. pl. II. 1443. Pollich palat. II. 628. n. 917. Sudow 38. n. 4. Leonhardi III. Borkhausen 138. Gleditsch 5. n. 44. Märter 53. von Burgsdorf Forsthandbuch 163. Ebenb. Holzcultur 233. n. 550. Läder IV. 374. n. 6. Doerrien 269. Du Roi II. 394.

## S. 714.

Mit länglich zugespikten, glatten, drüsig-gesägten Blättern, glatten Blattstielen.

Ein ganzer Strauch, der oft ein Baum dritter Größe wird. Die Rinde der Zweige ist glatt und hellgrün. Die Blätter sind groß, glatt, länglich zugespikt; den Mandelblättern ähnlich, auf der obern Fläche dunkelgrün,  
auf

a) Mit abgesonderten Blatt- und Blütenknospen.

b) — vereinigten — — — —

auf der untern weislich, mit vielen, dunkelgefärbten Adern durchzogen. Die Zähne endigen sich in Drüsen. An den Blättern der obern Enden der Zweige finden sich kleine, längliche, gezahnte Blattansätze, die aber bisweilen, und an den untern Zweigblättern allezeit fehlen. Die Knospen sind einblättrig, braun, glänzend, an der Spitze mit kurzen, feinen Haaren besetzt. Die Schuppen der männlichen Räschen haben zwei Staubfäden und zwei dicht beisammen stehende Honigbehältnisse von ungleicher Größe. Sie giebt ein leichtes, schlechtes Brennholz; sonst nimmt man das Holz auch zu kleinen Geräthschaften und die Zweige zu Faschinen.

## §. 715.

Art. 211. Goldweide. *S. vitellina*. Linn.

Synon. *Salix lativa lutea*, folio crenato. C. B. P. 473. Du Ham. n. 18. *Salix arborea foliis ellipticis, lanceolatis subtus sericeis, dentibus crassescens*. Hall. hist. n. 1635. L'Osier jaune. Yellow or Golden Willow. Hanb. Gelbe Weide, Dotterweide, gelbe Bandweide, gelbe Kieferweide, gelbe Haarweide, Berlweide, rothe Bandweide, braune Bandweide.

Linn. sp. pl. II. 1442. Schrank bav. I. 226. n. 44. Sudow 38. n. 6. Gleditsch 4. n. 42. Leonhardi 112. Du Roi II. 393. Märter 50. Borkhausen 144. Lüder IV. 373. n. 3. Dörrien 270. Becker 45. v. Burgsdorf 8. H. 164. Ebend. Holzcultur 333. n. 549.

## §. 716.

Mit ey-lanzettförmigen, glatten Blättern, deren Rand mit knorpelartigen Sägezähnen und die Stiele mit schwüligen Punkten besetzt sind.

Ein dauerhafter Baum der zwoten Größe. Die Zweige sind schlank, dünne, mit einer dottergelben Rinde bekleidet. Nach dem Grunde, auf welchem diese Weide steht, ändert sich die Farbe der Rinde ins braune. Im Lehmenboden aber findet man diese Weide mit eben so langen, tief herabhängenden Zweigen als die babylonische. Die



Die Blätter stehen abwechselnd auf Stielen, die mit schwüligen Punkten besetzt sind. Sie sind ey- lanzettförmig, glatt, gegen die Spitze zu fein gesägt und die Sägezähne knorpelartig, oben glänzend grün, unten matt weißgrau, bisweilen auf beyden Flächen mit schwarzbraunen Punkten besetzt. Blätter und Blüten kommen aus besondern Knospen. Die Blüte erscheint im May. Die Schuppen der mänl. Käzchen enthalten zwey bis drey Staubfäden. Die Saamenkapseln sind bey der Reife braun und enthalten viele wollige Saamen.

Ab. a) *S. rubens* Schrank?

Diese Weide ist ein guter Kopfbaum, der durch seine häufigen, langen, zähen Zweige, die auf seine Cultur verwandten Kosten reichlich ersetzt: denn diese Zweige sind zu allerhand Flecht- und Korbarbeit brauchbar und werden von dem Landmann sehr gesucht, weil er recht feste Verbindungen damit machen kann, welche bey Pflügen und andern Geschirr, die Stelle der eisernen Ketten und Klammern vertreten. Auch Heckenbinder, Baumgärtner und Winzer lieben diese Zweige vor andern, weil man damit, wie mit Stricken binden kann. Ueberdies gedeiht diese Weide in allerley Grund. Besonders gut kömmt sie um die Mühlenteiche fort, und ohngeachtet sie ein sehr zähes Holz hat, wächst sie doch in einem guten Boden geschwinder als die weisse Weide.

§. 717.

Art. 212. Weisse Weide. *S. alba* Linn.

Synon. *Salix alba arborescens*. C. B. P. 471. *Salix vulgaris alba arborescens*. Du Ham. n. 1. *Salix arboorea*, foliis ellipticis, lanceolatis subtus sericeis, dentibus crassescens. Hall. hist. n. 1635. L'Osier blanc. White Willow. Hanb. I. 180. Gemeine Weide, Silberweide, Pappelweide, Kopfweide, Weidenbaum, Felber, weiser Felber, Baumweide, Felsbinger, Falsbinger, Wilgenbaum, Welge, Weicheln, zähe Weide, mürbe Weide, Silberweide, weisse Bruchweide.

Linn.

Linn. sp. pl. II. 1449. n. 31. Pollich palat. II. 639. n. 925. Scopoli carn. II. 258. Schrank bay. I. 225. n. 43. Sudow 46. n. 34. Oleditsch II. 3. n. 39. und S. 18. Leonhardi 110. Borkhausen 150. Becker 43. Märker 48. Lüber IV. 372. n. 2. Dörrien. 272. Du Roi II. 400. v. Burgsdorff J. 5. 162. Ebenb. Holzcultur 234. n. 554. Hoffmann. F. II. p. 41.

Abbild. Cramer, t. 15. Hoffmann, l. c. T. VII. VIII. f. 1. 2.

§. 718.

Mit lanzettförmig zugespikten, gesägten, auf beyden Flächen behaarten Blättern, deren untere Randa Zähne mit Drüsen besetzt sind:

Eine der gemeinsten Weidenarten, die sich besonders durch die Silberweise ihres Laubes im Sommer und Herbst unterscheidet. Man findet sie bisweilen als einen ganzen Strauch, gewöhnlich aber als einen Baum und oft von einer ausnehmenden Höhe und Stärke. Die Rinde der Aeste ist anfangs glatt und braun, im Alter wird sie dunkler und pflegt am Stamme aufzureißen. Die jungen Schüsse sind glatt und blasgrün. Die Zweige sind anfangs zähe, werden aber nach und nach brüchiger. Blätter und Blüten kommen aus besondern Knospen. Jene stehen abwechselnd auf kurzen Stielen, sind lanzettförmig zugespitzt, auf beyden Flächen, (doch auf der untern am stärksten) mit kurzen, weissen Haaren besetzt. Die untre Fläche spielt in das silberweise. In Niedrigungen werden sie bisweilen mit ganz glatten Flächen gefunden. Ihr Rand ist verlohren oder undeutlich gezahnt. Mit zunehmenden Jahren werden die Blätter steifer, erhalten auch einen dickern, rothen Rand und stärkere Zähne. Bisweilen sind sie vorwärts am Stiele mit vier schwarzen, rauhen Punkten bezeichnet. Die Sägezähne haben kleine röthliche Drüsen, welche in der Mitte des Randes besonders röthlicht sind. Blattansätze findet man nicht. Die Blütenfäzchen sind dünne, weichhaarig, wohlriechend und haben an ihrer Basis einige Deckblättchen. Die männl.



männl. sind etwas walzenförmig und haben haarige, lanzettförmige, zugespitzte Schuppen, deren jede zwey Staubfäden mit gelben Staubbeuteln enthält. Die weiblichen längern Käzchen haben in ihren Schuppen einen glatten, kurzgestielten Fruchtknoten. Der Saame mit seiner vielen Wolle fliegt im Jul. ab.

Diese Art wird sehr häufig zum Köpfen gezogen. Da aber der Stamm, besonders wenn man beim Köpfen nicht vorsichtig verfährt, leicht kernfaul wird; so ist es besser Pflanzungen von diesem Baume als Schlagholz zu behandeln. Ja, Bäume, welche nicht geköpft werden, liefern mit vierzig Jahren ein ansehnliches Baumholz, und manche dieser Stämme haben von oben bis an die Wurzel einen festen, gesunden Kern ohne die mindesten Merkmale von Fäulniß. Als Nutzholz ist das Holz wenig zu gebrauchen. Man verfertigt zwar aus dem gesunden, kernigen Stammholze Mulden, Backtröge, Reifstäbe, kleine Böttcherwaaren und andres Geräthe, welche Arbeiten aber nur wenige Dauer haben. Im Nothfall schneidet man das gesunde Stammholz zu Brettern oder verwendet es zum bauen im trocknen. In Sibirien nimmt man es nach Gmelins Bericht, zu Kähnen. Als Brennholz taugt es vorzüglich für Camine, da es wenig Rauch gibt, und leicht fortbrennt. Es gibt jedoch wenig Hitze und keine Kohlen. Die Rinde ist officinell. Man muß sie aber von drey- bis vierjährigen Aesten sammeln. Es wird auch ein Extract daraus verfertiget. Ferner wird die Rinde zum gerben des dänischen Handschuhleders genommen. In kupfernen Kesseln gekocht, giebt sie der Seide und Wolle eine hochrothe Farbe, sonst aber mit Alaun versetzt und getrocknet, eine zimmetfarbige Lacke. Die Saamenwolle wird in Japan zum ausstopfen genommen, auch eine Matte daraus verfertigt, und Hr. Pr. Herzer läßt sie auch für seine Hutmanufactur sammeln. Koning de Cortice salicis albae. Harder. 1778. Sammlung für practische Aerzte. VIII. 520. Thunberg, jap. 25. §. 719.



Art. 213. Bruchweide, *S. fragilis* Linn.  
 Synon. *Salix fragilis*. C. B. P. 474. *Salix stipulis*  
*dentatis*, foliis glabris, ovato-lanceolatis, glumis ova-  
 tis, pilosis. Hall. hist. n. 1638. *Salix folio longo lato-*  
*que splendente, fragilis*. Raj. Cat. angl. 448. Le Saule  
 fragile. Crack Willow. Brechweide, Krackweide,  
 Glasweide, spröde Weide, Krackweide, Bitterweide,  
 Fieberweide, Sprockweide, Spröckelweide, Knackerwei-  
 de, Rostweide.

Linn. sp. pl. II. 1443. Pollich palat. II. 629. Schrank  
 bav. I. 228. Suckow 39. n. 9. Gleditsch II. S. 4. n. 40.  
 und S. 21. Leonhardi 112. Borkhausen 140. Märter 49.  
 Ledeb. 44. Du Roi II. 395. Dörrien. 270. Lüber IV. 375.  
 n. 9. Wittenberger Wochenblatt IV. 80. v. Burgsdorf 8. 2.  
 164. Ebend. Holzkultur. S. 233. n. 551.

§. 720.

Mit glatten, eilanzettförmigen Blättern, deren Rand  
 mit drüsigen Sägezähnen besetzt ist, gesägt-drüsigen  
 Blattstielen.

Sie gleicht in ihrem Wuchs der vorigen Art, von  
 welcher sie vielleicht als eine Halbart angeführt werden  
 kann. Ja man findet sie zuweilen im feuchten Boden von  
 der Höhe und Dicke der stärksten Eichen. Die Rinde ist  
 an den jungen Zweigen weißlichgrün, an ältern braun-  
 roth. Die Zweige sind in den Gelenken brüchig, doch  
 sind es die ältern weniger als die jüngern. Ihr Laub  
 treibt diese Art sehr frühe und mit einem solchen Ueber-  
 fluß an Saft, daß er häufig herausfließt. Es stehen aber  
 ihre Blätter abwechselnd auf gelben, oben gerinneten Stie-  
 len, die da, wo sie sich mit dem Blatte verbinden, kur-  
 ze, drüsige Sägezähne haben. Die Blätter selbst sind von  
 dicker, fester Substanz, eilanzettförmig, auf beiden Glä-  
 chen glatt, in eine lange Spitze auslaufend und am Ran-  
 de mit drüsigen Sägezähnen besetzt. An der Basis der  
 obern Blattstiele findet man häufig zwei herzförmige  
 Blat-

**Blattanfäße.** Die Blütenfäße haben haarige, gefranzte Schuppen, und an der Basis ihres Stieles drey bis vier Deckblättchen. Die männl. Schuppen enthalten zwey Staubfäden mit gelben Staubbeuteln.

**Ab. a)** Mandelblättrige L. W. *Salix auriculata foliis serratis glabris lanceolatis omnibus alternis.* Mill. n. 9.

**Du Roi II. 391.** *Salix folio amygdalino utrinque aurito corticem abjiciens.* Du Ham. n. 219. Ihre Rinde ist gelb und sie wirft sie jährlich ab. Almond-leaved Crack. Willow. Hanb.

**Ab. b)** *Salix folio lanceolato serratis omnibus alternis.* Mill. n. 10.

**Unter allen Weiden wächst diese Art am geschwindesten.** Sie wird daher, ob gleich ihr Holz nicht von besonderer Güte ist, dennoch weil sie außer ihren schnellen Wachsthum, außerordentlich hoch und stark wird, weil sie in feuchten Boden wie im trocknen, wo andre Arten nicht fortschlagen, gedeiht, in Gegenden, wo Holzman gel ist, geschätzt. In Bruchdörfern und niedrigen Orten, wird sie häufig und mit vielem Vortheile gezogen, weil sie alle fünf Jahre eine große Menge Reißholz zum brennen und zur Haltung der Uferflechtwerke und Zäune giebt. Nur darf man sie nicht an die Ränder der Aecker und Wiesen pflanzen, weil sie die Grundstücke durch ihre, vom Wind, Regen, Schnee und Glatteis leicht abbrechenden Zweige sehr verunreinigt. Ihrer Blüte fliegen die Bienen vor andern Weidenblüten nach. Die Rinde hat Gleditsch in verschiednen hartnäckigen, chronischen Krankheiten noch besser als Quassia und China gefunden.

**Besondrer Nutzen der Bruchweidenzweige in der Berliner Samml. IV. 306.** Meyer de salicis fragilis usu medico Bü- zow 1770. Richter's chirurg. Bibl. B. VII. S. 789.

**Ab. c)** *Salix folio lanceolato serratis omnibus alternis.* Mill. n. 11.

**Art. 214.** Dreyfadige Weide, *S. triandra* Linn.

**Synon.** *Salix foliis glabris, elliptico-lanceolatis, serratis; stipulis dentatis, julis gracilibus triandris.* Hall. hist. n. 1637. *Salix triandra glabra.* Ehrh. plantag. 27.

*Salix foliis elliptico-lanceolatis, utrinque glabris, serratis, appendiculatis.* Gmelin sibir. I. 155. Le petit Saule a feuilles de Laurier. Triandrous Willow. Hanb. Buschweide, Erdweide.

Linn. sp. pl. II. 1442. Pollich. pal. II. 627. Scopoli carn. II. 259. Schrank bav. I. 227. Eudow S. 38. n. 3. Borkhausen 137. Du Roi II. 384. Miller n. 2. Gmelin sib. I. 155. Räder IV. 375. Hoffmann II. 45. Ehrhard VI. 100.

Abbild. Gmelin. l. c. Hoffmann II. T. IX. X. t. XXIII. f. 2. Gleditschens Weide n. 44. die man gewöhnlich bey dieser Art citirt, kann nicht wohl *S. triandra* seyn: Denn er sagt ausdrücklich: S. 28. Eine jede Schuppe bedeckt insbesondere vier Staubfäden.

§. 723.

Mit ey- lanzettförmigen, auf beyden Flächen glatten, oft gar nicht, oft nur leicht sägezähnigen Blättern, langen, schlanken, gelben, kaum behaarten, dreysfadigen männlichen Kätzchen.

Sie erscheint gewöhnlich nur als ein niedriger Strauch, an sumpfigen Orten. Ihre Zweige sind biegsam, fest und variiren in der Rindfarbe. Die Blätter stehen abwechselnd, sind ey-lanzettförmig, auf beyden Flächen glatt, oft gar nicht, oft nur leicht sägezähnig, hart, ziemlich lang, unten bleichgrün, mit starken gelben Adern durchzogen. Die Blattstiele sind oben gefurcht und haben bisweilen am Ende des Blattes einige kleine Drüsen, An ihrer Basis stehen herzförmige, gezähnte Blattansätze, die vor der Blüte abfallen. Die männl. Kätzchen sind lang, schlank, gelb, nicht oder kaum behaart. Die Spuhle und innre Seite der Schuppen, welche drey Staubfäden enthalten, ist behaart. Die zwey Honigbehältnisse sind von gleicher Größe. Die weibl. Kätzchen haben einenglatten Fruchtknoten, kurze, zweytheilige Staubwege. Die innre Seite der Schuppen, so wie die Spuhle sind behaart. Der in Wolle gehüllte Same fliegt im Jul. aus.

Ab. *S. triandra pubescens.* Ehrh.?

Ee

§. 724.



## §. 724.

Art. 215. Lorbeerweide. *S. polyandra* Gled.

*Synon.* *Salix laurca*. *Salix pentandra*, foliis serratis glabris flosculis pentandris. Linn. Sp. pl. II. 1442. *Salix* foliis glabris ovato-lanceolatis, petiolis glandulosis, floribus hexandris. Hall. hist. n. 1639. *Salix* folio laureo seu lato glabro odorato. Raj. hist. 1420. vulgaris rubens. C. B. P. 473. ? La Saule odorant a feuilles de Laurier. Sweet-scented Willow. Hanb. I. 180. Lorbeerblättrige Weide, wohlriechende Weide, Baumwollenweide, Streichweide, Bitterweide, Fieberweide, Schaafweide, glatte Salweide, wilde Weide.

Linn. sp. pl. II. 1442. Du Roi II. 392. Gelehrte Beiträge zu den Braunsch. Anzeigen. 1769. Euckow S. 37. n. 1. Schrank. I. 228. n. 48. Gleditsch II. 4. n. 43. und S. 24. Leonhardi 114. Norkhausen 147. Mäntz 50. Mönch 126. Püder IV. 374. n. 7. Becker 46. v. Burgsdorfs F. H. 166. Eberd. Holzcultur. S. 233. n. 548. S. 192. Ehrhard. III. 114.

Abbild. Gmelin lib. I. T. XXXIV. f. 1. Kerner. B. III. t. 263.

## §. 725.

Mit ey-lanzettförmigen, stumpfgezahnten, glatten Blättern, drüsigen Sägezähnen und Blattstielen.

Kommt als Strauch und baumartig vor. Die Rinde der Zweige ist glänzend, braunroth, an den ältern Aesten und Stämmen grau und rissig. Die Blätter sind den Lorbeerblättern ähnlich, ey-lanzettförmig, steif, am Rande mit stumpfen, drüsigen Zähnen besetzt, auf beyden Flächen glatt, auf der obern schön unkelgrün, glänzend, auf der untern matt, ins weisgraue fallend. An den jungen Stammlothen sind sie am größten und haben an ihren drüsigen Stielen, an welchen sie abwechselnd stehen, zwey sehr große Blattansätze, die sie aber mit der Zeit verlieren. Die Blätter haben einen angenehmen Geruch, der von einem feinen, harzigen, ausschweifenden Saft herrührt. Die Knospen sind beynahe so dick als an den Pap-

**Pappeln.** Unter allen Weidenarten blüht diese am spätesten, auch wird ihr Saame erst im Sept. und Oct. reif. Die männl. Kästchen sind gros, stark und haben einen erquickenden Geruch. Die rauhen, dunkelbraunen Schuppen enthalten fünf bis acht Staubfäden. Die weiblichen Kästchen sind viel dünner und länger.

Das Holz dieser Weide ist unter allen Arten das festeste, dabey zähe und fault im Stamme nicht leicht aus. Die Rinde der einjährigen Zweige wird in manchen Fällen der China substituirt. Den Blüten fliegen die Bienen häufig nach und das Laub lieben die Schaafe. Die Saamenwolle wird erst im October, nachdem sie einige Nachtreise erlitten hat, reif. Sie läßt sich ohne weitem Zusatz gut spinnen und man kann allerley Fabricate daraus verfertigen. Man gewinnt sie auf eine leichte Art. Wenn die Kästchen im October reif sind und die Wolle zeigen, werden sie eingesammelt. Man läßt sie einige Tage in der Sonne trocknen, wendet sie während dieser Zeit oft um und säubert sie mit dem Fachbogen. Das beste Wächsthum zeigt dieser Baum in Niedrigungen, in feuchten Büschen und Feldhölzern, um Wiesen, Dörfer, besonders im freyen Stande.

Schwed. Abb. VII. 51. Hartmann diss. de Salice laurea. Utrecht 769. Ejusd. diss. de virtute salicis laureae anthelmintica. Ibid. 1781.

§. 726.

Es gehören aber die Weiden unter diejenigen Holzarten, welche am weitesten verbreitet sind. Man findet sie in allerley Grund und Lage, und sie gewähren uns mancherley Nützungen, davon einige von keiner andern Holzart zu erwarten stehen. Als Brennholz bleibt ihr Holz immer eines der schlechtesten, und man kann daher ihren Anbau zu dieser Absicht nur für Gegenden anrathen, wo keine bessern Brennholzarten fortschlagen. Dagegen liefern sie für manche Gewerbe ein ganz unentbehrliches Nutzholz. Die Blüten lieben die Bienen, die Schaafe das Laub.

Die Saamenwolle mancher Arten kann mit Vortheil verarbeitet werden. Von andern dient die Rinde zum Gerben, zum färben oder in der Arzneykunst \*). Die gesunden Stämme der Baumweiden geben Bretter, die im trocknen zu mancherley Gebrauch dienen. Die kleinen Arten so wie die zähen Zweige der größern, dienen zu Flechtzäunen, Horden, Wagenzainen, Bienenkörben, Faschinen, Fischreibern und andern unentbehrlichen Artikeln, deren Verfertigung vielen Händen einträgliche Arbeit verschafft. Manches Stück Land, das sonst seinem Besitzer nichts eintrug, kann durch die Cultur dieser Holzart vortheilhaft benutzt werden. Einige Arten dienen zur Befestigung der Ufer, andre zur Dämpfung des Flugsandes. Ein mannichfaltiger Gebrauch! der diese Holzarten schätzbar und ihre Cultur wichtig macht.

S. 727.

Man kann aber die Weiden erziehen:

a) aus Saamen.

Weil aber diese Vermehrungsart der Weiden wegen des zusammenballens des wolligen Saamens, mühsam ist, das Wachsthum in etwas verzögert und die Arbeiten vermehrt werden; so pflanzt man die großen Arten

b) durch Steckstangen, die kleinen aber

c) durch die jährigen Schosse

fort. Es müssen aber solche Pflanzungen (Saliceta, Weidigte) die ersten Jahre verheegt bleiben, dann kann man das Vieh eintreiben. Zu Stammweiden schicken sich: die weiße W. Mandel-W. Gold-W. purpurrothe W. Lorbeer-W. Pflanzungen von kleinern Weiden legt man an

a) zur Dämpfung des Flugsandes — Sandwerfft, rauher Werfft. b) Zur Befestigung der Ufer —

Korbs

\*) Gunzii diss. de cortice salicis, cortici peruviano substituen-  
do. Lips. 1772. Richards med. Wochenblatt. Jahrg. II. St.  
34. Baldingers neues Magazin. VI. 227. Richters chirurg.  
Bibliothek. VI. 715. Berliner Samml. III. 525. Philosophi-  
cal Transf. LIII. 195. Wittenberger Wochenblatt. VII. S. 25.



Korbweide. c) Zu Hecken — Bachweide, dreysfadige Weide, brauner Werfft. d) Zu Bindruthen — Bachweide. e) Für Korbmacher, dergleichen Pflanzungen Knehenbette, Korbweidenbuschbette genannt werden und sich reichlich verzinsen — Korb=W. Mandel=W. Gold=W. dreysfadige W. Sandwerfft.

v. Burgsdorfs Holzcultur. S. 232. Hesse Anleitung zum Holzanbau. 164. Weismantel in seinen verm. physic. Beyträgen. St. 2. Luiders de plantatione Salicis in Thesaur. oecon. danico T. I. p. 211. Dresdner gel. Anz. 1762. St. 37. Thüringer Beitr. St. I. n. 5.

### §. 728.

Das Köpfen der Baumweiden geschieht alle drey oder vier Jahre und im Merz. Bey dieser Gelegenheit wird alles taugliche Nutzholz gleich abgesondert. Man muß aber schon bey dem ersten Köpfen, bloß die Seitenäste wegnehmen, die obern drey bis vier Gipfelstangen aber stehen lassen. Die Seitenäste selbst nimmt man nicht dicht am Stamme weg, sondern läßt drey bis vier Zoll lange Sturzeln stehen, und bey jedesmahligen Köpfen läßt man allezeit Sturzeln, doch etwas kürzer stehen. Auf diese Art werden die Weiden ungemein hoch, die stehen bleibenden Gipfelstangen sind Saftleiter, welche verhüten, daß die Stämme zerplagen und hohl werden. Die Krone wird auf diese Art größer, und man erhält mehr Brennholz: Denn die Sprossen treiben immer munter aus den jungen Sturzeln nach und man hat noch zuletzt den Stamm zu Nutzholz übrig.

Hausvater. V. 153. Journal oec. 1759. 10. Forstmagazin III. 275. 290. 297. f. Wittenberger Wochenblatt. IV. 79.

### §. 729.

Gatt. 57. Empetrum, Rauschbeere. Laubholz.

Blumendecke dreytheilig. Blumenkrone dreyblättrig. Die männliche Blüte enthält drey sehr lange Staubfäden mit zweytheiligen Staubbeuteln. Die weibliche

Blüte hat einen niedergedrückten Fruchtknoten, einen kaum bemerkbaren Staubweg und neun zurückgeschlagene Narben. Die Frucht ist eine einsährige, neunsaamige Beere.

§. 730.

Art. 216. Schwarze K. E. nigrum Linn.

Synon. Empetrum montanum fructu nigro. Tourn: inst. 579. Empetrum procumbens, foliis ovato-lanceolatis, obtusis. Hall. h. II. 279. Erica baccifera. Matth. 154. Camerarii epit. 77. Clus. Panon 29. I. B. H. I. 526. La grande Bruyère a baies noires. Procumbent Berry-bearing Heath, Black berried Heath, Crow-berries, Crake-berries Haub. Affenbeerstrauch, Apfenbeerstrauch, Apenbeerstrauch, Zppenbeerstrauch, Steinbeere, Krähenbeere, Bichtkraut, Steinheide, Beerheide, Trinkelbeere, schwarzbeerige Heide, beeren-tragende Heide.

Linn. Syst. pl. IV. 235. Suſow 55. Gleditsch II. 241. v Burgsdorf Forstb. 274. Ebend. Holzcultur. S. 83. n. 181. Lüder IV. 384. n. I.

§. 731.

Mit niederliegendem Stamm.

Ein einheimischer, niedriger, immergrüner Strauch, der in dem unfruchtbarsten Erdreich und den kältesten Gegenden fortkommt. Auf dem Brocken machen seine weit umher streichenden Wurzeln ein Hauptingredienz des Torfes aus. Außerlich hat dieser Strauch einige Aehnlichkeit mit der Heide. Man findet ihn sowohl mit Zwitterblüthen als mit ganz getrenntem Geschlechte. Bey jenen ist die Blumendecke ein, in drey ovale Einschnitte abgetheiltes Blatt, welches nicht abfällt. Die Blumenkrone besteht in drey eyrundlänglichen Blättchen. Der Staubfäden sind drey. Sie hängen fadenartig aus der Blumenkrone und haben kurze, gerade, getheilte Staubbeutel. Der Fruchtknoten ist rundlich, hat einen kaum bemerkbaren Staubweg, mit neun, verschiedentlich gekrümmten

ten aus einander stehenden Narben. Die Frucht ist eine runde, einfache Beere, von der Größe einer Erbse, und bey ihrer Reife im August schwarz. Saamen fünf bis sechs, keimen erst nach acht Monathen. Die Stengel haben eine rothbraune Rinde, liegen darnieder. Die Blätter stehen sehr dicht um die Stengel herum, sind klein und einigermassen den Thymianblättern ähnlich.

Die Beere werden von allerhand Vögeln aufgesucht. Besonders ziehen ihnen Birkhüner so sehr nach, daß man sie da, wo dieser Strauch häufig wächst, meistens antrifft. Ehemahls beschuldigte man die Beere böser Eigenschaften, und versicherte, daß sie den Kopf einnahmen und Schwindel verursachten, daß die Leute durch ihren Genuß närrisch würden, so daß sie sich wie Affen gebährdeten, weswegen man sie auch auf dem Harz Alpenbeere genannt hat. Aber im Herzogthum Verden, wo dieser Strauch ziemlich häufig wächst, werden die Beere zum öftern von Kindern gegessen und zwar immer ohne den mindesten Nachtheil. Das Alaundecoet der Beere färbt Wolle und Garn braunroth.

Ehrhards Beytr.. III. 130.

§. 732.

Gatt. 58. Cornus, Cornelbaum. Laubh. sommergr.

Art. 217. Gemeiner C. C. mascula. Pallas.

Synon. Cornus Dioscoridis Lobel. obs. 591. Cornus mas Linn. Cornus silvestris mas. C. B. P. 447. Cornus mas pumilis. Clus. hist. I. 13. Cornus arborea, umbellis involucrum aequantibus. Hall. hist. 815. Le Cornier. Cornelian Cherry - tree. Hanb. I. 28. 108. Cornelkirschenbaum, Cornelkirschenstrauch, Corneliuskirschen, Corle, Caneelbeerstrauch, Corniolen, Kornlebaum, Kornerbaum, Kurbeerbaum, Hornkirsche, Herlige, Horlskenbeerstaude, Hörlicken, Dirlikenstrauch, Zierlen, Thirleinbaum, Dörlingsbaum, Dorlenstrauch, Dorlen, Dierlein, Dierlig, Dierling, Dientel, Zierferlenstrauch, Fürwigel, welscher Kirschbaum.

E e 4

Linn.



Linn. sp. Pl. I. 171. Pallas ross. I. 117. Schrank bavar. I. 405. Sukow 61. n. 1. Gleditsch II. 114. n. 61. und S. 116. Leonhardi 116. Du Roi I. 169. Märter 115. v. Burgsdorf 8. 5. 202. Ebend. Holzcultur 59. Lüder I. 174. Du Ham. I. 132.

Abbild. Kerner I. t. 4. Delhafen II. t. 32. 33.

S. 733.

Die länglich zugespitzten Blättern und Blumenschirmen, welche so lang als die gemeinschaftliche, vierblättrige Hülle sind.

Ein sommergrüner Strauch, der auch als Baum vorkommt. Die Stammrinde ist schwarzgrün und rauh. Die Blätter stehen auf kurzen Stielen einander gegenüber sind länglich zugespitzt, glattrandig, oben dunkelgrün, glänzend, glatt, unten hellgrün mit vielen erhabenen, bogenförmig laufenden Adern durchzogen. Sie brechen zu Ende des Mayes aus, fallen in der Mitte des Oct. ab. Die kleinen, goldgelben Blumen erscheinen (hier) im Februar. Sie stehen zu funfzehn bis sechs und zwanzig neben einander in Schirmen, auf dünnen, grünlichen, behaarten Stielen, die sich nach erfolgter Befruchtung verlängern. Die Blumenkrone besteht aus vier (bisweilen aus drey) länglich zugespitzten, zurückgebogenen, gelblichen Blättern. Staubfäden vier auch drey mit blasgelben Staubbeuteln. Die Blumendecke ist klein, vierzahnig, abfallend. Die sogenannte gemeinschaftliche Hülle ist so lang als der Schirm und vierblättrig. Staubweeg einer und so wie seine Narbe grün. Die Früchte sind länglich, auf beyden Seiten stumpfrunde, anfangs grüne, bey ihrer Reife im Sept. glänzendrothe Kirschen. Man findet Bäume

- a) mit meist männlichen b) andre mit meist weiblichen und nur wenigen Zwitterblüten, c) mit blos männlichen und weiblichen d) mit männlichen, weiblichen und Zwitterblüten.

Ab. a) mit gesenktem Laub. b) mit wachsfarbiger Frucht.

S. 734.

## §. 734.

Diese Holzart empfiehlt sich zu sehr schönen Hecken in einem frischen, aus Lehmen mit Dammerde gemischten Boden, die dem Raupenfraß nicht unterworfen sind. Sie kann aber auch zu einem ansehnlichen Baum in Obstgärten gezogen werden. Rinde, Zweige und Blätter in gleichen die unreifen Früchte sind zum Ledergerben brauchbar. Die kurz nach dem Ausbruch gepflückten und im Schatten getrockneten Blätter geben einen angenehmen schmeckenden Thee. Die Früchte sind reif und frisch genossen verstopfend. Manche pflücken sie noch grün und machen sie in Salzwasser mit Lorbeerblättern und Fenchel ein, wo sie dann wie Oliven genossen werden. Die reifen Früchte macht man mit Zucker oder Honig ein, oder gebraucht sie zu Gallerten. Durch die Gährung erhält man von ihnen ein weinartiges Getränk. Das Holz ist sehr fest, zähe und besser als von der folgenden Art. Man verarbeitet es zu Arthelmen, Radkämmen, Speichen, Hammerstielen u. d. gl. Auch giebt es die besten hölzernen Nägel. Den Blüten fliegen die Bienen nach.

v. Münchhausen III. 404. Ehrhards Ventr. III. 177.

## §. 735.

Art. 218. Rother Hartriegel. *C. sanguinea*. Linn.

*Synon.* *Cornus foemina*. *C. B. P.* 447. *Cornus arborea umbellis* (Cymis) nudis. Hall. hist. n. 816. *Virga sanguinea* Matth. et Dod. P. 782. *Corniolus*. Schwenckf. Cat. filif. 56. *Oslea* Rupp. jen. Sanguis. Crescent. Le Bois Punais, le Cournouiller sanguin. Common Dogwood. Hanb. I. 108. Wilder Kornelbaum, Hartriegel, Weinholz, Hartwiede, Hartstrauch, Hartbaum, Harten, Röhern, Hartröhern, Rothgerten, roth Weinholz, Heckenbaum, Hundsheerstrauch, Teuffelsbeere, Teuffelsmettern, Hartreder, wilde Dürliche.

Linn. sp. pl. I. 171. Pollich palat. I. 163. Moench. haff. I. 70. Pallas ross. I. 117. Schrank. bavar. I. 407. Ehrhard

III. 15. Suckow 62. 3. Scopoli carn. I. 112. Gleditsch II. 115. n. 62 und S. 119. Leonhardi 118. Borkhausen 225. Märter 118. Lüder I. 175. n. 3. Du Roi I. 162. v. Burgsdorf F. H. 204. Ebend. Holzcultur I. 200. 108. II. 60. n. 128. Becker 57. Hausvater V. 297. Du Ham. I. 132.

Abbild. Lobel. obs. 592. Tabernaemont. 1459.

§. 736.

Mit eyförmig zugespikten, glattrandigen Blättern, aufrechtstehenden, am Ende unbelaubten Zweigen, hüllenlosen Blüten.

In Deutschland und Nordamerika. Die Rinde ist an alten Stämmen weißgrau und rissig, an den jungen Zweigen im Sommer grün, im Winter blutroth. Die Blätter stehen an den Zweigen einander gegenüber, sind eyförmig zugespitzt, glattrandig, unten mit feinen, weißen Haaren besetzt und mit erhabnen, bogenförmigen Adern durchzogen, werden im Herbst blutroth. Die Blattstiele sind glatt, oben gefurcht. Die Blüten erscheinen (hier) im Junius in flachen Schirmen. Man findet ihn

a) mit Zwitterblüten, b) mit männlichen und auch weiblichen unter Zwitterblüten.

Die Blumendecke ist klein, vierzahnig, abfallend, weißgrünlich. Die Blumenkrone sitzt auf dem Fruchtknoten, hat vier weiße Blätter. Staubfäden vier auch fünf mit blaßgelben Staubbeuteln, Staubweeg einer, weißlich, die Narbe grün. Die Beere sind von der Größe einer Erbse, ganz rund, erst grün, bey ihrer Reife im Sept. schwarz, unesbar, enthalten in einem grünen Fleisch, einen runden, geribbten Stein.

Ab. a) Mit scheckigem Laub. v. Burgsdorfs Holzcultur II. 61. n. 129. Suckow l. c. b) Mit weißen Beeren. Gmelin sibir. III. 163. c) Mit blauen Beeren. Gmelin sibir. III. 163. d) Mit rothen Beeren. Hausvater V. 174.

§. 737.



## §. 737.

Das Holz dieses Strauchs ist hart und zähe, bricht und spaltet nicht und läßt sich gut bearbeiten. Es ist zu allerhand mittlern und kleinen Nutzholz brauchbar, giebt kleine Speichen und Rämme zu kleinem Räderwerk, wie auch Speiler für die Schlächter. Die langen und geraden Schosse geben gute Tabacksröhren. Die feinen Ruthen nehmen die Winzer in manchen Gegenden statt der Bandweiden, die stärkern Zweige dienen zu Reiffstäben. Aus den Saamenkernen der reifen Beere soll das gemeine Volk in Trient, nach Matthiolus, vermittelst des Kochens in Wasser und nachherigen auspressens derselben, ein Brennöl bereiten.

Evelyn will dieses von den Früchten des Spindelbaums verstanden wissen. Aber Arduino erhielt gleichfalls aus den Kernen Oehl, Leipz. Intell. 1769. St. 43.

## §. 738.

Gatt. Rhamnus. S. oben §. 109.

Art. 219. Gemeiner Kreuzdorn. *R. catharticus*. Linn.  
*Synon.* *Rhamnus solutivus*. Dodon. P. 784. *Spina infectoria* Camer. epit. 82. *Cervispina* Cordi et Tragi, *Rhamnus foliis spinosis, ovato-lanceolatis serratis*. Hall. h. n. 824. Le Nerprun, Bourguepine. Buckthorn, Purging-Thorn. Hanb. I. 165. Hirschdorn, Hirsedorn, Hundsholz, Farbedorn, Wegdorn, Stechdorn, Purgierdorn, Wiedorn, Wehdorn, Wochenbeerndorn, Hundsbere, Bersenstrauch, Berstenbeerstrauch, Schießbeere, Schlagbeere, Rheinbeere, Kreuzbeere, Amselbeerndorn, Gelbbeere, Hundebaumholz, Farbbeere, Farbeförner, Dintenbeer, Kreuzbeere, Blasen grün.

Linn. Sp. Pl. I. 279. Pollich palat. I. 229. Moench hass. I. 105. Scopoli I. 162. Schrank bav. I. 497. Sudow 107. Gleditsch II. 212. Leonhardi 128. Borkhausen 229. Du Roi II. 282. Dörrien 262. Märter 156. Du Ham. II. 167. Linder I. 382. Medicus bot. Beob. 1782. 318. Becker 55. Hausvater

vater V. 289. von Burgsdorf F. H. 215. Ebenb. Holz-Cultur I. 101, 108. 187. II. 209. n. 457.

Abbild. Ic, pl. medic. t. 203. Cramer t. 35.

### §. 739.

Mit eyrunden, fein gekerbten Blättern, aufrechtem Stamm und Zweigen, die sich in einen gerade stehenden, spitzigen Dorn endigen.

Ein sommergrüner, einheimischer Strauch, der bisweilen als ein mittelmäßiger Baum vorkommt. Die Rinde ist glatt und dunkelbraun. Die Spitzen der Nebenzweige endigen sich in spitzige Dornen. Die Wurzel wuchert sehr und treibt häufige Lohden. Die Blätter stehen bald abwechselnd, bald einander gegenüber, brechen im April aus, fallen im October ab. Sie sind eyrund, fein gekerbt, auf der untern Fläche mit weissen, bogenförmigen Adern durchzogen. Die Blüten sind klein, grünlichgelb, erscheinen im May gegen das Ende der Zweige hin, in dichten, wirbelförmigen Büscheln aus den Achseln der Blätter. Die Blumendecke ist vierspaltig, der Staubfäden sind vier. Staubweeg, einer mit viertheiliger Narbe. Die Früchte reifen im October, sind rund, glänzend schwarz, enthalten in einem saftigen, grünen Fleisch vier harte, schwarzbraune, fast dreieckige Samenkerne mit weissem Mark. Man findet

- a) Stämme mit ganz getrenntem Geschlecht.
- b) Mit Zwitter und männlichen Blüten.

### §. 740.

Diese Holzart dient zu lebendigen Hecken in frischem, leichtem Boden. Das Holz ist nach dem Eichenholz eines der härtesten und schönsten Nuzhölzer. Es läßt sich sehr gut glätten und fein bearbeiten und dient nebst der Wurzel und Maser zu Fournierarbeiten, Stockknöpfen, Tabacksköpfen und andern feinen Dreherwaaren. Auch ist es seiner Härte wegen, unter dem Buschholze, mit wel-

welchem es alle acht bis zehn Jahre abgetrieben werden kann, ein sehr gutes Brennholz. Die Früchte haben einen sehr wichtigen Nutzen in der Färbekunst, indem Wollé und Cassian damit gefärbt wird. Auch wird daraus das Cassi- oder Blasengrün bereitet.

Berliner Samml. V. 601. Journal oecon. 1762. Baricellus de spinæ Infectoriae baccis ad tenebrum remedio. in Hortulo geniali. S. 45. Linne (schwed. Abhandl. 1742. 31. Oledisch Abhandl. III. 361. II. 420. Holmberger in den schwed. Abhandl. 1779. Sieffert II. 74. Hamburger Magaz. XXIV. 585.

## §. 741.

Art. 220. Alpen-Kreuzdorn. *R. alpinus*.

Synon. *Frangula latifolia* foliis lanceolatis rugosis. Mill. n. 2. *Frangula rugosior et amplior folio*. Du Ham. I. 177. n. 2. L'Aune noire baccifere a grandes feuilles. Rough-leaved Alpine *Frangula* or Berry-bearing Alder. Hanb. I. 166. Alpen-Faulbaum, Alpen-Wegebarn.

Linn. sp. pl. I. 280. Scopoli carn. I 163. Moench hass. I. 106. Sudow I. 110. Borkhausen 233. Luder I. 385. von Burgsdorfs Holzcultur 210. n. 458.

## §. 742.

Dornlos, mit eyrunden, meistens doppelt gekerbten Blättern.

In den Feldhecken, auf dürrén Sandhügeln und Gebirgen. Ein einheimischer, sommergrüner Strauch. Die Blätter stehen abwechselnd, sind eyrund zugespitzt, kurzgestielt, scharf und meistens doppelt gekerbt, runzlicht. Die Dornen fehlen. Staubfäden vier. Staubweg einer mit dreyspaltiger Narbe. Geschlechtsdecke vierspaltig. Man findet ihn

a) mit blos männlichen Blüten. b) mit Zwitterblüten. c) mit Zwitter und männlichen Blüten.

Ab. a) Mit glatten Blättern. Smooth-leaved Alpine *Frangula*.

## §. 743.



§. 743. Gatt. 59. Morus. Maulbeerbaum. Sommergrünes Laubholz.

Blütenstand; Kätzchen. Geschlechtsdecke, nur eine, bey den männlichen Blüten vierspaltig, bey den weiblichen vierblättrig. Staubfäden vier, Staubweege zwey. Frucht, eine saftige Beerenfrucht, die aus mehreren einsaamigen, dicht an einander sitzenden Beeren zusammengesetzt ist. Die Geschlechter sind halb oder ganz getrennt.

§. 744.

Art. 221. Weiser M. M. alba. Linn.

Synon. Morus fructu albo. C. B. P. 459. Morus foliis scabris, semitrilobis et cordatis. Hall. hist. n. 1611. Morus fructu albo minori insulso. Du Ham. n. 3. Le Murier a fruit blanc. White Mulberry. Hanb. I. 21. 147.

Linn. sp. pl. I. 1398. Scopoli carn. II. 253. Schrank bay. I. 422. Märter III. Cuckow 75, Borkhausen 293. Du Roi I. 437. Miller III. 219. n. 4. Du Ham. II. 20. Mönch's Verzeichniß 62. Luder IV. 270. Lidbeck diff. de Moro alba. Lund. 1777. 4. Eph. nat. cur. Dec. II. an. IX. S. 212. Schwed. akad. Abhandl. XXXVIII. 147.

Abbild. Kerner II. t. 120.

§. 745.

Mit langen, glatten, oft schiefen, herz- und geigenförmigen Blättern.

Waterland. Schina. Seine Höhe ist nach dem Boden, worinnen er steht, und nach der Wartung, welche man ihm angedeihen läßt, verschieden. Die Blätter sind glatt und lang. Ihre Gestalt ist aber sehr verschieden. Manche sind schief, andre herzförmig, manche geigenförmig, wiederum andre in drey Lappen getheilt, davon die Seitenstücke wiederum bis zur Hälfte eingeschnitten, manche aber auch ungetheilt sind. Die Früchte sind nach haltener Reife weiß, eckelhaft süß. Die Rinde ist aschgrau,

grau, das Holz weißgelblich und ziemlich hart. Das Laub dieses Baumes liefert bekanntlich das beste Futter für die Seidenraupen. Der Baum selbst ist gar nicht zärtlich, indem er in einem mageren Sandboden im freyen Stande wohl gedeiht, wenn er nur in den ersten Jahren Schutz und in den folgenden die gehörige Wartung genießt. Männer von Einsicht haben ihn daher sogar für die Lüneburger Heide empfohlen. Das Holz zeigt sich im Wasser ungemein dauerhaft. Es taugt zu allerhand feinen Dreher- und Tischlerarbeiten. Nach Du Hamel werden in Avignon und Provence Bronneneymer und Weinfässer daraus verfertigt. Man verarbeitet es auch zu Kaufmannskisten und Packfässern. Die jungen Zweige und Schößlinge hat man in eine alkalische Lauge geweicht und alsdann wie Hanf bearbeitet \*).

1) Ehrhard III. 179. IV. 34. Fleischmann über die Erziehung der Maulbeerheiden, Dresden 1783. Kreßschmarz Maulbeerplantage, 1744. Memoire instructif sur les Pepinieres des Meuriers blanc, a Berlin 1745. Kurze Anweisung wie die Maulbeerbäume von dem Saamen gezogen, gepflanzt und gewartet werden sollen, Stuttgart 1749. Deutliche Anweisung, wie mit Säung des Maulbeersaamens, Pflanzung und Wartung der Maulbeerbäume zu verfahren, Berl. 1751. Anweisung wie mit der Wartung der Maulbeerbäume zu verfahren. Auf Königl. Preussischen Befehl publicirt, Berlin 1751. Reglement für die Prediger u. wegen Pflanzung der Maulbeerbäume, 1752. Anmerkungen von geschwinde Beförderung der Maulbeerplantagen, Berlin 1757. Gadd Cultura Mori, 1760. Unterricht von Pflanzung des Maulbeersbaumes, Leipzig 1763. B. des Sauvages de la Cultur des Meuriers, a Nîmes 1763. Thome Memoires sur la culture du Meurier blanc, a Lyon 1763. a Yverdon. 1765. Thome Memoires sur la maniere d'élever des Vers a Soie et de cultiver les Meuriers blancs, a Lyon. 1767. Bolet Essais sur la culture du Meurier blanc. Dyon 1766. Des Blas Traité des Meuriers etc. a Paris 1769. Schwed. akad. Abhandl. 1753. 286. 1754. 221. Zinzens Leipziger Samml. B. II. S. 1032.

\*) Hesses Darmst. Landzeitung 1792. N. 33.

1032. B. IV. 215. B. VIII. 621. Meschini della stagione di potare i Gelsi e della loro Moria. Verona. 1774. Denso phys. Briefe, B. I. S. 39. Physic. Belustigungen, St. 27. S. 1251. 1295. Journal oecon. 1751. S. 52. Natur und Kunst-Cabinet I. 367. Allgemeines Magazin VI. 333. Journal oecon. 1761. S. 401. 1762. S. 451. Stuttg. phys. ökon. Auszüge II. 234. Phys. ökon. Patriot. I. 404. Schles. ökon. Samml. I. 209. 216. Handbr. Samml. 1756. S. 1346. Ökon. Nachrichten VII. 881. Realzeitung 1756. 575. Jen. Frag und Anzeige 1752. 103. Nachr. der schles. patr. Gesellschaft, III. 182. IV. 92. Wittenb. Wochenblatt. X. 81. 371. 380. Dremes neue Vorschläge die Maulbeersbaumzucht mit Erfolg und Vortheil zu betreiben, Breslau 1783. Ökon. technol. Abhandlung über die syrische Seidenpflanze und den weissen Maulbeerbaum, von F. G. Krieser, Breslau 1791. Ueber die Cultur des Maulbeerbaumes in Deutschland, Berlin 1790.

2) Aus dem vorigen Jahrhunderte gehören hieher: B. L. de Beauthor. Le naturel et profit admirable du Murier etc. a Paris 1604. Benigne le Roi etc. Instruction du plantage et propriété des Muriers, a Paris 1605. Instruction for the increasing of mulberry trees, London 1609. Kaysers Unterricht, wie die Maulbeerbäume in Deutschland zu kultiviren, Wien 1669. F. Donnius de serendis, plantandis et putandis Moris instructio, 1690.

3) Von den Krankheiten der Maulbeerbäume. Della Idropisia de Gelsi. Montani. 1767. Loccatelli diss. su la corrente malattia de' Gelsi. Verona 1773. Albati dell' epidemica mortalità d'Gelsi, Salo. 1773. Scopoli de lue epidemica Mori albae in seinem Anno hist. nat. IV. 115 und 120. Giornale d'Italia. VII. VIII. XI. Montet de morbo qui in Dioecesi Alais Moros albas devastavit. Acad. reg. Paris. 1762.

4) Von Nuzung der Rinde. Opuscules de Pierre Richer de Belleval, avec un traité d'Olivier de Serres sur la maniere de travailler l'écorce du Murier blanc, a Paris 1785. Beckmanns ökon. phys. Bibl. XIV. 79.

§. 746.

Art. 222. Rother M. *M. rubra*. Linn.

Synon. *Morus virginienensis arbor*, *Loti arboris inflata romosa*, *foliis amplissimis*. Du Ham. n. 7. Le Murier de



de Virginie. Virginian Mulberry. Hanb. I. 148. the red Mulberry Tree. Wang. 37.

Linn. sp. pl. II. 1399. Schrank bavar. I. 422. Eudora 76. Borkhausen 295. Marshal 170. von Wangenheim 37. Du Roi I. 430. Müncchs Verzeichniß 63. Lüder IV. 271. Miller n. 3. Schoepff. 136.

Abbild. v. Wangenheim F. XXIV.

§. 747.

Mit herzförmigen, unten filzigen Blättern, walzenförmigen Blütenkästchen.

Er stammt aus Virginien, und kommt in einer südlichen Lage und in einem beschützten Stand auch bey uns gut fort. Die Blätter sind herzförmig, bisweilen zwey, drey und mehr lappig, scharf gezahnt, auf der untern Fläche kurz behaart, und an männlichen Bäumen am größten. Die Blüten erscheinen in walzenförmigen Kästchen, die unsern Birkenkästchen gleichen. Die Früchte sind groß, bey ihrer Reife dunkelpurpurroth. Man findet Bäume mit

- a) bloß männlichen Blüten, b) und andre mit männlichen und weiblichen.

§. 748.

Da der weisse Mulbeerbaum durch späte Fröste oft hart mitgenommen, und dadurch der Seidenbau beträchtlich gehemmt wird, so ist dieser dauerhaftere Baum, besonders schätzbar. Seine Blätter sind auch größer, welches das einsammeln beschleunigt, und wegen ihres stärkern Bestandwesens werden sie nicht sobald welk. Die Seidenraupen fressen sie gerne, und ob sie gleich gröber und härter als vom weissen Maulbeerbaume sind: so geben doch die damit gefütterten Raupen eine starke, feine Seide. Das Holz giebt sehr dauerhafte Zaunpfähle. Es ist fest, hochgelb und nimmt eine treffliche Politur an. Besonders werden die gemaserten Stücke gesucht. Die großen Früchte haben einen sehr angenehmen Geschmack.

§ f

§. 749.

§. 749.

Art. 223. Tatarischer M. *M. tatarica*. Linn.*Synon.* Le Murier de Tartarie. The Tatarian-Mulberry.

Suckow 77. Mönchs Verzeichniß 64. Miller n. 7.

Mit eyrund länglichen, gleichseitigen, gleichförmig gezahnten Blättern.

Er wächst an den Ufern der Wolga und Tanais. Heintzelmann traf ihn auch bey Azov in den Wäldern an. Da nun daselbst die Kälte strenger als in Schweden ist; so ist gar kein Zweifel, daß er auch bey uns fortkommen würde. Zur Cultur aber empfiehlt er sich vor allen Arten dieser Gattung: denn

- a) er ist von dauerhafter Natur, b) seine Früchte sind so gut als die Früchte des schwarzen Maulbeerbaumes, c) und seine Blätter liefern den Seidenraupen ein vorzüglich gutes Futter.

§. 750.

Gatt. 60. Viscum. Mistel. Schmarozer-Holzart.

Art. 224. Weißer M. *V. album*. Linn.

*Synon.* Viscum Tabern. 1376. Viscum baccis albis. C. B. P. 423. Viscum foliis lanceolatis, obtusis, caule, dichotomo, glomeribus (spicis) axillaribus. Hall. hist. n. 1609. White Mistle, Mistletoe. Hanb. I. 248. Mistel, Mispel, Kenster, Künster, Kinstel, Affolter, Affelster, Marentafen, Heil aller Schaden, gemeiner Mistel, gemeine Mistel.

Linn. Sp. pl. II. 1451. Pollich palat. II. 641. Scopoli. carn. II. 261. Schrank bauar. I. 408. Suckow 81. Leonhardi 140. Gleditsch II. 132. Workhausen 277. Ehrhard I. 122. III. 28. IV. 177. V. 53. Du Hamel II. 266. Miller IV. 635. Forst-Magazin I. 110. Märter 210. Räder IV. 381. Dörrien 277. Berner Abhandl. 1763. II. 21. Baier diff. de Visco. Altd. 1706. Colbatch's diff. concerning Mistletoe. Lond. 1725. franz. Paris 1729, deutsch, Altenb. 1748. und

und 1758. mit Zusätzen. Altenburg 1776. nach der sechsten englischen Auflage, Amsterdam und Leipzig 1746. mit Beyträgen ab Indagine. Ebend. 1771. Koelderer diff. de Visco. Argent. 1747. Scaliger exercit. de Subtil. 554. Du Hamel Obs. sur le Guy. Acad. Reg. Paris. 1740. Kleinere Schriften der Leipz. ökon. Societät 1778. Frankf. Samml. IV. 524. Philos. Transf. n. 397. p. 215. n. 405. p. 547. Camerarii Sylloge Mem. Cent. V. 319. Eph. nat. cur. Dec. III. ann. I. 173. an. V. VI. 264. ann. IV. app. 49. Dec. II. an. VI. 361. an. II. 263. v. Burgsdorfs Forsth. 264.

Wächst auf Eichen, Kiefern, Apfel- und Birnbäumen. Der Stengel ist strauchartig, rund und rauh, die Aeste sind sperrig und stehen einander paarweise gegenüber. Man findet den Mistel mit

a) ganz getrenntem und b) halb getrenntem Geschlechte.

Die männliche Blüte hat eine einzige, vier oder fünfspaltige Geschlechtsdecke. Staubfäden fehlen. Vier Staubbeutel sind an die Geschlechtsdecke angewachsen. Die weibliche Blüte hat gleichfalls nur eine einzige, vier bis fünfspaltige Geschlechtsdecke, welche über dem Fruchtknoten sitzt. Staubwege fehlen. Eine einzige Narbe sitzt unmittelbar auf dem Fruchtknoten. Die weiblichen Blüten erscheinen in den Achseln der Blätter und in den Spitzen der Zweige, die männlichen blos an letztern. Die Wurzel dringt durch die Rinde der Zweige bis auf den Splint. Die Beere ist bey ihrer Reife weiß und enthält einen flebrigen Saft.

Abbild. Cramer t. 46.

§. 751.

Die Fortpflanzung dieses Schmarogergewächses geschieht durch die Beere, welche die Vögel in ihren Excrementen, die man zuweilen in ellenlangen Fäden an den Aesten hängen sieht, auf die Bäume bringen. Man kann ihn aber auch selbst ziehen, wenn man wirklich be-

§ f 2

frucht-



fruchtete Beere auf glatte Baumzweige zerdrückt, nur in die Rigen alter Bäume darf man sie nicht legen. Die Bauern und Schäfer brechen den Mistel in langen Wintern zum Futter für Kühe und Schaafe. Sonst braucht man ihn auch in der Arzneykunst und die Beere zu Vogel-leim.

Buchwald diff. Analysis Visci eiusque usus in diversis morbis. Hafn. 1753. Pfuindel de spasms Visco albo persanatis. Ienae 1783. Lebenwald de Visci querni admiranda virtute. Eph. Nat. Cur. Dec. II. An. II. S. 263. Ehrhart de Visci querni operandi modo in morbis convulsivis. ibid. Vol. VIII. 334. Jacobi von der Kraft des Mistels in der Epilepsie. in Vogels medic. Bibl. B. I. 363. Weismann Usus decocti Visci querni polychrestus. Eph. Nat. Cur. Vol. I. 422. Liselein Versuche mit dem Mistelharze in Crells chemischen Entdeck. VII. 58. Cartheuser examen chemicum Visci betulini. in Act. Mogunt. T. II. 361. Gleditsch vollst. Geschichte der Pflanzen I. 254. Ebend. vermischte Abhandl. I. 219.

### §. 752.

Gatt. Ribes. S. oben §. 120.

Art. 225. Alpen-Johannisbeere. *R. alpinum*, Linn.

Synon. *Ribes alpinus dulcis*. I. B. H. II. 298. *Ribes dulce* Clusii et insipidum. Schwenckf. Cat. files. 182. *Ribes montanum oxyacanthae sapore*. C. B. prodr. 160. *Ribes inerme*, floribus planis, bracteis florum longitudine. Hall. hist. n. 817. Le Groseiller a grappes et a fruit doux. Alpine Courrant. Rethbeerstrauch, Bergjohannisbeerstrauch, wild Johannissträublein, Passelbeere, Straußbeere, falscher Corinthenstrauch, kleiner, glatter Bergjohannisbeerstrauch mit Stachelbeerlaub, falscher Corintierstrauch.

Linn. sp. pl. I. 291. Pollich pal. I. 234. Moench. haff. I. 109. Schrank. bavar. I. 503. Sudow 120. Gleditsch II. 244. Borkhausen 270. Märter 153. Ehrhard I. 139. Du Roi II. 313. v. Burgsdorfs Forstb. 239. Ebend. Holzcultur 219. n. 475.

Abbild. Cramer t. 38.

### §. 753.

## §. 753.

Mit rundlichen, gezahnt eckigen, unten filzigen Blättern.

In dichten Hecken, Weinbergen, Ruinen, mittlern Gebirgen. Blüht im April. Ein niedriger Strauch. Die Blätter stehen abwechselnd, sind den Blättern unsers Weisdorns ähnlich, variiren aber sehr in ihrer Gestalt, kommen jedoch darinnen mit einander überein, daß sie am Rande gezahnt, auf der obern Fläche hellgrün und glatt, auf der untern mit weisem Filz überzogen sind, der sich mit ihrem Alter verliert. Die Blattstiele sind kurz, oben gefurcht, etwas behaart. Die Blättchen der Blumen- decke sind grünlich, die der Blumenkrone röthlich. Die Blüten sind mit einem Deckblättchen versehen, welches zugespitzt und größer als die Blüte ist. Die Beere ist klein, weisröthlich, fünfsaamig. Man findet diesen Strauch;

a) mit-Zwitterblüten, b) häufiger mit ganz getrenntem Geschlecht.

Das Holz dieses Strauches wird in Schweden, wo er vielleicht größer als bey uns wird, zu Harkenzähnen gebraucht, außerdem legt man auch Gartenhecken davon an.

## §. 754.

Gatt. 61. Fraxinus. Esche. Sommergrünes Laubholz.

Art. 226. Gemeine E. F. excelsior. Linn.

Synon. Fraxinus apetala, foliis pinnatis ferratis. Hall. hist. n. 528. Fraxinus excelsa. Thunberg. jap. 23. Fraxinus. j. hist. 1131. Le Frene commun. Common Ash. Hall. I. 122. Asche, Eschern, Eschbaum, Aschbaum, Edelesche, Waldescher, Steinesche, Langaspe, Wundholzbaum, Geißbaum, Vogelzungenbaum.

Sowohl der Geschlechtsstand als der Blütenbau wechseln bey dieser Gattung so häufig ab, daß sich nichts allgemeines darüber angeben läßt. Das einzige Charakteri-

sche Merkmal der Gattung sind die Knospen, welche bey allen Arten aufgetrieben und schwarz sind.

Linn. sp. pl. II. 1509. Pollich II. 664. Scopoli carn. II. 281. Schrank bavar. I. 223. Sudow 50. Gleditsch I. 209. Leonhardi 176. Borkhausen 339. Märter 38. Dörrien 258. Du Roi. I. 278. Lüder IV. 459. Ehrhard III. 73. VI. 40. 41. v. Burgsdorfs Forsthandbuch 139. Ebend. Holzcultur. I. 98. II. 94. Schrebers neue Cameralschriften II. 463. Du Hamel I. 178. Medicus bot. Beob. 1782. 201. Becker 21. v. Brode Forstwissenschaft. Leipz. 1768. I. 89 — 92. 298 — 303. IV. 410 — 412. Schröders Beschreibung des Eschenbaums, Frankf. a. d. D. 1700. Doebels Anmerkungen vom Eschenbaum in den ökon. Nachr. V. 612. VIII. 57. Meese de Fraxino.

Abbild. Delhafen II. 16. 17. Cramer t. 8. Blackwell. t. 328.

§. 755.

Unsre Esche erwächst mit sechzig bis siebenzig Jahren, zu einem ansehnlichen Baum, der bisweilen eine ausnehmende Höhe erreicht. Nach dieser Zeit fängt sie von innen an einzugehen. Ihr Stamm ist gerade und glatt. Die Aeste und Zweige stehen ziemlich regelmäßig von einander ab, und man findet sie in einem fetten Boden dicht belaubt. Ihre stumpfen, dicken, weichen, saftreichen Enden machen den Baum, so lange er noch unbelaubt ist, kenntlich. Man findet sie bey uns inn- und außerhalb der Wälder in allerley Lagen und Boden. Ihre Wurzel geht vier Fuß tief, und die starken Wurzeln breiten sich sechs Fuß weit aus. Die Rinde ist aschfarbigbraun, dick, schwarz, bleibt bis in das dreßzigste Jahr glatt, dann fängt sie an Risse zu bekommen, die von Jahr zu Jahr stärker werden. Die Blätter sind ungleich gefiedert, brechen im May aus, fallen in der Mitte des Octobers ab, und hinterlassen einander gegenüber stehende, schwarze Knospen, die Blättchen, deren sieben bis dreyzehn sind, sind länglicht zugespitzt, gezahnt, klein, stehen an dem sechs Zoll langen Stiele einander gegenüber. Ihre untere Fläche ist heller und glatter als die obere



obere und der Länge nach mit einer weissen Ader bezeichnet. In manchen Jahren werden sie von den spanischen Fliegen gänzlich zerstört, worauf mit dem zweyten Trieb andre hervorkommen, welche sich bis zu den ersten Frösten halten. Die Blüten erscheinen zu Ende des Aprils aus den Achseln der Blätter in dichten Büscheln und dehnen sich nach und nach in Trauben aus. Man findet Eschen

- a) mit Zwitterblüten, b) mit Zwitterblüten und männlichen Blüten auf verschiednen Aesten, c) mit ganz getrenntem Geschlechte, d) mit Zwitter und männlichen Blüten in einer Rispe.

Blumendecke und Krone fehlen. Die Staubfäden sind kurz, zwey, die länglichen gerade aufwärts stehenden Staubbeutel sind viertheilig. Staubweeg einer, anfangs walzenförmig wird aber allmählig platt und spizig. Die Narbe ist in zwey Spitzen getheilt. Die Frucht ist ein länglicher, zungenförmiger, hellbrauner Balg, der aus zwey sehr dünnen Schalen zusammengesetzt ist und ein weisblauliches, längliches, plattes, oben zugespitztes unten stumpfrundes Saamenkorn einschließt. Sie reift im October und fliegt sodann ab.

Ab. a) mit gelbem Laube, b) mit gelb gestreiftem Laube, c) mit weis gestreiftem Laube.

Anmerk. 1) In England hat man nach Du Roi bisweilen Eschen gefällt, die 132 Fuß lang waren. Von einem sehr großen Eschenbaum, S. neues Bremisches Magazin, II. 215.

2) Die Esche steht hier in verschiednen Gärten innérhalb der Stadt und außerhalb derselben um den Wallgraben. Der schönste Baum steht in dem Garten des Hrn. R. R. Balser.

§. 756.

Dieser Baum gehört unter unsre nuzbarsten Holzarten. Das dauerhafte, zähe Holz dient zu Kutschen- und Wagenbäumen. Man verfertigt daraus Schäfte für Spiese und Spondons, Piquen, Sattelbäume, Radkämme, Schlitten, Pflüge, Molden, Tröge, kleine Hand-

Handleitern, andres kleines Geräthe. Es werden Bretter zu Tischen, Spinden und Bettstellen, schwache Bohlen für Zimmerleute daraus geschnitten. Da es nach dem verarbeiten ein schönes, weißlichgelbes, geflamintes Ansehen erhält, zuweilen schöne Adern zeigt und nicht leicht Risse bekommt, so nimmt man es zu physicalischen Instrumenten. Im Unterholze erhält man von jungen Eschen gute Bänder und Reiffe. Nicht weniger gehört die Esche unter unsre besten Brenn- und Rohlhölzer und da sie sehr schnell wächst; so verdiente sie häufiger zu Schlagholz angezogen zu werden, Man kann sie als Baum-Kopf- oder Schlagholz benutzen. Mit zwanzig Jahren giebt sie schon ein gutes Schlagstammholz, wobei aber zu merken ist, daß die Abholzung ja nicht im Frühjahr, sondern im Herbst unternommen werden muß.

Hausvater V. 180. Hesse vom Holzbau III.

§. 757.

Als Bauholz werden Eschen am besten gegen Weihnachten gefällt, weil das zu einer andern Zeit abgetriebene Holz leicht wurmistichig wird. Man muß die Bäume so tief als möglich an der Erde abtreiben, und wenn ihr Wald sehr groß ist, die größten Aeste zuvor wegnehmen, damit die Bäume beim Fällen keinen Schaden nehmen. Als Zimmerholz hat Eschenholz in oder auf der platten Erde keine Dauer, und muß in einer solchen Anwendung dem Eichenholze weit nachstehen. Dagegen hat es da, wo es keine Nässe ausstehen muß, die längste Dauer, ja es erlangt eine solche Härte, daß Instrumente nur schwer darauf haften. Das Laub ist ein gutes Futter für Rüge, Schaaf und Ziegen. Im Hildesheimischen werden zu dieser Absicht Eschen, wie Sahweiden gezogen und im August und Sept. nach sechs bis sieben Jahren mit scharfen Werkzeugen geköpft, die abgeschnittenen Zweige in Büschel gebunden, im Schatten getrocknet und den Winter über, dem Hornvieh und Schaafen, besonders den Zie-

Ziegen vorgelegt. Die Gipfel bleiben dabey verschont um den Stamm nach und nach in gleicher Dicke immer höher wachsen zu machen, und ihm am Ende noch als Baumholz zu benutzen \*). Die Rinde giebt verschiedene brauchbare Farben und dient zum gerben \*\*). Nach van Swieten, Pollich u. a. Versuchen sind ihr auch einige Heilkräfte eigen, allein es war eine Zeit, wo man allen Theilen der Esche beynahe gegen alle Krankheiten, solche wirksame Eigenschaften zuschrieb, daß dieser Baum nothwendig eine eigne Apotheke vorstellen mußte \*).

## S. 758.

Der vielfache Nutzen der Esche macht ihren häufigern Anbau sehr rathsam, und Unternehmungen dieser Art verzinsen sich gut. Man kann die Eschensaat anwenden, alte Oerter zu verjüngen oder Blößen damit anzubauen: denn man kann Eschen mit gleichem Vortheile in den Schlagholzrevieren als Oberholz überhalten, da sie nichts verdämmen oder als Schlagholz behandeln, da die abgehauenen Stöcke häufige Lohden schnell nachtreiben. Der Landmann kann sie in die Hecken, um Teiche,

S f 5

Bäche

\*) Germershausen das ganze der Schaafzucht. I. 121. Museum rusticum. VII. 64. Arnolds Reisen nach Marienzell. Wien 1785. Stumpfs Grundsätze der teutschen Landwirthschaft 217.

\*\*) Siffert II. 106.

\*\*\*) Helwig diff. de Quinquina Europaeorum (cortice Fraxini) Gryphswald. 1712. Camerarius de Fraxino, serpentibus infenso, calculosis utili in Sylloge memor. Cent. III. 145. Tablet de salis fraxini virtute et foliorum vi purgante. Memoires de Trevoux. 1710. Sept. 1711. Oct. Kraft des Saftes der ausgepreßten Eschenblätter wider den Vipernstich in Vandermonde Sammlung. VI. 243. Moptin Versuche mit dem Saft vom Eschenlaub giftiger Schlangen-Bisse zu heilen. Schwed. akad. Abb. 1765. 154. Claudinus de ligno fraxini. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. VI.



Bäche an Wiesenränder, Gemeinden um die Stadtgräben anpflanzen. In die Dörfer, um Mistgruben, um und neben die Häuser ist es aber nicht rathsam Eschen zu pflanzen: denn bey Feuersbrünsten sind sie weit weniger geschickt die Verbreitung der Flamme zu verhindern, als andre Laubbäume, weil sie grün sehr leicht in Brand gerathen. Birnbäume-Küstern und Linden entsprechen dieser Absicht weit besser. Auch auf Aecker schicken sie sich nicht. Desto besser in Parks. Die großen, zusammengesetzten Blätter geben dem Baum ein edles Ansehen, und im Winter macht sein aufrechter Stamm mit seiner grauen Rinde eine gute Wirkung. Da aber die Esche ihr großes Laub zeitig im Herbst abwirft, so setzt man sie nicht gern auf solche Stellen, die rein und sauber bleiben sollen, sondern in die größern Quartiere, theils in Gruppen, theils isolirt. Wegen ihres schönen Ansehens hat man auch die Eschen in die Allee bey Potsdam unter andre Bäume aufgenommen, und gewiß ist die Esche ein trefflicher Chausseebaum, in einem nahrhaften Grunde.

Man kann auch Köpfpflanzungen von Eschen anlegen. Sie wachsen geschwinder als andre harte Bäume und können daher auch öfters geköpft werden. Indessen werden sie bey dieser Benutzungsart leicht hohl, geben zuletzt weniger Zweige, und bringen sie auch langsamer hervor. Um dieser Ursachen willen muß man bey solchen Pflanzungen immer eine Baumschule unterhalten, um die ausgehenden Kopfbäume von Zeit zu Zeit durch neue ersetzen zu können. Sobald man nun an einer alten Kopfesche einige Abnahme bemerkt, muß man sie fällen, um davon noch gutes Zimmerholz zu erhalten. Solche Bäume muß man regelmäßig und immer einen jungen zwischen zwey alten pflanzen. Man findet in manchen teutschen Provinzen Bauerngärten, wo Eschen unter Apfel- und Birnbäume gepflanzt stehen. Sie treiben hoch, so daß sich oben ein Gipfel nur eine mäßige Krone findet. Dergleichen Gärten bringen gemeiniglich öfters Obst als andre

andre, die von wilden Bäumen rein gehalten werden. Sie haben nämlich weit seltner Raupenfraß, und die Besitzer haben außer der östern Obsternte noch den Vortheil, daß sie Jahr vor Jahr junge Eschen, wenn sie die Dicke eines tüchtigen Leiterbaums erlangt haben, an die Stellmacher verkaufen, welche daraus Gerüste zu den Korrensensen oder den Hacken daran, verfertigen, wozu sich keine Holzart so gut als diese schickt.

Eschen lieben einen guten, schwarzen, feuchten oder doch frischen Wiesen- und Waldgrund, wo ihre starken Wurzeln tief und weit streichen können. Die Lage kann sowohl schattig als frey seyn. Der Spätherbst ist die natürliche Saatzeit: denn der im Frühjahr gesäte Saame liegt wenigstens ein volles Jahr, ehe er aufgeht. Man säet also den Saamen am besten, gleich nach seiner Reife, in einen mit dem Pflug oder mit Hacken zubereiteten Boden (25 — 30 Pf. Saamen auf einen Morgen) und überzieht sodann den Platz mit einem Dornstrauch. Viele Pflanzen erscheinen aber erst im zweyten Frühjahr, und solche Anlagen müssen in den ersten Jahren sorgfältig verheget werden: denn sie sind dem verbißentwerden sehr ausgesetzt, da sie an Hirschen und Rehen große Liebhaber finden. Wo daher ein starker Wildstand ist, findet man wenig Eschen.

v. Burgsdorfs Forsthandbuch 140. 451. Heppes encycl. Calender 1787. S. 31. Hannover. gel. Anzeigen 1753. 165.

### §. 759.

Art. 227. Schwarze Esche. *F. nigra*.

Synon. Le Frene noir. The black Ash.

v. Burgsdorfs Holzcultur II. 96. 208. Er unterscheidet sie von *F. novae angliae* als Abart. Von dieser handeln Cuslow 53. Marschal 91. v. Wangenheim 51. Ehurpf. Bemerk. 1774. 206. Medicus in den botanischen Beobachtungen 203. Du Roi I. 290. Müncchs Verzeichniß 43. Lüber IV. 490. n. 2.

Sie

Sie wird dreyßig und mehr Fuß hoch. Die Rinde ist rauh, hellgefärbt. Die Blätter sind aus drey bis vier Paar und einem einzelnen an der Spitze zusammengesetzt. Die Blättchen sind am Rande fein sägeförmig ausgeschnitten, auf der untern Fläche ribbig, sehr dunkelgrün, sterben im Herbst mit einer noch dunklern Farbe ab.

§. 760.

Art. 228. Manna-E. *F. rotundifolia* Linn.

*Synon.* *Fraxinus rotundiori folio* du Ham. n. 2. Le Frene a feuilles rondes. Manna Asb. Hanb. I. c.

Sudow 51. n. 3. Du Roi I. 286. Mönchs Verzeichniß 42. Du Hamel I. 178. Hirschfelds Gartenkalender 1782. 98. Läder IV. 461. Ehurpf. Bem. 1774. 204. v. Burgs: dorf Holzcultur 95.

Ihr Vaterland ist Calabrien. Die Rinde der jungen Schüsse ist glatt, bräunlichgrün, mit einigen graulichen Flecken besetzt. Die Blätter sind aus sieben bis neun eyrunden, tief gezahnten Blättchen, die innen hohl sind und einen beygebogenen Rand haben, zusammengesetzt. Die Knospen sind spizig und haben eine aschgraue Farbe. Sie dauert auch bey uns ziemlich aus, doch steht noch zu erwarten, ob sie bey uns, wie in ihrem Vaterlande Manna liefern werde.

§. 761.

Gatt. 62. Acer. Ahorn. Laubh.

Sowohl der Geschlechtsstand als die Zahl der Staubgefäße sind wandelbar. Abbildungen aller Arten dieser Gattung findet man in Oestreichs allgemeiner Baumzucht von Franz Schmidt. Wien, 1792.

Art. 229. Gemeiner A. *A. Pseudoplatanus* Linn.

*Synon.* *Acer montanum candidum*. C. B. P. 430. *Acer foliis quinquelobis, acute serratis, racemis pendulis*. Hall. h. n. 1029. L'Erable de montagne. Greater Maple or Sycomore - tree, Hanb. I. 18. 84. Teut- scher



scher Ahorn, weiser Ahorn, weiser Bergahorn, Ehre, Ere, Urle, Urlenbaum, Ohre, Steinhore, Arle, Waldesche, Breitlaubere, Spillenholz.

Linn. sp. pl. II. 495. Pollich pal. II. 661. Schrank bay. I. 650. Sudow 198. Gleditsch I. 288. Leonhardi 82. Borsthausen 40. Lüber IV. 446. n. 2. Du Roi I. 4. Du Hamel I. 24. Krünitz Enc. I. 238. Märter 66. Becker 40. v. Burgsdorff J. H. 175. Ebend. Holzcultur I. 98. 200. II. 16. Dörrien 252.

Abbild. Cramer t. 6. Delhasen II. t. 22. 23.

J. 762.

Mit fünflappigen, ungleich gesägten Blättern, hängenden Blüentrauben.

Ein in Teutschland sehr gemeiner Baum. Seine Pfahlwurzel geht vier Fuß tief, und die Seitenwurzeln breiten sich gegen sechs Fuß weit aus. Er erreicht oft eine Höhe, in welcher er mit den Eichen wetteifert. Die Rinde ist an jungen Lohden braunröthlich, ins grünliche spielend, an den Stämmen im mittlern Alter grau, ins gelbliche fallend, und bey einem hohen, gesunden Alter ändert sich diese Farbe ins weisgraue. Die jungen Zweige und Lohden haben anfangs einen sehr schwammigen Kern, daher sie in den ersten Jahren gegen Frost und Hitze sehr empfindlich sind, und eines schützenden Schattens nicht entbehren können. Das Holz gesunder Stämme ist weislich, hart und sehr zähe. Seine Jahrringe liegen dicht an einander. Unter dem Hobel läßt es sich ausnehmend glatt und fein bearbeiten. Es treibt aber unter unsern Ahornen diese Art ihr Laub am spätesten, nämlich erst im May. Die Blätter sind groß, in fünf Lappen getheilt, davon die untersten kleiner, alle aber nach oben zu gerichtet und am Rande unordentlich gesägt sind. Auf der obern Fläche sind sie dunkelgrün, glatt, auf der untern bleichgrün, mit weislicher Wolle bekleidet. Sie stehen einander auf vier bis fünf Zoll langen, röthlichgrünen Stielen, insgemein Paarweise gegenüber. Die Knos-

Knospen sind im Winter gelblich. Das Laub fällt im October ab, und in einem trocknen Boden noch früher. Wegen seines süßen Saftes wird es von Insecten sehr heimgesucht. Die gelblichgrünen Blüten erscheinen gleich nach Ausbruch des Laubes in abwärts hängenden Trauben auf ziemlich langen Stielen. Man findet Bäume

- a) mit Zwitterblüten. Die Blumendecke ist einblättrig in fünf gleiche, zugespitzte Einschnitte getheilt, nicht abfallend. Die Einschnitte sind gefärbt und auf dem Grunde platt. Staubfäden, fünf, acht, zehn. Die Blumenkrone ist fünfblättrig und von jener schwer zu unterscheiden. Der Fruchtknoten ist platt gedrückt. Staubweeg einer, mit einer gespaltenen Narbe. Der Saame liegt in einer geflügelten Kapsel, reift im Oct. und fliegt im Nov. ab. b) Mit männlichen Blüten. Zehn Kelchblättchen, wenn man nicht fünf für die Blumendecke und fünf für die Krone rechnet. Staubfäden acht, die in der Mitte beisammenstehen. Statt des Fruchtknotens findet man einen Büschel weißer, kleiner, zarter Haare.

Ab. a) mit gelbgeschecktem Laub. In Ziegenberg.  
Medicus bot. Beobachtungen 249.

§. 763.

Unter den deutschen Laubbäumen ist der Ahorn wegen seines ansehnlichen Wuchses und seiner großen, schön belaubten Krone einer der edelsten Bäume. Da er zugleich sehr nutzbar ist; so gaben ihm unsre dankbaren Vorfahren den Namen Ehre, wie er am Harzwalde noch heißt. Sein Laub ist, wenn es abgetrocknet, nicht vom Reiff getroffen, noch von Insecten verunreinigt ist, ein gutes Schaaffutter, wegen des vielen süßen Saftes, den es bey sich führt und da es sehr groß ist, langt man weiter damit als mit anderm Laub. Den Blüten fliegen die Bienen nach. Das im November und December gefällte Bauholz, taugt zum bauen im trocknen. Allein  
den

den größten Nutzen liefert es als Werk- und Nußholz. Man verfertigt daraus Dreschflegel, Rollen, Walzen, Raben, Oehlstempel, Radzähne, Billardqueues, andre gute Dreherwaaren, allerley Hausgeräthe, Morden, Backtröge, Arthelme, Schlittkufen. Da es sich gleich dem rothbuchenem Holze in sehr dünne Bretter schneiden läßt; so kaufen es die Instrumentenmacher zu Lauten, Clavieren, Violinen, Resonanzböden. Die Tischler verfertigen Stühle, Tische, Behälter, Wäschmangen daraus. Die starken Stämme geben gute Bohlen und Bretter, welchen letztern man durch Beize eine schöne Mahagonifarbe geben kann. Das schön geflammte, masserige Holz wird zum einlegen gebraucht. Wegen seiner Glätte, Härte und Reinigkeit giebt dieses Holz die schönsten Teller, Kannen und Löffel.

Anmerk. In Helberhausen, einem Dorfe in der nordöstlichen Ecke des Amtes Hilgenbach im Fürstenthum Nassau: Siegen, kamen 1690. drey junge Hirten, Claus, Helmes und Preis, zugleich auf den Einfall, während sie ihre Heerden weideten, aus getrocknetem Ahornholze, Löffel zu verfertigen. Interesse, leidenschaftlicher Hang und ein gemeinschaftlicher Wettstreit befeuerten sie, ihre Arbeit zu vermehren und zu verfeinern. Sie theilten auch ihren Nachbarn die Handgriffe ihrer Kunst mit, und nach und nach stieg die Zahl dieser Löffelmacher auf vierzig. Ein Karren Holz wurde damahls mit 1 fl. bezahlt, aus einer solchen Ladung wurden 1000 Stück Löffel verfertiget, welche 16 fl. galten, und jährlich zog dieses kleine Gewerbe 4000 fl. in das Dorf, wovon nur 240 für Holz wieder abgiengen. Der Absatz war sicher, bequem und nahm immer zu. Daher vermehrten sich die Löffelmacher nach und nach auf achtzig. Diese Zahl hat sich seit vierzig Jahren erhalten. Der gegenwärtige Verlauf des Ertrages ist jährlich 8000 fl. Ein Beweis daß auch das geringste Gewerbe die Aufmerksamkeit des staatswirthschaftlichen Departements verdiene.

S. Ehurpfälzische Bemerkungen vom Jahr 1780. S. 193.  
Giesser histor. ökonom. Wochenblatt. N, XLV.



## §. 764.

Die in unsern Forsten vorkommenden Ahorne werden mit dem andern Laubholze, unter welchem sie stehen, so oft dieses der Hieb trifft, abgetrieben und die zu Werk- und Nutzholz tauglichen Stücke ausgesondert. Aus der Wurzel treiben sie bald wieder starke Lohden. Es ist aber den Grundsätzen einer guten Forstwirthschaft gemäß in gutem Boden immer einige der schönsten Stämme stehen zu lassen, und sie erst nach erlangtem Alter der Vollkommenheit abzuholzen, wo sie alsdann am höchsten genutzt werden können. Durch den abfliegenden Saamen vermehren sie sich reichlich. Nur erfordern die Pflanzen anfangs Schutz und Schatten.

Wegen des schönen Nutzholzes, das der Ahorn liefert, verdient sein Anbau sehr Empfehlung. In Parks, in Gehölzen und an Feldern macht er eine angenehme Mannichfaltigkeit, da er aber sperrig wächst und seine schönen Blätter bey dem Eintritt der heißen Witterung von Insecten sehr verderbt werden; so verwirft man ihn zu Alleen. Sonst schickt er sich vor andern Bäumen zum Schutz der Gebäude und Wälder gegen Sturmwinde. Auch schickt er sich gut an Seeküsten, weil die vom Winde fortgeführten, feuchten Dünste ihm weniger als andern Bäumen schaden. Auch in Kopfpflanzungen ist er brauchbar. Zu Gartenwänden und Brusthecken schickt er sich aber nicht, da er das beschneiden nicht verträgt.

Die natürliche Saatzeit ist der Späthherbst. Weil aber die jungen Pflanzen zärtlich sind, wählt man lieber das Frühjahr. Auf einen Morgen rechnet man sechzehn Pfund Saamen. Der Boden wird gepflügt oder gehackt und nach der Aussaat mit einem Dornstrauch überfahren, um dem Saamen eine geringe Bedeckung mit Erde zu geben. Auf Blößen schickt sich aber die Ahornsaat nicht, weil die Pflanzen anfänglich Schutz und Schatten verlangen. Jung lassen sich die Stämmchen auch gut verpflanzen.

pflanzen und kann die Auspflanzung sowohl im Frühjahr als Herbst geschehen. Den im Herbst gesammelten Samen schüttet man auf einen luftigen Boden, wo er unter öftern umwenden, bald trocknet. Dann bewahrt man ihn den Winter über in feuchtem Sand auf.

v. Burgsdorfs Forsthandbuch 155. Hesse 108. 153. Hartig 77. 91. Buehl 42. Hausvater V. 167. Forst-Cameralwissenschaft 93.

## §. 765.

Art. 230. Pehne. *A. platanoides*. Linn.

*Synon.* *Acer montanum tenuissimis et acutis foliis*. C. B. P. 431. *Acer foliis quinquelobis, dentibus acutis, intervallis lunatis, racemis erectis*. Hall. hist. n. 1029. Le Plane. Norway Maple. Hanb. I, 84. Leimhorn, großer, spitzblättriger Ahorn, Bergahorn, pohluischer Ahorn, norwegischer Ahorn, Spisahorn, Lynbaum, deutscher Zuckerahorn, Lienbaum, Line, Lähne, Lenne, Löhne, Breitlehne, Breitlöbern, Leinbaum, großer Milchbaum, deutscher Salatbaum, Breitblatt, Weinblatt, Leinahre.

Linn. sp. pl. II. 1496. n. 5. Pollich. palat. II. 662. Schrank bavar. I. 651. Sukow 199. Gleditsch I. 288. n. 8. Leonhardi 83. Borkhausen 42. Ehrhard I. 144. Du Roi I. 11. Schrebers neue Cameralschr. I. 176. Linder IV. 447. n. 5. Märter 66. Du Ham. n. 3. v. Burgsdorf 8. S. 177.

Abbild. Cramer t. 7. Delhafen II. t. 24. bis 27.

## §. 766.

Die gelbliche, glatte Rinde, die gerade aufgeschossen, glatten Zweige, und die sehr langen Triebe machen diesen Baum auch ohne Blätter kenntlich. Man findet ihn mit andern Holzarten, im Mittel und Vorgebirge. Die jungen grünen Triebe und das Laub lactesciren. Der Stamm dieses Baumes ist reich an süßem Saft und dieser muß in den Blüten besonders geläutert seyn, weil ihnen die Bienen so häufig nachfliegen. Die Knospen ha-

ben im Winter eine röthliche Farbe. Die Blätter stehen einander gegenüber auf drey Zoll langen, röthlichgrünen Stielen, brechen zu Anfang des Mayes aus, fallen im October ab. In der Jugend sind sie sehr zart und bey nahe durchsichtig. Sie sind fünf bis siebenfach eingeschnitten, zugespitzt, scharf gezahnt, auf beyden Flächen glatt, oben dunkel, unten hellgrün, mit weißlichen Nerven durchzogen die in ihrer frühen Jugend roth sind.

Die Blüten erscheinen vor Ausbruch des Laubes sehr zeitig in kurzgestielten, dicken, breiten Astersträußern. Zuerst kommen männliche Blüten zum Vorschein, welche acht Staubfäden mit fruchtbaren Staubbeuteln haben. In der Mitte zeigt sich ein Rudiment von einer Narbe, Wenn sie bey nahe abgeblüht haben, erscheinen die Zwitterblüten. Die Kronenblätter sind deutlich unterschieden. Der Blumenboden ist sehr drüsig mit einer Grube versehen. Wenn die Blüten schon aufgeblüht sind, wächst der Staubweg hervor. An der Basis jedes Blütenstiels ist ein kleines Nebenblättchen. Das Holz ist härter als von der vorigen Art, aber auch grobaderiger. Die Wurzel geht drey Fuß tief und breitet sich sechs Fuß weit aus. Eine Pfahlwurzel hat er nicht. Von Insekten wird dieser Baum wenig belästigt.

Ab. Mit gelbgescheckten Blättern.

Anmerk. Von diesem Baume findet man auch männliche und weibliche Blüten auf zwey besondern Stämmen. Der Same ist zeitig ausgewachsen. Ich fand ihn in Ziegenberg schon in den ersten Wochen des Junius völlig ausgewachsen. Auf diesem Gute ist die Lehne an einen Fahrweg häufig gepflanzt und giebt einen Beweis, wie gut sie sich zu einem Chaufferbaum schicke.

S. 767.

Die Lehne wird gewöhnlich unter dem andern Laubholz, unter welchem sie steht, abgetrieben. Sie dient wie die vorige Art zum Schutz der Häuser, um welche sie gepflanzt wird und ist ein guter Kopf- und Chaufferbaum.



**Baum.** Zu Alleen um Dörfer, wo viele Bienenzucht ist, ist er besonders zu empfehlen. Das Holz ist nicht so fein als von der vorigen Art. Es wird daher zu gröbern Arbeiten zu Wagen- und Rutschenbäumen, Pflügen u. d. gl. genommen. Man benutzt den Baum auch zuweilen auf Zuckersaft. Doch wird der daraus erhaltene Zucker nicht so süß als der gewöhnliche. Auch kann man aus dem Lehnensafte Brandewein und Essig bereiten. Die Blätter geben nach H. Suckows Versuchen verschiedene brauchbare Farben.

Die Lehne wird in einem aus Sand mit Dammerde gemischten Boden in frischer Lage ein Baum erster Größe. Der Boden wird zur Saat gepflügt oder gehackt und der Saatplatz nach der Saat mit einem Dornstrauche überfahren. Auf einem leichten, sehr trocknen Boden schlägt dieser Baum zwar auch fort, muß aber daselbst durch Pflanzung angezogen werden. Da er nun sehr zeitig treibt; so ist der Herbst die beste Versetzzeit.

v. Burgsdorfs Holzcultur I. 98. 200. II. 16. n. 5. Worowskys Almanach 182.

§. 768.

**Art. 231. Maßholder. A. campestre. Linn.**

**Synon.** Acer campestre et minus. C. B. P. 431. Acer foliis semitrilobis, obtusis, lobis lateralibus emarginatis. Hall. hist. n. 1029. Le petit Erable. Common Maple. Hanb. I. 84. Kleiner, deutscher Ahorn, Kleiner, milchblättriger Ahorn, Maschholder, Meßellern, Maßerle, Epellern, Merle, Meveller, Anerle, Kerpelthau, Schreiberholz, Schreiberlaub, Weißlöber, Weißbaum, Kreuzbaum, Wasserhülse, Binbaum, Angerbinbaum, Maßlieben, Eßdorn, Eperle, Apler, Appeldören, Schwebstockholz, Wasserlinden, Wittneber, Laubbaum, Kreuzbaum.

Linn. sp. pl. II. 1497. n. 7. Pollich palat. II. 662. n. 946. Scopoli carn. II. 280. Schrank bav. I. 652. Suckow 200. Gleitsch I. 289. Leonhardi 83. Borkhausen 45. Räder IV.

446. Märter 66. Du Roi I. 24. Doerrien 252. Becker 42. v. Burgsdorf F. H. 179. Ebend. Holzcultur I. 101. 190. 200. II. 17. Hausvater V. 163. Ehurpfälzische Bemerkungen 1777. S. 7.

Abbild. Cramer t. 29. Delhafen II. t. 28.

S. 769.

### Mit stumpflappigen, ausgerandeten Blättern.

Ein einheimischer, ganzer Strauch, der auch bisweilen als ein Baum zweiter Größe vorkommt. Seine flache Wurzel geht anderthalb Fuß tief, breitet sich aber gegen vier Fuß weit aus. Die Rinde ist gelbbraun, gerissen wie am Korfrüster. Die jungen Triebe und Blätter lactesciren. Diese sind in drey bis fünf Lappen mit stumpfen Spitzen getheilt, oben dunkel- unten hellgrün, zartadrig, sitzen paarweise übers Kreuz, auf anderthalb Zoll langen, röthlichgrünen Stielen. Die Blüten erscheinen an den Spitzen der Zweige auf abwechselnd stehenden Stielchen in unvollkommenen Schirmsträußern und erscheinen im May bald nach ausgebrochenem Laube. Man findet Maßholder

- 1) mit Zwitter- und männlichen Blüten auf zwey besondern Stämmen.

Sonst erscheinen auf einem und eben demselben Stamme, männliche, und wenn diese abgeblüht haben, Zwitterblüten. Beyder Geschlechtsdecke hat zehn Blätter, wovon man die fünf breiten für die Blumendecke, die fünf schmalen für die Blumenkrone rechnen kann. Der Boden ist wulstig. Aus einer kleinen Vertiefung entspringen acht Staubfäden. Bey der Zwitterblüte findet man in der Mitte den Fruchtknoten mit zwey Flügeln. Auf ihm steht ein cylindrischer Staubweeg, der sich in eine zweyspaltige Narbe endigt.

Ab. a) Mit gescheckten Blättern. b) Kleiner spanischer Maßholder.

Das

Das Holz des Maßholders ist hart und zähe. Es dient zu allerley Nutz- und Schirrholz. Besonders werden die Maseren zu feinen Dreherarbeiten gesucht. In Thüringen verfertigen eigne Handwerker geflochtene Peitschenstöcke aus diesem Holze. Die Klasten dieses Holzes wird daher daselbst mit funfzehn Thaler und mehr bezahlt. Wegen seiner Zähigkeit läßt sich eine, aus dem groben zubereitete Stange der Länge nach beynahe in zwanzig Peitschenstöcke bis an den Griff spalten, die alsdann weiter verarbeitet und geflochten werden. Da nun diese Peitschenstöcke allenthalben sehr gesucht sind; so verlohnt es sich der Mühe, den Maßholder mehr zu cultiviren, zu Schlagholz einzurichten und in funfzehnjährigen Umtrieb zu bringen. In einem höhern Alter wird das Holz besonders in der Wurzel und dem Stammende schön braun und gestammt, im Kern aber noch weit fester, so daß es sich trefflich glatt bearbeiten läßt und dann zu Gewehrschäften, zu eingelegter Arbeit, parketirten Fußböden u. d. gl. taugt. Das gerade Holz wird zu Ladstöcken genommen. Auch wird es zu Sensenstielen und verschiedenen kleinen Stücken gesucht. In gutem frischen Boden kann man aus Maßholder Hecken anlegen, die den Schnitt wohl vertragen, fest, dauerhaft sind und wegen ihres Laubes gut in die Augen fallen.

## §. 770.

Art. 232. Gestreifter A. A. striatum. D Roi I. 8.

Synon. Acer pensilvanicum. Linn. sp. pl. 1496? Acer canadense Marsh. 6. L'Erable de Canada feuilles de Tilleul. American striped Maple. Marsh. 6. the striped Bark Maple. Wang. 29. Canadischer, gestreifter Ahorn.

S. die bey der Synonymie dieses Baumes angeführten Schriftsteller. Suclow 203. n. 8. Ehrhard IV. 29. Lowth de Acere 35. Mönchs Verzeichniß 4. Churpf. Bem. 1774. 140. Borkhausen 345.



Abbild. von Wangenheim F. XXVIII. Du Roi T. I. f.  
1 — 4.

## §. 771.

Mit glatten, drey bis fünflappigen, doppelt gesägten Blättern, zugespikten Blattlappen, wenigblütigen, unterwärts hängenden Trauben, glatten, lanzettförmigen Kelchblättchen, verkehrt eyrund-keilsförmigen Kronenblättchen.

Waterland. Nordamerika. Die Blätter stehen auf gefurchten Stielen einander paarweise gegenüber. Sie sind in drey, selten in fünf scharf zugespigte und scharf, aber ungleich gesägte Lappen getheilt. Die Blüten erscheinen in abwärts hängenden Trauben. Die Abschnitte der Blumendecke sind lanzettförmig und stumpf, die Kronenblätter groß, verkehrt eyrund, gekerbt. Staubfäden acht und eben so viele Honigdrüsen. Sein Wachsthum ist schnell und er dauert in unsern strengsten Wintern aus. Sein Holz hat als Werk- und Nutzholz dieselbe Güte als das Holz des Zuckerahorns.

Anmerk H. Borkhausen empfiehlt ihn zu Alleen, und nach H. Suckow's Färbversuchen giebt der Baum auch von dieser Seite Hoffnung zu einer vortheilhaften Benutzung. Ehurpfälz-Vorlesungen, Mannheim 1788.

## §. 772.

Art. 233. Silber-Ahorn. *A. dasycarpum*. Ehrh.

*Synon.* *Acer glaucum*. Marsh. 2. *Acer virginianum* Catesby. carol. I. 62. *Acer rubrum mas*. Linn. veg. ed. 13. p. 766. *Acer rubrum floribus masculis*. Du Roi obs. p. 60. *Acer foliis tri-vel quinque-lobis, serratis, subtus glaucis, floribus distinctis, confertim aggregatis, monoicis*. Trew. Ehret. p. 47. Silver-leaved Maple. Marsh.

Ehrhard IV. 23. 79. Hirschfeld's Gartentalender 1785. 201. Borkhausen 346. Marshal 2.

Abbild. Catesby. l. c. t. 62. f. min. Trew. l. c. t. 86. v. Wangenheim F. 27.

## §. 773.

## §. 773.

Mit handförmig fünfflappigen, sägezähnigen, unten bläulichen Blättern, fast lanzettförmigen, sehr spitzigen Blattlappen, stiellosen, wenigblütigen Schirmen, haarigen Fruchtknoten, etwas aufgerichteten Saamenflügeln.

Waterland. Nordamerika. Man findet Bäume mit

a) bloß männlichen Blüten b) mit Zwitterblüten.

Die Rinde ist an jungen Stämmen graulich grün, an alten mehr aschgrau, an den jungen Zweigen fällt sie ins röthliche. Die Blätter stehen paarweise einander gegenüber, haben fünf scharf zugespitzte, grob und scharf gezahnte Einschnitte, sind oben blaulichgrün, unten blaulichweiß, die Blüten sind roth, die Saamenumschläge haarig. In seinem Waterlande wird dieser Baum ziemlich groß. Das Holz ist gelblich, feinaderig, fest und hart, es giebt sehr gute Tischlerwaare.

Anmerk. Linne, Du Roi, Sudow und Murray hielten diesen Baum für den männlichen rothen Ahorn, welches er aber nicht ist. Ehrhard und Marshal führten ihn als eine eigne Art auf, welches er wirklich ist.

## §. 774.

Art. 234. Scharlachrother Ahorn. *A. rubrum*. Linn.

*Synon.* *Acer virginianum*, folio majori, subtus argenteo, supra viridi, splendente. Catesby. carol. I. 62. *Acer foliis quinquelobis, subdentatis, subtus glaucis, floribus pedunculatis, simplicissimis, rare aggregatis, dioicis.* Trew. Ehret. 41. *Acer rubrum*. Linn. sp. pl. 1496. *L'Erable rouge d'Amérique.* Scarlet flowering Maple. Marsh. 7. Rothblühender Ahorn.

Catesby. carol. I. 62. Linn. sp. pl. 1496. Borkhausen 348. Ehrhard IV. 23. Ill. 158. Marshal 7. v. Wangenheim 28. Sudow 202. Schoepff. 153.

Abbild. v. Wangenheim T. XI. b. Trew. l. c. t. 85? Catesby. l. c. t. 62. fig. maj.

## §. 775.

Mit herzförmigen, fünflappigen, sägezahnigen, unten weislichen Blättern, eckrund lanzettförmigen Lappen, stiellosen, wenigblütigen Schirmen, glatten Fruchtknoten, ausgebreiteten Saamenflügeln.

Waterland. Nordamerika. Man findet von dieser Art Bäume

- a) mit bloß männlichen Blüten b) mit bloß weiblichen Blüten c) mit bloß Zwitterblüten.

Die Rinde ist an jungen Stämmen glänzend grün, an ältern aschgrau. Die Blätter stehen auf langen, rothen Stielen, sind groß, in drey bis fünf undeutliche, zugespitzte, kaum merklich gezahnte Lappen, getheilt, oben glänzendgrün, unten weislich, baunig. Die Blüten erscheinen in Dolden an langen, scharlachrothen Stielen. Der Baum wird in seinem Waterlande vierzig bis funfzig Fuß hoch und zwey Fuß dick. Sein Holz ist ganz weis, sehr hart, gemasert und nimmt eine schöne Politur an. Es giebt ein gutes Brenn- Nutz- und Kohlholz.

## §. 776.

Art. 235. Zucker-Ahorn. *A. saccharinum*. Linn.

Synon. L'erable a sucre. The sugar Maple. Marsh. 9.

Linn. Sp. pl. 1496. Gron. virg. n. 161. Schoepff m. m. a. 153. Sudow 201. n. 5. Ehrhard IV. 24. Münchhausen V. 96. Du Roi I. 14. Schriften der Berliner Gesells. I. 310. Reich syst. IV. 332. Lowth de Acere 24. Mönchs. Verz. 2. Du Hamel. I. 29. Marshal 8. v. Wangenheim 26. Lüber IV. 447. n. 4.

Abbild. v. Wangenheim f. XXVI. Reinhard in den Schriften der Berliner Gesells. I. c. T. IX. f. 1 — 3.

## §. 777.

Mit fünflappigen, zugespitzten, selten gezahnten, unten behaarten Blättern, Blüentrauben, etwas aufgerichteten Saamenflügeln.

Waterland. Nordamerika. Er wird funfzig bis sechzig Fuß hoch, zwey und mehr Fuß dick, erwächst mit



siebenzig bis achtzig Jahren zu Baumholz, mit zwanzig bis fünf und zwanzig zu Schlagholz. Seine Wurzeln laufen seitwärts flach aus. Die Blätter sind handförmig, in fünf Lappen mit gesägtem Rande getheilt, oben glatt, und hellgrün, unten weißlich. Männliche und Zwitterblüten sind auf einem Baume vorhanden. Die Blüten sind gelblichgrün. Die Saamenflügel sind etwas aufgerichtet. Das Holz ist ein vorzüglich gutes Brenn- und Kohlholz. Zu Gewehrschäften zieht man es selbst dem Nußbaumholze vor. Aus dem Saft dieses Baumes wird ein Zucker bereitet, der so fest, süß und angenehm ist, als derjenige, den man aus dem Zuckerrohr erhält.

Dudley the method of making sugar from the juice of the Maple tree in new England, Philos. Transf. n. 364. p. 27. Crells chem. Archiv II. 173. Forstmagazin X. 273. Schwed. Abhandl. XIII. 149. Krinitz Enc. I. 238. Sprengels Geschichte der Europäer in Nordamerika 63.

§. 778.

Art. 236. Eschen-Ahorn. A. Negundo. Linn.

Synon. L'Erable de Virginie a feuilles de Frene. The Ash leaved Maple. Marsh. 3. white Ash. Wang. 30. Schoepff. 155.

Linn. sp. pl. II. 1497. Suckow 200. Marshal 3. v. Wangerheim 30. Schöppf 155. Ehurpf. Bem. 1774. 136. 1777. 9. 1778. 32. 1789. Medicus botan. Beobacht. 1782. 242. Magazin für die Botanik, St. IX. 140. Vorkhausen 349. Medicus Beiträge zur schönen Gartenkunst 16. 300. Du Hamel n. 10. Borrowshs Almanach 186. Du Roi I. 31. Monchs Verzeichniß 8. Lüder IV. 448.

§. 779.

Mit gefiederten Blättern, kurzgestielten, länglichen, zugespitzten, gesägten Blättchen, Blüentrauben.

Waterland. Nordamerika. Seine Wurzeln laufen seitwärts flach aus. In einem nahrhaften, feuchten Boden und geschütztem Stande wird dieser Baum vierzig und mehr Fuß hoch und gegen drei Fuß dick. Die Blätter sind ungleich gefiedert und stehen auf langen, dünnen,

gelblichgrünen Stielen, einander gegenüber. Jedes Blatt besteht aus drey oder fünf kleinen, länglichen, am Rande ungleich gesägten und eingeschnittenen, kurzgestielten Blättchen. Die Rinde der jungen Zweige ist grün und glänzend, der ältern aschfarbig. Man findet Bäume

a) mit blos männlichen Blüten

b) — — weiblichen —

welche H. R. R. Medicus umständlich beschrieben und auch abgebildet hat. Wahrscheinlich finden sich auch Bäume mit Zwitter- und männlichen Blüten.

§. 780.

Art. 237. Tatarischer Ahorn. *A. tataricum*. Linn.

L'Erable de Tatarie. Tatarian Maple-tree. Hanb.

I. 89.

Mönchs Verzeichniß I. Du Roi I. 25. Läder IV. 448. Suckow 204.

Abbild. Acta Petrop. 1749. t. 13. Schmidt Destr. B. 3.

Waterland. Die Tataren, Croatien. Ein dauerhafter Baum, der auch bey uns guten Saamen bringt. Die Blätter sind am Rande gesägt. Von ihrer Gestalt läßt sich nichts sagen: denn sie variiren so sehr in Ansehung ihrer Form als nur irgend bey einer Holzart. Der Baum wächst geschwind, nimmt mit allerley Boden und Lagen vorlieb, und giebt gutes Brennholz. Die Blüten erscheinen in traubenförmigen Büscheln in der ersten Woche des Junius (in Ziegenberg) Männliche und Zwitterblüten stehen in einem Blütenstande. Die Blumendecke ist einblättrig und hat fünf weißlichgrüne Einschnitte, welche herzförmig sind. Kronenblätter fünf, weisse, durchsichtige. Staubfäden fünf bis acht, mit gelben Staubbeuteln. Staubweeg einer, mit einer zweispaltigen, zurückgerollten Narbe. So fand ich die Blüte 1792 im Jun. zu Ziegenberg und samlete sie für mein Herbarium.

§. 781.

## §. 781.

Gatt. 63. Ilex. Hülse. Immergrünes Laubholz.

Zwitterblüten haben eine vierzählige Blumenbedeckung. Die Blumenkrone ist radförmig. Der Fruchtknoten ist von der Blumenbedeckung umgeben. Staubweege sind nicht vorhanden, aber stumpfe Narben. Die Frucht ist eine vierfaamige Beere.

## §. 782.

Art. 238. Gemeine H. I. Aquifolium. Linn.

Synon. Ilex aculeata baccifera, folio sinuato. C. B. P. 425. Aquifolium. Tabernaem. 1382. Halleri hist. n. 667. Agrifolium Lobel obs. 582. Le Houx. Common Hally. Hanb. I. 214. Stechpalme, Schrader, Hülsestrauch, Hülsebusch, Stechbaum, Waldbissel, Stechapfel, Christdorn, Zwieseldorn, Hülseholz, Kleebusch, Hülst, Holst, Stechlaub.

Gleditsch II. 127. Linn. sp. pl. I. 181. Leers herborn. 55. Becker 58. Scopoli carn. 116. Schrank bav. 426. Endow 85. Borkhausen 245. Leonhardi 138. Du Roi I. 316. Dekon. phys. Abhandl. IV. 864. Forst Magazin I. 19. V. 243. Du Hamel I. 49. v. Münchhausen V. 179. Münchs Verzeichniß 51. von Burgsdorfs Forsthandbuch 119. 257. Roth's Beyträge II. 12. Martyn de Sexu Agrifolii in Philosophical Trans. Vol. XXXVIII. P. II. p. 613.

Abbild. Ic. plant. med. t. 372. Lobel l. c. besser bey Tabern. l. c. Cramer t. 31.

## §. 783.

Mit immergrünen, eyrund zugespitzten, am Rande mit Stacheln versehenen und wellenförmig gebogenen Blättern.

Ein einheimischer, immergrüner Laubbaum, der auch sehr oft bloß als Strauch vorkommt. Die Rinde ist am Stamme glatt und grau, an den Zweigen dunkelgrün. Die Blätter sind sehr steif, auf der obern Fläche dunkelgrün und glänzend, auf der untern hellgrün und matt, mit einer starken Ader bezeichnet, eyrund zugespitzt, am Rande



Rande wellenförmig gebogen und mit Stacheln besetzt. Sie stehen abwechselnd auf sehr kurzen Stielen. Das Holz ist schön weiß und zuweilen ins gelbliche spielend, fest, zähe, schwer, hat einen dunkeln oder schwärzlichen Kern. Die schmutzig weißen, wohlriechenden Blüten erscheinen im May. Die Blumendecke ist bleibend und vierfach eingeschnitten. Die Blumenkrone besteht aus einem fleischfarbenem Blatte, welches in vier tiefe Einschnitte getheilt ist. Die Zwitterblüten enthalten vier bis fünf unverwachsene Staubfäden, mit röthlichen Staubbeuteln. Auf dem rundlichen Fruchtknoten ruhen vier zugestumpfte Narben. Die Frucht ist eine rundliche, hellrothe Beere, welche zu Anfang des Oct. reif wird. Sie enthält vier steinige, dunkelgelbe Saamen in vier Fächern. Man findet Bäume mit ganz getrenntem Geschlechte und mit Zwitterblüten.

## §. 784.

Man findet von dieser Holzart eine zahlreiche Sammlung von Spiel- oder Abarten. Sie lassen sich aber unter zwey Klassen bringen.

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>A. Mit einfärbigen grünen Blättern.</b></p> <p>a) Glatte, grüne H. I. A. glabrum. West. Smooth-leaved Holly. Hanb. I. 218.</p> <p>b) Gelbbeerige, grüne Hülse. I. A. bacciflavum. West. Yellow - berried Holly. Hanb. I. 218.</p> <p>c) Buchsblättrige, grüne Hülse. I. A. foliis parvis, interdum vix spinosis. West. Box - leaved Holly.</p> <p>d) Grüne Igelhülse. I. echinata. Mill. n. 2. I. cana.</p> | <p><b>B. Mit scheckigen Blättern.</b></p> <p>a) Gemeine stachelige Hülse mit</p> <p>aa) weißgestreiftem Laub.</p> <p>bb) gelbgestreiftem Laub.</p> <p>bb) gelbgeflecktem Laub.</p> <p>b) Glatte Hülse mit</p> <p>aa) weißgestreiften Laub.</p> <p>bb) gelbgestreiften Laub.</p> <p>cc) geflecktem Laub.</p> <p>c) Schmahlblättrige Hülse mit</p> <p>aa) gestreiftem Laub.</p> <p>bb) milchfarbigem Laub.</p> <p>d) Gelbbeerige Hülse, geflekt.</p> <p>e) Kupferfärbige Hülse.</p> <p>f) Weißblättrige Hülse. densis.</p> |
|---|--|

- denlis. West. Hedge-Hog g) Vielfarbige Hülse.  
 Holly. Hanb. I. 218. h) Igelhülse.
- e) Grüne H. mit schmahlen aa) mit weisem Rande.  
 gesägten Blättern. I. A. bb) — gelbem —  
 ferriforme. West. Sawod- cc) — weissen Flecken.  
 leaved Holly. Hanb. I. dd) — gelben —  
 218. i) Hülse mit geschminkten,  
 scheckigen Blättern,

Die Blüten geben den Bienen Wachstoff. Das Holz nimmt eine schöne Politur an und hat, besonders schwarz gebeizt ein gutes Ansehen. Unter unsern schwachen Nuzhölzern ist es eines der besten und gesuchtesten. Jung ist es biegsam. So lange es noch grün ist, läßt es sich gut bearbeiten, im Alter aber wird es brüchig, und trocken ist es überaus hart zu schneiden. Man nimmt es zu mechanischen Instrumenten. Wegen seiner Härte und feinen Struktur dient es vorzüglich zu Weßholz um Scheermesser darauf abzuführen. Die englischen Kunstschler verarbeiten es mit Vortheil auf mancherley Art.

Gleditsch Bienenstand 197. Abhandl. der Naturforschenden Ges. zu Zürich II. 381. Die Italiäner halten die Hülse für eine Anzeige auf Alaun, aber mit Unrecht, Beckmann in Comment, Goett. I. 132.

Die Blätter und andre Theile wurden ehemahls gegen die Gicht gebraucht. Die Beere sind eine Lieblingspeise der Turteltauben. Man hat sie sonst auch gegen den Stein empfohlen, und neuerdings sind sie in der Monatschrift von und für Mecklenburg als ein erprobtes Mittel gegen die Steinschmerzen angerühmt worden. Man sammelt sie zu dieser Absicht im Herbst, dörrt sie auf einem Ofen oder Feuerheerd, stößt sie zu Pulver, so daß dieses wie halb gebrannter Coffee aussieht, und nimmt davon, sobald man spürt, daß die Schmerzen ihre fatale Periode wie-

wieder antretten wollen, des Morgens einen guten Theelöffelvoll in Thee, trinkt ein paar Tassen nach und wiederholt dieses einige Morgen.

Defonom. Abhandl. II. 155. Martyn von Heilung der Sicht durch eine Ptisane aus Ilex aqu. in Rhauß medic. Magazin I. Jahrgang 1 u. 2. Stück. Der Anzeiger 1792. N. X. S. 80.

Aus der Rinde wird Vogelleim gemacht und zwar nach Evelyn's Vorschrift auf folgende Art. Die Rinde wird um Johanni abgeschält, in einen mit Brunnenwasser gefülltem Topf geworfen, und etwa zwölf Stunden lang gekocht, binnen welcher Zeit sich die weiße und grüne Rinde ablösen. Dann wird das Wasser abgegossen, beyde Rinden von einander abgesondert, und die grüne Rinde in einem kalten Keller oder Gewölbe auf den Boden gelegt, und ziemlich dick mit frischem, saftigen Unkraut bedeckt. Wenn sie vierzehn Tage so gelegen hat und völlig zu Schleim geworden ist, wird sie in einem steinernen Mörtel so lange gestoßen, bis ein zäher Teig daraus wird, welcher aber so fein seyn muß, daß man nicht das geringste Stückgen Rinde mehr darinnen wahrnimmt. Alsdann wird sie in immer frisch aufgegossenem Wasser so lange mit Fleiß gemaschen, bis man eine ganz reine Masse erhält. Diese wird in ein irdenes Gefäß gethan, worinnen sie vier bis fünf Tage gähren und immittelst aller aufstoßende Unrath abgeschäumt werden muß. Wenn keiner mehr erscheint, wird sie in ein frisches irdenes Gefäß gethan, aus welchem man hernach jedesmahl zum Gebrauch eine beliebige Quantität herausnimmt, ein drittel Wallnussöhl hinzusetzt, beides in einem irdenen Topf über einem mäßigen Feuer gut durcheinander rührt bis es sich völlig vermischt hat, worauf man es, bis es erkaltet, beständig umrühren muß. Dann ist der Vogelleim fertig. Damit er aber bey strengem Froste, wie oft geschieht, an den Ruthen nicht gefriere; so pflegt man zu der Composition den vierten Theil so viel Stein-



Steinöhl hinzu zu thun, als man Nußöhl genommen hat.

Die Hülse giebt die dichtesten und allerschönsten Hecken. Wer sich von dem Nutzen dieser Holzart zu Hecken nicht überzeugen kann, darf nur nach England reisen und ein Augenzeuge davon werden, wenn er dieses nicht will Leuten glauben, die da gewesen sind. Man trifft aber auch in Deutschland welche an. So sah H. Ehrhard im Bremischen einen Baumgarten, der mit einer zwölf Fuß hohen Hülsehecke befriedigt war, die so dicht war, daß kein Vogel durchfliegen konnte. An einem andern Ort fand er zwei große Bäume dieser Art vor der Hausthüre eines Landmannes gepflanzt. Allein solche Hecken taugen nicht in Gegenden, wo Wild ist, weil das Schwarzwild leicht durchbricht, und das Rothwild welches nebst den Schaafen den Knospen sehr nachgeht, dergleichen Hecken beschädigt und verdirbt.

Kalms Reisen I. 167. Ehrhards Beiträge II. 55. 86. Onomat. for. s. v. Strepalmhecke. Razi hist. 1622.

Für Lustpflanzungen hat diese Holzart ganz besondern Werth. Die Sorten mit einfärbig grünen Blättern machen in immergrünen Gruppen durch ihre Blätter gegen das mannichfaltige Grün andrer Sträucher einen angenehmen Contrast, weswegen sie auf eine Ausnahme in Bosquets gegründeten Anspruch machen können. Ehemals pflanzte man sie häufig einzeln und zog Kugeln, Halbkugeln, Pyramiden, auf eine unverantwortliche Art aus ihnen. Besser stellt man sie in Gruppen, und nichts gewährt einen schönern Anblick, als eine Sammlung von ihnen, wenn man sie ihrer Natur nach frey fortwachsen läßt, weil sie sich sodann ganz von unten auf bezweigen, und einen Keel zu bilden pflegen, dessen Grundfläche unmittelbar auf dem Boden steht. Sie haben zu jeder Zeit ein schönes Ansehen, jedoch im Winter das feinste, welches

ches sodann auch noch durch ihre zahlreichen rothen Beerenbüschel nicht wenig vermehrt wird.

Anmerk. So sehr es mir gefällt, daß wir alle nur mögliche Arten von Bäumen und Sträuchern in unsre Bosquets bringen und solche einheimisch zu machen suchen; so übel bin ich doch mit den meisten Besitzern derselben zufrieden, daß sie allda einigen von unsern alten deutschen Bürgern den Platz versagen. Ich will nur einen einigen nennen, und solcher ist die Hülse. Hat die Natur sich je Mühe gegeben, einen schönen Baum hervorzubringen; so ist es gewiß bey diesem geschehen. Man sehe einmahl seinen schönen Anstand, sein prächtiges, auch im härtesten Winter und bey der grimmigsten Kälte grünlänzendes Blatt, die kleine weiße Blüte, die wie Scharlach glühenden Beeren u. s. w. Ist wohl unter allen ausländischen Bäumen einer, welcher diesem gleich ist? Und doch vermisste ich ihn meist in allen Gärten. Fragt man nach der Ursache; so bekommt man zur Antwort, daß er sich nicht gerne verpflanzen lasse. Es kann so seyn. Ich sah aber doch im Bremischen vor einem Jahre einen Bauerngarten, dessen Einfassung aus zwölf Fuß hohen, sich frey gelassenen Hülzen bestand, die so dichte waren, daß kein Vogel durchkriechen konnte. Die schönste Umzäunung eines Gartens, die ich jemahls gesehen habe. Ich sahe ferner in einem benachbarten fürstlichen Garten große, neu angelegte Hülzenhecken, davon kein Stück ausgegangen war. Ich sah noch im letztern Herbst bey der Haushüre eines Landedelmanns, daß auf jeder Seite ein großer Baum von dieser Pflanze den Eingang zierte. Es muß also doch möglich seyn, daß sich die Hülse verpflanzen läßt. Wären eure Gärtner nun weniger commode, sagte der Anleger letztgedachter Hecken, und überließen ihre Arbeiten nicht unwissenden Tagelöhnern, sondern nähmen selbst ein Grabscheid in die Hände; so würden eure Gärten ebenfalls Hülzen zieren. Und jener Bremische Bauer erwiederte: Ja das glaube ich wohl! — ich habe sie auch selbst ausgegraben, und die Wurzel so viel möglich unbeschädigt gelassen, auch die Erde daran zu behalten gesucht, und das verpflanzen und begießen that ich auch selbst. Nun ziert aber auch meinen Garten, so lange ich lebe, ja vielleicht noch nach meinem Todt eine Hülzenhecke, da hingegen die Gärten meiner Nachbarn von Brettern oder dürren Zäunen umgeben werden, die alle Jahre kostbare Reparaturen erfordern. Ehrhards Beyträge II. 55.

§. 785.

Für Liebhaber scheckiger Gewächse befindet sich in den zahlreichen, gescheckten Hülzensorten, Stoff genug, zur Befriedigung ihres Vergnügens. Wenn aber ihre Schönheit recht auffallend werden soll, müssen sie in Gruppen zusammengepflanzt werden: denn alsdann sieht man mit einem Blick ganz kontrastirende Farben, von der Natur selbst auf die ihr eigenthümliche Art ungezwungen schattirt, Blätter von unterschiedener Größe und Gestalt und so mancherley Farbenzeichnungen welches alles sich gleichsam mit Fleiß vereinigt zu haben scheint, eine um so größere Mannichfaltigkeit zu machen. Hanburn glaubt, daß kein Gemählde im Stande sey, die Einbildungskraft auf eine angenehmere Art zu reizen, und die Sinne stärker zu rühren, als eine Gruppe von scheckigen Hülzen. Was aber ein solches Sortiment noch mehr empfiehlt, ist dieses, daß es sich eben in den Wintermonaten auf der höchsten Stufe seiner Schönheit zeigt. Im Sommer fehlt es nicht an genugsamen mannichfaltigen Gegenständen, die sich dem Auge alle Tage in einer ununterbrochenen Folge in ihrem Reiz darstellen. Im Winter aber sind solche Gegenstände etwas seltenes. Er hält also die Vertheilung scheckiger Hülzengruppen, in die für die immergrünen Bäume und Sträucher bestimmten Quartiere der Empfehlung würdig. Diese stellen sich dann mit der grünen Farbe ihrer Blätter, im Grün des blühenden Sommers dar, gegen welches die scheckigen Hülzen auf eine erhabne Weise kontrastiren und dem Lustwandler, wie ein in der Flor stehendes Blumenbeet entgegen lächeln. Und beyde sind in dieser Verbindung wahre Symbole eines ewigen Frühlings und eines immerwährenden Sommers.

Anmerk. Kalm hingegen ist den bunten Hülzen gar nicht ginstig. Die Einbildung sagt er, hat die Leute in das buntemachen der Stechpalme sehr verliebt gemacht, und man giebt sich

H h

daher



daher viele Mühe, durch pfpöpfen den Blättern, weisse und gelbe Ränder zu geben. Man hält solches für schön, in vernünftigen Augen aber haben solche Blätter ein kränkliches Aussehen. Man mag sie immerhin schön nennen: allein derjenige, der freiwachsende Stechpalmen in ihrem eignen starken und gesundem Grün, so wie ihre vollen Zweige im Winde spielen sah, kann die bunten und beschnittenen (wer wird aber letztere begünstigen?) nicht anders als für schlecht verbessert ansehen.

---

# R e g i s t e r

über die lateinischen, französischen und englischen Namen  
der beschriebenen Holzarten.

## A.

*Abeletree* 381.  
*Abies* 325. [336.](#) [339.](#) 341.  
 344. 345.  
*Acacia* [237.](#) 376.  
*Acacia* [237.](#)  
*Acer campestre* L. [467.](#) da-  
 sicarpum 470. Negundo, L.  
 473. platanoides L. 465.  
[Pseudoplatanus](#) L. [460.](#) ru-  
 brum L. 471. sacharinum L.  
 472. tataricum L. [474.](#)  
*Acer.* 460. [465.](#) 469. [470.](#)  
[471.](#)  
*Aesculus* 92. *Hyppocastanum*  
 L. ib.  
*Agrifolium* [475.](#)  
*Ajonc* 235.  
*Airelles* [217.](#)  
*Alder* 55.  
*Alder - Birch* 256.  
*Alizier* [175.](#)  
*Alnus* [257.](#) 260, *nigra* [54.](#) [55.](#)  
*Alouche* [178.](#)  
*Alpine - Frangula* [445.](#)  
*Alpine - Rose* [199.](#)  
*Amelanchier* [183.](#)  
*Anagyris* 231.  
*Andromeda* [113.](#) *polifolia*  
 114.  
*Andromede* 114.

*Anonis* [228.](#) [229.](#)  
*Apple - Rose* [204.](#)  
*Aquifolium* [475.](#)  
*Arbor Judae* [109.](#) *vitae* [309.](#)  
*Arbre de vie* [309.](#)  
*Arbutus* [115.](#) *Uva ursi* L. ib.  
*Arbutus* [115.](#)  
*Arctostaphyllum* 115.  
*Aria* [178.](#)  
*Arrête beuf* [228.](#)  
*Ash* [453.](#) 459. 460.  
*Aspentree* 385.  
*Aubepine* [155.](#) 158. [159.](#) 161.  
[162.](#) [164.](#)  
*Aubour* [231.](#)  
*Aune* [257.](#) 260. *noir* 55. 445.  
*Avellana nux* 281.  
*Avornus* [55.](#)  
*Azarole* 180. *Azerol* ib. *Aze-*  
*role* [163.](#) *Azerole - Pear-*  
*tree* [181.](#) *Azerolier* 163:  
 180. [181.](#)

## B.

*Balm of Giledd - Fir* [344.](#)  
*Balsam - tree* [387.](#)  
*Barnet - Rose* 198.  
*Baumier de Gilead* [344.](#)  
*Bear - berry* 115.  
*Beech - Sumach* 372.  
*Beech - tree* 295.



- Berberis 117. racemifera *Caragana de Siberie* 240.  
118. Berberis vulgaris L. Carpinus 276. Betulus L.  
118. ib. duinensis 280. orientalis  
 Berry-bush 118. 279. Ostria 279.  
 Berry-bearing Alder 445. Carpinus 276.  
 Betula 242. acuminata 255. Castanea 301. dentata 304.  
 alba L. ib. Alnus 257. B. A. pumila 305. fativa 301.  
 incana L. 260. carpinifolia Castanea 301. equina 92.  
253. Cedar 398. of Canada 309.  
 Betula 242. 253. 255. 260. of Libanon 350. Cedar-tree  
 Bilberry 97. 217. 401. 402.  
 Birch 256. Birch-tree 242. Cedre 398. 402. blanc 354.  
253. 255. du Liban 350.  
 Bird-Cherry 146. 149. Cedrus 398. 401. 402.  
 Blackthorn 133. Celtis, 357. occidentalis L. ib.  
 Blackwort 217. Celtis 357.  
 Bladder-Nut 90. Cembro-Pine 323.  
 Bleuets 217. Cerasi 138.  
 Bois d' *St. Lucie* 144. dur 274. Cerasus 138. 139. 143. 144.  
 gentil 107. avium 146. Mahaleb 144.  
 Bonnet de Pretres 58. Ceraso affinis 144.  
 Bouleau 242. a Papier 256. Cercis 109. canadensis L. 110.  
 Bourdaine 55. Siliquastrum L. 109.  
 Bourquepine 443. Cerisier 139. 142. 143.  
 Box-tree 262. 146. 148. 149.  
 Bromble 213. 214. 215. Cervispina. 443.  
 Branching-Broom 224. Chamaemespilus 153. 183.  
 Broom 219. 221. 223. 225. Chamaecerasi 51. Chamae-  
 Brusque, Gruet 235. cerasus dumetorum 51.  
 Bruyère 101. 105. 438. Chamaecerasus 143.  
 Buckthorn 360. 441. Chamaecerasier 51.  
 Buis 262. Chamaeelaagnus 361.  
 Bullace-tree 136. Chamaegenista 223.  
 Bufferole 115. Chammoek 228.  
 Butternut-tree 292. Charme 276. 279.  
 Button Wood 307. Chataigner. 301. 304. 305.  
 Buxus 262. arborescens ib. Chene 264. 266. 272. 273.  
 Buxus sempervirens arbore- 274. 275.  
 scens L. 262. Cherry 143. Cherry-tree 139.  
 C. 149.  
 Caprifolium 49. 51. Chesnut 301. Chesnut-tree 304.  
 Caragana. 306.  
 Chevre-feuille 49.

Chin-



*Chinquapin* 305.  
*Cidonia* 191.  
*Cinamom-Rose* 200. 201.  
*Cistus* Ledon 111.  
*Clematis* 130. *Flammula*  
 132. *Vitalba* L. 130.  
*Clematis* 130. *Clematidis* ib.  
*Clematite* 130.  
*Cluster-Nut* 283.  
*Cocconitea* 374.  
*Cocks/pur-Hawthorn* 159.  
*Coggygia* 374.  
*Coignassier* 191. 192. *Coignier*  
191.  
*Cormier de Lapponie* 174.  
*Cornelian Cherry-tree* 439.  
*Cornier* 439.  
*Corniulus* 441.  
*Cornus* 439. *mascula* ib. *sanguinea* L. 441.  
*Cornus mas* L. 439.  
*Cornus* 439. 441.  
*Corylus* 280. *arborescens*.  
 L. 283. *avellana* L. 281.  
*maxima* 283.  
*Corylus* 281. 283.  
*Cotoncaster* 153. 186.  
*Coudre moinsienne* 82. 83.  
*Cournouiller* 441.  
*Courrant.* 62. 63.  
*Crake-berry* 438.  
*Cranberry* 98.  
*Crap Apple; Crap-tree* 187.  
*Crataegus Aria* α L. 178.  
*Crus Galli.* L. 163. *Oxyacantha* L. 155. *tomentosa* L. 164.  
*Crataegus* 156. 158. 159. 162.  
164. 174. 175. 178. 180.  
184. 186.  
*Creeping-Climber* 132.  
*Crow-berries* 438.

*Cupressus* 352. *disticha* L.  
 353. *sempervirens* L. 353.  
*thyoides.* L. 354.  
*Cupressus* 355.  
*Cidonia* 191. 192.  
*Cypres* 353. 356.  
*Cypress; Cypress - tree* 353.  
 354. 355.  
*Cytise* 233. 234.  
*Cytiso-Genista* 219.  
*Cytisus* (*monadelphus*) 231.  
*austriacus* L. 233. *Laburnum* 231.  
*Cytisus* 233. 234.  
*Cytisus* 233. 234.

## D.

*Damask-Rose* 206.  
*Daphne* 105. *Laurcola* 106.  
*Mezereum* L. 107.  
*Daphnoides* 107.  
*Dewberry-bush* 115.  
*Dog-Rose* 206.  
*Dogwood* 441.  
*Doucin* 189.  
*Drogne* 235.  
*Drouiller* 178.  
*Dulcamara* 52.  
*Dwarf-Apple* 189. *scotch-Rose*  
189.  
*Dyers-Broom* 225.

## E.

*Elder* 84. 88. 89.  
*Eglantine or sweet Briar* 197.  
*Elm* 70. 73. 76. 78. *Elm-tree* 77.  
*Empetrum* 437. *nigrum* L.  
 438.  
*Empetrum* 438.  
*Erable* 460. 467. 469. 471.  
472. 473. 474.



*Erica* 101. *glabra* ib. Tetralix L. 105.

*Erica vulgaris* L. 101.

*Erica* 101. 105. *baccifera* 438.

*Epine blanche* 156. *luisante* 162. *noire* 133. *de Pinchaw* 164. *vinette* 118.

*Epinettee blanche* 336. *noir* 339.

*Evonymus* 57. *latifolius* silvestris 59. *petiolatus* 57. *verrucosus* L. 60.

*Evonymus* 57. 58. 59.

## F.

*Fagus* 295. *silvatica* ib.

*Fagus Castanea* L. 301.

Fagus 295. *Castanea* 304.

*Force* 235.

*Framboisier* 212.

*Frangula* 54. 55. 445.

*Frankincense-tree*; *pine* 321.

*Fraxinus* 453. *excelsior* L. ib. *nigra* 459. *rotundifolia* L. 460.

*Fraxinus* 453. 460.

*Frene* 453. 459. 460.

*Fufago* 57. *Fufaria* ib.

*Fufain* 58. 59. 60.

*Fustet* 374.

## G.

*Gagel* 361. 362.

*Gale* 361. or *sweet Willow* 362.

*Gallican-Rose* 205.

*Garou* 107.

*Genet* 219. 221. 223. 224. 225. 235. *sagittal* 227.

*Genevrier* 397. 398. 401.

*Genista* 222. *germanica* L. ib. *pilosa* L. 223. *sagittalis* L. 227. *tinctoria* L. 225.

*Genista* 219. 222. 224. 225. 235.

*Genistella* 222. 223.

*Giled-Fir* 344.

*Glastonbury Thorn* 158.

*Gleditsia* 376. *triacanthos* L. ib.

Gleditsia 376. 378.

*Gooseberry* 64. 65.

*Gorse* 235.

*Groseiller* 62. 63. 64. 65. 452.

*Grossularia glabra* 64.

*hirsuta* ib. *reclinata* 65.

*Grossularia* 61.

## H.

*Hawthorn* 155. 156. 158. 161. 162. 164.

*Hazel* 281.

*Heath* 101. 105. 438.

*Hedgehog* 477.

*Hedera* 66. *Helix* ib.

*Hedera* 67.

*Hedre* 195.

*Hemlock-Fir*. *Heml. spruce-Fir*. 345.

*Hep-tree* 206.

*Herbe à la puce* 371.

*Hickory Walnut* 294.

*Hippocastanum* 92.

*Hippophaë* 359. *Rhamnoides* L. ib.

*Holly* 475.

*Honeysuckle* 49. 51.

*Honey-Locust-tree* 376.

*Hornbeam* 276. *Hop. Hornbeam* 279.

*Horse-Chestnut* 92.

*Houx* 475. 476.

## I.

*Jean* 235.

*Jersey-pine* 319.



*If* 403.  
*Ilex* 475. *Aquifolium* L. 475.  
*Ilex* 475.  
*Ioncmarin* 235.  
*Iron-Wood* 279.  
*Judas-tree* 109. 110.  
*Juglans* 284. *alba acuminata* 294. *alba oblonga* 292.  
*nigra* 290. *regia* 284.  
*Juglans alba* L. 294. *cinerea* L. 292.  
*Juglans* 292.  
*Juniperus* 391. *caroliniana* 400. *communis* ib. *commun.* α L. 394. *commun* β L. 395.  
*lycia* L. 402. *Oxycedrus* L. 397. *phoenicia* L. 401. *Sanna* L. 396. *Sab.* β L. 397.  
*thurifera* L. 398. *virginiana* L. 398.  
*Juniper* 344. 395. 397.  
*Juniperus* 394. 395. 397.  
 398. 401.  
*Ivy-tree* 66.

## K.

*Kentish-cherry* 142.

## L.

*Laburnum* 231.  
*Landes* 235.  
*Lantana* 92.  
*Larch-Tree* 346. 348.  
*Larix* 346. *Cedrus* 350.  
*Laureola* 106. 107.  
*Laureole* 106.  
*Leaf-tree* 178.  
*Ledum* 111. *palustre* L. ib.  
*pal. latifolium* 112. *pal. thymifolium* 113. *pal. fol. variegatis.* ib.  
*Ledum* 111. 114.

*Lentiscus-leaved. Sumach* 372.  
 373.  
*Lierre* 66.  
*Ligustrum* 47. *deciduum* ib.  
*Ligustrum vulgare* L. 47.  
*Ligustrum al.* aut. 47.  
*Lilac* 45.  
*Lilas* 45.  
*Lime-tree* 124. 125. 126. 127.  
*Liriodendron* 128. *tulipiferum* ib.  
*Liriodendron tulipifera* L. 128.  
*Lonicera* 49.  
*Lonicera periclymenum* L. 49.  
*Xylosteum* L. 51.  
*Lonicera* 49.

## M.

*Mahaleb or perfumed Cherry* 144.  
*Malus paradisiaca* L. 189.  
*Malus Cotonea silvestris* 192.  
*pumila* 189. *silvestris* 187.  
*Manonier d'inde* 92.  
*Maple* 460. 465. 467. 469.  
 470. 471. 472. 473. *Maple-leaved Service-tree* 175.  
*Maple-tree* 474.  
*Marceau* 411. 414.  
*Marsh Cistus* 111. 114.  
*Marsh Elder* 79. 81.  
*Medlar* 151. 158. 164. 182.  
 185.  
*Melese* 346.  
*Merisier* 255.  
*Mespilus acerifolia* 158.  
*biflora* ib. *coccinea* 160. *Cotoneaster* 153. *M. C. rubra* ib. *M. C. nigra* 154. *M. C. fl. pleno; fructu luteo; fr. albo; major* 158. *Crataegus* 156. *cuneifolia* 163. 164.  
 5 b 4 Ger-



*germanica filvestris* 151. *lucida* 162. *M. l. latifolia*; *salicifolia* *ib.* *Oxyacantha* 155. *phoenopyrum* *L.* 165. *rotundifolia* 164. *viridis.* *L.* 161. *Xanthocarpus* *L.* 164. *Mespilus Amelanchier* *L.* 183. *arbutifolia* *L.* 184. *canadensis* *L.* 182. *Chamaemespilus* *L.* 186. *Mespilus al.* *Aut.* 151. 153. 156. 157. 158. 159. 163. 165. 170. 175. 177. 178. 182. 183. 186. *Mezereum* 107. *Micoculier* 357. *Missel*; *Misseltœ* 450. *Montiulmus* 75. *Morelle* 52. *Morus* 446. *alba* *L.* *ib.* *rubra* *L.* 448. *tatarica* *L.* 450. *Morus* 446. 448. *Mountain-Sumach* 372. *Mugho-Pine* 317. *Mulberry* 446. 448. 450. *Mulberry-tree* 449. *Mures de Renard* 213. *Murier* 446. 448. 450. *Myrica* 361. *Gale* *L.* *ib.* *Myrica* 229. *Myrtillus* 97.

## N.

*Nefflier* 151. 153. 158. 164. 186. *Nerprun* 443. *Nettle-tree* 357. *Newfoundland Spruce* 336. *Nex-Coupe* 90. *Night-Shade* 52. *Nois* 285. 286. *Noisettier* 281. 283. *Noyer* 284. 290. 294.

## O.

*Oak* 264. 266. 272. 273. 274. 275. *Obier* 79. 81. *Oleaster* 359. *Ononis* 227. *arvensis*; *arv.* *non spinosa* *ib.* *inermis* 229. *Ononis mitis* *L.* 229. *spinosa* *L.* 228. *Opulus* 79. 81. *Orme* 73. 77. *Orme Tilleul* 75. *Ormille* 70. *Osier* 417. 425. 427. 428. *Oslea* 441. *Ostria* 276. *Oxyacantha* 159. *Ozier* 417.

## P.

*Padus* 145. *Padus* 146. 148. *Paper-Birch* 256. *Pear-tree* 168. *Pear-Quince* 192. *Pendulous Fruited-Rose* 200. *Perfumed-Cherry* 144. *Perclymena* 49. *Periclymenum distinctum* 49. *Quercifolium*; *serotinum* 50. *Periclymenum* 49. *Pesse* 325. *Peuplier* 379. 380. 384. 385. 387. 389. 390. 391. *Picea* 311. 325. *Pimentroual* 362. *Pin* 311. 319. 322. *d'Arove* 323. *Chipre* 320. *de Tazda* 321. *a Trochet* 321. *Pinafter* 311. 317. *Pine* 311. 319. 320. 321. 322. 324.

## Pi.



*Pinus* 311. *Abies* 341. americana 345. balsamea 344. Cedrus 350. cembra L. 324. echinata 320. Larix L. 346. P. L. alba; nigra; rubra 348. laxa 336. mariana 339. maritima 313. montana 317. *Picea* 325. P. alba; cinerea; nana 331. rigida 321. rubra 340. silvestris L. 311. Strobus L. 322. Taeda L. 321. virginiana 319. *Pinus Abies* L. 325. *Picea* 341. *Pinus* al. Aut. 311. 317. 319. 320. 321. 322. 323. 331. 336. 340. 345. *Piper* rusticus 107. *Piperella* 63. *Pistacia* silvestris 90. *Pitch-Fir* 325. *Pine* 319. *Plane* 465. *Plane-tree* 307. *Platanus* 306. occidentalis 307. *Platane* 307. *Pliant-Meally-tree* 82. *Plume-tree* 137. *Poirier* 185. sauvage 168. *Poison-Ash* 367. Oak 369. 371. 372. vine 369. *Poisonous-Alder* 367. *Poisonood-tree* 367. *Polifolia* 114. *Pomier de Doucin; de St. Jean* 189. *Pomme d'Astracan; de Glace* 190. *Poplar* 379. 382. 384. 385. 388. 390. 391. *Poplar-tree* 128. 388. *Populus* 379. alba L. ib. canadensis 390. carolinensis 389. gracca 391. hetero-

phylla L. 388. Italica 384. nigra L. 382. Tacamahaca 387 tremula 385. *Populus balsamifera* L. 387. *Populus al. Aut.* 379. 382. 384. 385. 388. 390. 391. *Prickly-Broom* 235. *Privet* 47. *Prunier* 136. 137. *Prunus avium* L. 138. *Prunus Cerasus* 142. P. C. fruticosa 143. P. C. Mahaleb 144. infititia L. 236. *Prunus oeconomica* silv. 137. *Padus* L. 146. P. P. virginiana 148. spinosa L. 133. *Prunus domestica* L. 137. Mahaleb L. 144. virginiana L. 148. *Prunus al. Aut.* 133. 136. 137. 138. *Pseudo-acacia* 237. 240. *Pseudoligustrum* 146. *Purging-Thorn* 441. *Pyræ silvestres* 168. *Pyrus Cidonia* 191. C. silvestris; oblonga ib. maliformis 192. communis 167. *Crataegus* 174. C. Aria 177. C. Azarolus 180. C. torminalis 175. *Malus baccata* 190. frutescens 189. praecox ib. silvestris 187. *Mespilus* 182. M. Amelanchier 183. M. arbutifolia 184. M. Botryapium 182. M. Chaemespilus 186 communis domestica 169. nivalis ib. *Pyraster* 168. *Sorbus* 170. S. pinnatifida 174. silvestris 170. *Pollwilleriana* 181. *Pyrus baccata* L. 190. *Pollueria* L. 181.



*Pyrus* al. Aut. 168. 170. 174.  
175. 180. 183. 184. 186.  
187. 189. 192.

## Q.

*Quercus* 264. alba 272. bre-  
vipeduncula 265. *Cerris* 275.  
longipeduncula 265. *Prinos*  
274. *rubra maxima* 273.  
*Quercus* *robur* L. 264.  
*Quercus* al. Aut. 264. 265.  
266. 272. 273. 274.  
*Quiken-tree* 170.  
*Quince* 153. 186. *Quince-tree*  
191.

## R.

*Raspberry* 212.  
*Red-bud-tree* 110.  
*Redwhorts* 100.  
*Reinora* *aratri* 228.  
*Resta* *bovis* 228.  
*Rest-harrow* 228.  
*Rhamnoides* 360. *Rhamnoides*  
359.  
*Rhamnus* 54. 443. *alpinus*  
445. *catharticus* L. 443.  
*Frangula* L. 54. *saxatilis* 56.  
*Rhamnus* 55. 360. 443.  
*Rhododendron* 114.  
*Rhus* 363. *copallinum* 372.  
*Cotinus* L. 374. *C. cana-*  
*dense* 373. *glabrum* L. 365.  
*g. canadense* 366. *radicans*  
L. 369. *Toxicodendron* L.  
371. *typhinum* L. 363. *Ver-*  
*nix* L. 367.  
*Rhus* 361. 363. 365. 367.  
369. 371. 372. 374.  
*Ribes* 61. 452. *alpinum* 452.  
*nigrum* L. 63. *rubrum* L. 61.  
*Ribes* *Grossularia* L. 64. *re-*  
*clinatum* 65.

*Ribes* al. Aut. 61. 62. 63. 64.  
*Robinia* 237. *Caragana* L.  
240. *Pseudoacacia* 237.  
*Robinia* *altagana*; *sibirica*  
240.  
*Romarin* *sauvage* 111. 112.  
113.  
*Ronce* *de champs* 215.  
*Rosa* 195. *alba* L. 210. *al-*  
*pina* L. 199. *canina* L. 206.  
*collincola* 200. *corymbifera*  
208. *gallica* L. 205. *herpor-*  
*hodon* 202. *lanceifolia* 205.  
*mollifolia* 203. *pendulina* L.  
200. *pimpinellifolia* 198.  
*pomifera* 203. *rubiginosa* L.  
196. *spinosissima* 198. *um-*  
*bellata* 207.

*Rosa* *cinnamomea* L. 200.  
*villosa* L. 203.  
*Rosa* al. Aut. 196. 197. 198.  
199. 200. 201. 202. 203.  
206. 211.

*Rose* *de canelle* 200. *Rose-wil-*  
*low* 423. *Rose without thorns*  
199.

*Rosier* 197. 198. 204. 205.  
206. 210.

*Rosmarinum* *silvestre* 111.  
114.

*Rubus* 211. *caesius* L. 215.  
*Fruticosus* 213. *idaeus* L.  
212.

*Rubus* 212. 213. 214. 215.

## S.

*Sabina* 396.

*Sabine* 396. 397.

*Sagittated Broom* 227.

*Salix* 410. *acuminata* 415.  
*alba* L. 428. *amygdalina*  
426. *arenaria* L. 420. *au-*  
*rita* L. 414. *caprea* L. 411.  
cine-



cinerea L. 413. fragilis L. 413. fusca L. 419 helix L. 423. incubacea 422. polyandra 423. purpurea L. 424. rosmarinifolia L. 416 triandra L. 432. viminalis L. 417. vitellina L. 427.  
**Salix** laurea L. 434.  
**Salix** al. Aut. 411. 415. 417. 419. 420. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 431. 432. 433. 434.  
*Sallow* 411. 415.  
**Sambucus** 84. laciniata L. 88. nigra L. 84. racemosa L. 89.  
**Sambucus** 84. 86. aquatica; palustris 79.  
**Sanguis** 441.  
**Sapin** 341. 345.  
**Saule** 416. 419. 420. 423. 426. 431. 433. 434.  
**Savin** 397.  
*Service* 174.  
*Siberian-spiraea* 144.  
**Siliquastrum** 109. 110.  
*Silver-Fir.* 341.  
*Sloe-Bush; Sloe-tree* 133.  
*Snowball-Viburnum* 81.  
**Solanum** 52. scandens 53.  
**Solanum** dulcamara L. 53.  
*Sorbier des Oiseleurs* 170.  
**Sorbus** aucuparia L. 170. hybrida L. 174.  
**Sorbus** al. Aut. 175. 178 186.  
*Sowin* 396.  
**Spartium** 219. 221. scoparium L. ib.  
**Spina** acuta 156. intectoria 443.  
*Spindle-tree* 58. 59 60.  
**Spiraea** 193. chamaedrifolia

lia 194. salicifolia L. 193. undulata 194.  
**Spiraea** 193. 194.  
*Spiraea a feuilles de saule* 193. 194. de fieberie 194.  
*Spruce-Fir.* 326. 336. 339. 340.  
*Spurge-Laurel* 106.  
**Straphyllea** 90. pinnata L. ib.  
**Staphylodendron** 90.  
**Sumac** 363. 365. 369. 372.  
**Sumach** 363. 364. 365. 366. 374.  
*Sureau* 84. 88. 89.  
*Swamp-Sumach* 367.  
*Sweet-Willow* 362.  
*Sycamore-tree* 460.  
**Syringa** 45. vulgaris L. ib.

## T.

*Tacamahac-Poplar; Tacamahac-tree* 387.  
**Tamariscus** 229. 230.  
*Tamariske* 230.  
**Tamarix** 229. Germanica L. ib.  
**Tamarix** 229.  
**Taxus** 402. baccata L. 403.  
**Taxus** 403.  
**Thuja** 308. occidentalis 309.  
*T. O. odorata; variegata* 310.  
**Thuja** 309.  
**Thymelaea** 106. 107.  
*Tileul* 124.  
**Tilia** 121. mucronata 127. nigra 126. platyphyllos 124. ulmifolia 125.  
**Tilia** europaea α L. 124.  
*T. c. γ. L.* 125.

Tilia



*Tilia* al. Aut. 124. 125. 126.  
127.

*Tilia* mas 75.

*Tillau* 125. 126. 127.

*Torchepin* 317.

*Toxicodendron* 367. 369.

*Transparent - Apple* 190.

*Travellers - Joy* 130.

*Trempling - Poplar* 385.

*Triple - thorned Acacia* 376.

*Troene* 47.

*Tulipier; Tulip - tree* 128.

*Tulipifera Liriodendron* 128.

## U.

*Ulex* 234. europaeus L. 235.

*Ulmus* 68. americana L. 77.

hollandica L. 76. minor ib.

mollifolia 78. octandra 73.

scabra L. 75.

*Ulmus* 70. 73. 74. 76.

*Uva crispa* 64. spina 65. Ur-  
si 115.

## V.

*Vaccinium* 97. monadel-  
phum 217. Oxycoccos L.  
98. racemosum 99. uligino-  
sum L. 97.

*Vaccinium Myrtillus* L. 217.  
218. vitis idaea L. 99.

*Vaccinium* 217. 218.

*Varnish - tree* 367.

*Vernis* 367.

*Viburnum* 70. Lantana L.  
82. Opulus 79.

*Viburnum* 82.

*Viorna* 130.

*Vitis idaea* 97. 99. 183. 217.

*Virga sanguinea* 441.

*Viscum* 450. album L. ib.

*Viscum* 450.

## W.

*Walnut* 284. 285. 286. 290.  
294.

*Walnut - tree* 292.

*Water - Beech* 307. Poplar ib.

*Wayfaring - tree* 82.

*Wedgeteaved - Mespilus* 163.

*Weymouth - Pine* 322.

*Whins* 235.

*White - Rose* 210. 211.

*White - Wood* 128.

*Whortle - Berry* 217.

*Whortle - Berries* 100.

*Wilding or Crap Apple* 187.

*Wild - Rosemary* 111. 112.  
113. 114.

*Willow* 414. 416. 419. 420.  
421. 425. 426. 427. 428.  
431. 433. 434.

*Willow leaved Spiraea* 193.  
194.

*Witch - Hazel.*

## X.

*Xylosteum* 51.

## Y.

*Yew - tree* 403.

*York and Lancaster varieg. Ro-  
se* 206.

*Yperea* 70. 76.



# Deutsches Namenregister.

## A.

- Aalbesie 63. Aalbesinge ib.  
 Abele 380.  
 Abellen 380.  
 Abreschenbaum 170.  
 Acacia, falsche 237. die wah-  
 re 376. Acacienbaum, un-  
 ächter 237.  
 Acacienbaum 237.  
 Aderbrombeere 215.  
 Aderhauechel 228. flach-  
 liche ib. unbewehrte 229.  
 Abarten ib.  
 Aderweide 420.  
 Adlasbeerbaum 175.  
 Adlersbeere 175.  
 Ackerbaum 266.  
 Alebaum 175.  
 Aelschelebaum 175.  
 Aelpe 385.  
 Affelter 450.  
 Affenbeerstrauch 438.  
 Affholder 80.  
 Affolter 450.  
 Ahlbeere 63.  
 Ahlfirsche 51.  
 Ahorn 460. gemeiner ib. g.  
 mit gelbgeschecktem Laub  
 462. gestreifter 469. schar-  
 lachrother 471. tatarischer  
 474.  
 Ahorn, canadischer gestreifter  
 469. kleiner, großer, spitz-  
 blättriger 465. deutscher,  
 milchblättriger 467. norwe-  
 gischer; polnischer ib. roth-  
 blühender 471. deutscher;  
 weiser 461.  
 Alabeer 63.  
 Alantbeer 63.  
 Alaprobst 380.  
 Albe 379. Alber; Alberbrust;  
 Albernbaum 380.  
 Alder 257.  
 Ale 146.  
 Alfranke 52. steigende 53.  
 Alhern; Alhorn 84.  
 Alpenebenholz 231.  
 Alpenfaulbaum 445.  
 Alpenheckenfirsche 52.  
 Alpenjohannisbeere 452.  
 Alpenkiefer, kleine 317.  
 Alpenkrenzdorn 445.  
 Alpenrose 199. hochrothe;  
 weisse 200.  
 Alpenwegedorn 445.  
 Alpfirsche 146.  
 Alsbeerenbaum 175.  
 Altbaum 146.  
 Amelanchier 183.  
 Anselbeerdorn 443.  
 Andromeda 113. polenblätt-  
 rige 114.  
 Auerle 467.  
 Angerbinbaum 467.  
 Angerweide, kleine 422.  
 Ape 146.  
 Alpenbeerstrauch 438.  
 Alpenirsche 151.  
 Alpenbeerstrauch 438.  
 Apffel, beerartiger; moskow-  
 tischer; sibirischer, durchsich-  
 tiger 190. süßer; wilder 189.  
 Apfela



- Apffelbaum 186.  
 Apffelbaum, wilder 186.  
 Apffelquitte, wilde 192.  
 Apffelstrauch 189.  
 Apleru 467.  
 Appenbeerstrauch 438.  
 Appeldorn 467.  
 Arbe 324.  
 Arbeere 175.  
 Arbielbaum 380.  
 Aresel 170.  
 Arintsweide 418.  
 Arkirsche 175.  
 Arlasbaum 178.  
 Arle 257. 461.  
 Arlsbaum 175.  
 Arlsbeerbaum 175. weiser 178.  
 Aroßel 175.  
 Arve 324.  
 Asche, Aichbaum 453.  
 Aipe 379.  
 Atlasbaum 175. 178. Atlas-  
 beere 175. Atlasbeerbaum  
178.  
 Augsteiche 266.  
 Azarolapffelbaum 180.  
 Azerolbaum 180.  
 Azerolbirnbaum 180.  
 Azerolhagedorn 180.  
 Azerolmispel 180. Azerolmi-  
 spelbaum, virginischer 163.  
 Azeroll, nordamerik. großer,  
 weiser 159.
- B.
- Baberesche 385.  
 Bachholder 80.  
 Bachweide 423.  
 Bärenbeere 115.  
 Bärentraube 115.  
 Balsampappel 387. rothe ib.  
 Balsamtanne 344.  
 Balsamtanne, giledische 344.
- Bandstrauch 82.  
 Bandweide 416. braune 427.  
 gelbe ib. große 418. rothe  
425. 427.  
 Banholz 47.  
 Bastardkiefer, nordamerikan.  
 zwey und drey nadeliche; vir-  
 ginische 320.  
 Bastardsorbus 174.  
 Bastardspenerling 174.  
 Bastardquitte 186.  
 Bastiline 75.  
 Bauerkirsche 142.  
 Bauernpflaume 137.  
 Baumholder 84.  
 Baumweide 428.  
 Baumwinde 66.  
 Baumwollenweide 434.  
 Bayselbeere 118.  
 Beberesche 385.  
 Bechholder 80.  
 Bechner 55.  
 Bechtanne 326.  
 Beere, finnische 360.  
 Beerenholz 55.  
 Beerheide 438.  
 Beerstrauch, schwarzer 84.  
 Weinholz 47. 51. 441. rothes ib.  
 Weinhölzlein 47.  
 Weinstöckholz 51.  
 Weinhülse 47.  
 Belle 380. 384. Bellweide  
380.  
 Bendelholz, schwarz 146.  
 Berberisstaude; Berberizen;  
 Berberbeere; Berbis; Ber-  
 bisbeere 118.  
 Bergahorn 465. weiser 461.  
 Bergeiche 264.  
 Bergfichte 317.  
 Bergholder 89.  
 Bergjohannisbeerstrauch 452.  
 Bergkiefer, sibirische 324.  
 Berg-



- Berglinde 125.  
 Bergrose 198. 199.  
 Bergrüster 75.  
 Bergquittenbeere 153.  
 Berke 243.  
 Berlweide 427.  
 Besenheide, braunrothe 105.  
 Besenpfrieme 219. mit weißer Blume 221.  
 Besige; Besinge; Besingstrauch, schwarzer 217.  
 Bettlerskraut 130.  
 Beuhbaum 295.  
 Bickbeere; Bickelbeere 217.  
 Bienenheide III.  
 Bilze 136.  
 Binbaum 467.  
 Bindweide, rothe 426.  
 Birkbaum 243.  
 Birke 242. spitzblättrige 255.  
 Abarten derselben ib. und 256.  
 Birke mit dem Hopfenschopffe; rothe 255. schwarze 253.  
 warzige 256. zähe 255.  
 Birne, canadische 182.  
 Birnbaum 167. gemeiner ib. wilder 168.  
 Birnstrauch, nordamerikanischer mit Erdbeerblättern 85.  
 Birnquitte, wilde 191.  
 Bittersüß 53.  
 Bitterweide 431. 434.  
 Blasennuß 91.  
 Blasengrün 443.  
 Blaubeere 217.  
 Bloder, wilder 142.  
 Blumenrüster, langstieliger 75.  
 Blutkirsche, wilde 142.  
 Bockbeere 215.  
 Bockbeere, kriechende, blaue 215.  
 Bogenbaum 403.  
 Bohnenbaum 231.  
 Bolle 380. Bollweide ib.  
 Bramen 220.  
 Brandlinde 125.  
 Brasilienholz, falsches, gelbes 374.  
 Braunheil, deutsches 47.  
 Brechweide 51. 431.  
 Brehme 219.  
 Breitblatt 465.  
 Breitlaubere 461.  
 Breitlehne 465.  
 Breiulobern 465.  
 Bremen 214.  
 Briselbeere 118.  
 Brockenbirke 245.  
 Brom 220.  
 Brombeerstrauch 213. Abarten desselben 215.  
 Brombeerstrauch großer; hoher; polnischer 214.  
 Bromen 214. 220.  
 Bruchweide, mandelblättrige 432.  
 Bruchbeere 97.  
 Bruchweide 431.  
 Bruchweide, weisse 428.  
 Bruchwerffweide, kleine rauhe 420.  
 Brumbeerstrauch 213.  
 Buchbaum 295. Buche ib.  
 Buchsbaum 262.  
 Buchsbaum, baumartiger, hochstämmiger 262.  
 Buche 295.  
 Buchelbeere 100.  
 Büche 295.  
 Bückenbeere 100.  
 Bügelholz 82.  
 Büschelbirne 184. Abarten davon 185.  
 Büschelkiefer, virginische 321.

Bü



Büschelfirsche [146.](#)  
 Buschapffel [187.](#)  
 Buschweide [426.](#) [433.](#) kleine  
 416.  
 Buttelhöfen 206.  
 Butternußbaum [292.](#)

## C.

Calinen; Calinchenbeere; Calinchenbeere [79.](#)  
 Caneelbeerstrauch [439.](#)  
 Caninienbeere [79.](#)  
 Caprifolium, wildes [50.](#)  
 Caragana 241.  
 Ceder, canadische, weisse [309.](#)  
 lycische [402.](#) phönicische [401.](#)  
 rothe carolinische [401.](#) rothe  
 virginische [398.](#) russische [324.](#)  
 selavonische [397.](#) sibirische  
[324.](#) spanische [398.](#) wahre  
 350. weisse [354.](#)  
 Cedermacholder [397.](#)  
 Cedernfichte [324.](#)  
 Cembrobaum [324.](#)  
 Cercis [109.](#) canadischer [110.](#)  
 gemeiner [109.](#)  
 Cercis, großer [109.](#)  
 Cerinde [45.](#)  
 Cerreiche [275.](#)  
 Chingert [47.](#)  
 Chinquabinbaum 306.  
 Christdorn [475.](#)  
 Cirbelbaum [312.](#)  
 Clematitis, gemeine 130.  
 Clupers [394.](#)  
 Copalsuchmach [372.](#) cana-  
 discher [373.](#)  
 Corinthenstrauch; Corinthier-  
 strauch, falscher [452.](#)  
 Corle [439.](#)  
 Cornelbaum [439.](#) gemeiner  
 ib.

Corneliuskirschen; Cornelkir-  
 schenbaum; Cornelkirchen-  
 strauch; Corniolen [439.](#)  
 Cornwallistanne, lang-  
 zapfige [331.](#)  
 Courbaril [237.](#)  
 Creutzbaum [467.](#)  
 Creutzbeere [443.](#)  
 Creutzdorn [360.](#)  
 Cronwitt [394.](#)  
 Cypresse [352.](#) immergrüne  
 357. zweizeilige [355.](#)  
 Cypresse, acacienblättrige 355.  
 gemeine [357.](#) kleine, blau-  
 beerige 354. virginische mit  
 abfallenden Nadeln 355. weisse  
[354.](#)  
 Cytisus 231. östreichischer  
[233.](#) schwärzlicher [234.](#)  
 Cytisus, immergrüner, tatar-  
 rischer [233.](#)

## D.

Damascenerrose, rothe;  
 weisse; röthliche [206.](#)  
 Dannenbaum [341.](#) roth [326.](#)  
 Darmbaum; Darmbeere;  
 Darmbeerbaum; Darmbeers-  
 hagedorn [175.](#)  
 Dientel [439.](#)  
 Dierling [439.](#)  
 Dierlich; Dierlichenstrauch [439.](#)  
 Dintenbeer [443.](#) Dintenbeere  
[144.](#) Dintenbeerstrauch [47.](#)  
 Dintenbeerkirsche [144.](#)  
 Dörlingsbaum [439.](#)  
 Dorlen; Dorlenstrauch [439.](#)  
 Dornrose 206.  
 Dornschlehen [133.](#)  
 Dotterweide [427.](#)  
 Drachenbaum, deutscher 146.  
 Dropelbeere 80.

Drum.



Drumpelbeere 97.  
 Dünenbesingstrauch 360.  
 Dünentrose 197.  
 Du lize, wilde 441.  
 Dürleiche 264.  
 Dymnenstaude 394.  
 E.  
 Ebenbaum 403.  
 Ebenholz, falsches 231.  
 Eberaschenbaum 170.  
 Ebrizbaum 170.  
 Ebschbeerbaum; Ebschenbeers-  
 baum 170.  
 Echenbaum 403.  
 Edelesche 453.  
 Edelianne 341.  
 Egelbaum; Egele; Egelebirn  
175.  
 Eglanterrose; Eglantier 197.  
 Ehelein; Ehelinsveere; Ehle  
175.  
 Ehre 461.  
 Eibe; Eiben; Eibenbaum 403.  
 Eibischbeerbaum; Eibschbeers-  
 baum 170.  
 Eiche 264. weise 272.  
 Eiche, burgundische 275. ge-  
 meine 266. kastanienblättrige  
274. langstielige 266. rothe  
273.  
 Eischbele; Eischbirle 175.  
 Eiseiche 264. Eisholzleiche  
 ib.  
 Eisenbeerstrauch 47.  
 Elexbeere; Elex; Elexen 146.  
 Elge 175.  
 Ellern 257.  
 Ellrike 175.  
 Elpe 146.  
 Else 257. nordische 261. Else-  
 beerbaum 175. gemeiner, ro-  
 ther ib.

Elsbirlebaum 178.  
 Elst; Elsterbaum; Elten 257.  
 Elzbeere; Elze 175.  
 Elzbeere 140. nordamerikanis-  
 che 159.  
 Elzbirnbaum 175. Abarten  
 davon 176.  
 Emmerle; Emmerling 142.  
 Eng. Irbierrose 197.  
 Epe 76.  
 Epellern; Eperle 467.  
 Ephen, gemeiner 66.  
 Eppin 66.  
 Erbselbeere 118.  
 Erbsenbaum, sibirischer 241.  
 Erbsenstrauch, sibirischer 240.  
 Erdepheu 66.  
 Erdspeime, kleine 224. rau-  
 he ib. stehende 223. ungar-  
 rische 224.  
 Erdrose 198.  
 Erdweichsel 143.  
 Erdweide 433. gelbe; Frie-  
 chende; liegende 422.  
 Ere 461.  
 Erle 257.  
 Erle, gemeine 257. langblättr-  
 ige 261. nordische, weise  
260. raube, weißgraue ib.  
 weise norwegische; preussische;  
 pommerische; nordische 261.  
 Erlenbirle 256.  
 Eschbaum 453.  
 Esche 453. gemeine ib. schwar-  
 ze 459.  
 Eschern 453.  
 Eschrösel 170.  
 Eschenahorn 473.  
 Espe 385. weise 380.  
 Espel 151.  
 Espenbaum 381.  
 Esdorn 467.  
 Esigdorn 118.

Si

Esigo



**Eßigrose** 205. gemeine; bun-  
te; schwarze 206.

**Eßlein** 178.

**Egenbaum** 175.

**Eue, Euen, Ere** 403.

**Evereschenbaum** 170.

**Erig, Ewig** 66.

**Emischbaum** 170.

**Eyerbretterholz** 58.

**Eyerling** 175.

**F.**

**Fackelbaum; Fackelbeere** 79.

**Fackelfor** 311.

**Färbbeere** 443.

**Färbeblumen; Färberginster;**

**Färberkraut; Färberpfrieme**

225.

**Färbginster** 225.

**Falbinger** 428.

**Farbedorn; Farbekörner** 443.

**Farbenblumen, gelbe** 225.

**Farbholz** 374.

**Faulbaum** 54.

**Faulbaum, falscher** 146. grü-  
ner 47.

**Faulbeere** 55. 146. schwarze  
55.

**Faulesche** 170.

**Felbaum** 382.

**Felbbeere** 443.

**Felber** 428. weiser ib.

**Felbinger** 428.

**Feldbirnbaum** 168.

**Feldcypreß** 394.

**Feldweide** 420 kleine 422.

**Feldwerfft, kleiner** 420.

**Felenpeß** 394.

**Ferberbaum** 374.

**Ferche** 312.

**Ferckeleiche** 266.

**Festenbaum** 312.

**Feuchttanne** 326.

**Feuerstaude** 394.

**Feurenfahne** 312.

**Fichtbaum** 311.

**Fichte, schwarze** 339. weisse  
336.

**Fichte, sächsische** 326. schwar-  
ze 322. weisse, nordamerika-  
nische 336. wilde 311.

**Fichten, deutsche** 325.

**Fieberweide** 431. 434.

**Fiechtbaum** 311. Fiechtanne  
326.

**Fiedelrümpfchen** 51.

**Firnifßbaum** 367.

**Fischerweide** 417.

**Fistelholz** 374.

**Flacheweide, grose** 418.

**Flatteraspe, Flatteresche** 385.

**Flegelholz** 277.

**Flidder, Flieder** 84. spani-  
scher 45.

**Fliegenbaum** 74.

**Fliegenbeerstrauch** 183.

**Flitter** 84.

**Flitteresche** 385.

**Flübbirle** 153.

**Flübbirnstrauch** 183.

**Flübfirsche** 51.

**Forcheln** 311.

**Forchbaum** 312.

**Föhre** 311. 312.

**Förling** 311.

**Fohre** 313.

**Forenbaum, Forle, Forren**  
311.

**Fosspiepen** 51.

**Frauenrose** 198.

**Frauenschuel** 220.

**Früheiche** 266.

**Frühlinde** 124.

**Färe** 312.

**Fürwitzel** 439.

**Fuhlborn** 55.

**Gane**



**G.**

Gänseflieber 80.  
 Gänsemord [130.](#)  
 Gärnischbaum 170.  
 Gäst, Gast [220.](#)  
 Gagel [322.](#)  
 Galingenbaum [79.](#)  
 Geißbaum [453.](#)  
 Geißblatt, deutsches; gemei-  
 nes; holländisches; wildes  
 49.  
 Geißbohnenbaum 168.  
 Geißhülse [47.](#)  
 Geißstaude 231.  
 Gelbholz; Gelbholz: Sumach  
[374.](#)  
 Gelderrose, wilde 80.  
 Gelster; Geneste; Genister [220.](#)  
 Genst [225.](#) gemeiner ib.  
 Fenster 220. grüner ib.  
 Gerbermyrte 362.  
 Gester [220.](#)  
 Gichtbeere 63.  
 Gichtkraut 438.  
 Gichttanne 111.  
 Gieniz 220.  
 Giffbaum [367.](#) [371.](#) eichen-  
 blättriger [371.](#) wurzelnder  
[369.](#)  
 Giffteiche 371.  
 Gifftesche 367.  
 Giffsumach [371.](#)  
 Gilbkraut [225.](#)  
 Gimpelholz 80.  
 Ginster [222.](#) deutscher ib. haa-  
 riger [223.](#) pfeilsförmiger [227.](#)  
 Ginster [220.](#) ästiger [224.](#) fär-  
 bender [225.](#) haariger [223.](#)  
 Nachlicher [223.](#) [235.](#)  
 Girlweide 416.  
 Glanzmispel, breitblättrige  
 162. schmahlblättrige ib.

Glasapffel [190.](#)  
 Glastonburyhagedorn  
 158.  
 Glasweide 431.  
 Gleditschie 376. drenstache-  
 liche ib. dorulose 378  
 Gleditschie, dornige [376.](#)  
 Gdgenholz 380.  
 Goldweide [427.](#)  
 Gooseflieber 80.  
 Gänst [220.](#)  
 Gränholz [312.](#)  
 Grandenbeere 100.  
 Granenholz [326.](#)  
 Granze 111. kleine [114.](#)  
 Graselbeere 65.  
 Graslinde [124.](#)  
 Granfichte 331.  
 Grichsche [220.](#)  
 Griesholz [47.](#)  
 Grisselbeere 100.  
 Grinisch; Grinsche [220.](#)  
 Grübeldnuß [285.](#)  
 Grünbeere 65.  
 Grünling [220.](#)  
 Grünfelbaum [47.](#)  
 Grünspan [220.](#)  
 Grundholz [55.](#)  
 Grundweide [417.](#) schmahl-  
 blättrige 416.  
 Grunzel 65.

**H.**

Haarbeerstrauch [212.](#)  
 Haarholz [146.](#)  
 Haarweide, feine, kleine [416.](#)  
 gelbe [427.](#) große [418.](#) lange  
[417.](#) rothe [425.](#)  
 Hachenbuche [277.](#)  
 Hägerweide [426.](#)  
 Härten 441.  
 Härtern, Härthern [47.](#)

**I 2**

**Hae**



- Haferkirsche 139.  
 Haferrose 198. bleichrothe;  
 gestreifte; marmorirte; mit  
 scheidigen Laub; weisse 199.  
 Hafer schlehe 136.  
 Haffdorn 360.  
 Hageapffelstrauch 156. kleiner  
 155.  
 Hagebuche 277.  
 Hagebuttenrose, große 203.  
 Hagebuttenrose 206. rauche  
 204.  
 Hagedorn 156. ahornblättri-  
 ger; mit gefüllter Blume;  
 gelber; großer 158. grüner  
 161. weisser 158.  
 Hagedorn 156. grüner, ohne  
 Stacheln 161. rundblättriger  
 164. wolliger 165.  
 Hagedornbirnbaum 174.  
 Hagedornrose 206.  
 Hagehot 156.  
 Hagehotten; Hagehöffen; Ha-  
 gehüttchen 206.  
 Hagenweide 423.  
 Hagseiler 130.  
 Hainbuche 276. buinische; mora-  
 genländische 279.  
 Hainbuttenrose 206.  
 Hainhocken 206.  
 Hahnehodchen; Hahnenklob-  
 chen 206.  
 Hahnenhöddlein; Hahnenhüt-  
 lein; Hahnenklobchen 58.  
 Hahnenstorn 159.  
 Halinke 79.  
 Hammerbesien 100.  
 Hanbuttenbirne 181.  
 Hanfweide 417.  
 Hangelbirke 245.  
 Hanreschbaum 170.  
 Hartbaum 441.  
 Hartkraut 228.  
 Hartholz 277.  
 Hartheide 111.  
 Hartreder; Hartdthern 441.  
 Hartriegel rother 441. mit  
 scheidigem Laub; mit blauen;  
 mit rothen; mit weissen Be-  
 ren 442.  
 Hartriegel, unächter; weisser  
 47.  
 Hartstrauch; Hartwinde 441.  
 Harzbaum 312.  
 Harzeiche 264. Harztanne 326.  
 Hasel 280. Haselbaum 283.  
 Haselreide 266.  
 Haselstaude 281. Haselnuß-  
 staude, baumartige 283.  
 Haselnußstrauch 281. baum-  
 artiger 283. Haselstrauch,  
 wilder 281.  
 Haselstrauch, gemeiner 281.  
 großer 283.  
 Hasengeil; Hasenheide 220.  
 Hartschapersche 202.  
 Haubeere 82.  
 Haubuche 277.  
 Hauhechel 227.  
 Haushülse 47.  
 Heckdorn 133. 156.  
 Hecke buche 277.  
 Heckenapfel 189.  
 Heckenbaum 441.  
 Heckenkirschen 51. gemeine  
 ib.  
 Heckenkirsche 142.  
 Heckenrose, große, äpfeltra-  
 gende 204.  
 Heckenweide 423.  
 Heckenweisdorn 156.  
 Heckholz 47.  
 Heckerose 206.  
 Hecksamen, europäischer 235.  
 Heckschlehen 133.  
 Heide 101.

Heide



- Heide 101. glatte ib.  
 Heide, brabantische 105. beer-  
 rentragende 438. gemeine  
 101. niederländische; rothe;  
 rothschwärzliche 105. schwarz-  
 beerige 438. ungarische 105.  
 weise 111.  
 Heideginster 235.  
 Heidel 217.  
 Heidelbeere 97. verwach-  
 sene 217. mit weiser Frucht  
218.  
 Heidelbeere, blaue 217. rothe  
 100. schwarze 217.  
 Heidelbeermyrte 362.  
 Heidelbeerstrauch, großer 97.  
 schwarzer 183. spanischer  
 116.  
 Heidelstaude; Heidelstrauch  
217.  
 Heidenrose 198.  
 Heidepfrieme, kleine 224.  
 Heidepfriemen 220.  
 Heideschmuck 225.  
 Heidnischbienenkraut 111.  
 Heil aller Schaden 450.  
 Heiligenholz 380.  
 Heller 80.  
 Hemlockstranne 345.  
 Herliche 439.  
 Hermeltingbaum 187.  
 Heßpon 151.  
 Heuhechel 228.  
 Heuschreckenbaum, der honig-  
 tragende 376. wohlriechender  
 237.  
 Herenbaum 146.  
 Herenstrauch 130.  
 Henbe 101.  
 Hiefe 206.  
 Himbeere 212.  
 Himbeere 211.  
 Himbeerstrauch, gemeiner  
212.  
 Himmelbreme 212.  
 Himpelbeere 212.  
 Hindbeere 212.  
 Hirschkraut 53.  
 Hirschbirle 153.  
 Hirschdorn 443.  
 Hirschsolbensumach 363.  
 größer; niedriger 304.  
 Hirschkraut 53.  
 Hirschholder 80. Hirschholler  
 89.  
 Hirsedorn 443.  
 Hbckernbaum 294.  
 Hbckernwallnuß, weise 294.  
 Hblige 187.  
 Hdrick; Hdrlick 175.  
 Hdrlicken 439.  
 Hduche 187.  
 Hohlbeere 212.  
 Hohlheide, stehende 223.  
 Hohlkirsche 146.  
 Hohlweide 412.  
 Holder 84. spanischer 45. wil-  
 der 89.  
 Holdernetzeln 82.  
 Holler, rother 89.  
 Hollunder 84. schwarzer ib.  
 Abarten desselben 86. petersta-  
 lienblättriger 88.  
 Holunder, spanischer 45.  
 Holperlebeere 100.  
 Holst 475.  
 Holstbeerbaum 168.  
 Holzapfelbaum 187.  
 Holzbirnbaum 168. weiß-  
 blättriger 169.  
 Holzstöcklingbaum; Holzstöck-  
 lingbaum 187.  
 Holzwalldrebe 130.  
 Hombeere 212.  
 Hopfenhornbaum 277.  
 Horstkenbeerstaude 439.  
 Hornbaum 276. gemeiner ib.  
Si 3 duinis



buinischer 280. morgenlän-  
 discher 279.  
 Hornbaumbirke 253.  
 Hornfirsche 439.  
 Hornrauchbuche 277.  
 Hornrose 206.  
 Hundebaumholz 443.  
 Hundsbäum 51. 146.  
 Hundsbere 443.  
 Hundsberestrauch 51. 441.  
 Hundsholz 443.  
 Hundsfirsche 51.  
 Hundsdorn 156.  
 Hundrose 206.  
 Hüften 206.  
 Hülscheholz 476.  
 Hülse 45. mit grünen; mit  
 gescheckten Blättern 476.  
 Hülsenbusch; Hülsenstrauch;  
 Hüls 475.  
 Hünereugenbere 146.  
 Hüttelbeerbaum 175.

## J.

Jachandel 394.  
 Jägerbere 97.  
 Jbe; Jbenbaum 403.  
 Je länger je lieber 49. 53.  
 Jersenkiefer 319.  
 Jf 403.  
 Glaub; Jlof 66.  
 Jhme 74.  
 Johannisapffel 189.  
 Johannisbere, schwarze  
63.  
 Johannisbeerstraucher  
61. Johannisbeerstrauch, ro-  
 ther ib. wilder 62.  
 Johannisnuß 286.  
 Johannisraublein 62. wild  
452. Johannisraube 62.  
 Judasbaum, canadischer 110.  
 europäischer; gemeiner 109.

Jugelbere 97.  
 Jungfernröse 199.  
 Jungfraubaum 63.  
 Jper 76.  
 Jven 66.

## K.

Kadig 394.  
 Kastenbaum 301.  
 Kaline; Kalinke; Kalinkbere;  
 Kalinkenbere 79.  
 Kalkbere 80.  
 Kamillenstaude 394.  
 Kandelweide; Kandelbere 82.  
 Kandelwiede 82. 146.  
 Karsebere; Karsten; Kasbee-  
 re 139.  
 Kastanie, wilde; indische 92.  
 Kastanienbaum 301. ame-  
 rikanischer 304. europäischer  
301.  
 Kastanienbaum, zahmer 301.  
 Kastanienbuche, virginische  
306.  
 Kastanieneiche 274.  
 Katzenpfötgen 58.  
 Kaulbere 82. 146.  
 Keffe; Kelle 89.  
 Kehlholz 47.  
 Kellerhals 105. gemeiner  
107. Abarten davon 108.  
 Kellerhals, immergrüner 106.  
 Lorbeerartiger ib.  
 Kenster 450.  
 Kerngerste; Kerngersten 47.  
 Kernholz 312.  
 Kerzenbeerstrauch, deutscher  
362.  
 Kiefer 313. deutsche 311.  
 schottische 313.  
 Kiefer, rauhe, nordamerikanis-  
 che 321. stachelzappige 320.



- gemeine, virginische; virginische dreyblättrige 321. weiße 322.
- Kiefern** 311.
- Kieferweide**, gelbe 427.
- Kiehnbaum** 313.
- Kiehnbaum** 311.
- Kiehnpost** 111. breitblättriger 112. scheffiger; rhinianblättriger 113.
- Kiehnpost**, falscher 114.
- Kienföhre** 312.
- Kiengärten** 47.
- Kienporst** 111.
- Kierschen** 133.
- Kifferbaum** 312.
- Kinster** 450.
- Kirieporst** 111.
- Kirschapffel** 190. **Kirschenapffel** 189.
- Kirschbaum**, virginischer, wilder 149. welscher; wilder 139. wohlriechender 144.
- Kirsche**, deutsche 146.
- Kirsche**, rheinische 139. wilde 55.
- Kirschen** 138. **Sauerkirschen**; **Süßkirschen** ib.
- Kirschbaum** 146.
- Klappernuß** 91.
- Kleebaum** 231.
- Kleejebusch** 475.
- Klimop** 66.
- Klusterbeere** 65.
- Knackerweide** 431.
- Knevenbusch** 418.
- Knickel** 394.
- Knirschelbeere** 55. 146.
- Knoppereiche** 264.
- Knoienbaum** 168.
- Kdstenbaum** 301.
- Kopffweide** 428.
- Koppelweide** 422.
- Korbweide**, gemeine 426. große 417.
- Korbwerfft** 417.
- Kordrüster** 70.
- Kornelbaum**, wilder 441.
- Kornerbaum** 439.
- Kornlebaum** 439.
- Kornrose** 198.
- Kornwallnme**, kleine 76.
- Koßbeere**; **Kostbeere** 97.
- Kostebeere** 139.
- Kraackweide** 431.
- Krachweide** 431.
- Krachbeere** 97. **Krachbesien** 97. 100.
- Krahenbeere** 438.
- Krähsichte** 312.
- Kräuselbeere** 65.
- Krametsbeerstaude**; **Krametsstaude** 394.
- Kranbeere** 97. 100.
- Kranewetstaude**; **Kraneweckensstrauch** 394.
- Kranzbeerstaude**; **Kranzeritz** 394.
- Kranzflchte** 331.
- Kraselbeere** 65.
- Krazbeersstrauch** 214.
- Kraußbeere** 65. 100.
- Krebweide** 416. große 417.
- Krecken** 136.
- Kreuzbaum** 467.
- Kreuzbeere** 443.
- Kreuzdorn**, gemeiner 443.
- Kriche** 136.
- Kriechrose** 202.
- Kriechenbaum**, wilder 133.
- Krißföhrenbeere** 65.
- Kronsbeere** 100.
- Krunbeere** 100.
- Krumholzkiefer** 317.
- Krumholzbaum** 317.
- Kruschenbaum** 168.



Rührichte 311.  
 Rühnbaum 312.  
 Rühnrost 111.  
 Rühnschröten 220.  
 Rührrost 111.  
 Rünster 450.  
 Rüttenbaum; Rüttenstrauch 191.  
 Rüttenbeere, wilde 153.  
 Rühlschröten; Rühnschröten 220.  
 Rurbeerbaum 439.  
 Ruthecken 217. große 97.  
 Ryferholz 312.

## L.

Laburnencytisus 231.  
 Lähne 465.  
 Läusebaum 51. 55. Läuseholz 55.  
 Langaspe 453.  
 Lantanenschneeballen 82.  
 Laubbaum 467.  
 Lavendelheide 114.  
 Lazerolbirnbaum 181.  
 Lazerole 180.  
 Lebensbaumcypresse 354.  
 Lebensbaum 309. gemeiner; westindischer ib.  
 Leerbaum 346.  
 Leertanne 346.  
 Legföhre; Legföhre; Legföhren 317.  
 Lehne 465.  
 Leimahorn 465. Leimbaum 74.  
 Leinahre 465. Leinbaum 324. 465.  
 Lenne 465.  
 Lerchen 346. rothe; weise; schwarze ib.  
 Lerchenbaum 346.  
 Lerchtanne 346.  
 Libanonceder 350.

Lienbaum 465.  
 Lienen 130.  
 Lierbaum 346.  
 Liesch 130.  
 Lilaß 45. gemeiner ib.  
 Lilienfrucht 50.  
 Linbaum 170.  
 Lindbast 73.  
 Linde 121. einheimische ib.  
 Sommerlinde 124. spitzblättrige 127. Winterlinde 125.  
 Linde, amerikanische, schwarze 126. blaublättrige 125. breitblättrige 124. großblättrige ib. nordamerikanische, schwarze 126. raubblättrige 124. 125. ulmblättrige 125.  
 Linc 465.  
 Linsenbaum 231.  
 Lohneiche 266.  
 Löhne 465.  
 Lonicere 49.  
 Lorbeerdaphne 106.  
 Lorbeerkellerhals 106.  
 Lorbeerfirsche, moskowitische 146.  
 Lorbeerkraut 66.  
 Lorbeerweide 434.  
 Lorobbaum 346.  
 Lotusbaum, virginischer; westlicher 358.  
 Lucienholz, gemeines 146.  
 Lynen 130.  
 Lynbaum 465.

## M.

Machandel 394.  
 Mählsbaum 178. Malbaum ib.  
 Mädelbaum 317.  
 Mäandelbaum 311.  
 Mäapel 151.  
 Mäulbeere 156.

Mäul-



Mäuseholz 53.  
 Mahalebirsche 144.  
 Malinenstrauch 79.  
 Mandelbaum 58.  
 Mandelweide 426.  
 Mangelbaum 58.  
 Mannäse 460.  
 Marentacken 450.  
 Margripelstaude 230.  
 Ma iendorn 198.  
 Markholz 80.  
 Marsholder 80.  
 Marterholz 51.  
 Maschholder 467.  
 Maserbirke 244.  
 Maßbeerbaum 170.  
 Maßerle 467.  
 Maßholder 467.  
 Maßholder 80.  
 Maßlieben 467.  
 Maßbaum 341.  
 Maßbuche 295.  
 Maßteiche 266.  
 Mattenweide 422.  
 Mattenwerst 422.  
 Mauerepheu; Mauerewig;  
 Mauerpfaue 66.  
 Mauermurz 66.  
 Maulbeerbaum 446. rother  
448. tatar. 450. weißer 446.  
 Menenbaum 243.  
 Manpfrieme, kleine 224.  
 Manrose 201.  
 Meelbaum 178.  
 Meelstrauch 156.  
 Meerdorn 360.  
 Meerkiefer, deutsche 313.  
 Meerkirschenbaum 178.  
 Mehlbaum 178. kleiner 82.  
 rother 178.  
 Mehlbeerbaum 178.  
 Mehlbeere 116.  
 Mehlbeerhagedorn 178.

Mehlbeerstrauch, der kleine,  
 glänzende 155.  
 Mehlbirnbaum 177.  
 Mehlbirnbaum, mit fast gefies-  
 derten Blättern 180.  
 Mehlorn 156.  
 Mehl säßergengstrauch; Mehl-  
 säßgen 156.  
 Mehlfeistgen 156.  
 Mehlstrauch 82.  
 Melbaum 178.  
 Meldorn 156.  
 Merle 467.  
 Meßellern 467.  
 Meßpel 151.  
 Meßel 450.  
 Metternholz 51.  
 Meveller 477.  
 Mene 243.  
 Milchbaum, großer 465.  
 Mispel 151. deutsche ib. glän-  
 zende 162. feilblättrige 163.  
 f. mit essbarer Frucht 164.  
 rundblättrige ib. scharlach-  
 rothe 159.  
 Mispel 450. erdbeerbaumblät-  
 trige 185. wilde 151.  
 Mispelbaum, canadischer 182.  
 mit den Hahnenipornen 159.  
 Mispelbirne 181. 182.  
 Mispelbirne 181.  
 Mispelbirnstrauch 483.  
 Mistel 450. weißer ib.  
 Mistel, gemeiner 450.  
 Mitschelinsholz 58.  
 Möllerbrod 156.  
 Mohnrose 206.  
 Moorbeere 97.  
 Moorbirke 256.  
 Moorrosmarin 111.  
 Moorweide, spitzblättrige 416.  
 Moosheidelbeere 97. 98.  
 Mottenkraut 111.



Mündholz; Mundweide 47.

Mutterbirke 243.

Mutterholz 51.

Myrika 361. gemeine ib.

Myrie, brabantische 362.

Myrtenheide 362.

Myrtenstrauch, niederländischer 362.

## N.

Nägelsinstrauch 45.

Näpkel; Nespel 151.

Neujersypedhtiefer 322.

Nospel 151.

## O.

Ochsenbrech 228.

Ochsenmyrte 362.

Ohre 461.

Oltbaum 146.

Oltbaum; Oltkirsche 146.

Orelbaum 178.

Orlinbaum 257.

Otter; Otterbaum 257.

Oxycedrus 397.

## P.

Pabst 146.

Pabstbaum 82.

Pabstviere 82. 146.

Paluweide 412.

Pappel 379. canadische 390. griechische 391. virginische 388.

Pappel, atheniensische 391.

carolinische 388. italiänische

384. lombardische ib. lybische

383. schwarze 382.

Pappelstrauch 82.

Pappelweide 379. 382. 428.

Pappierbaum 380.

Paruckenbaum 374.

Parfumkirsche 144.

Pasfelbeere 118. 452.

Paternosterstrauch 91.

Patscherben 82.

Pattelsche 385.

Pattischerbe 146.

Payselbeere 118.

Pechbaum 326.

Pechkieser, nordamerikanische, zweynadelige 319.

Peiselbeere 118.

Peruckensumach 374.

Peselbesien 100.

Pescherben 82.

Pfaffenholz; Pfaffenhütlein;

Pfaffenkappel; Pfaffenmütze;

Pfaffenpfötgen; Pfaffenrös-

lein; Pfaffensorge 58.

Pfahlweide 426.

Pfefferbaum 63.

Pfefferholz; Pfefferreißelholz 58.

Pfeiffenholz 412.

Pferdenuß 285.

Pferdekastanie 92.

Pfingstmane 243.

Pfingstpfriemen 220.

Pfirschweide 426.

Pflaumen 133.

Pflaumenschlehe 136.

Pfrieme 219.

Pfrieme, gemeine 219.

Pfriemenholz; Pfriementraut 220.

Philbeerleinbaum 170.

Pickelbeere 100. 217.

Pilbeerbaum 170.

Pimpernuß 98. gefiederte ib.

Pimpernußstrauch, gemeiner 90.

Pis



**Pinus** 311.  
**Pinnholz** 55.  
**Pistacien**, wilde 91.  
**Platanus** 306. abendländischer 307.  
**Platanus**, amerikanischer 307.  
**Porsch**; **Porst** 111.  
**Potischerben** 146.  
**Praiselbeere** 100.  
**Praußbeere** 100.  
**Preiselsbeere** 100.  
**Preußelbeere**, rothe 100. schwarze 217.  
**Prummelbeere** 118.  
**Prunus** 133.  
**Puckelbeere** 217.  
**Pümpernußle** 91.  
**Pulverholz** 55. schwarz ib.  
**Purgirdorn** 443.  
**Purgirkirsche** 51.  
**Pyramidenpappel** 384. carolinische 389.  
**Pyrus** 166.

Q.

**Qualster** 170.  
**Quantelbirne** 183.  
**Quantelbeerstrauch** 183.  
**Quetschenbaum** 137.  
**Quickenbaum** 170.  
**Quitsche**; **Quitschbeerbaum**; **Quitschern** 170.  
**Quitte** 191. wilde ib.  
**Quittenbeere** 153.  
**Quittenmispel** 153. schwarze 154.  
**Quitzbeerbaum** 170.

R.

**Rabetbeere** 214.  
**Racholderstaude** 394.

**Rainweide** 47. sommergrüne ib.  
**Raseneiche** 266.  
**Ratteler**; **Rattelsche** 385.  
**Rauhbusche** 277. 295.  
**Rauhlinde** 75.  
**Rausch**, großer 97. kleiner 100.  
**Rauschbeere** 437. schwarze 438.  
**Rauchbeere** 100. große 97.  
**Rebbinden** 130.  
**Rechbeerstrauch** 452.  
**Rechholder** 84.  
**Rechholder**, **Reckstaude** 394.  
**Riefe** 89.  
**Rehbinden** 130.  
**Rehheide**; **Rehraut** 220.  
**Rehstaude** 394.  
**Reinweide**; **Reinwunder** 47.  
**Reißbeere**; **Reißelbeere** 118.  
**Repelbau** 467.  
**Reuster** 74.  
**Rhabarberbaum**, deutscher 55.  
**Rhambeere** 214.  
**Rhamnus** 54.  
**Rhebarberbeere** 118.  
**Rheibeere** 443.  
**Rheinbeerbaum**; **Rheinbesingbeerstrauch**; **Rheinweide** 47.  
**Ribeselftrauch** 62.  
**Rieseneiche**, rothe 273.  
**Robinie** 237. sibirische 240.  
**Robinie**, gemeine 237. sibirische 241.  
**Röhrenweide** 47.  
**Röhrholz** 51.  
**Röthern** 441.  
**Rollholz** 277.  
**Rose** 195. hängende 200. lanzettblättrige 205. pimpinellblättrige 198. Abarten derselben ib. ranche 210. rothblättrige 196. Abarten derselben



- selben 197. weichblättrige  
 203 weise 210 weise nied-  
 rig; einfache; halbgefüllte,  
 jungsträuchlich röthliche 211.  
 Rose, bibernellblättrige 198.  
 ohne Dornen 199. französische  
 205. mit hängenden  
 Früchten 200 rostfarbene 197.  
 sanfthaarige 203. wilde, wohl-  
 riechende 197.  
 Rosenmunde, bunte 206.  
 Rosenholder 80.  
 Rosenfranzstaude 91.  
 Rosenstrauch, wilder, weiser  
 202.  
 Rosenweide 423. braune ib.  
 Roßkastanie 92. gemeine ib.  
 gelbscheckige; weißscheckige 93.  
 Rosmarin, kleiner wilder 114.  
 wilder 111.  
 Rosmarinheide 416.  
 Rosmarinwerfft 416.  
 Roßbeere 217.  
 Roßnuß 235.  
 Roßweide 431.  
 Rothbaum 346.  
 Rothbesingstrauch 100.  
 Rothbuche 295. deutsche ib.  
 Abarten derselben 298.  
 Rotheiche 266.  
 Rötherle 257.  
 Rothfichte, amerikanische  
 340.  
 Rothfichte 326.  
 Rothgarten 441.  
 Rothschnelle 82.  
 Rothtanne 326.  
 Rothweide 425.  
 Rubigelsstaude 62.  
 Rüster, gemeiner 74.  
 Rüster, glatter 73. rother 70.  
 Rusche 74.  
 Rurholz 74.
- S.  
 Saalweide 412. breite, große ib.  
 Sadebaum; Sadewacholder  
 396.  
 Sälen 412.  
 Sahlweide 412.  
 Salatbaum 110. deutscher 465.  
 Salbenbaum 382.  
 Sale 412.  
 Salbenweide 414.  
 Salbenwerfft 414.  
 Salsendorn 118.  
 Salweide 412. glatte 434.  
 Sambacca 128.  
 Sandbeere 115.  
 Sandbelle 384.  
 Sanddorn, deutscher 360. wegg-  
 dornartiger ib.  
 Sandlinde 125.  
 Sandweide, kleine, niedrige  
 420.  
 Sandwerfft 420.  
 Sandwerfft, kleiner 420.  
 Sarbacher; Sarbaum 382.  
 Sarbachsbaum 380. 382.  
 Sarbaken 382.  
 Sauapffelbaum 187.  
 Saubirnbaum 168.  
 Sauerach; Sauerdorn 118.  
 Sauerfirschaum 142.  
 Sauranze 111.  
 Saugthanne 111.  
 Saurach 117. Abarten davon  
 119.  
 Schaafweide 434.  
 Schabenkraut 111.  
 Schachkraut 220.  
 Schälweide 426.  
 Schallaster 84.  
 Scharlacheiche 273.  
 Scharlachhagedorn 159.  
 Scherben 82. 146.

Scher:



- Scherbiden [82.](#)  
 Schergenpabst [82.](#)  
 Scherckenholz [146.](#)  
 Scheriden [82.](#)  
 Scherpfen [146.](#)  
 Schiebgen [89.](#)  
 Schiebiden [84.](#)  
 Schierbaum, wilder [178.](#)  
 Schierlingstanne [345.](#)  
 Schießbeere [55.](#) [79.](#) [82.](#) [443.](#)  
 falsche [51.](#) rothe [80.](#) schwarze [55.](#)  
 Schirmrose [209.](#)  
 Schlaftanz; Schlaftanz [206.](#)  
 Schlagbeere [443.](#)  
 Schleedorn [133.](#)  
 Schlehdorn [133.](#)  
 Schlehenbaum; Schlehen-  
 strauch [133.](#)  
 Schlehendorn, rother [360.](#)  
 Schleißfor [311.](#)  
 Schlickweide [426.](#)  
 Schlimpfenschleglein [58.](#)  
 Schlingbaum; Schlingbeers-  
 baum; Schlinge; Schling-  
 genbaum; Schlingweide [82.](#)  
 Schlingstrauch [82.](#) mit mehr  
 eyrunden Blättern; mit scheß-  
 figem Laub [83.](#)  
 Schlungbeer [82.](#)  
 Schneeballen [79.](#) gemeiner ib.  
 Schneeballenstrauch, sche-  
 diger; gefüllter; rosenblüti-  
 ger [87.](#)  
 Schneeballenstrauch, wilder [80.](#)  
 Schneepappel [380.](#)  
 Schönbaum [346.](#)  
 Schoßbeere [55.](#)  
 Schotendorn, amerikanischer;  
 virginischer [337.](#)  
 Schreiberlaub; Schreiberholz  
[467.](#)  
 Schülweide [47.](#)  
 Schußweide [425.](#)  
 Schwalbeere; Schwalbesbeere;  
 Schwalgesbeere [79.](#)  
 Schwallen; Schwallenbeers-  
 strauch [79.](#)  
 Schwarzalberbaum [382.](#)  
 Schwarzbeere [217.](#)  
 Schwarzdorn [133.](#)  
 Schwarzerle [257.](#)  
 Schwarzfohre [313.](#)  
 Schwarzlinde [126.](#)  
 Schwarzpappel [382.](#)  
 Schwebstockholz [467.](#)  
 Schweißbeere [80.](#)  
 Schwelgen; Schwelgenbeere  
[79.](#)  
 Schwellen; Schwellenbaum,  
 gemeiner [79.](#)  
 Schwindelbeerbaum, tyroler  
[82.](#)  
 Schradel [475.](#)  
 Schübidenbeere [84.](#)  
 Scorpionkraut [235.](#)  
 Seckreuzdorn [359.](#) weibens-  
 blättriger [360.](#)  
 Segelbaum [396.](#)  
 Seidelbast [106.](#)  
 Sellenholz [51.](#)  
 Sersebaum; Sersebirlein [175.](#)  
 Seilweide [412.](#) [417.](#)  
 Sevenbaum [396.](#) portugie-  
 sischer; scheidiger; tamaris-  
 kenblättriger [397.](#)  
 Silberahorn [470.](#)  
 Silberbaum, deutscher [380.](#)  
 Silbertanne [341.](#)  
 Silberweide [428.](#)  
 Silberweide [428.](#) kleine [422.](#)  
 Siliquaster [109.](#)  
 Södenholz [51.](#)  
 Sohle, Sohlweide [412.](#)  
 Sommerbirke [244.](#)

Som.



- Sommerleiche [266.](#)  
 Sorbenbaum, wilder [170.](#)  
 Sorsch [175.](#)  
 Spanholz [312.](#)  
 Spateiche [264.](#)  
 Spathlinde [125.](#)  
 Spargelbeere; Spargelholz [55.](#)  
 Specklilie, eichenblättrige [50.](#)  
 gemeine [49.](#) späthblühende [50.](#)  
 Specklilien [49.](#)  
 Sperberbaum [178.](#) wilder [170.](#)  
 Spenerlingsbaum [178.](#)  
 Spicker [55.](#)  
 Spierlingsbaum, wilder [178.](#)  
 Spierstaude [193.](#) gamanderblättrige; wellenblättrige; weidenblättrige [ib.](#)  
 Spillbaum [58.](#)  
 Spillenholz [461.](#)  
 Spindelbaum [57.](#) deutscher, breitblättriger [59.](#) gestielter [57.](#) warziger [60.](#)  
 Spindelbaum [58.](#)  
 Spinelle [65.](#)  
 Spinling [133.](#)  
 Spitzahorn [465.](#)  
 Spitzweide [417.](#)  
 Splittapffel; Splittche [189.](#)  
 Spöckern; Spöckenholz [55.](#)  
 Sporgelbaum; Sporgelbeerbaum; Sporgelbeerstaude [55.](#)  
 Spräzern; Sprecker; Sprickerholt; Spröcker [55.](#)  
 Spröckelweide [431.](#)  
 Sprözer [55.](#) Sprözern [51.](#)  
 Sprockweide [431.](#)  
 Sprucefichte, neuländische [336.](#) schwarze nordamerik. [339.](#) weisse nordamerik. [ib.](#)  
 Spulbaum [58.](#)  
 Spunelle [65.](#)  
 Stachelbeere, glatte; rauhe; haarige [64.](#) rothe [65.](#)  
 Stachelkiefer [320.](#)  
 Stachelpfrieme, rauhe [223.](#)  
 Stallkraut [228.](#)  
 Staudelbeere [217.](#)  
 Stechapffel; Stechbaum [475.](#)  
 Stechdorn [65.](#) [443.](#) weidenblättriger [360.](#)  
 Stechginster [234.](#) europäischer [235.](#)  
 Stechginster [235.](#)  
 Stechlaub; Stechpalme [475.](#)  
 Stechpfrieme [220.](#)  
 Stechwiede [76.](#)  
 Steinbeere [116.](#) [438.](#) rothe [100.](#) Steinbeerlein [ib.](#)  
 Steinbuche [276.](#)  
 Steineiche [264.](#)  
 Steinesche [453.](#)  
 Steinfichte [331.](#)  
 Steinheide [438.](#)  
 Steinholler; Steinholler [89.](#)  
 Steinkirsche [144.](#)  
 Steinkreuzdorn [53.](#) [56.](#)  
 Steinlinde [76.](#) [125.](#)  
 Steinmispelstrauch [153.](#)  
 Steinnespel [153.](#)  
 Steinnuß [285.](#)  
 Steinhöhre [467.](#)  
 Steinweide [420.](#)  
 Steinweirel [144.](#)  
 Stichbeere [65.](#)  
 Stickwurz, wild [53.](#)  
 Stieleiche [265.](#)  
 Stinkbaum [55.](#) [63.](#) [146.](#)  
 Strauchweide [416.](#) kleine; niedrige [423.](#)  
 Straußbeere [452.](#)  
 Straußrose [208.](#)  
 Streichpalme [412.](#)  
 Streich:



Streichweide 434.  
 Streitbesienstrauch 360.  
 Strobzern 51.  
 Süßholzbaum 437.  
 Süßkirsche 139.  
 Sumach 363. glatter 365.  
 glatter mit rothen; mit schwarz-  
 lachfarbenen Blumen 366.  
 wurzelschlagender 369.  
 Sumach, giftiger 369. glatter,  
 nordamerikanischer 365. vir-  
 ginischer 363. wurzelnder 369.  
 Sumpfsheide 105.  
 Sumpfsheidelbeere 97.  
 Sumpfsilberpflanze 111.  
 Sumpfspreußelbeere 97.  
 Syrene 45.

**S.**

Tabacksröbrenholz 51.  
 Tabelfen 380.  
 Takamahakbaum 387.  
 Takamahakpappel 387.  
 Talghusch, deutscher 362.  
 Talinkenbeere 79.  
 Tallen 312.  
 Tamariske 229. deutsche ib.  
 Tamariskenstrauch, deutscher  
 230.  
 Tanne, canadische, weisse 336.  
 norwegische; rothe; schwarze  
 326. tarblättrige 341. 345.  
 weisse, amerikanische 336.  
 Tanneiche 266.  
 Tannen 341.  
 Tannensichte 322.  
 Tannenborst 111.  
 Taubenerbsen 241.  
 Tarus 402. gemeiner 403.  
 Teuffelsbeere 441.  
 Teuffelsholz; Teuffelskirsche  
 51.

Teuffelsmettern 441.  
 Teuffelszwirn 130.  
 Terpentibaum 346.  
 Thale 312.  
 Thannenbaum, schwarzer 326.  
 Thelsbirlebaum 178.  
 Thierleinbaum 439.  
 Thuja 308. abendländische  
 309. scheckige; wohlriechende  
 310.  
 Thujacypresse 354.  
 Tintenbeerstrauch 47.  
 Tirlen 439.  
 Tiselfirsche 139.  
 Todtentopflebaum 91.  
 Töpelgensbaum 146.  
 Torffbeide 114.  
 Torffmyrte 362.  
 Torffroschmarin 114.  
 Traubenbirne 182.  
 Traubeneiche 264.  
 Traubenheidelbeere 99.  
 Traubenhollunder 89.  
 Traubenkirsche 145. virgi-  
 nische 148.  
 Traubensaurach 118.  
 Trieselbeere 146.  
 Tringelbeere 97.  
 Trinkelbeere 438.  
 Trufelbeere 264.  
 Trunkelbeere 97.  
 Tüpfelmispel 164.  
 Tulpenbaum 128. gemeiner  
 ib.  
 Tulpenbaum, virginischer 128.  
 Tunkirsch 51.

**U.**

Uferweide 417. 418.  
 Ulex, europäischer 235.  
 Ulme



Ulm 68. amerikanische 77.  
 breitblättrige 75. glatte 73.  
 holländische 76. schmalblättrige  
 ib. weichblättrige 78.

Ulm englische, breitblättrige  
75. kleinblättrige 70. nord-  
 amerikan. weisse 77. rauhe 70.

Ulmernbaum 74.

Unsern lieben Frauen Birlein  
156.

Urle 75. 257. 461. Urtenbaum  
461.

### W.

Werreiche 266.

Werge 312.

Wersich 118.

Wexierkastanie; Wexierkette 92.

Wiereiche 264.

Wlieder 84.

Wogelbeerbaum 170. halb-  
 gefiederter 174. wilder 170.  
 wilder mit gelbgestreiften  
 Blättern 172.

Wogelbeerbaum, nordischer  
174. zahmer, falscher 175.

Wogelkirsche 138. Abarten  
 derselben 140.

Wogelkirsche 146. virginische  
149.

Wogelkirsche, rothe 51.

Wogelzungenbaum 453.

### W.

Wacholder 391. carolinischer  
400. gemeiner 392. lycifolius  
402 mit oben weißgestreiften  
 Nadeln; mit breiten, nicht ste-  
 chenden Nadeln 395. phönici-  
 scher 401. virginischer 398.  
 Windischer 395.

Wacholder, schwedischer 395.

spanischer 397. virgin. 401.

Wacholderbaum 395

Wacholderstrauch, deutscher  
394.

Waldapfelbaum 187.

Waldbeere 217.

Waldbirke 245.

Walddistel 475.

Waldeiche 266.

Waldeppich 66.

Waldesche 461.

Walcescher 453.

Walgeißblatt 49.

Waldhaselstaude 281.

Waldholder 89.

Waldkirsche 139.

Waldlilie 49.

Waldlinde 125.

Waldlorbeere 106.

Waldnachschatten 53.

Waldrebe 130. brennende  
132. gemeine 130.

Waldrebe, blasenziehende; stei-  
 gende 130.

Walnuß 284. dünnchalige  
285 gemeine 284. schwarze

290. Abarten von dieser 291.

späte 286. weisse 292

Walnuß, graue 292 weisse 294.

Walnußbaum, grauer, nord-  
 amerikanischer 292.

Walpurgismene; Walpurgis-  
 strauch 51.

Wasserhorn 80.

Wasseralbe 467.

Wasserbeere 139.

Wasserbirke 243.

Wasserbuche 307.

Wasserflieder; Wasserflitter 80.

Wasserholder 79. Wasserholzer  
80.

Wassers



- Waßerhülse [467.](#)  
 Waßerlinde [124.](#)  
 Waßerrüster [75.](#)  
 Waßerichlinge [146.](#)  
 Waßerweide, langblättrige [426.](#)  
 Wechholder [394.](#)  
 Weegeschlinge [82.](#)  
 Wegdorn; Wehdorn [443.](#)  
 Wegholder; Wegstaude [394.](#)  
 Weicheln [428.](#)  
 Weichsel; Weichselbaum, wil-  
 der [142.](#)  
 Weide [410.](#) brensfadige [432.](#)  
 purpurrothe [424.](#) weise [428.](#)  
 Weide, braune; burbaum-  
 blättrige [419.](#) gelbe [427.](#)  
 gemeine [428.](#) geöhrt [414.](#)  
 graue [413.](#) lorbeerblättrige  
[431.](#) mandelblättrige [426.](#)  
 mürbe [428.](#) purpurne [425.](#)  
 rothe, gemeine rothe ib.  
 spizblättrige [415.](#) spröde  
[431.](#) wilde; wohlriechende  
[434.](#) zähe [425](#) [428.](#)  
 Weide, spanische [47.](#)  
 Weiden [423.](#)  
 Weidenbaum [428.](#)  
 Weidendorn [460.](#)  
 Weihrauchwacholder [397.](#)  
 Weihrauchfichte [322.](#)  
 Weinäugeleinstrauch [118.](#)  
 Weinbeere [62.](#)  
 Weinblatt [465.](#)  
 Weinlägelein [118.](#)  
 Weinrose [197.](#) wilde ib.  
 Weinschädling; Weinscherlin-  
 ge; Weinschürlein [118.](#)  
 Weinzäpfel [118.](#)  
 Weisalber [380.](#)  
 Weisbaum [467.](#)  
 Weisbuche [276.](#)  
 Weisbeinholz [47.](#)  
 Weissbirle [242.](#)  
 Weisdorn [155.](#) der kleine ib.  
 Weisdorn [156.](#) filziger [165.](#)  
 mit gelber Frucht ib. nord-  
 amerikanischer, großer, stach-  
 lichter [159.](#) nordamerikanis-  
 cher mit glänzendem Laub  
[162](#) stachelbeerblättriger, vir-  
 ginischer [165.](#)  
 Weiserle [260.](#)  
 Weissfichte [331.](#)  
 Weisläuben; Weislaub [178.](#)  
 Weislober [467.](#)  
 Weispappel [379.](#) groß-  
 blättrige; Kleinblättrige [381.](#)  
 Weisschlingensbaum [82.](#)  
 Weistanne [341.](#)  
 Welge [428.](#)  
 Welperman [51.](#)  
 Wendelbeere [63.](#)  
 Werff [411.](#)  
 Werfft, aschgrauer [413.](#) spiz-  
 blättriger [415.](#)  
 Werfft, brauner [418.](#) großer  
[411.](#) kleiner rundblättriger  
[414.](#) kleiner raubblättriger  
 ib. kriechender [422.](#) rauher  
[411.](#)  
 Werffte [411.](#)  
 Werfftwende [412.](#) kleine, runde  
 blättrige [414.](#)  
 Werfenstrauch; Werstenbeera-  
 strauch [443.](#)  
 Weschelholz [58.](#)  
 Weymouthsfichte [322.](#)  
 Weymouthskiefer [322.](#)  
 Weyrauchbaum [322.](#)  
 Weyrauchkiefer [321.](#)  
 Weyrauchkiefer, virginische  
[321.](#)  
 Wibder [80.](#)  
 R f  
 Wies



- Wiedebaum 146.  
 Wiedel; Widelbaum 82.  
 Wiedern 82.  
 Wiedorn 443.  
 Wiegenstrauch 206.  
 Wiepenstrauch, großer, rauch-  
 blättriger 204.  
 Wiepfen 206.  
 Wiete 76.  
 Wildholz 220.  
 Wildling 187.  
 Wilgenbaum 428. rother 425.  
 Winterbirke 244.  
 Winterreiche 264.  
 Winterrephen 66.  
 Wintergrün 66.  
 Winterheide 105.  
 Winterlinde, großblättrige;  
 kleinblättrige 126.  
 Winterschlageiche 264.  
 Wipen 206.  
 Wirbelbaum 312.  
 Wirbgen 206.  
 Wispelbeere; Wißbeere 139.  
 Witschen 220.  
 Wittbuche 277.  
 Wittneber 467.  
 Wochenbeerndorn 443.  
 Wolbermai; Wolbertmei;  
 Wolpermai 51.  
 Wollenbaum 382.  
 Wunderbaum 380.  
 Wundholzbaum 453.  
 Wütscherling 118.  
 Wunnebaum 243.
- Y.
- Ygelliefer 320.  
 Ylme 74.  
 Yspe 74.
- 3.
- Zäunling 51.  
 Zaunbuche 277.  
 Zaungilge 50.  
 Zaunkirsche 51.  
 Zaunlilie 49.  
 Zaunriegel 47.  
 Zeidelbast 106.  
 Zeitbeere 63.  
 Ziegenholz 312.  
 Ziernußbaum 324.  
 Zieserlenstrauch 439.  
 Zimmetrose 200. einfache  
201. gefüllte ib.  
 Zimmetrose, niedersächsische  
 gefüllte 202.  
 Zinnobermispel 165.  
 Zirbelbaum 312.  
 Zirbelkiefer 324.  
 Zitieresche 385.  
 Bitterpappel 385.  
 Zuckerahorn 472.  
 Zuckerahorn, deutscher 465.  
 Zuckerbirke, schwarze 253.  
 Zuckerrose 201. 205.  
 Zürbe 324.  
 Züribisnüsscherstrauch 91.  
 Zürgelbaum 357. amerika-  
 nischer ib.  
 Zürgelbaum, virginischer; west-  
 licher 358.  
 Zweckholz 51. 58.  
 Zwergapffelbaum 189.  
 Zwergbirke 256.  
 Zwergbuche 277.  
 Zwergbuchs 263.  
 Zwergfichte 331.  
 Zwerggeißlee 234.  
 Zwergkastanienbaum 305.  
 Zwergkastanienstrauch 306.  
 Zwergmispel 186. Zwergmis-  
 pel=



- spelbaum, schwarzbeeriger Zwetschenbaum, wilber 137.  
 183 Zwergmispelstrauch 153. Zwieseldorn 45.  
 Zwergqueßel; Zwergqueßpel 153. Zwieselsbeerbaum 129.  
 Zwergrose, schottische 198. Zwitschenbeere; Zwitschenflaude 89.  
 Zwiespenbaum 137.

## Sachregister.

A.

- Absätze s. Schuhabsätze  
 Achsen von Nehlbirnbaum 179.  
 Ackergeräthe, Ackergeschirr,  
 deutsche Mispel 153. Vogel-  
 beerbaum 173. Elsbeerbaum  
 177. Birke 247.  
 Alzende Säfte des Epheu 67.  
 Alleebäume, holländische Ulme  
 77. Kastanie 94. Linde  
 121. Tulpenbaum 129. Vo-  
 gelbeerbaum 172. Hornbaum  
 279. Esche 458.  
 Aqua Rubi idaei 213.  
 Auriculae ludae 87.  
 Armbrüste, von Larus 406.  
 Äsche, gute, von der gemeinen  
 Heckenfirsche 52. Sumpff-  
 heidelbeere 98. Birke 249.  
 Asthma, im chronischen werden  
 in Lancaster die Wurzeln des  
 wurzelschlagenden Sumachs  
 gebraucht 37 L.  
 Arthelme, Arstiele von Stamm-  
 holz des Hagedorns 158.  
 Höckernbaum 295. Cornel-  
 baum 441. Ahorn 463.

B.

- Backtröge, von Erlenz 259.  
 Weispappeln = 380. weissen  
 Weiden = 430. Ahornholz  
 463.  
 Bänder, von der Büschelbirne  
 185.  
 Bäumen ist der Epheu schädlich  
 67.  
 Balken, von weissen Tulpen-  
 baumholz 129. von der Py-  
 ramidenpappel 385.  
 Balsam, von der Takamahaka-  
 pappel 388.  
 Barometer und Thermometer-  
 Bretter, von der Weisstanne  
 342.  
 Bauholz, gutes, giebt der  
 Korkrüster 71. Acacienbaum  
 239 die Eiche 267. der Kas-  
 stanienbaum 302. 305. die  
 Thuja 310 die Kiefer 314.  
 die Fichte 331. weisse Fichte  
 337. Weisstanne 342. Der  
 Lerchenbaum 348 die Thuja-  
 cypresse 355. zweizeilige Cya-  
 presse 356. carolinische Py-  
 ra



- ramidenpappel 390. Esche 456. der Uhorn [462.](#)  
 Bauholz, das dauerhafteste, von der Eypresse [353.](#)  
 Bast, brauchbarer, von der Ulme [74.](#) [76.](#) Linde [122.](#) Besenpfrieme [221.](#) sibirische Robinie [241.](#) Birke [250.](#)  
 Becher von Korkrüster [72.](#) Espen 386.  
 Bedeguar off. Rosenschwämme oder Schlafäpfel 208.  
 Beere vom Elsbeerbaum werden mit Zucker eingemacht [177.](#) des Kellerhalses besitzen eine corrosivische Schärffe; Mit deren Aufguß reiben sich in Rußland alte Gesichter um volle Wangen zu bekommen 108. vom Himbeerstrauch, mit Wein und Zucker zubereitet; eingemacht [213.](#) des Larus werden in England gegessen [409.](#) des Vogelbeerbaums, werden unter das Futter der Rüh, Schweine, Schaafe, Ziegen, Kaninchen und des Geflügels gemengt [172.](#) [173.](#) des Wacholderbaums dienen zum Räuchern [393.](#)  
 Beere so von den Vögeln besonders aufgesucht werden, der gemeinen Heckenfirsche [52.](#) des Schneeballenstrauchs [81.](#) Schlingenstrauchs 84. Traubenholzers [90.](#) die Traubenheidelbeere 101. des Vogelbeerbaums 172. Elsbeerbaums [177.](#) Larus [405.](#) Rauschbeerstrauchs [439.](#)  
 Beere deren sich die Vogelsteller bedienen, vom Ephen 68. Vogelbeerbaum [172.](#)  
 Beere der Hülse, eine lieblingsspeise der Turteltauben; besitzen Heilkräfte [477.](#)  
 Behälter von Uhornholz 463.  
 Befriedigungen, s. Hecken.  
 Beize, gelbe zu Holzwaaren [120.](#)  
 Berausende Kraft der Sumpffheidelbeere [98.](#)  
 Bergtröge von Birkenholz [247.](#)  
 Besen, von der Besenpfrieme [221.](#) von Birkenreilern [252.](#)  
 Bettstücke mit Heide [104.](#) mit rothbuchenlaub ausgefüllt [299.](#)  
 Bettstellen von Erlen: [259.](#) von Rothbuchen: [299.](#) von Eschenholz 456.  
 Bienen suchen die Blüten der Rainweide [48.](#) gemeinen Heckenfirsche [52.](#) des Riehnpostts [113.](#) der Linde [123.](#) des Schlehdorns [135.](#) der Heidelbeere [218.](#) Hauhechel [229.](#) des Hirschkolben Sumachs 364. glatten Sumachs 366. rauhen Werffts [413.](#) der Bruchweide [432.](#) Lorbeerweide [435.](#) des Cornelbaums 441. Uhorns [446.](#)  
 Bier von Spruce 338.  
 Bierartiges Getränke aus den Früchten des Hagedorns 158.  
 Bierbrauen, hiezu sind anwendbar: die Blätter der Rostkastanie 95. Heide [104.](#) Riehnpost [113.](#) die Zweige der Besenpfrieme [221.](#) der deutschen Tamariske [231.](#) die Nadeln und jungen Schüsse der



- der amerikanischen Rothfichte 241. die Schoten der drey-  
stachlichten Gleditschie 379.  
Birkensaft 251.  
Biersäßer von Lerchenbaumholz  
348.  
Bildhauer bedienen sich des Hol-  
zes von der Linde 123. Weiß-  
pappel 380. Pyramidenpap-  
pel 385. Espe 386.  
Billardqueues von Ahorn 463.  
Bind- und Flechtwerk, gemeine  
Waldrebe 131.  
Bindruthen giebt die purpurro-  
the Weide 426. Goldweide  
428. Bachweide 437. der  
Hartriegel 443.  
Birkendhl; Birkentheer 250.  
Birkensaft, ein blutreinigendes  
Mittel 257.  
Birkhüner suchen die Knospen  
der Birke 251. die Rausch-  
beere 439.  
Blätter der Rose, ihr Gebrauch  
196. des Walnußbaums,  
vertreiben die Insecten 286.  
der Hülse, ein Mittel gegen  
die Gicht 477.  
Blasengrün 445.  
Blasenziehende Eigenschaft des  
Laubs und Bastß von der ge-  
meinen Waldrebe 131. der  
Rinde des gem. Kellerhalseß  
108.  
Bleystefte, englische, werden  
mit dem Holze vom virgin.  
Wacholder eingefaßt 400.  
Blüthen des schwarzen Hollun-  
ders eingemacht; mit Butter  
gebacken oder in Milch ge-  
kocht 86. des Schlehdorns  
dienen zur Frühlingscur 135.
- Böttchersgeschirr; Böttchers-  
waare, dazu dienliches Holz,  
deutsche Traubenkirsche 148.  
Bogelbeerbaum 173. Birke  
248. Hölzerbaum 295. Fich-  
te 331. Lerchenbaum 348.  
weiße Weide 430. weißer  
Maulbeerbaum 447.  
Bogen von Tarnholz 406.  
Bohlen von der Pyramidenpap-  
pel 385. Espe 456. Ahorn  
463.  
Botanik der Holzarten 7.  
Brandsohlenbretter giebt das  
Rothbuchenholz 299.  
Brandwein aus den Sumpfsch-  
delbeeren 98. Sauwachbeeren  
120. Schlehdornfrüchten 135.  
Kirschen 141. Hagedornfrüch-  
ten 158. Holzbirnen 169.  
Bogelbeeren 172. Elsbeeren  
177. Mehlbirnen 179. Leha-  
nensafte 467.  
Brennholz, vorzügliches, Rü-  
stern 72. Holzbirnbaum 169.  
wilder Bogelbeerbaum 172.  
Elsbeerbaum 177. Acacien-  
baum 239. Birke 248. Horn-  
baumbirke 254. Erle 259.  
Hornbaum 278. Hölzerbaum  
295. Rothbuche 299. Fichte  
331. weiße Fichte 337. Espe  
456. scharlachrother Ahorn  
472. Zuckerahorn 473.  
Bretter vom weißen Tulpen-  
baum 129. vom Kirschbaum  
141. von der virgin. Trau-  
benkirsche 150. Thuja 310.  
Weißtanne 342. Thujap-  
resse 355. Pyramidenpap-  
pel 385. Espe 456. Ahorn  
463.



Brettspiele von Weispappelholz Dämme, dazu ist Korbwerfft  
380. anwendbar 419.

Brunnenrdhren vom Korkrüster Dämpfung des Flugfandes, das  
71 Schwarzerlen 259. zu dienliche Gesträuche,

Brunnenträge von der Weispap- Sandwerfft 422. 430. rau-  
pel 380. her Werfft 430.

Buchbinderbretter giebt die Dagget 250.

Rothbuche 299.

Büchsen von Espenholz 386.

Büchsenmacher bedienen sich des Degenohl, schwarz; Degon 250.

Holzes vom Wallnußbaum Deicheln von Korkrüster = 71.  
286. Hornbaumholz 278.

Büchsenpulver, von Erlenkoh- Dendrographie oder Holzfun-  
len 259. de I.

Butterfässer von der Thujaach- Dendrologie I. 19.

preße 355. Diehlen von Kiefernholz 314.

Dogget 250.

Dosen von der Maserbirke 248.

Dreherarbeiten; Dreherwaare,

dazu taugliches Holz: Rain-

weide 48. Gestielter Spindel-

baum 59. Korkrüster 72.

Hollunder 87. Cercis 110.

Mahalebkirchenbaum 145.

deutscher Traubenkirchen-

baum 148. Hagedorn 159.

Holzbirnbaum 169. Elsbere-

baum 177. Mehlbirnbaum

179. Büschelbirne 185. Holz-

apfelbaum 189. Maserbirke

248. Erle 250. Eiche 267.

Hornbaum 278. Wallnuß-

baum 286. Kastanienebaum

303. 306. Weistanne 342.

Weispappel 380. Pyrami-

denpappel 385. Wöchelder

394. Larus 406. Kreuzdorn

444. weiser Maulbeerbaum

447. Ahorn 463.

Dreschflegel von Hornbaum

278. Ahorn 463.

Drilz

## C.

Cedria, Harz von der Libanonß  
ce-er 352.

Champagnerartiges Getränke  
vom Birkenassaft 51.

Charoallen von Weispappelholz  
380.

Chausseebäume, Leyne 467. f.  
Alleebäume.

Claviere vom Holz des gestielten  
Spindelbaums 59. Ahorn  
463.

Cochenille, sogenannte deutsche,  
an den Wurzeln der Bären-  
beere 117.

Copal, 373. 374.

Cryptogamia 2.

## D.

Dachrinnen von der Weistanne  
342.

Dachsparren von der Pyrami-  
denpappel 385.



Drillinge vom Stammholz des Hagedorns [158.](#) von Birkenholz [247.](#)

## E.

Ebenisten bedienen sich des Larusholzes [406.](#)

Eggenzähne von Lilakholz [46.](#)

Einfassung der Quartiere oder Gartenbeete von der Traubenheidelbeere [101.](#)

Eingelegte Arbeiten, hierzu dienen Saurachholz [120.](#) Eichenwurzel [267.](#) s. auch Fournierarbeiten.

Eisenblechbeize mittelst der Roßkastanienfrüchte [95.](#)

Ellen von Zwetschgenbaumholz [138.](#)

Essig aus den Beeren des gem. Schneeballenstrauchs [81.](#) des Saurachs [120.](#) aus den Früchten des Schlehdorns [135.](#) des Hagedorns [158.](#) des Holzbirnbaums [169.](#) aus Elsbeeren [177.](#) Himbeeren [213.](#) vom Saft der Hornbaumbirke [254.](#) aus Lehnensaft [467.](#)

Etnis von Holze des gestielten Spindelbaums [59.](#)

Extractus nucum juglandum [287.](#)

Eymer von Hornbaum: [278.](#) Platanus: [308.](#) Thujaen: pressen: [355.](#) Espenholze [386.](#)

## F.

Färbender Saft, braungelber des wurzelnden Sumachs [371.](#)

Färberer, die zu derselben anwendbaren Holzarten und Theile derselben, Heide [103.](#) Blätter und Zweige der gem. Waldrebe [131.](#) Rinde des Kirschbaums [141.](#) Heidelbeere [219.](#) Besenpfrieme [222.](#) Färbginster [226.](#) Hauhechel [229.](#) Birke [251.](#) Rinde von der Erle [259.](#) Wallnußblätter [286.](#) [287.](#) graue Schaaalen der reifen Früchte ib. Rinde der schwarzen Wallnuß und äußere Fruchtschaale [292.](#) Rinde der Schwarzpappel [383.](#) der weißen Weide [430.](#) Rauschbeere [439.](#) Beere des Kreuzdorn [445.](#) Färbkräfte der canadischen Ercis [111.](#)

Farben geben die Rinde des Faulbaums [56.](#) Saamenkapseln des gestielten Spindelbaums [59.](#) Rinde des schwarzen Hollunders [86.](#) Schaaalen und Blätter der Roßkastanie [95.](#) Blätter des Tulpenbaums [129.](#) Rinde vom Hagedorn [158.](#) innere Rinde des Holzapfelbaums [189.](#) Laub vom Brombeerstrauch [215.](#) Heidelbeere [219.](#) Färbginster [226.](#) Zweige der Tamariske [230.](#) Rinde und Fruchtschaale der weißen Wallnuß [293.](#) Blätter des Hirschfolvensumachs [362.](#) Verksensumach [375.](#) Rinde der Esche [457.](#) Blätter der Lehen [467.](#)

Faschinen, dazu taugen Heide [104.](#) Schwarzpappel [383.](#) R I 4 Pyras



- Pyramidenpappel 385. Espen 386. Wacholder 393. Mandelweide 427.
- Faßdauben von Eichen 267. Kastanienholz 303.
- Faßhahnen vom Holze des gestielten Spindelbaums 59.
- Faßreif, s. Reif; Reifstangen.
- Felgen von Korkrüster = 71. Birkenholz 247.
- Fensterstöcke von Kieferholz 314.
- Figuren von Lindenholz 123.
- Filet- und Fischernadeln von Hollunderholz 87.
- Filtrirbecher von Epheuholz 68.
- Firniß von dem Firnißsumachbaum 368.
- Fischerböte von der amerikan. Rothfichte 341.
- Fischerzeug, hiezu ist Korbwerfft tauglich 419.
- Fischreisser aus dem Lindenbaste 123.
- Flachsbrechen von Hornbaum 278. Rothbuchenholze 299.
- Flechtarbeit; Flechtwerk, Pyramidenpappel 385. rauher Werfft 413. Goldweide 428.
- Flöten aus den Zweigen des Elsbeerbaums 277. vom Mehlbirnbaum 179.
- Flugsand, zu dessen Dämpfung sind dienlich der Brombeerstrauch 213. die Besenpfrieme 222. Färbginster 226. Haushechel 229.
- Formenschneider bedienen sich des Holzes der Roßkastanie 96. des Holzbirnbaums 169. Vogelbeerbaums 173. Elsbeerbaums 177.
- Fournierte, oder eingelegte Arbeiten vom Holz des Hollunderbaums 87. der gemeinen Waldrebe 131. des glatten Sumachs 366. Veruckensumachs 375. Larus 406. Kreuzdorns 444. Ahornmaser 463.
- Früchte des Spindelbaums sind Menschen und Thieren schädlich 59. werden von einigen Vögeln gesucht ib. der Roßkastanie sind zur Zeit der Brunst ein Futter der Hirsche 94. des Schlehdorns werden roh und gedörrt, mit Zucker oder Senff eingemacht genossen 135. des Kirschbaums, locken Amseln und andre Singvögel an 40. dienen gedörrt zur Winterspeise 141. der deutschen Traubenkirsche werden in Lappland und Kamtschatka mit Salz und Brandwein geessen 148. des Holzbirnbaums geben, wenn sie teig geworden eine Speise für den Landmann 169. der Eiche, ihr Gebrauch 269. 274. des Walnußbaums, ihr Gebrauch; unreife werden eingemacht; mit Weingeist infundirt geben sie das Rußwasser 287. 288. des Cornelbaums, sind verstopfend; werden eingemacht 441.
- Fußböden von Kiefern 314. von Weißpappelholz 380. parketirte, von Wachholder 469.
- Fütterung für Geflügel geben die Birkenknospen 251.
- Futter für Kühe und Schaafe giebt



giebt das Laub des Faulbaums [56](#). Erlenlaub [259](#). für Rindvieh, Schweine und Geflügel, Mark der Rothbuchenfrüchte 300. für Kühe und Schaafe [452](#). für Seidenraupen [447](#). [449](#). für Kühe, Schaafe, Ziegen, Eichenlaub [456](#).

## G.

Gabelstiele von Kastanienbaumholz [306](#).

Gartenwände von Acacienbäumen [239](#).

Gefäße, allerhand von Espenholz [386](#).

Gelbe Beize zu Holzwaaren aus der Lauge der Saurachwurzel [120](#).

Gelbe Farbe auf Saffian und Wolle von der innern Rinde des Saurachs [120](#).

Gelbsucht, darwider dienen die Knospen der Birke [251](#).

Geleer von Himbeeren [213](#).

Geräthschaften, kleine, von der Krumholzkiefer [318](#).

Gerben, die dazu anwendbaren Holzarten und Theile derselben, Sumpsheidelbeere [98](#).

Heide [104](#). Kiehnpost [113](#).

Bärenbeere [117](#) Wurzeln und Früchte vom Schlehdorn [135](#).

Früchte, Rinde, Zweige und Laub von der deutschen Mispel [153](#). unreife Früchte des Vogelbeerbaums [173](#). Hei-

delbeere [218](#). Besenpfrieme [222](#). Rinde von der deutschen Tamariske [230](#). Eichenägs-

späne [268](#). Rinde von der Ei-

cheib. und [274](#). [275](#). von der Rothbuche [298](#). vom Kastanienbaum [303](#). weisse Fichte [337](#). Myrica [363](#). Hirschholbensumach [364](#). Peruckensumach [375](#). Rinde vom rauhen Werst [413](#). vom Sandwerst [422](#). von der weissen Weide [430](#). von der Esche [457](#).

Gesetze sollten nach Plato auf Tafeln von Cypreßholz geschrieben werden, um ihnen eine ewige Dauer zu geben [353](#).

Gerränke, gesundes aus den Früchten der virgin. Traubenkirsche [150](#). kühlendes von Holzäpfeln [188](#) weinartiges aus den Himbeeren [213](#). koffeeartiges von Eicheln [269](#). weinartiges aus den Cornelkirschen [441](#).

Gewehrshäfte vom Holz der deutschen Traubenkirsche [148](#). des Vogelbeerbaums [173](#). Maßholders [469](#). Zuckerahorns [473](#).

Gewürz geben die Knospen und zarten Blättern des Walnussbaums [287](#).

Gicht, ein Mittel dagegen, Blätter der Hülse [477](#).

Giftige Ausdünstungen des Firnis Sumachs [368](#).

Giftige Eigenschaften des Larus [405](#). [407](#). [408](#). [409](#).

Ginstkappern [222](#).

Grüne Farbe, verlohren gegangene der Seide und Wolle wieder zu geben [249](#).

Gummi vom Kirschbaum [141](#).

K f [5](#)

Haar-



**H.**

- Haarfeile von der Rinde des Kellerhalses [108](#).  
Hagedorn in Bisthum Basel von der Höhe eines großen Birnbaums [157](#).  
Hammerwellen von der Kiefer [314](#).  
Hammerstiele von Cornelbaumholz [173](#). Mehlbirnbaumh. [179](#).  
Handgriffe vom Vogelbeerbaum [137](#). Mehlbirnbaum [179](#).  
Handschlitten von Rothbuchenholz [299](#).  
Handwerkzeug vom Stammholz des Hagedorns [158](#). von Hornbaum [278](#).  
Hanfartige Zubereitung aus den Zweigen der weissen Maulbeere [447](#).  
Harz, copaibabalsamähnliches in den jungen Reißern der Birke [252](#). von der Fichte [332](#). Libanonceder [352](#). Enpressen [353](#).  
Harzseife, zum Bleichen dienliche [249](#).  
Haselbäume von besondrer Größe [283](#) [284](#).  
Haßgeräthe allerhand von Zwetschgenbaumholz [138](#). von Holz der deutschen Traubenkirsche [148](#). des Elsbeerbaums [177](#). des Laburnen Eytisus [233](#). Acacienbaums [239](#).  
Hebel von Hornbaumholz [278](#).  
Hecken, dazu dienliche Holzarten, Rainweide [48](#). gem. Heckenkirsche [52](#) Schneeballens-  
strauch [81](#). Schlehdorn [134](#).  
Mahalebkirsche [145](#). Hagedorn [158](#). Scharlach Hagedorn [160](#). Glanzmispel [163](#). rundblättrige Mispel [164](#). Glasapfel [191](#). Acacienbaum [240](#). Hornbaum [279](#). [280](#). Haselstrauch [282](#). Ebenbaum [396](#). Bachweide [424](#). [437](#). dreifadige Weide; brauner Berst [137](#). Cornelbaum [441](#). Kreuzdorn [444](#). Alpen-Johannisbeere [453](#). Esche [457](#). Maßholder [469](#). Hülse [479](#).  
Himbeergeist; Himbeer-Meth; Himbeersaft; Himbeerwasser [213](#).  
Hirsche lieben die Früchte des Kastanienbaums [303](#).  
Hobel von Vogelbeerbaum [173](#). Mehlbirnbaum [179](#). Holzapfelbaumholz [189](#).  
Holländerholz giebt die Kiefer [314](#).  
Holzarten, Bedeutung dieses Worts im botanischen Sinne [2](#).  
Holzkunde, was sie ist. [1](#).  
Holzschneider bedienen sich des Holzbirnbaumholzes [169](#).  
Holzschuhe von Erlen [259](#). von Rothbuchenholz [299](#).  
Honigstoff enthalten die Blüten der Rainweide [48](#). der gem. Heckenkirsche [52](#). des Faulbaums [56](#). des Schneeballensbaums [81](#). des Roskastanienbaums [95](#). der Heide [104](#). des Holzapfelbaums [189](#).  
Hopfenbäume geben der Korkrüster [72](#). die Linde [122](#) der Be-



Bogelbeerbaum [172.](#) die Käse für Maden zu bewahren  
 i Birke [245.](#) Hornbaum [279.](#) 251. werden mit Rinden von  
 der Kastanienbaum [303.](#) Schlehdorn aufbewahrt [135.](#)  
 Hüften werden getrocknet; ein- Kästchen von Mahalebirschen-  
 gemacht [208.](#) holz [145.](#)  
 Hüte zu denen Pappelwolle mit Kammräder von Horubaum-  
 angewendet wird [384.](#) Saa- holz [278.](#)  
 menwolle der weissen Weide Rannen von Ahornholz [463.](#)  
[430.](#) Kappen eigentliche, um Hof-  
 Hundsfrosenstock von besonderer heim im Mannzischen [87.](#)  
 Größe [52.](#) statt derselben werden ges-  
 braucht, eingemachte unreife  
 Hollunderbeere, Früchte der  
 grossen Kapuziner = Blume  
 (Trop. maj.) Blumenknospen  
 der Psilome (Spart. scop.) ib.

### J.

Jagdspiese vom Holz der deut-  
 schen Nessel [153.](#)  
 Insekten vertreibt das Laub  
 vom Walnußbaum [286.](#)  
 Instrumente von Laburnumcorti-  
 sus [233.](#) mechanische, von der  
 Hülse [477.](#) musikalische,  
 Weistranne [342.](#) Ahorn [463.](#)  
 physikalische, Esche [456.](#)  
 Instrumentenmacher bedienen  
 sich des Holzes vom Kork-  
 rüster [72.](#) Kirschbaume [141.](#)  
 von der Kiefer [314.](#) vom  
 Larus [406.](#)  
 Joche, hierzu taugliches Holz  
 Birken [247.](#) Rothbuchen  
[249.](#)  
 Zuchten, Dehl zu dessen Zube-  
 reitung [250.](#) Zubereitung  
 desselben mit der Rinde des  
 Sandwerffs [422.](#)  
 Zulepp von Himbeeren [213.](#)

### K.

Kähne vom Holz der Kiefer  
[314.](#) der Thujaachpreße [355.](#)  
 der weissen Weide [430.](#)

Käse für Maden zu bewahren  
 251. werden mit Rinden von  
 Schlehdorn aufbewahrt [135.](#)  
 Kästchen von Mahalebirschen-  
 holz [145.](#)  
 Kammräder von Horubaum-  
 holz [278.](#)  
 Rannen von Ahornholz [463.](#)  
 Kappen eigentliche, um Hof-  
 heim im Mannzischen [87.](#)  
 statt derselben werden ges-  
 braucht, eingemachte unreife  
 Hollunderbeere, Früchte der  
 grossen Kapuziner = Blume  
 (Trop. maj.) Blumenknospen  
 der Psilome (Spart. scop.) ib.  
 Kastanien, ihr Gebrauch [303.](#)  
[305.](#) [306.](#)  
 Rehrbesen von der Heide [104.](#)  
 Kestern von Rothbuchenholz  
[299.](#)  
 Kiele von der Kiefer [314.](#)  
 Kiendhl giebt die Kiefer [314.](#)  
 Kirschgess von der virgin. Trau-  
 benkirsche [150.](#)  
 Knoppem [268.](#)  
 Knospen der Birke sind eine Ne-  
 sung der Wirthener [251.](#)  
 Fütterung für Geflügel; die-  
 nen in der Gelbsucht ib.  
 Körbe, siehe Korbmacherarbeit.  
 Kohlen, vorzügliche geben die  
 Rüster [73.](#) der Acacienbaum  
[239.](#) die Birke [254.](#) Erle  
[259.](#) der Hornbaum [278.](#)  
 Höckerybaum [295.](#) die Roth-  
 buche [299.](#) Fichte [331.](#) weisse  
 Fichte [337.](#) der Lerch nbaum  
[348.](#) die Esche [456.](#) der  
 scharlachrothe Ahorn [472.](#)  
 Zuckerahorn [473.](#)  
 Korbmacherarbeit, dazu tanga-  
 liche



- liche Holzarten, Rainweide 48. Walldrebe 131. Birke 247. Pyramidenpappel 385. rauher Werfft 413. Sandwerfft 422. Goldweide 428. 437. Korbweide; dreyfadiger Sandwerfft 437. Kriesswasser, aus den Früchten des Kirschbaums abgezogen 141. Krumholzdahl 318. Kübel von Hornbaumholz 278. Kummeter; Kummethölzer von Hornbaum, 278. Rothbuschenholz 299. Kutschenbäume, giebt der Korkruster 71. die Esche 455. Lehne 467.
- L.
- Ladestöcke von amerikan. Bürgelbaum 359. Maßholder 469. Läuse tödtet das Pulver von den Früchten des gestielten Spindelbaums 59. der Thiere, vertreibt der Absud der Riehnpostzweige 43. Laub des Traubenhollunders wird von den Hirschen gesucht 90. von Eichen, ist dem Rindvieh schädlich 269 von der Rothbuche, dient zu Ausfüllung der Bettsäcke 299. vom Ahorn, ist ein gutes Schaaßfutter 462. Laubwerck von Lindenholtz 123. Laugensalz, scharfes enthält die Asche vom Ulmenholz 73. Lauten von Ahornh. 463. Lavetten von Hornbaumholz 278.
- Leisten von Erlenholz 259. Leitern, kleine, von Eschenholz 455. Liqueur, diuretischer aus den Knospen der Takamahakpappel 388. Löffel von Maserbirken = 248. Pyramidenpappel = 385. Ahornholz 463. Löffelfabrik, ansehnliche 463. Lohballen 268. Lucienholz 145. 148. 150. Lustgärten; Lustgebüsch; Lustpflanzungen; Lustwaldungen, dahin schickliche Holzarten, Tulpenbaum 129. Scharlachhagedorn 161. deutsche Tamariske 231. Laburnencotissus 233. Seekreuzdorn 361. Peruchensumach 375. dreyflachelichte Gleditschie 379. Larus 404. Hülse 479. 480. 481. 482.
- M.
- Magalep - oder Morgalepsamen 145. Maschinen, dazu wird gebraucht Stammholz vom Hagedorn 159. Holz vom Mehlbirnbaum 179. der Birke 247. Maserholz giebt die Weispappel 380. Maßstäbe von Hollunder = 87. Zwetschgenbaumholz 138. Mast für allerhand Vieh, Roßkastanien 94. Elsbeere 177. Mehlbirn 179. Holzäpfel 188. Haselnüsse 282. Eicheln 269. Mastbäume giebt die Kiefer 314.



- 314.** Fichte 331. Pyramidenpappel **385.**  
 Matten von der Saamenwolle der weissen Weide **430.**  
 Manwachs der Fichte **327.**  
 Mechaniker bedienen sich des Holzes vom Korkrüster **72.** Elsbeerbaum **177.** Mehlbirnbaum **180.** Laburnumcytissus **233.**  
 Mehl aus dem Marke der Rothbuchenfrüchte **300.**  
 Meißerhefte von Mahalebirschenholz **145.**  
 Meiß von Birkenascht **251.**  
 Methodenlehre, dendrographische **42.**  
 Milchbutten von Birkenholz **247.**  
 Mist mit Heide zubereitet **103.**  
 Mistbeete, dazu dienet Eichen-gerberlohe **268.**  
 Morgalepsaamen **145.**  
 Most aus Holzbirnen **169.**  
 Motten von Kleidern und Zeu-chen abzuhalten dienet Myrris-aholz **362.**  
 Mühlbau = und Geräthholz, Korkrüster **71.** Elsbeerbaum **177.** Eiche **267.** Buche **299.** Lerchenbaum **348.**  
 Mulden von Birken = **247.** Er-len = **259.** Pyramidenpappel-**385.** weissen Weiden = **430.** Eichen = **455.** und Ahornholz **463.**  
 Mundfäule, in derselben dienet die innre Rinde des Saurachs **120.**  
 Mundleim aus den auf den Blättern des Korkrüsters be-sindlichen Blasen **72.**
- Mus von Hollunderbeeren **87.**  
 Saurachbeeren **120.** Hüßten **208.**
- N.**
- Naben von Korkrüster = **71.**  
 Ahornholze **463.**  
 Nachen aus der äußern Rinde der Hornbaumbirke **254.**  
 Nägel zu Mühlrädern von Bos-gelbeerbaumholz **173.** Nägel vom Cornelbaum **441.**  
 Naturgeschichte der Holzarten, allgemeine oder theoretische **7.**  
 Nutz- und Werkholz, Horn-baumbirke **254.** spitzblättrige Birke **256.**
- O.**
- Oehl aus den Kernen des ge-stielten Spindelbaums **59.** von Roskastanien **92.** von Lindensaamen **124.** Hasel-nüssen **282.** Wallnuskernen **288.** Höckernüssen **295.** den Früchten der Rothbuche **300.** aus den Saamenkernen des Hartriegels **443.**  
 Oehl aus dem Riehnpostholze zur Zubereitung des Suchten **113.**  
 Oehlstampfen, taugliches Holz dazu, Hornbaum **278.** Roth-buche **299.** Ahorn **463.**  
 Oekonomie der Holzarten **37.**  
 Oleum rusci s. *betulae* **250.**  
 Orgelbauer bedienen sich des Kiefern- **314.** Fichtenholzes **331.**  
 Orgelpfeifen vom Holz des ge-stielten Spindelbaums **59.**

Pallio



## P.

Pallisaden von Eichen = [267](#).  
 Schwarzpappelholz [383](#).  
 Papier aus der Saamenwolle  
 der gem. Baldrebe [131](#).  
 Pech giebt die Kiefer [314](#) Weh-  
 rauchkiefer [322](#).  
 Peitschenstiele vom deutschen  
 Mispel = [153](#). amerikanischen  
 Zürgelbaum [359](#). Maßholz  
 der [469](#).  
 Pfeiffenköpfe von Naserbirken-  
 holz [248](#).  
 Pfeiffenröhre giebt der Schnee-  
 ballenstrauch [81](#). Schling-  
 strauch [84](#).  
 Pfeile von den Stacheln der  
 dreystachelichten Gleditschie  
[379](#).  
 Pferdfütterung von zerquetsch-  
 ten Zweigen des Stechgin-  
 sters [236](#).  
 Pflanzungen, Holzarten für die-  
 selben Cercis [110](#). Holländi-  
 sche Ulme [77](#). Linde [121](#).  
 Pflüge von Eschen = [455](#). von  
 Lehnholz [467](#).  
 Pfosten giebt die Kiefer [314](#).  
 Phaenogamia [2](#).  
 Physik der Holzarten [22](#).  
 Picasse; Piquette. Holzäpfel-  
 saft [188](#).  
 Pipen für Weins und Bierfässer  
[406](#).  
 Piquen von Eschenbaumholz  
[455](#).  
 Pirschpulver von Kohlen von  
 dem Brombeerstrauch [215](#).  
 Preußelbeermus; Preußelbeers-  
 wasser [101](#).  
 Puder vom Mark der Rothbu-  
 schenfrüchte [300](#).

Pumpen, hiezu taugt Korkrü-  
 ster [71](#).

Punsch zu welchen Moosheidels-  
 beere genommen werden [99](#).

## Q.

Queues zu Billards von Ahorn-  
 holze [463](#).

## R.

Radkämme; Radzähne, dazu  
 taugliches Holz, Stammholz  
 des Hagedorns [158](#). Holz-  
 birnbaum [169](#). Vogelbeers-  
 baum [173](#). Mehlbirnbaum  
[179](#). Holzapfelbaum [189](#).  
 Birke [241](#). amerikan. Zür-  
 gelbaum [359](#). Corneliaum  
[441](#). Hartriegel [443](#). Eschen  
[455](#). Ahorn [463](#).

Räder von Mehlbirnbaumholz  
[179](#).

Raquettenstöcke vom Holzbirns-  
 baum [169](#).

Rauchtoback geben die Blätter  
 der Bärenbeere einen ange-  
 nehmen Geruch und Ge-  
 schmack [117](#). auch bekommt  
 er von der Rinde des Kirsch-  
 baums einen angenehmen  
 Geruch [141](#).

Rebhüner suchen die Besenpfrie-  
 me bey tiefen Schnee auf [221](#).

Rechenzähne aus dem Holze der  
 gem. Heckenkirsche [52](#).

Reif; oder Straabholz, Korkrü-  
 ster [72](#). Schlingstrauch [83](#).  
 Vogelkirschbaum [140](#). deut-  
 sche Traubenkirsche [148](#). Bir-  
 ke [248](#). Eiche [267](#). Hasel-  
 strauch [282](#). Kastanienbaum  
[303](#). Kiefer [314](#). Krummholz-  
 kie



- Kiefer 318. rauher Werfft 413. Korbwerfft 419. weisse Weide 430. Hartriegel 443. Esche 456.  
 Reifgen und Bänder zu Trinkgeschirren und kleinen Fäßgen von der Ilfranke 54. gem. Baldrebe 131.  
 Reißbretter von Weispappelholz 380.  
 Reißkohlen s. Zeichenkohlen.  
 Reitgerten vom Schlingstrauch 83.  
 Rinde des Roßkastanienbaums besitzt Heilkräfte 95. des deutschen Traubenkirschbaums 148. und der deutschen Tamariske desgleichen 231. der Birke, ihr Gebrauch 249. 250. von weissen Wallnußbaum, Extract derselben giebt ein abführendes Mittel 293. der Bruchweide, besitzt Heilkräfte 432. der Lorbeerweide, desgleichen 435.  
 Röhren von Weisstannen = 342. von Lerchenbaumholz 348.  
 Rollen von Hornbaum = 278. Rothbuchen = 299. amerikan. Zürgelbaum 359. Ahornholz 463.  
 Roob nucum juglandum 287.  
 Rosenkränze von den Saamen der Pimpernuß 92.  
 Rosenwasser; Rosenhonig; Rosenconserve; Rosendhl; Rosenschwämme 196.  
 Ruder von Rothbuchen 299.  
 Ruß von der Pirke 249.  
 S.  
 Saamenwolle der Bruchweide läßt sich spinnen, 435.  
 Sägeblöcke von Erlen 299. Kiefernholz 314.  
 Sattel; Sattelhölzer von Hornbaum = 278. Rothbuchenholz 299.  
 Saffian gelb zu färben dienet die innere Rinde des Saurachs 120.  
 Saft der Saurachbeere, dessen Gebrauch 120. brennender, der gem. Baldrebe 131. der Birke, ein blutreinigendes Mittel 251. corrosiver des wurzelschlagenden Sumachs 370. des Gifsumachs, zeigt verdächtige Eigenschaften 372.  
 Saftgrün 445.  
 Salat von den Blumen der canad. Cercis 111. von Blättern des Saurachs 120.  
 Salinen, dazu anwendbares Holz, Lerchenbaum 348.  
 Saurach giebt der Wacholder 393.  
 Sattelbäume von Eschenholz 455.  
 Schachspiele von Weispappelholz 380.  
 Schachteln, aus der Rinde der Linde 123. von Platanus 308. Weisstannen Holz 342.  
 Schaafte nähren sich von den Keimen der Heide 104. lieben das Laub der Bruchweide 435.  
 Schaafen sind die Roßkastanien dienlich 95. ingleichen der Absud des Ephen Laubs bei schweren Geburten 68. ist die Andromede schädlich 115.  
 Schaaffutter, Laub der Birke 251.



251. der Erle 259. des  
 Ahorns 462.  
 Schaalen von Maserbirke 248.  
 Schaufeln von Erlen: 259.  
 Pyramidenpappelnholz 385.  
 Scheiden, Degen: Messer: da-  
 zu ist Rothbuchenholz an-  
 wendbar 299.  
 Scheffel von Espenholz 386.  
 Schienen von Korkrüster 71.  
 Schießpulver, gutes geben die  
 Kohlen von der Rainweide  
49. vom Faulbaum 56. der  
 Linde 123. des Haselnuß-  
 strauchs 282. der Espe 386.  
 des rauhen Werffis 413.  
 Schiffbauholz, Korkrüster 71.  
 Krummholzkiefer 318. Wey-  
 mouthskiefer 323. weisse Fich-  
 te 337. Weistanne 342. Ler-  
 chenbaum 348. Thujach-  
 presse 355. zweizeilige Cy-  
 presse 356. virgin. Wachol-  
 der 400.  
 Schindeln giebt das Thujaholz  
 310. die Thujachpresse 355.  
 zweizeilige Cypresse 356.  
 Schirrholz von der Rainweide  
48. Stammholz vom Hage-  
 dorn 159. Rothbuchen 299.  
 Maßholder 469.  
 Schlafäpfel 208.  
 Schlingen und Haarseile für das  
 Vieh vom Schlingstrauch 83.  
 Schlittenkufen giebt der Holz-  
 äpfelbaum 189. die Birke  
247. Eiche 267. Esche 455.  
 der Ahorn 463.  
 Schränke, dazu taugliches Holz  
 Korkrüster 72. Weispappel  
 380.  
 Schrauben und Pressen von Bo-  
 gelbeerbaum: 173. Elsbeer-  
 baum: 177. Mehlbirnbaum:  
179. Hornbaum: 278. Roth-  
 buchenholz 299.  
 Schreinerarbeiten, feine, von  
 Hirschfolbensumachholz 364.  
 vom Wacholderholze 394.  
 Schreiner s. Tischler  
 Schüsseln von Korkrüster 72.  
 Schüttgelb 226. 251.  
 Schüttgrün 251.  
 Schuhabsätze von Erlen: 259.  
 von Rothbuchenholz 299.  
 Schuhzwecke von Rainweiden  
48. gestielten Spindelbaum:  
59. Schneeballenbaumholze  
81.  
 Schwarzfärben mit dem Holze  
 der Hydromede 115 mit Bä-  
 renbeeren 117. mit Reispig  
 und Laub des Mehlbirn-  
 baums 179. mit Erlenrinden  
259. mit Beeren des Hirsch-  
 folbensumachs 364. mit Ei-  
 chenspänen 267.  
 Schwarzfärbende Eigenschaften  
 des Giftsumach 372.  
 Schweinmast geben die Früchte  
 des Hagedorns 158. des Holz-  
 birnbaums 169. schwarzen  
 Walnuß: 292. Butternuß:  
293. Hückernußbaums 295.  
 der Rothbuche 299. 300. des  
 Kastanienbaums 303. 305.  
306.  
 Schwellen von Weymouthskie-  
 ferholz 323.  
 Schwindeschucht, in derselben ist  
 die Rinde des Schlehdorns  
 dienlich 135.  
 Seidenraupen, Futter derselben  
447. 449.



- Seife, zu wohlriechender wird das Mahalebkirchenwasser gebraucht [145](#).
- Seifenartige Eigenschaften geben die Früchte der Rößkastanie dem Wasser [95](#).
- Selze offic. aus Hollunderbeeren [87](#).
- Siebmacher bedienen sich des Holzes der Birke [247](#). des rauhen Wersts [413](#).
- Siebränder giebt die Weistanne [342](#).
- Silber weiß zu fieden mit Moosheidelbeeren [99](#).
- Singabgel gehen den Früchten des Kirschenbaums [140](#). und der deutschen Kirsche nach [147](#).
- Sohlenhölzer von Eichenbretchen [267](#).
- Spaden von Rothbuchenholz [299](#).
- Spazierstöcke giebt der Saurach [120](#). Hagedorn [158](#). Vogelbeerbaum [173](#). Walnußbaum [286](#). amerik. Zürgelbaum [359](#).
- Speichen von Cornelbaumholz [441](#). von Hartriegelholz [443](#).
- Speiler für die Schlächter von Hartriegelholz [443](#).
- Spiegelbreiter von Rothbuchenholz [299](#).
- Spiegelrahmen von Zwetschgenbaumholz [138](#).
- Spieße vom Vogelbeerbaum [173](#).
- Spinden von Erlen [259](#). von Eschenholz [456](#).
- Spindeln giebt das Holz des gestielten Spindelbaums [59](#). Vogelbeerbaums [173](#). Elsbeerbaums [177](#). Mehlbirnbaums [179](#).
- Epiunhütten für Seidenraupen von der Heide [104](#). vom Sandwerst [422](#).
- Spinnräder; Spinn- und zwirnmaschinen von Hollunder [87](#). Zwetschgenbaum [138](#). Pyraamidenpappel [385](#). Esphenholz [386](#).
- Spiritus rubi idaci [213](#).
- Spondons von Eschenholz [455](#).
- Spongia Sambuci [87](#).
- Spruce von der weissen Fichte [338](#). schwarzen Fichte [340](#).
- Staabhölzer, geben die Kiefer [314](#). weisse Fichte [337](#). Thuja [355](#). jacypresse [355](#). zweizeilige Cypresse [356](#).
- Stärke aus dem Mark der Rothbuchenfrüchte [300](#).
- Statuen von Lindenholz [123](#).
- Stiele giebt das Stammholz des Hagedorns [158](#).
- Stockendpfte von Kreuzdornholz [444](#).
- Sidpsel vom Marke der Schwarzpappel. [383](#).
- Straßendämme mit Pappeln besetzt. [380](#).
- Sireu giebt das Wa. nußlaub [286](#).
- Stühle von Birken [247](#). Rothbuchen [299](#). Pyramidenpappel [385](#). Ahornholz [463](#).
- Succus rubi idaci [213](#).
- Synonymie der Holzarten [3](#).

E.

Tabakähnliches Produkt aus den Blättern des Hirschholbensumachs [364](#).

L I

Tabak:



- Tabakspfeiffe von Kreuzdornholz 444.  
 Tabakspfeiffenröhre geben die Zweige der gemeinen Heckenfirsche 52. des Saurachs 120. der deutschen Traubenfirsche 148. des Hartriegels 443.  
 Tafelungen von Pyramidenpappel 385. virginischen Wacholderholz 400.  
 Teller von Korkrüster 72. Rothbuchen 299. Pyramidenpappel 385. Espen 386. Ahornholze 463.  
 Terminologie, botanische 3.  
 Terpentin von der Weyrauchkieser 322. Weymouthskieser 324. weissen Fichte 337. Weisstanne 343. zweizeiligen Enpreße 356. venetianischer vom Lerchenbaum 348.  
 Thee von den Blättern der Preußelbeere 101. des Schlehdorns 135. des Hundrosenstrauchs 208. von den Spitzen der Zweige der deutschen Tamariske 231. von den Blättern des Cornelbaums 441.  
 Theer giebt die Kiefer 314. Weyrauchkieser 322.  
 Theerkuden von Erlenholz 259.  
 Thor Säulen giebt das Eichenholz 267.  
 Tinte aus den Früchten des Schlehdorns 135. hochrothe aus Saurachbeeren 120.  
 Tischblätter giebt das Kiefernholz 314.  
 Tische von Korkrüster 72. Eschen 456. Ahornholze 463.  
 Tischler Arbeiten, vorzüglich dazu taugende Holzarten, Roßkastanie 96. Cercis 110 111. Mahalebirsche 145. deutsche Traubenfirsche 148. Elsbeere 177. Mehlbirnbaum 179. Holzapfelbaum 189. Maserbirke 248. Eiche 267. Hornbaum 278. Walnußbaum 286. 292. Kastanienbaum 303. Kiefer 314. Weisstanne 342. Fichte 331. Enpreße 353. Weispappel 380. virginischer Wacholder 400. weisser Maulbeerbaum 442. Ahorn 463. Silberahorn 471. Hülse 477.  
 Toiletten von Mahalebirschenholz 145.  
 Tollerhundsbiß, Mittel dagegen vom Larusholz 406.  
 Troff, dessen Vermehrung durch die Wurzeln der Andromede. 115.  
 Tröge von Eschenholz 455. für Dehl- und Pappiermühlen von Eichenholz 267.  
 Trockniß der Fichte 328.  
 Turrtrauben lieben die Beere der Hülse 477.

## U.

- Ufer, zu deren Befestigung dient die Korbweide 436.  
 Ungarischer Balsam 318.

## V.

- Vertäfelungen von Mahalebirschenholz 145.  
 Viehstreu von Heide 103.  
 Vignettenstecher bedienen sich des Holzes vom Holzbirnbaum 169.

Violette



Violette Mahlerfarbe [49](#).

Violenen, dazu taugliches Holz vom Ahorn [463](#).

Vögel suchen die Früchte des Kirschbaums [141](#). die Elsbeere [177](#). Heidelbeere [219](#).

Vogelleim von der Rinde des Schlingstrauchs [84](#). vom Mistel [452](#). aus der Rinde der Hülse [478](#).

### W.

Wachstoff für Bienen in den Blüten der Hülse [477](#).

Wäschmangeln von Ahornholz [463](#).

Wagenbäume, dazu taugliches Holz, amerikanischer Zürgelbaum [359](#). Esche [455](#). Lehne [467](#).

Wagenkörbe aus der Borke der Linde [123](#).

Wagnerarbeit, dazu schickliches Holz, Korkrüster [71](#). Mehlbirnbaum [180](#). Birke [247](#). [248](#). Hornbaum [278](#). Hölzernbaum [295](#). Rothbuche [299](#).

Waldgärten (Parks) dahin taugt deutsche Traubenkirsche [147](#).

Walddogel suchen die Früchte der Hefenkirsche auf [52](#).

Waldzäune von Schlingstrauch [83](#).

Walzen von Vogelbeerbaum: [173](#). Elsbeerbaum: [177](#). Hornbaum: [278](#). Ahornholz [463](#).

Wanzen vertreiben die frisch. u. Zweige des Kieknopfs [113](#).

Wasser, abgezogenes aus den Hollunderblüten [86](#). wohlriechendes, aus den Blüten

der Preußelbeere [101](#). von Schlehdornblüten [135](#). wohlriechendes, von den Saamensteinen, Blüten und Blättern der Mahalebkirsche [145](#). aus der Rinde des wilden Vogelbaums [172](#).

Wasserbau, dazu brauchbares Holz, steigende Alfranke [54](#). Schwarzerle [258](#). Eiche [267](#).

Wassereymer von Rothbuchenholz. [299](#).

Wassersucht, in derselben dienen die äußere Rinde des Sau-rachs [120](#). Trank von Liedenholz [123](#).

Weberkämme aus dem Holze der gemeinen Hefenkirsche [52](#). des Elsbeerbaums [177](#).

Weberspuhlen von Mehlbirnbaumholz [179](#).

Wechselfieber, in demselben wird statt der China gegeben Rinde vom Schlehdorn [135](#). vom Kirschbaum [141](#).

Wehrnan, taugliches Holz für denselben, Korkrüster [71](#).

Wein, mit den Beeren der Rainweide gefärbt [49](#). aus den Beeren des weissen Hollunders [87](#). mit Hollunderbeeren gefärbt [87](#). aus den Früchten des Bocksbbeerstrauchs [216](#). Läuterung desselben durch Rothbuchenspäne [299](#).

Weinartiges Getränk aus den Früchten des Schlehdorns [136](#).

Weine, Färbung derselben mit Brombeeren [215](#). Heidelbeeren [219](#). zähe, deren Verbesserung mit Schlehdornfrüchten [136](#).



Weinfässer von Lerchenbaumholz 348.

Weinpfähle gegen der Korkrüster 72. Mahalebkirichenbaum

145. Acacienbaum 239. Kastanienbaum 303.

Weißböttcher bedienen sich des Fichtenholzes 331.

Weißbäume von Mehlbirnbaum 179.

Wellen für Mühlen und Hammerwerke von der Eiche 267.

Werk- und Nutzholz, Hornbaum- birke 254. spitzblättrige Bir-

ke 256. amerikanische Kastanie 305.

Werk- und Staabholz, Weymouthskiefer 323.

Werkzeuge giebt das Höckery- baumholz. 425.

Werkholz, Scheermesser abzu- ziehen, Hülse 477.

Wieden zum Wellenbinden vom Schlingstrauch 83.

Wildäsung, Saurach- Früchte 120. Kirschen 141. Früchte

des Hagedorns 158. Holz- äpfel 188. Knospen und

Blätter der Espe 387.

Wild, suchet die Besenpfrieme bey tiefen Schnee auf 221.

Wolle, rothe Farbe auf diesel- be von Schlehdornrinde 135.

Würmer, wider sie werden die abfallenden Blütenkäzchen

vom Wallnußbaum gebraucht 287.

Wundöhl aus Birkenreißern 251.

Wurff- und Kornschauffeln von Rothbuchenholz 299.

### Z.

Zaunpfähle vom rothen Maul- beerbaum 449.

Zeichenköhlen vom Holze des ge- stielten Spindelbaums 59.

der Linde 123. des Hasel- strauchs 282.

Zuber vom Holz der Thuiach- presse 355.

Zucker aus der Hornbaum- birke 254. aus den Safte des

Höckerybaums 295. aus der Lehne 467. vom Zuckerahorn

473.

Zwecken s. Schuhzwecken.

Zweige vom weissen Maulbeers- baum wie Hauff zu bereitet

447.

Zwergpfeiffen von den Zweigen des Elsbeerbaums 177.



## Verbesserungen.

|    |     |    |    |      |             |       |               |
|----|-----|----|----|------|-------------|-------|---------------|
| 6. | 4   | 3. | 20 | ließ | Haub        | statt | Haub.         |
| —  | 68  | —  | 31 | —    | Parls       | —     | Paris.        |
| —  | 139 | —  | 3  | —    | Cerisier    | —     | Merisier.     |
| —  | 142 | —  | 6  | —    | Cherry      | —     | Chorry.       |
| —  | 145 | —  | 19 | —    | Lucienholz  | —     | Bucienholz.   |
| —  | 257 | —  | 3  | —    | Schwarzerle | —     | Schwarzeiche. |
| —  | 475 | —  | 11 | —    | Holly       | —     | Hally.        |

100

| Year | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1911 | 12   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 1912 | 12   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 1913 | 12   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 1914 | 12   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 1915 | 12   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 1916 | 12   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 1917 | 12   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |















